





*Thesaurus*

THE  
ABNER WELLBORN CALHOUN  
MEDICAL LIBRARY  
1923



CLASS

*R*

BOOK

*V. 3*

PRESENTED BY

*Dr. Waldo Moore*

Ed. Taylor

Sid. C. Martin M. D.



Handwritten text, possibly a signature or name, in dark ink, appearing as a series of connected, stylized characters.

# THESAURUS MEDICUS

EDINBURGENSIS NOVUS:

S I V E,

DISSERTATIONUM

IN ACADEMIA EDINENSI,

AD REM MEDICAM PERTINENTIUM,

AB ANNO 1759 AD ANNUM 1785,

D E L E C T U S,

AB ILLUSTRIBUS

SOCIETATE REGIA MEDICA EDINENSI

HABITUS.

---

T O M U S I.

---

EDINBURGI & LONDINI,

Apud C. ELLIOT & G. ROBINSON;

*Dublino*, apud G. GILBERT; *Parisiis*, apud P. T. BARROIS;

*Viennæ & Lipsiæ*, apud RUDOLPHUM GRAEFFER.

---

M,DCC,LXXXV.





# THESAURUS MEDICUS:

S I V E,

DISPUTATIONUM,

IN ACADEMIA EDINENSI,

AD REM MEDICAM PERTINENTIUM,

A COLLEGIO INSTITUTO AD HOC USQUE TEMPUS,

D E L E C T U S,

AB ILLUSTRIBUS

SOCIETATE REGIA MEDICA EDINENSI

HABITUS.

---

T O M U S   I I I .

---

EDINBURGI & LONDINI,

Apud C. ELLIOT & G. ROBINSON;

*Dublino*, apud G. GILBERT; *Parisiis*, apud P. T. BARROIS;

*Viennæ & Lipsiæ*, apud RUDOLPHUM GRAEFFER,

---

M,DCC,LXXXV.





---

## EDITOR LECTORIBUS

S.

**T**HESAURI MEDICI vulgandi consilium anno 1777 primum inii. Volumen igitur primum anno 1778, alterum 1779 fuit editum. Quae Dissertationes iis continentur, eae a viris medicinae non mediocriter peritis selectae, et postea a Professoribus hujusce Academiae illustrissimae medicis comprobatae, qui tamen delectum prius habitum aliqua ex parte mutarunt.

SUCCESSUS autem horum Voluminum prosperi votis meis ex toto responderunt; quanquam e Dissertationibus potissimum constant, quae ab anno 1726, quo Arti Hippocraticae operam sedulo navantes ad summos medicinae honores evehi primum coeperunt, ad 1759 usque editae sunt, et igitur systemati Boerhaaviano plane accommodatae. E memoria vero excidere minime debet, a viris esse conscriptas, qui ex eo tempore, in medicina et facienda et docenda versati, summam sibi famam et claritudinem merito compararunt, eoque multum doctrinae exquisitae pretiosaeque comprehendere; et insuper, quibusnam modis et medicina et philosophia medica per illud temporis spatium gradatim apud nostrates fuerint excoltae, clare evidenterque monstrare.

QUAN-

QUANTUM ad Volumina duo, quae nunc emittimus, attinet, ea optimas Dissertationum, quae tempore, quod annum 1759 inter et 1785 interfluxit, publicatae fuerunt, amplectuntur; et vel pro opere novo, vel pro eodem provectiore, cum *Tertium Quartumque* inscribantur, haberi possunt. Non tantum in conspectum dant omnes fere partium medicinae diversarum theorias, quae a Professoribus hujusce Academiae celeberrimis vel recipi vel convelli soleant; sed pleraque etiam, usum praepticum spectantia, et praeelectionibus eorundem deprompta, vel in oculis exarata, capiunt. Quanta igitur eorum utilitas futura sit, judicium penes unumquemque Lectorem esto.

Quo Volumina, quae in praesentia in vulgus edo, attentione et favore publico quam maxime digna efficerem, ad Socios *Regiae Medicae Societatis* omni laudis genere jure optimo florentissimos decucurri, et ab eis petivi, ut ex omnibus Dissertationibus praestantissimas editoque aptissimas seligerent mihiq; benevoli monstrarent. Hoc libentissime quidem fecerunt, studio nostrum medicinae promovendi et doctrinas Academicas longius latiusque diffundendi laudabili induciti. Prius triginta delegerunt; meo deinde rogatu, qui *Thesaurum Medicum* ad initium anni 1785 usque deducere non parum cupiverim, his octo alias adjiciendas curarunt. Triginta octo igitur haece duobus Voluminibus comprehenduntur; quarum pretium, si, quanta plerarumque ex his longitudo sit, quotque tabulae aeneae fuerint adjectae, vobiscum repuraveritis, satis modicum, uti spero, esse videbitur.

Hoc denique commodis horum Voluminum propriis accensendum, quod non tantum seriem nominum patriæque omnium Auctorum, quibus tempora ab anno 1726 ad 1785 laurea Apollinea fuerint reddita, sed Argumentorum etiam, quæ fuerint executi chronologicam exhibent.

VALENTE.

Ex Arta Civis Bonifacii Arbelli }  
Colonia M. 1785. }

DISSERTATIONUM, quas hocce VOLUMEN  
complectitur, ARGUMENTA.

	Pag.
<i>DE Cinchona Officinali Linnaei, sive Cortice Peruviano.</i>	
Auctore Ric. Pultney.	9
<i>De Vermibus Intestinalium.</i> —Joan. Fythe Palmer.	42
<i>De Rachitide.</i> —Joan. Mervin Nooth.	56
<i>De actione musculari.</i> —Tho. Smith.	78
<i>De Febre remittente putrida Paludum quae grassabatur in Bengalâ A. D. 1762.</i> —Jac. Lind.	116
<i>De Febris ardens discutiendisq.</i> —Alex. Monro- Drummond.	134
<i>De Elementariis Muscæ Sensationibus.</i> —Lud. Odier.	181
<i>De Cynanche stidula.</i> —Tho. Crawford.	216
<i>De Perspiratione insensibili.</i> —Jac. Hamilton.	232
<i>De Cystirrhoea.</i> —Joan. Parnham.	256
<i>Observationes Miscellaneæ, de Vinis principum.</i> —Ogle. Wainman.	269
<i>De Morbis Coeli curatione medendis.</i> —Jac. Gregory.	315
<i>De Plumbi Virtutibus medicis.</i> —Gul. Lilie.	370
<i>De Arteriarum omnium, et Venarum Partis, Irritabili- tate.</i> —Ric. Dennison.	394
<i>De Hominum Varietatibus, et harum Causis.</i> —J. Hunter.	431
<i>De Physiologia Plantarum.</i> —Geo. Bell.	471
<i>De Alimentorum Concoctione.</i> —Edw. Stevens.	469
<i>De Rabie canina.</i> —Joan. Heysham.	496



DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,  
DE CINCHONA OFFICINALI LINNAEI,  
SIVE CORTICE PERUVIANO,

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,  
Ex Auctoritate Reverendi Illustrissimi Viri,  
GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.,  
Academiae Edinburgensis Praefecti,

SECUNDUM  
Amplicius HERAULUS ACADEMICI Decretum,  
in Universitate FACULTATIS MEDICAE DOCTRINAM

PER GRADU DOCTORATUS,  
IURISQUE IN MEDICINA HONORARIUS ET PRIVILEGIIS RITE  
ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

PROBATORUM EXAMINI SUBIECIT  
RICARDUS PULTENEY, R. S. S. BRITANNUS.

Ad Dicam Matri, hora locoque solitis.

---

*Et non se efficitur ADVERTERE VIDERI  
Quodlibet etiam in oculis!*

---

1764.

---

Viro praenobili, Patrono plurimum colendo,  
HUGONI BARONI WILLOUGHBY DE PARHAM;  
Societatis Antiquariae apud Londinenses  
Praefidi dignissimo creditissimoque;  
Societatis Regalis vice Praefidi (surgenti;  
Musei Britannici & Curatorumque, &c. &c.  
Fautori egregio, eo quo par est obsequio,  
Grati animi monumentum,  
Hanc Dissertationem  
Sociam voluit.

RICARDUS PULTENEY.



## DISSERTATIO MEDICA,

DE

## CINCHONA OFFICINALI.

**D**ISSERTATIONCULAM, pro more academico, concinnaturo, materiem satis amplam praebeet Cortex Peruvianus : Medicamentum, quod Novus fert Orbis, virtute tam insigni praeditum, ut auro gemmisque jussidem practiosius longe sit aestimandum. Inter omnia auxilia, quae genti humanae furs unquam objecerit, aut diu multumque meditando extuderit labor; inter omnia, quae aegris corporibus liberaliter concesserit alma Natura: nullum, ex vegetabilium saltem regno, nullum fortasse praestidium, aliunde petitum, in hanc usque diem detectum, magis laudabilem praestitit effectum, quam hoc, de quo agitur, medicamentum; a mortalibus igitur, grato, ut decet, animo, accipiendum.

Arboris itaque primum, ex qua colligitur hoc nobile medicamentum, inquirendus et colligendus est character classicus et genericus ex systemate sexuali. Clariss. *De la Condamine*, cui volupe erat, ad incrementum scientiarum, iter suscipere arduum ac difficile Americanum, hanc arborem vidit, in Peruviano regno, solo natali lacte vegetantem. Ille, autopsya instructus, perfectissimam quam antea optimamque dedit historiam hujus et descriptionem in Actis Gallicis; e quibus character naturalis a Linnæo, in ejus Generibus Plantarum, constructus est.

## CLASSIS ET GENUS.

Secundum Systema de la Sexuali, pertinet hoc genus ad Classem Pentandriam, Ordinem Monogyniam; et his notis, sub nomine Cinchonae, ab aliis distinguitur.

## CHARACTER ESSENTIALIS.

Lin. Syst. Nat. edit. x. p. 929.

Corolla infundibuliformis: capsula infera, bilocularis, a basi dehiscens.

CHA-

## CHARACTER NATURALIS.

LIN. Gen. Plant. edit. v. N<sup>o</sup> 205.

Calix. Perianthium monophyllum, quinquefidum, minimum, persistens.

Corolla. Monopetala, infundibuliformis; tubus cylindricus, longus; limbus patulus, quinquefidus, serratus, acutus.

Stamina. Filamenta quinque minima. Antherae oblongae intra tubum corollae.

Pistillum. Germen subrotundum infra receptaculum floris. Stylus longitudine corollae. Stigma crassiusculum, oblongum, simplex.

Pericarpium. Capsula subrotunda, calyce coronata, bilocularis, a basi, versus apicem, bilariam dehiscens.

Semina, plurima, oblonga, compressa, marginata.

Obs. Flos interdum demit quintam partem numeri, in singulis partibus.

## SPECIES.

PEN seculum, et quod excurrit, unica tantum species hujus generis nobis cognita erat. Non ignoro interim, tam ex Geoffroy (a), quam ex Hoffmanni (b), aliorumque dissertationibus, corticem quendam, paucis abhinc annis, ex America allatum esse; multosque in fraudem induxisse, sub nomine Kinae Kinae Femininae. Hic tamen minori efficacia, imprimis febrifuga, multum cedit Quinquinae verae; et ad Cascarillae vel Eleutheriae genus, omnium fere auctorum suffragiis, amandatus est. At, nuperrime, Jacquinus, inter reformatores primi subtellii Botanicus, arborem in Insulis Caribaearum habitantem detexit; quae legibus, a Linnaeo institutis, Cinchonae generi suae apponi debet.

## SYNONYMA.

I. *Cinchona Officinalis* panicula brachiata. Lin. Sp. Plant. edit. 1. p. 244.

*Cinchona Officinalis*. Lin. Sp. Plant. edit. 1. p. 172. Lin. Mat. Med. N<sup>o</sup> 71. Syst. Nat. tom. 2. p. 929.

Quinquina. Geoffr. Mat. Med. tom. 2. p. 180. Condamin. M. Paris. ann. 1738. Alston. Ind. Med. Tripl.

Cortex Peruvianus, Peruanus, China Chinae, Quinquina

B 2

Officin.

(a) Geoffroy Mat. Mèdic. tom. II. p. 202.

(b) Hoffman. Dissertat. De Cortice Cascarillae, § 5. Suppl. III. par. 1. p. 706.

*Officin. Dalei Pharm. edit. 3. p. 291. Lewis Mat. Med. p. 227.*

*China Chinaz. Hoffman. suppl. ii. par. 2. Mat. Med. p. 166. Vogel. Hist. Mat. Med. p. 227.*

*Arbor febrifuga Peruviana. Rati Hist. Plant. tom. 2. p. 1796.*

*II. Cinchona Caribaea, pedunculis unifloris. Jacquin Amer. p. 26. Lin. Spici. Plant. edit. 2. p. 295.*

#### CINCHONAE OFFICINALE DESCRPTIO.

Radix lignosus, ramosus.

Caudex ascendens, arboreus, teres, erectus, ramosus, crassus sex vel octo pollices; altus (x) organa duas vel tres, cortice tridus duas aut tres lineas crasso; epidermide, in antiquiori scabro, sulco vel canescente; in juniore, laeviusculo rufescente.

Rami divaricati.

Folia petiolata, simplicia, opposita, ovato oblonga, integerrima, cuspidata, glabra, nervosa, lata duas, longa tres uncias.

Petioluli lineares, unciam dimidiam longi.

Pedunculi summos ramos terminantes, paniculati, brachiati, multiflori.

Corolla intus, colore miniam, ungue viviori, limbo pallidiori; extus, rubore squalido.

Reliqua adumbrationis & caractere naturali petenda sunt.

Lubet hic adungere hujusce arboris ramuli Iconem, ab ingeniosissimo J. Hawkeens, olim delincentem.

A, Ramulum foliis et floribus ornatum exhibet.

B, Corollam.

C, Corollae Tubum dissectum, ut in conspectum veniant Staminum Antherarumque situs et numerus.

D, Pistillum. a, Germin; b, Calycem; c, Stylum; d, Stigma.

E, Fructus. e, Capsulam, a basi versus apicem bifariam delincentem.

F, Capsulam longitudinaliter dissectam, ut semina in conspectum prodant.

G, Semina.

[F]d. PLATE I. fig. 1.]

LOCUS.

(c) Poni, ex quibusdam descriptivibus, vel Cerasi circiter amplitudine gaudet Cinchona.—Vide Phil. Transact. Astrid. vol. (v. par. ii. p. 222. vide etiam Librorum cui Titulus, *Tallier's Wonderful Secret*, Lond. 1687, p. 2.

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



FIG. 6







## L O C U S.

Habitat in Americe Meridionalis regione, Peruvia dicta, in montibus praesertim circa Loacæ. Ea fide etiam D. Ulloa, in Cuencae Jurisdictione ejusdem regionis, sylvas densas constituit (f).

## T E M P O R E.

Refert, ex autopsia, Cl. De la Coudamine, Cinchonam nunc plurimum e calidis regionibus arborum, in omni anni tempore frondescere, florere etiam, et fructum ferre perpetuo. In Peruvia, apud vulgus, recipitur, Corticem ex arboris plaga orientem versus evulsam, et lunae jam tempore senescentis, optimum esse. Sub coelo tamen sicco, et quolibet anni tempore, per totum quoque caudicem decorticatur nunc arbor. Insolatione siccatur cortex ad emporium.

## NOMINUM ETYMOLOGIA.

Quae ad nominum etymologiam pertinent, ut rem parvi momenti, et dubii plenam, paucis absolvam verbis. Quina Quina dicitur, vel Quinquina, ut quidam (e) volunt, a voce Quina, sermone Indiarum vernaculo, Corticem in genere, denotante. Et hinc, ob eximiam ejus praestantioresque, praec aliis corticibus, virtutem, Cortex Corticum, quasi appellatur. Cinchona appellatur a Linnaeo, secundum legendam fundamentis (f) ejus botanicis traditam, ex *Gemite del Cinchon*, tunc temporis, quum vires Quinquinae coeperunt inclarescere, Florae Jurisdictionis Limaë Hispanicae. *Cortex Peruvianus*, *Pulvis Patrum*, aliaque nomina, notiora sunt, quam ut tempus in his recensendis impendam.

## CORTICIS PERUVIANI FATA.

Si fata fortunaeque medicamentorum usque ab origine contemplemur, facile inveniemus, nobilium plurima, casu potius sortuito, quam experientiam tentando, in lucem proferri. Exemplum, nisi fama, saepius mendax, nos deciperit, per totam fere terram notissimum, e re jam jam tractanda, proferemus: hominis nempe cuiusdam, natione Indorum Loacæ, febre saevissima, et, ut videtur, intermitte-  
tente, aegrotantis. Ille, sibi coactus, aquam, e lacu, Cortice

Peru-

(d) Voyage to South America, book vi. chap. 2.

(e) Copernicus. A. D. Parisi anno 1738.

(f) Critica Botanica, § 238. p. 77. Vide etiam Philos. Botanic.

Peruviano acius satorato, copiosissime hausit: Eo pacto, non sibi solum, sed toti regno, salutem dedit. Virtute igitur Cinchonae insignissima, hoc ut praedicant modo, feliciter detecta, ex odio erga Hispanos, utpote victores, longo temporis intervallo, apud Indos, ex industria celabatur arcanum. Quidam demum Americanus, grati animi causa, idem communicavit cum Lovaë (g) Praefecto, natione Hispano: hic, paulo post, uxori Comitis *del Guichenot*, tertiana febre periculose, ut putabant, decumbenti, novum propinavit, et subtile medicamentum; statimque, in omnium stuporem, illa convaleuit. Ob dignitatem talis seminae sanatae, brevi, in illa regione, inelarusit Quinquina; et tempus nunc demum instabat, quo virtutem ejus eximiam illustrarent Europaei. Patres e Societate Jesu, ex quibus Pulvis Patrum audit, ex America in Italiam primum, circiter 1649, Corticem Peruvianum in Europam introducere; experimentisque fufulti, optimam ejus certissimamque, ad intermittentes, virtutem comprobaverunt.

Satis igitur patet, Corticem Peruvianum, pro tempore saltem, sub Patrum e Societate Jesu tanquam imperio positum fuisse, ideoque ex legibus empiricis exhibitum.

Quamprimum autem de Cortice Peruviano disserere inceperant medici, in diversas statim abiire sententias. Quidam, de ejus qualitate, num calida et sicca, aut in quo gradu, ex Peripateticorum dogmate, lites moverunt. Quidam, frigidam et narcoticam (h); quidam, calidam (i) pronunciarunt: Alii, ex chymicosam massae, alkalinam (k) inesse naturam voluerunt: Euerunt alii, qui operam et oleum perdidere, modum operandi quaerendo: Horum nonnulli (l) eum valde incusarunt, ut infarctionum viscerum promotorem; alii contra, plus quam satis est, laudaverunt, tanquam panaceam. Ex his, facile colligi potest, quod cuncti fere, vanis scholarum hypothesebus obnubilari, secundum propriae sectae dogmata, ut in verba magistri jurare addicti, de Quinquinae indole, usu ejus et abusu, dijudicaverint.

Haec tam diversa inter doctos judicia in damnata medicamento non raro tendunt. Certe, Quinae fama, dum hac gerebantur lites, imminui coepit; et plane, summa cum

(g) *Gedroy Mat. Med. tom. II. p. 1.*

(h) *Sanch. Castanae, ut a Musson et Langio allegatus.*

(i) *Chiffletius, in tract. de Pulv. fab. Orbis Americani, Paris 1621.*

(k) *Etmullerus, in disput. de Praecipitamentum usu, ut a Langio allegatur.*

(l) Inter quos enumerandi sunt Baglivius, Etmullerus, Stahlus, ejusdemque sectatores, ut ab Hossinanno citantur omnes, in dissertatione De recto Corticis Chinae usu in febribus intermittentibus. *Oper. omn. tom. VI. p. 32.*

tum artis medendi injuria, in desuetudinem abiit. Num id incommodi ex mala et intempestiva medicaminis administratione; num potius, ut videtur, ex dosi inutili, ac morbo plane impari; num, denique, ex aliis causis; laud equidem scio. Certe interim sic se res habuit: mox vero, ratione exhibitionis magis apta, sensim ac feliciter, detecta, dosim imprimis, si mihi liceat conjectare, augendo, sese illustrarunt denique Quinquinae recuperatae vires; et facile, ab aliis febrifugis dictis, palmam reportavere.

In omni Europa, non desuerunt Viri, arte medica versatissimi, quibus in confesso fuerunt Quinquinae meritis, quique calamum in ejus dignitate vindicanda exerceverunt. Inter vindicet, nemo est qui non agnoscat quod plurimum laudis ac meriti Sydenhamo nostro debeatur. Ille, in honorem artis suae omnino natus, hypotheseos spernens, fida experientia edoctus, non tantum ejus vim, ad intermittentes sistendas, fuisse et magis perspicaciter docuit, et stabilivit; sed primus fere posteriores ejus usus, ad alias nec paucas nec leviores vitae imbecillitates profligandas, praei amplissima ostendit. Illi etiam, ad Corticem vindicandum, adforgebant Mortonus, alique docti; quorum consiliis tandem, jure quidem ac merito, primum fere locum obtinuit Cortex. Nec mihi vitio vertatur, quod Talbotium, in Gallia, oblivioni tradiderim: Quamquam multum ei tribuerint auctores; moneo, ex auctoritate vix spernenda, quod consicere liceat, Talbotium quidquid luminis, de vera Corticis Peruviani propinandi methodo, habuerit, id ex Sydenhamo (m) etiam expulasse.

#### VIRUS CORTICIS PERUVIANI ET QUALITAS.

Medicorum omni aetate clariores, in dignoscendis plantarum viribus, multum desudarunt. Quis non novit, quid temporis Sectae Astrologorum medici, ab astris; quid Signalores (n), ut cum *Linnaeo* loquar, e colore, ex facie externa, habitu toto, aliisque signatis, vires plantarum deducendo, impenderit? Quid demum laboris, partibus vegetabilium omnibus examini per ignem subjectis, Academia Scientiarum Parisina (o), frustra, ni fallantur hodie, perdidit? Inter recentiores, Botanici quidam, a classibus plan-

(m) Vide Swan's Sydenham, ed. 3. p. 308, Lond. 1753, note (4).

(n) Inter hos eminent J. B. Porta Phytognomonica. Opus magnum plura laboris.

(o) Fere haec mille analyses per ignem fecere Chymici Reg. Scient. Acad. Parisinae; sed his omnibus praeflatum nihil, nisi ut liquidum faceret, ex omnibus communiter extrahi posse oleum, spiritum, phlegma, sal, et terram, et fere haec omnia eadem quantitate et proportionem in plantis diversissimi effectus. *Chémel. Hist. Plant.* p. 37.



plantarum naturalibus (p); alii quidem, a sapore et odore (q), magis feliciter earum vires indagant. Hi tamen, nisi usu et experientia, more veterum, Dioscoridis præcipimus, fulti, omnes in lubrico versantur. Ad hoc confirmandum, e re tractanda exemplum profuse licebit: quis enim, ex Corticis Peruviani sapore, miram nempe, præ aliis amaris et adstringentibus febrifugam, et gangraenas sistendi, virtutem in Cortice inesse opinaretur?

Optime ad usum Cortex Peruvianus eligatur rufescens, vel rubens, Cinnamomum referens; sapore adstringente, non ingrato, et aromatico amaro; odore quasi mucido, leviter aromatico; dentibus attritus friabilis, non viscidus et glutinosus, non ligneus, non effoetus et annosus (r).

Cortex talis, chemicæ subjectus analysi, phlegmatis acidi, cum pauculo alkali urinosi mixti, tertiam præbuit partem; olei crassioris consistentiæ, octavam; salis alkalinii, circiter sexagesimam.

Resina hinc in Cortice, ex hujus acidi et olei mixtura, ad quartam totius fere partem affurgit (s).

Cortex Peruvianus, in aqua coctus, liquorem adstringentem, amarum, et, dum calet, subrubrum, subpellucidum reddit: cum friget, vero, subflavescens et turbidum, ob resinam suspensam, eradit decoctum. Coctione cum prioris residuo, in alia aqua, ad vices plures repetita, liquor tandem, cum friget, pellucidus redditur; ac eadem ratione, qua repetitur coctio, saporem etiam adstringentem amittit; attamen, longius adhuc postea coctus, longiusque, amaritiam retinet (t).

Cortex Peruvianus, aqua frigida maceratus, liquorem pellucidum, sapore quam decoctum potentiorẽ præbet. Hinc videretur materiem gummosam, inter resinam et aquam frigidam quasi mediantem, lentius licet, perfectiorem tamen elicere solutionem: coctione enim, gummosa materies cum resinosa, in vegetabilibus, arctissime nupta, ab ea nunis subito distrahi videtur (u).

In spiritu vinoso rectificato, multo magis perfectio, et largiis quidem, quam aqueo menstruo, virtutem fundit Cortex Peruvianus: ad plenissimam interim Corticis virtutem, qua fieri possit, extractionem, coquantur residuum hujus

(p) Hasselquist, in Amoen. Academ. vol. I. p. 189.

(q) Plozer in Pharmacopœia, Lond. 1687. Instans in dissertatione de methodo compendiis vires plantarum indagandi. Op. omnium. v. p. 60. Lin. Sapor. et Odores Plant. in Amoenitatibus Academicis.

(r) Geoffroy Mat. Med. tom. II. p. 180. (s) Ibid. p. 184.

(t) Lewis Mat. Med. p. 476. (u) Ibid. p. 476.

jusce tincturae in aqua, repetitis vicibus; hac tandem, magis quam ulla alia methodo, iners et impotens redditur Cortex Peruvianus (u).

Haec tinctura, cum decocto mista, et utrisque, secundum artem, ad debitam consistentiam evaporatis, Extractum Corticis remanet, vim fere totalem retinens, et perfectiorem multo, quam si a decocto solo, vel tinctura, paratum fuisset: Corticis enim saporem adstringentem, et amaritatem, possidet, ac elegans medicamentum praebet (x).

Corticem, in substantia exhibitum, genuinum effectum edere, et efficaciorum, quam ulla ejusdem praeparatio, uno ore consentiunt Praetici: omnes interim hae praeparationes medicis in usum veniunt. Febricitantibus, quibus vires, ventriculi praesertim, sunt debiles, decoctum, quam pulvis levius, aptius esse inde videtur. Infusio frigida Hemmachicum praebet egregium amarum, chronicis variis utilissimum, et infantibus. Vi adstringente, praevalet Extractum aqua sola, praesertim, fideliter paratum.

Amara fere omnia, calidiora maxime, vi tonica gaudent in genere: ex amaro itaque Corticis Peruviani aromatico et restringente sapore, vim tonicam e legibus analogiae deductis, jure quidem ac merito, deducere licebat: febri-fugam et antisepticam sola docuit sola experientia. Inter omnia amara, pullet Cinchonae amaritatem enim, diutissime licet cocta, pertinaciter retinet (y); immo et solida fibrasque musculorum, ut apud auctores, certe non contemnendos, lego, ex insicit (z). An ab hac diutina amaritie et intensiori, vires coctivas quali superante, tantus ejus praestantiorque, praeter alia, effectus? Annon ab hac indole eximia, tantum praestitit, nempe tonicorum classis, profluere videntur ejus auxilia tam mirifica, in morbosum corpus humanum; siue sit quavis affectum, siue sit aetonia vel generali vel partiali debilitatum? An praestata Corticis triplex quasi efficacia, qua febres nempe intermittentes tollit, morbos demum gangraenosos, et illos denique a lassitate simpliciter ortos, vi potissimum antisepticae debetur; vel tonico junctae, vel alii specificae, liceat enim hoc verbo ad ignorantiae asylum confugere; id dubium, magistra in arte enodandum, relinquo. Qualitatem interim Corticis

VOL. III.

C

Feb.

(u) Lewis Mat. Med. p. 470. (x) Ibid. p. 472.

(y) Cum olim, experienti causa, ejusdem (Corticis) pulverem saepius dioxisset, non eo usque vires ejus exhaustae valui, quin vel octavam decoctum manifeste adhuc amaricaret. *Fall. Pharm. Extemperaz. edit. 6. p. 5. Lond. 1778.*

(z) Geoffroy Mat. Med. tom. 8. p. 270. Vide etiam Linn. *Amot. Acad.* vol. 1. p. 294. *Quid. Mat. Med.* p. 24.



febrifugam summe antiseptice vi deberi, inter alia, intermittentium generatione, probabile est; quae non raro, ut videtur, a putrida causa (a) ortum ducunt: eandem tonicæ vi deberi, suadet ea, a cathartico, facultas, tam facile easdem febres revocandi.

At siquis de modo operandi percontetur; an in solida, an in fluida, an in systema denique nervosum, primum et immediate agat Quinquina: id, vero, in arbitrium rei medicæ Principum reiero; mihi, in tenebris et nocte occulta hæc esse, agnoscens. Id tamen, quod medentibus indicæ patet, vulgare phaenomenon animo adesse velim; quam cito, scilicet, in febribus intermittentibus, seipsum attingat Cortex Peruvianus! Unde patere viderur, cum non in humores, non in solida simplicissima, ut cum Gaubio loquar, sed in systema nervosum, vel solida eiva, primum et immediate agere.

#### EFFECTUS CORTICIS PERUVIANI, IN CORPUS HUMANUM, GENERALES.

Fatis viribusque Quinquinae sic breviter adumbratis, postulat nunc ordo, ut usum tractemus; quem vero, ut fulius dicam, nec tempus finit, nec nostri propositi brevitati: tot enim hodie tantisque morbis opitulatur Quinquina, ut nobis opus sit in compendium quasi ejus præsidia redigere.

Præquam vero singulatim de morbis, a Cortice subsidium petentibus, agendum sit; juvaret equidem, fundamenta, si licuerit, ponere tanquam generalia: quorum auxilio, regulæ quaedam, de usu prerogativa ejus et abusu, aliquatenus saltem, statui possunt.

Hæc quidem consilia, plenius ac ad amussim, propius impleremus, si nobis dicere daretur, qui ex quot sint effectibus, in corpus humanum, generaliores, sub sensum cadentes, quos cedit Cortex Peruvianus; legibusque easdem rite firmare. Ut ut huic penso plane impar sim; ne mihi tamen sit culpa, aliquid conari. Corticem, quocirca, ut rectius iudicium de re seramus, largire manu exhibitum esse ponemus. Annon, rebus sic constitutis, hi sunt effectus?

Appetitum ventriculo ciet Cortex Peruvianus (b).

Alvum fere striclam reddit: nonnunquam, nimio praesertim dato, solvit.

Pul.

(a) Vide Fring's Observations on the Diseases of the Army, ed. 3. Lond. 1762, p. 217.

(b) Hoffman. De rebus usi Cort. Chlo. §. 16.

Pallum in genere fortius et quasi contritiorem reddit; inflammatoris febricitantibus, durior, celerior; que, lentis vel malignis febricitantibus, lentior, fortior et firmiter; languidis et convalescentibus, celerior et fortior.

Calorem corporis naturalem auget, febrilem minuit (c).

Robur et vigorem corporis et animi erigit (d).

Sudorem fere minuit.

Sanctusianam dictam perspirationem, omnium pene consensu medicorum, lacte promovet.

Excretionem per renes vel moderatur, vel saepe auget.

Diathefin in corpore humano putredinosam, mirum in modum, coercet.

Annon, ex amara aromatica virtute, qua languidus excitatur ventriculus, appetitum ciere videtur?

Tonum canalis alimentaris vitalem tonica vi, intendendo, ejus adstrictivus, in primas vias, effectus profluere videtur.

An ex vi tonica simpliciter, an ex aliis, haud equidem scio: cordi interim certe, ac systemati arterioso, tantum moderamini, febricitantibus praesertim, largiendi facultas; convalescentibus, tantum roboris, nulli alii medicamento, hucusque detecto, dari videtur. Illic licet porro obiter notare, id quod in animo iterum volvi iterumque, dum vires Quinquinae contemplantur sum; quod, nempe, non omnino inanis sit celeb. Hoffmanni februm theoria: eas statuens, spasmodicas universi systematis nervosi et vasculosi, esse affectiones (e). Ad rem redeo.

Eadem forte ratione, qua cordis vigorem tam pulchre, robor etiam totius machinae humanae, auget: nec non, nexu quem nesciunt sapientissimi mediante, quendam etiam animo tenorem aequalem, immo hilaritatem non raro, hoc praebet medicamentum, nunquam satis laudandum.

Quomodo calorem corporis sani auget, febrilis vero minuit: id, nempe, quod difficillimum extricatu, ignorantiam lubentissime fassus, majoribus in arte relinquo.

Cutim laxatam roborando, sudorem coercere, mihi visum est.

Circuitum sanguinis totalem augendo, et systema nervosum intendendo, Sanctusianam perspirationem promovet:

C 2

Spas-

(c) De Haen. Ratiō Medendi, par. ii. cap. De suppresso calore corporis humani.

(d) Hoff. De recto Cur. Chin. affe. § 10.

(e) Vide Opera omni. hum. ii. p. 9. De februm natura in genere; § 2. Vide etiam ejusdem Dissert. med. De generatione februm; suppl. ii. par. 2. p. 3. § 6.

Spasmos in genere, venales specialim, sedando, urinae profluvio moderari, videtur.

CAUTELAE, DE CORTICIS PERUVIANI USO TUTIORI,  
GENERALES.

His rite perpenſis, generaliter quasdam ex iis cautelas deducere liceat, ut tuto neque ac jucunde, five ad febres, five ad morbos chronicos proſtigandas, a medentibus exhibeatur Cortex Peruvianus.

Ab ejus vi, in primis, ut aiunt, vias, adstringente, illuviem acidam, tenacemve, vel sordem bilioſam, quibus onerari poſſunt, ante Corticem propinandum, per emeſin, vel catharſin, evacuandi, oritur ſere neceſſitas.

Ab ejus effectu, ad appetitum ſaepe acuendum, victus levis eſt ſere praefcribendus: vegetabilia, ſi morbo aptiora, ut ſtatu ex iis, ab indole Corticis roborante, corrigantur vel expellantur, magis libere admitti poſſunt in victu.

Ex aucto ſyſtematis cordiaci vigore, et momento majori ſanguinis; e ſenſatione capitis, quaſi conſtrictiva; e ſtrictura abdominis, ſaepe dolente; e reſpiratione, nonnunquam impedita; nec non ſecreatione diſſacili, ab uſu Corticis, male praefertim exhibiti, non raro oriuntis; plethora, ſi adſit, vel inflammationis internae ſigna, leviora quanquam, priuſquam exhibendus ſit Cortex, ſanguinis miſſione minui debent.

E ſudore nonnullis, ſub Corticis uſu, aliquantulum licet, impedito, non parum momenti, in acutis, eſt calor leſti, cum petu diſſenti, ut laxata evadant vaſa cutanea: in chronicis, ut ſancturiana ſit aucta perſpiration, quod aeger ſit bene veſtitus, pariter neque prodeſt.

Ex his ſimilibus rationibus, quia vi nempe pollet adſtringendi Cortex, et ſyſtematis arterioſi robur et vigorem tam cito ſaepe intendendi, caute, immo cautiſſime, uſurpanda eſt Quinquina: quandocumque ſeſe manifeſtat diſtethis ſanguinis phlogiſtica; quandocumque corpus, ab obſtructo quocumque vel ſcirrhoſo viſcere, cachecticum evadit; quandocumque reſpirationis anhelofae ſigna, vel ſymptomata inveterae inflammationis, thoracis praecipue, dantur; ubi ſigna ſunt porro ſuppurationis vel puris incluſi, niſi hic forte aliquid ſit malignitatis; ubi ſuppreſſa demum ſunt evacuationes criticae; aut tempus denique menſium inſtat, vel fluxus haemorrhoidalis.

Hiſce conſiliis, de tutiori Corticis propinandi methodo, inſtitutis, ad poſtremam tranſeo opuſculi partem; morborum nempe recenſionem, in quibus emineant Quinquinae vires;



vires: alii insigniores tantum, ob nullam incepti nostri rationem brevitatemque, leviter percurram et strictim.

#### CORTICIS PERUVIANI USUS SPECIALES.

Cum in Europam primum importaretur Cortex, Quartanae sibi solum fere vindicabant ejus usum: nunc temporis, omnes intermittentes febres, siue universales, siue topicae sint, nec non remittentes, eo felicissima profligantur.

Leges exhibitionis, in febribus cujusvis generis Quinquina debellandis, ex antedictis partim, partim ex sequentibus, deduci possunt.

In Remittentium et Biliosarum febrium genere, quo propius ad continuam speciem, vel inflammatoriam, accedit febris; eo magis opus est cautione, in Cortice exhibendo. Priusquam itaque tuto detur Quinquina, praemitti fere debet regimen antiphlogisticum; plethora nempe, et diathesi phlogistica, sanguinis missione subductis; ventriculo per emesin, alvo per catharsin, vel per enemata purgatis; tutius erit, meliori prudenti, Corticis usus, et felicitior eventu.

In Quartanis denique, per emesin saepius, per catharsin non raro, purgatione opus est; rarius sanguinis diminutione: multum his profuant, cum Cortice, medicamenta aromatica; multum lautius victus; multum perspiratio sanctoriana, exercitatione non tantum debita, sed corpus indumentis leneis investiendo, aucta.

Febris intermittens, vernali tempore, haud semper auxilio eget Quinquinae: at, autumnali, quum vehemens diu saevit, vel corpus redditum est admodum debile; in hoc casu, ipso Boerhaavio (f) suadente, haud sine quo illo Corticis Patrono; apurexiae tempore, dosi, morbi vehementiae, aegri aetati, sexui, satis apta, cum regimine, usum habet Cortex praestantiorum. Et, quanquam minus necessarium, ut plurimum, in quotidianis ac tertianis, levioribus, praesertim, quam in remittentibus, antiphlogisticum, cum Cortice, regimen, esse videatur; non paululum tamen curae, in alvo purganda, biliosis, in autumno, sordibus gravata, ponendum est. Summa veruntamen arte ac prudentia opus est in Cortice exhibendo; quodocumque Febris ipsa intermittens, Quartani speciatim typi, apoplectico supervenerit, vel paralytico, vel cuivis alii, eo morbi genere decumbenti: his enim, ut cum Celso loquar, ipsa febris saepe praesidio est.

Eisdem



Iisdem tempestatibus, quibus febres intermittentes, Rheumaticae etiam saepe simulque praesentantur, et haud raro leviores periodicum induunt typum: has perinde, quum Cortice curari oportet, ratione prius ad phlogistici sanguinis diathesin habita, legibus iisdem, quibus intermittentes, necesse est subicere. Et hic, etiam, de Hemierania periodica, pertinet mentionem brevi facere; de Rheumatismo neuralgico; dolore Ischiadico; aliisque ejusmodi doloribus, diversas corporis partes excruciantibus; qui, quoniam et intermittentes non raro quoque faciem, quotidianae praesertim, aculantur, topici intermittentes dici solent. His veruntamen affectionibus, neque expulit perpetuus, neque convenit, Corticem statim propinare; quippe quod evacuationibus ipsis, ante Corticem rite praemittendis, sine ejus ope, saepe solvatur morbus. Quod res sic scire habeat, experientiam medicorum candide provoeco; quibus videre licuit, Hemieraniam, ob consensum caput inter et ventriculum, vomitoriis cedentem.

Lentis febribus, vel nervosis, in subsidium venit Quinquina, egregium et potens (g): Haec tamen, ut plurimum, crisi uterunque dubia ac incerta, perfectius quam malignae, judicantur; et saepe, declinante morbo, remissione, simul interdum et intermissione, cedunt, Corticis ope. In malignis, non raro, statim ab initio, urina est suberrima (h); in lentis, magis aquosa (i); in illis, minus judicii ferens, citius quam in his, evadit turbida ac crassa: in lentis, idcirco, febrifugum neque ac analepticum, censendus est Cortex, remedium.

Quod vis insit in Cortice, mira et praestans, qua, antidoti more, intermittentium venenum sistit, ac sub incensibilis quasi jugulat, omnibus nunc clare innoscit: eandem tamen facultatem, in Putridarum, Malignarum, Petechialium decursum sistendo, non aequipollere, nunc evicit multoties experientia annorum: his enim, antiseptica forte et tonica, potius quam febrifuga virtute, laudabiles ejus praestitit effectus. In malignis, canali alimentari a sordibus primum expurgato, tonum dein vitalem cardiacis ac analepticis sustinere oportet, et diathesin putredinosam enecere: in hunc finem, instar omnium analepticorum, valde conducit Quinquina. Num prodesset, nec ne, Cortex in

4

ma-

(g) Huzham, Essay on Fevers, Lond. 1736. edit. 2. p. 67. Langrish on Fevers, p. 247. Gilchrist on nervous Fevers, Edin. Essays, vol. 4. part 2. p. 332.

(h) Langrish on Fevers, p. 263. Huzham on Fevers, p. 95.

(i) Langrish, p. 339. Huzham, p. 76.

malignis, dudum dubia moverant medici; gangraenosa tandem praepotens, quidni in universa humorum corruptione valeret, inter alios, quæriti Clarissimus Huxamius (k). Et nunc summum cardiacum in confesso est remedium, vino austero, potui acido, et diaphoreticis aptis mixtum (l). Neque tamen in his omittenda est, id quod plurimum usus habet, æris inquinati correctio (m). Quum porro compertum sit, quod hæc febres sint contagiosæ; non prava, ut opinor, consilia iis darem, quibus ex officio necessarium est, inter homines malignis decumbentes versari, si Corticis deglutitionem, ad contagium avertendum, suaderem.

Ad Anginam Gangraenosam, utpote speciem quasi ejusdem generis, transeundum est: morbum quidem, quem primum ad malignarum classem amandavit, apud Anglos, Clar. Fothergill; quem, veruntamen, Cortice Peruviano penitus fugare, primus et aperte docuit Cl. Wall (n). Ea itaque, quæ proxime de Corticis præsidio in malignis breviter tetigi et striclim, ad hunc quoque morbum accommodari possunt sine damno. Non alienum erit, hic in transitu observare, quod, in initio præsertim morbi, serpentem gangraenam lotionibus antisepticis et vaporibus prohibere, maximè res sit momenti. His enim auxiliis, incipiente morbo, institutis, si mihi id, quod in propria præxi non semel observatum, innutire liceat, morbus quasi topicus, non raro, cursu statim sistitur, et radicitus tollitur.

Illæ, quas Lentas vel Hæclicas Febres vocant Medici, originem tam diversam agnoscunt et multiplicem, ut earum causas optime scire sæpe difficile sit. Quibus systema nervosum nimium mobile est, et irritabiliter ii, ab animi motibus inordinatis, ab evacuationibus prælargis, diuturnis, et insolitis, vel ab alijs, quæ mobilitatem corporis et irritabilitatem adaugent, causis, facilibus incidunt in Hæclicam Idiopathicam: his, inter alia analeptica, multum profunt, ad tonum corporis in genere, vel alicujus visceris speciatim roborandum, medicamenta e Cortice Peruviano parata (o): attentione insuper, ut alia sint scire accommodata, semper habita ad causas remotiores. At, quum suppurationes internæ Symptomaticam esse Hæclicam denunciant febrem, alia est

(k) Vide *Observationes de ære et morbis epidemicis*, vol. i. p. 103.

(l) *Ibid.* vol. ii. p. 84.

(m) Vide Pringle on the Diseases of the Army, edit. 3. p. 272.

(n) Vide opus periodicum, cui titulus, *Gentleman's Magazine*, Novemb. 1747.

(o) Hoffmann, *Opus. omni.* tom. ii. p. 121. § 13. Langrill de Febribus, p. 235.

est rerum plerumque facies: et peior sane, dum ulcerosa evadunt viscera. Nihilominus, hic etiam, cum apto regimine, equitatione, coeli salique mutatione, aliisque idoneis, quia magnopere humorum putrori et fibrarum atoniae obstitit, in Hecticorum subsidium venit, nonnunquam, neque infausse, hoc antilepticum nobile et tunicum (p).

Id vere, mirificum quod in Pure Ulcerum, mali praesertim moris, emendando effecerit Cortex Peruvianus, primum dedit indicium eo utendi, ad Variolarum pustulas maturandas: ad alium enim scopum, nempe, febrifugum, Cortice utitur Mortonus; declinante nimirum morbo, vel febre secundaria remittente, vel intermittente (q). At, hodie, quoties crudae sunt Pustulae et aquosae, et corporis vires ad maturandas impares evadunt, aliis nec obstantibus, bonum enim fructu, suaserunt Corticis usum medici clarissimi. Quoniam interim propius ad inflammatoriam speciem accedit febris variolosa, non saltem cautiore, aut nullus, sit usus. Quandoquidem a misalinate varioloso oriuntur, vel saltem illud comitantur febres malignae, petechiales, haemorrhagiae, aliisque id genus notis, maxime dignoscendae: hic etiam, aequae ac in caeteris malignarum typis, plurimum juvant Quinquinae vires; audaciorque sit ejus usus (r). Per studium hujus Variolarum generis universa, non pertimescendam esse remedium, lucide, ac primum fere, docuit Cl. Muro (s): ulterius confirmarunt denique Cl. Wall (t), Huxham (u), alique (x).

Inter febres exanthematicas, post variolosam, naturaliter in animum venit Morbillosa: uterque enim morbus saepe simulque grassatur, et multa utrinque habet communia. Morbillosae interim febris initia, quam variolosae, Catarrhi frequentius stipantur signis, morbi genio equidem magis propriis: et saepius porro, ad nurstu statum, peripneumonica superveniunt indicia periculosiora. Praematuram deinde macularum recessionem, hostem pulmonibus vere funestum, propulsare summa cura nitendum est. Hujus rei causa, Corticem Peruvianum auxilium in Morbillis esse, quasi novum et egregium, exemplis et consiliis, nifus est stabilire,

(p) Vide De Haen Rat. Medend. editt. Lugd. cap. 27. et passim.

(q) Marton Pyretolog. Geny, 1696, p. 111.

(r) Vide Tissot de Variolis, &c. Lausan. 1761, p. 33.

(s) Medical Essays and Observations, vol. v. art. 101. p. 102.

(t) Philosoph. Transact. vol. xli. N° 221. p. 333.

(u) Essay on Fevers, p. 151.

(x) Mead de Variolis, cap. 3. Vide etiam De Haen Rat. medendi, cap. 15.



(stabilire; et Orbi Medico nuper publicum fecit, Cl. Cameron (y).

In febre Miliari, si manifestius signa adsint malignitatis; si in longum protrahatur morbus; si potro rigores et ca- lures periodum quandam ferrent; si urina praesertim sit lateritia, et alia remissionis vel intermissionis signa appa- reant; tunc felicissime oppugnetur Miliaris Cortice Pe- ruviano: ut alvus tamen prius ecognitiois, vel iniectioni- bus, laxata sit; et respiratio, si difficilis, rectoris libera reddatur; cautelae sunt medico rite servandae.

Quod Cortex Peruvianus sphacelis adeo laete succurrit; ea propter, Erysipelas morbum, naturam gangraenosam in- ducentem, etiam juvari, non est mirandum. Civis interim inflammatoriam sanguinis diathesin contemplant, clare pa- tebit, hoc remedium, nec magna sine cura, exhibendum esse. In hoc morbo nec leviori, nec adhuc gangraenosa penitus; haud parum auxilii, post sanguinis detractiorem, a catharsi et Cortice, alternis diebus iteratis, me observasse credo.

Illud dignissimum Corticis ingenium, a Cl. Rushworth detectum, quo longe caeteris antecedit medicamentis, in gangraenis et sphacelis sistendis; quo porro, in ulcram pure vulnerrumque emendando valet; suae vi deberi, im- primis antisepticae, videtur. Adeo certe laudabiles hic praestitit effectus, in vires corporis resuscitando, humores a putredine cohibendo; adeoque amplae sunt leges exhi- bitionis: ut, salvum ejus esse usum, siue ab interna, Gan- graenae, siue ab externa, utrae sint, causa; siue febris veh- ementior adsit, siue nulla; per longam experientiam nunc viderint practici, e re chirurgica optime meriti (z). At, incipiente gangraena, dum adhuc vasa sanguine spissiori turgent, et phlogisticon, non tuto adhibetur medicamen- tum (a).

E putridarum stirpe, orta est saepius Dysenteris; cui auxilium fere Cortex Peruvianus. Neque tamen, in initio statim morbi, eo usi convenit. Dum febris enim, si adsit, viget; dum putrida illuvie primae sordent vix; cane pejus et angue fugienda sunt adstringentia: his autem, quae Quinquinae auxilio obstabant, expurgatis; spasmis insuper, demulcentibus et papavere sedatis, ad intestinorum unum

VOL. III.

D

restit.

(y) Vide Gentleman's Magazine, December 1751.

(z) Edin. Medical Essays and Observations, vol. iv. art. 2. and vol. v. art. 2. Ranby on Gunshot wounds, Lond. 1744.

(a) Pringle on the Diseases of the Army, p. 343.



restituendum, multum conducere Quinquinam, nunc notericorum experientia pulam fecit (b).

In cæteris intestinorum morbis, ab atonia originem ducentibus; in Diarrhoeis longis nempe et chronicis; in diuturnioribus etiam illis et pertinacioribus alvi fluxibus, quos nominarunt auctores Liemeriam, ac Caeliacam affectionem; multum valet Quinquina; equatione præcipue ejus efum comitante, aliisque morbo ac aegrotanti apud medicamentis.

Quinquina Rheumatismus Febrilis phlogistica sanguinis diathesi plerumque stipatur; quidam tamen inter hodiernos, præeunte sanguinis detractione debita, ac urina sedimentum deponente, arduum dolore adhuc et febre aliqua remanente, Corticem propinare audent (c). Nisi morbus veruntamen externis solum partibus sæviit, et salva sunt viscera nobiliora, remedium erit non tantum lubricum, ac periculose fœne plenum.

Quinetiam, in chronico Rheumatismo, neque terreant remedia, e Cortice Peruviano confecta; signis enim inflammatoriis, si eorum vestigia adsint, sanguinis detractione minutis, plurimum usus consequentur, saponacris, guajaco, balneo frigido, victui tenui, præsertim juncta (d).

Cum, in Arthritide, stadium inflammatorium prægressum sit, et fractæ jam vires analeptica summa eliditaverint medicamenta, cum Cortex, recentiorum suffragio, hunc usum rescindi adimplebit jucunde: Neque prorsus inutilis arthriticis, in intermissione, idem propinetur, ad malum avectendum; ut olim fuisse Sydenhamus noster (e).

In Hydropse curando, Cortex Peruvianus, ob vim adstringentem, minus quam in multis aliis morbis, apud medicos, obtinuit; cum interim evacuentur aquæ, non defuerunt viri summi, quibus, inter alia tonica, majoris sit momenti hoc nobile remedium. Certe, cum languant totius, ut hydropico solent, corporis, ac præsertim ventriculi, vires; tam tonum solidorum, admodum jam debilem, restituat, et corporis vim, mirum in modum, resuscillet Quinquina (f). Insuper tamen temporis, dum hæc gerun-

(b) Vide Epistolam a Cl. Whytt ad D. Pringle, in libro cui titulus, *Observations on the Diseases of the Army*, edit. 3. p. 243. Notè. Vide etiam Tralles de Opio, § 3. p. 206. Baker de Catarrh. et Dysenteria, Londinens. p. 37. Watson's Letter to Dr Huxham, Phil. Transact. vol. 60. p. 246.

(c) Vide Pringle's Observations, &c. p. 157, note †.

(d) Pringle's Observations, &c. Vide etiam Swan's Sydenham, edit. 3. p. 276, note.

(e) Tract. de Podagra, § 32.

(f) Hoffmann. opera omnia. tom. III. p. 227. § 43.

geruntur cum Cortice; tale instituire oportet regimen, et alia propinare medicamenta, quibus augeatur in corpore vis absorbendi, et lotum stimuletur segnitie. Talia sunt forte exercitia debita, frictions, diæta secca et parca; medicamentum sit, inter heroica, Scilla laudata (g).

Ubique, in corpore humano, alte insisterit radix fœdum illud et perniciosa malum, quod scrupulum nuncupant auctores, ægre cedit medicæ arti. In senecta tamen ætate præsertim, quum neque labe hæreditaria sit, neque morbus adhuc inveteraverit; quum neque nubilia infarciantur vel pure fœcant viscera; tunc, præter alia decantata remedia, apud medicos, specifica, quasi habita, spes aliqua sit saltem ponenda in Quinquina viribus; quæ primum clare, ad hunc morbi curam sistendum, ac erudite illustrare Cl. Fothergill et Fardoc (h).

Inter Cerebri et Nervorum morbos, convulsivi generis, summa quasi ac gravissima convulsivo est Epilepsia: quem sane morbum distribuerunt auctores in Idiopathicam, cum vitium sit in ipso cerebro; vel in Sympathicam, cum cerebrum, a sympathia cum aliis partibus, turberetur. Huiusmodi causæ, apud auctores celebratissimas (i) recensitæ, variæ sunt, et sæpe aciem humanam omnino fugientes. Sine his tamen rite exquisitis, medicina manca saltem esset et debilis. Cum interim hæreditarius sit morbus, vel inveterascens Idiopathica ægrum torqueat; quod frustra sæpius in morbum medicina nihil valeat, conceditur lubeatissime. At, sive Idiopathica, sive Sympathica, eos invadat Epilepsia, periodica præsertim, quibus reterum ac alacritatulum est genus nervosum, quibique spasmodica videtur esse affectio; præter Valerianam decantatam, aliæque specifica, ad accessiones præcavendas, tentari dignæ sunt Curicis Peruviani vires (k).

At, quanquam aliqui boni e Cortice, in Mado Camitiali, sperare liceat, cum oportuit cautissime Epilepsiam propinare, quibus Quartana aliave intermittens supervenerit: his enim febribus non raro pertinaciora chronica varia, ac epileptica mala, penitus tolluntur; dudum adnotante Hippocrate (l).

D 2

Sunt

(g) Vide Tissot, de Variolis, Apoplexia et Hydropse, p. 188.

(h) Medical Observations by a Society of Physicians in London, vol. 1. p. 207, p. 284. (i) Boerhaav. Aphor. § 1075.

(k) Mead Monit. et Præcept. med. p. 65. Vide etiam Werlhof de Febribus intermittensibus, p. 16, in initio.

(l) Qui a Quartana corriguntur, non ita valde convulsiones corriguntur. Si vero prius corrigantur, et quartana insuper accedat, cessant.

Sunt et alii convulsiui morbi, qui tamen gradu, magis quam genio, ab Epilepsia distare videntur (w). Tales motus in genere Spasmodici, Chores Sancti Viti, habentur, et Tetanus. His morbis, ut in Epilepsia, alia in accessionibus est ratio morandi, alia in intervallis. Huc attamen non pertinet, de auxiliis tractare, quibus, instante paroxysmo, symptomata saepe horrenda sedantur. Quid vero in intervallis, ad recidiva praecavenda, tam polebre ac Cortex qui corporis vires, jam nunc debiles, resuscitat, et tonum solidiorum inaequalem admodum moderatur, votis respondere potest!

Malum illud multiforme, quod in viris Hypochondriacum, in feminis Hystericum, vocant; an sedem habeat in tone canalium alimentaris, hic intensiori, illic remissiori, ut opinatus est Hoffmannus (x), unde vermicularis motus intestinorum perturbatur, ac in hystericiis in consensum trahitur uterus atque viscera; an, denique, in generis nervosi irritabilitate nimia, vel mobilitate, ventriculi praesertim et intestinorum, ut suaderent potius Hystericarum phaenomena; nunc praeteream. Quoniam tamen, in hoc malo, inaequalis esse plane videtur tonus vitalis, et spasmodicae inde facillime oboriuntur affectiones; multum certe, ab eximio Corticis ingenio, sperandum erit, inter chalybeata et antispasmodica, ne hoc malum indices ingravescat (y).

Inter haemorrhagias, quae a disruptis e plethora exoriantur, nulla fere periculosior est ea, quae dicitur Haemoptysis: ea plane ratione scilicet, quod tabes plerumque consequatur. Cum per narium tamen, vel haemorrhoidalem, vel uteri vasa, Naturae institum, ut saepe solet accidere, sanguinis copia minuitur; tum, omni cura, nitatur medicas, ne hi Naturae salutes conatus intempestive obstantur. Hi, vero, valde periclitantur, quibus Natura, sanguinis, per pulmonum vasa, abundantiam minuendi consuetudinem instituisse coepit: Arduum enim ac difficile est, impetum sanguinis alio divertere, nimium orgasmum compescere, ac laesum vasorum tonum restituere. Sanguinis missione interim molendum est hoc opus, alvum leniterducendo, regimen demum instituendo, ne communiis totam pacando omnino accommodatum. Quid igitur, quam Cortex (z), quoniam

Cellius, Aphor. 70. § 3. A Quartana correpti, et Magna Morbo non corriguntur: Si vero corrigantur prius, et succedat quartana, libenter. Hipp. Popolar. lib. vi. § 6.

(w) Boerhaave Aphor. § 1083.

(x) Hoffmann. Opera omnia, tom. ix. p. 66. § 2.

(y) Traites de Opes. lib. iii. p. 191. 62.

(z) Hoffmann. Oper. omn. tom. iii. p. 205. § 2. et p. 206. § 7.



praefertim et papaveris succo auxiliante, magis valet, in hos febiles argasmos compescendo, et tonum systematis aequalitatem reddendo! Haec dicta, de Haemoptysae curatione, ad alias in genere haemorrhagias applicari possunt.

An in pulmone (q) vehemens illa Tussis, quam Convulsivam vocant Puerorum, primariam habeat sedem; an in ventriculo (r); siquidem utraque opinio fautores habuit, anceps haerens: morbum, interim, putavi hunc tantumacem, me non semel vidisse, vomitorio, singulis vel alternis diebus, ventriculo vacuo exhibito, si simul et duratione coercitum esse: utcumque autem res sese habeat, cum morbus sit genii certe spasmodici, et vires corporis non raro valde frangat, sic Cortice etiam juvatur. Oportet nihilominus, non raro, ante Corticem propinandum, sanguinem minnere, cum turgida sint vasa, ventriculum emetico, et alvum cathartico, deplere: his quoque scite peractis, tutius evadit id, quod, ad spasmos sedandos, saepe perneccissarium est, Opii puta auxilium.

Quae ad Quinquinae praesidium, in spirandi difficultate, attinent, haec satis erunt. In asthma convulsivo vel periodico, cum prius rite peragantur evacuationes, et opio leniantur spasmi, irritabilitati pulmonum tunc occurrit praecipuus Cortex Peruvianus; cui, cum fructu, adijciuntur Sagapenum, aliaque, id genus, e ferulaceis gummi.

Distillationem vel Catarrhum, quum in pulmonem praefertim suis morbus; tum ab tussim saepe violentiorem, tum ab eam scilicet rationem, quod, soli initis neglectus, phthisi pulmonum viam non raro sternit; intentius considerare, prudentis est medici, nec non a pulmone, sanis viribus, divertere. Et quanquam, inter morborum pectoris initis, non legitimus et nimis adstringentium usus, pessima mala fere inferat; Catarrho tamen declinante, cum jam remittantur inflammationis indicia; cum sputa fiant cocta; cum aeger facile spiret; cum febricula adsit lenta, et languens demum corporis, pulmonum praecipue, tonus, analeptico-rum usum efflagitet; tum aegrotanti, tum convalescenti, optime succurrendum est Cortice Peruviano. Hujusce virium, in tali rerum statu, praestantiorum exemplum, catarrhum, adducam, duos ante annos fere, in Britannia, epidemice grassantem: quo in morbo, multum levaminis inesse in hoc nobili medicamento, medentibus clare patuit (s).

Inter

(q) Ibid. tom. iii. p. 2. § xiii.

(r) Ut voluit Waldfchmidtus, Dolaeus, Ettmüller.

(s) Mead Monit. et Praecept. med. p. 202.

(t) Vide Baker de Catarrho et Dysenteria epidem. p. 12.



Inter morbos, ab atonia originem docentes, illa, quae fontentarios maxime, vel molles, ac studiosos, molestat Ventriculi nimirum et Intestinarum Imbecillitas, ob viscerum functionem necessariam, et quod post sese, mala fere innumera trahat, non ultimum certe tenet locum. Huic etiam Imbecillitati, ratio prius ad aegritudinis causam, saepe diversissimam, habita, ut regimen rite institui posset; heroicum, inter tonica, medicamentum praebebit Cortex Peruvianus, nuptus praesertim amaris calidioribus et chalybeatis. Caeterum mihi liceat, ex usu proprio iudicium ferenti, inter Stomachica et Cortice petita, illam mizocratiorem, a Cl. Lewis memoratam, praec aliis laudare.

In ictero, profit Quinquina, an non? Certe, minimum suminis de hac re, apud auctores, invenio. Nec tordeat tamen, brevi narrare, id quod in transitu occurrat, Commercio apud Norimbergenses Literaria legenti; Exercitationis nempe Compendium (a) Academicæ, sub Camerario Ratibonensis auspiciis editæ; quæ usus Corticis a febre ad letum extensus. In hac dissertatione, primum argumentum est, quod urinam Ictericorum, neque certe ac febre laborantium, mutet Cortex Peruvianus. Sistuntur curationes variae, hoc remedio feliciter peractae. At, quantum boni a Cortice, quantum ab aliis remediis, quum neque sola data esset Quinquina, neque sit semper accurate definita sit dosis, doctorum iudicis scrutinioque referam.

Quinquina saepe saltem auxiliatur illi, quod diabetem vocant, urinae Profluvio. An a tabulis renum laxatis, ut quidam autumant (x); an ab eorum tono intensiori, ut alii (y); litum non movet. Quantumvis enim, certe haud paululum, auxilium, ad hunc morbum, concessum est, alia adferre roborantia, aluminosa, aquae calcis vel Brissoliensis potationem, assae Specifica; febri interea concomitanti, hostica, Corticis usum indicare videtur; duce etiam experientia, eo, non raro, morbus pulcherrime cohibetur.

Hæc sat erunt, ad præstantiores Corticis facultates agnoscendas, in morbis, qui ei cedunt, insignioribus; cunctotum enim recensionem brevis dissertatio non par est. Sufficit, quod auxilium hoc divinum, in omnibus morbis, a laxitate solidorum simplicium, vel a tono solidorum vivorum remissiori, sine putrida diathesi coortis, vel cum ea complicatis, nec usum nec gloriam unquam amittet. Prius tamen quam opusculum ad finem perducam, brevi differere de

(a) Vido Commenc. Literar. Norimb. anno 1737. Heblom. 21. p. 182. (x) Hoffmann. Oper. omn. vol. 1. p. 207. § 21.

(y) Vido Lawrence Praelect. quod. p. 279.

de morbis quibuscumque, muliebri sexui et infantili aetati propriis, Cortice etiam iuvandis, decrevit.

DE CORTICE PERUVIANI USU, IN QUIBUSDAM  
MULIERUM MORBIS.

In deliciarum sexu, cui tota corporis compages sit laxior; imbecillitatibus, ob sexus praecipue vivendique rationem natas, non admodum paucis, ac valde incommodis, vi imprimis tonica, mire locumrit Cortex Peruvianus.

In tenellis ac delicatulis, cum his adsit nimis Menstrui Copia; procatarticus, pariter ac therapeuticus, est Cortex Peruvianus. Evitatis, in his casibus, quae sanguinis augeant fervorem, omnibus; eum exhibere, in intervallis, et tempellive et optime convenit. Dum fluunt menses, ne malum, adstringente ejus facultate, in pejus rueret, cautio sit usus: nihilominus, eo etiam tempore collide exhibitus, sanguinis fervorem febrilem compescit, spasmos continet, tonum vasorum firmat, nec non, perinde ac in aliis etiam haemorrhagiis, plurimum solatii jucundissimumque subministrat.

Ad Fluoris Albi medelam, cum morbus sit a laxitate, uteri praesertim, ortus; evacuationibus, si defint, praecautibus, summa a roborantibus, calidioribus et resinosis petuntur auxilia, inter quae eminet Cortex Peruvianus; nec illo in morbo usu eximio caret.

Causae fortis exclusionis immaturae multiplices sunt: quando tamen, ob uteri vel systematis totalis debilitatem, vel mobilitatem nimiam, vel ob aliam demum id genus causam, mos sit abortum faciendi; tum plurimum pollet Cortex Peruvianus, per tres primos vel quatuor menses praegnantis propinatus. Tonum enim corporis haec medicina magis aequalem reddit; spasmus, quos tamen opio nunquam seldare oportet, mirum in modum reprimunt; et irritabilitatem auctam temperat: his etiam, quae facilius abortum patiuntur, in subsidium veniunt, cum Corticis adjumento, plethorae urgentis diminutio, corporis quies, et denique animi affectuum pacatio.

In Lochiorum Fluxu nimio, a tono uteri laxato, quam contractione impedita, potius oriundo, quando periculum, ob viriam defectus, et fluxus diuturnitatem, imminet, cum aliis restaurantibus, debitam certe meretur laudem Cortex Peruvianus.

## DE CORTICIS PERUVIANI USO, IN QUIBUSDAM INFANTUM PUEBORUMQUE MORBIS.

Quamvis, ex vi insigni adeo tonica, et quasi styptica, qua praedita est Quinquina, adstringentium damna, in infantibus et pueris, ejus usum non legitimum subsequi possent; hisque etiam et nimis Corticis usus, ne eorum adaugeantur corpora, impedimento esse queat: veruntamen, si medicus propria calleat doctrina, neque infantibus nocet hoc dignum remedium.

Cum in infantibus, ubi alimentaris tonum laeserit aedam, ut solet. Praedominans, tum quoque, in viribus intestinorum restituentis, peracta prius evacuatione, multum praevalet, et egregie, Cortex Peruvianus; recens etiam si natis adhibitus. Magnesia alba, medicamentum jure certe ac merito decantatum, plurimum nonnullis generat aeris, dum agitur in primis viis saturatio: Hinc, non raro fit, quod medicina malo sit; statibus enim venter intumescit, et termina tenellos cruciant acriora. Minuuntur haec mala Cortice Peruviano, cum Magnesia maritato, ac, feliciori saepe cum fructu, hoc modo compositum propinavi medicamentum.

Quum inter morbos, quibus obnoxium est genus humanum, aetas praecipue infantilis; vix ulli, equidem notiora, laesi ac inaequalis solidorum toni, et fracti viscerum elateris, quam Rachitis, dant signa; tum facile est judicare Corticem, ad hunc morbum, principem, inter unica auxilia, sibi locum vindicare. Neque hic sane medicum prudentem omnino fallat hoc Nobile Medicamentum. Corticem ad morbum adhuc ingruentem propinatorum, oportet Rhen, Aloeticis, alioque aptis, primas prius purgare vias; victus regimen roborans jubere, vivendi quoque similem rationem. His rite institutis, tuta cacochymiam Rachitidi laborantis, nec minus feliciter et aeternam, juvat Quinquina. At, cum viscera intumescant, aut scirrhis indurescant, ut saepius, vel pure feseant; cum demum adsint hydrocephalus, hydrops, ossium caries, vel alia denique istius generis mala; morte, potius quam Cortice, miseri sere sublevantur tenelli.

Cum, inter alias causas, Vermium generationi, sub infantili aetate, paveat imbecillus intestinorum tonus: quicquid inde boni, ab amaris et roborantibus, id certe a Cortice Peruviano, est etiam legitime expectandum. Neque minimi usus, ut mihi videtur, est ejus vis febrifuga, in illis febribus, quae a Vermium Progenie originem saepius ducunt,



eunt, quaeque solent profecto nonnunquam fuisse facere: ope enim hujusmodi remedia, febribus optime emperitur, donec mercurium, aliave, ad Vermium expulsiorem, remedia, medico opportunum erit propinare.

Atque haec sunt, quae de Cinchonae viribus jam discere licuit: nostri nunc instituti ratio monet et tempus, ut Opuscula huic, incandum equidem et rudi, finem imponam. Mihi interim deficeret Pietas ipsa, si *Celeberrimae* et *Florantissimae* hujus *Academiae*, ut omnia sint fausta, seculis, prius precarer: si grati demum animi testimonium hoc publicum, *Facultatis* praecipue *Medicar* Professoribus, ob eam, qua me complexi sunt, Benevolentiam dicatum vellem: si gratias denique Patronis meis et Amicis, qui supersunt, haberem—Nam, dum haec scribo tristis, eheu! venit nuntius, Patroni Factorisque eximii mortem referens, non a me tantum, sed ab omnibus bonarum artium cultoribus, valde lugendi, Georgii Comitis Macelesfieldii, Societatis Regalis per annos scilicet tredecim Praesidis dignissimi. Vir fuit, si quis alius, facilis et comis, facundus aequae ac eruditus: ab omni fastu prorsus alienus. Qui, in reconditissimis Mathematicis disciplinis, eo usque versatus est, ut ad illud honoris summum fastigium merito eveheretur, inter peritissimos scientiae ejus cultores, dami forisque, optimo jure aestimatus. Qui mihi, et conatibus meis usque favens, triiduo tantum ante obitum descendum nec opinatum, pro sua erga me humanitate, eujam benigne concessit, ut Tractatulum liceret ipsi inscribere: lucillum, eheu! summae benevolentiae pignus! Memoriae ejus hoc tributum saltem persolvam!

*Et fungar inani munere!*



TENTAMEN MEDICUM INAUGURALE,  
DE VERMIBUS INTESTINORUM:

QUOD, ANNUNTIU SUMMO NUMINE,

*Esse Auctoritate Reverendi obsecrandi Vobis,*

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

*Academice Edinburgense Praestitit*

SEU MORS

*Amplissimi SENATUS ACADEMICI Concilio,*

*Et Nominatim FACULTATIS MEDICAE Decretis:*

PAO GRADU DOCTORATUS,

SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGIVIMUS CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JOANNES FYSHE PALMER, BRITANNUS

Ad Diem 2 Martii, hora locoque solitis,

1766.

---

Viro clarissimo,  
GULIELMO CULLEN,

Collegii Medicorum Regii Edinensis

Suo dignissimo;

Medicinae et Chemiae

In alma hac Academia

Professuri celsiterrimo;

Ob summam humanitatem,

Et innumera erga se beneficia,

Hanc Dissertationem

Dicatam voluit

JOANNES FYSHE PALMER,

## DE VERMIBUS INTESTINORUM.

**N**ATURA vitae animatae ortui et incremento benigne alicui consulit, ut nulla non materies incolis suis gaudet, nulla non huic aut illi animalium generi nutrimentum praebet et hospitium benignum. Neque vegetabilia huic muneri vacare, immo alia aliis animalibus nutriendis inservire voluit. Vis enim ulla reperias animalia, quae non viva adhuc et valentia (ut de mortuis nihil dicam) victum sedemque fortuitam dent plurimis aliis sibi perpetuo adherentibus, et eadem gaudentibus forte; adeo ut, illis florentibus, haec quoque valeant, illis pereuntibus, dispareant. Bene igitur parasitici haec audiunt, quorum salus, animalium, quibus adherent, salute omnino pendet.

Horum in numero saepe recensentur vermes illi, qui ventriculum hominis et canalem intestinale pro sede habent. Quoniam autem vermes illi saepenumero corpus humanum misere excruciant, et summam medicinae operi postulant, de his impraesentiarum loqui, haud ex re esse videtur.

An non igitur ex corpore humano ortum et auctum ferunt, aut foras enati, et forte quadam in corpus delati, victu quodam fortuito vitam tolerant, primum omnium quaerendum est.

Si vermes illi revera hominibus congeniti sunt, quid obstat, quo minus unumquemque pariter veant? non ex est apud homines, saltem apud imobiles adhuc et tenellos, diversa vivendi ratio, quae pro hujus diversitatis causa haberi potest. Quamplurimi autem ab ineunte aetate usque ad senectutem his omnino carent. Adde, quod vermes non omni vitae tempore, neque omnes gentes invadunt. Rarissimi in infantibus ante ablationem, rarissimi in proVectioris aetatis hominibus observantur. Quod si Theophrastum (a) et Plinium audiamus, hoc malo Thraeces, Phrygesque, et Athenienses nunquam non immunes sunt.

Anne igitur existimandum est verminum ova per totum humanum genus undique deferri, et apud hos rarius, apud illos nunquam vita animata coepisse sui? Longe a naturae sagacitate, ab illi inanis istae agendi modus.

Quid quod varias parasiticorum species vertit quibusdam legibus a se invicem distinguantur? neque, his violatis, ad tigridem unquam (b) lenis pediculus migret, aut planta bu-

E =

jus

(a) F. Hoffman, in Supplement. 6. part. 11. p. 576.

(b) Vid. Cl. Redi exper. in viv. animal.

jus arboris alteri innascatur. Aliæ vero vermium intestinalium species aliis animalibus pariter insident: simul enim in canibus, in tigride, in vitulis, lumbricum teretem invenit *Redi* (c). Singulas tæniæ species in canibus reperit *Linnæus*, et in eodem cane diversas *Van Dæuten* (d).

Parasitici etiam certam quandam animalis plantæve partem sibi pro sede vindicant. Lumbrici vero et in renibus reperti fuerunt, et in vesica, sub membrana hepatis tæniæ, et in vagina ascarides. Attamen paulo magis a se invicem discrepare diversa animalia videntur, quam diversas ejusdem animalis partes.

Quin et extra verum animatarum termines nonnunquam evagantur vermes. Ita semel in puteo (e), bis etiam in palude, inventam fuisse tæniam legimus. Ascarides quoque (f) in paludibus et locis lutosis reperti sunt. Lumbricum quidem hominis teretem, nusquam alibi quam in animalibus adhuc compertum esse fatendum est.

His ex omnibus vermes eos ex parasiticorum numerum esse, minus verisimile videtur. In corpus igitur quodammodo extrinsecus deferantur, et huic aut illi corporis statui salutem acceptam referant, necesse est. Nullus vero in corpus, præter os, patet aditus, quod cibus recti et inviolati subeant. Forma autem vermis introeuntes facile indicaret, adeo ut non, nisi sub ovarum specie latentes, in corpore inire viderentur.

Omne ovum non nisi quodam certo calore et tempore constituto promovetur, crescit, maturascit. Attamen eodem aut quam simillimo omnes homines sunt calore, ut nulla ex ea re diversitas oriri posse videatur.

Quo velocius igitur aut tardius per intestina transit cibus, eo plus minusve vermes provenire debeat, sæpius apud tardiores alium, apud solutius rarius. Longe vero aliter sese res habet. Iste enim, qui vermibus laborat, incertius est, haud raro itrida, frequentissime laxior. Neque a vermibus oritur hæc laxitas, utpote cū omnes pueri et infantes pariter sunt obnoxii.

Nulla vermium frequentius habita est causa, quam mucosa intestina oblinens. Potius autem a præconcepta quadam theoria ortum duxisse videtur hæc opinio, quam a re ipsa. Majorem enim mucæ intestinalis copiam in tenero quam valuit corpore habitu inesse minus certum est, neque ab illis exempla fide satis digna apparet.

Si

(c) Exper. in ziv. animal. p. 76.

(d) Tentam. inaugur. De Vermib. Intestin. p. 24.

(e) Amoenitat. Academ. vol. II, p. 93. (f) Ib. p. 72.

Si a mucosa membrana in aliis corporis partibus, scilicet Schistelleriana, judicare liceat, longe aliud est. Quod si verminantium faecibus saepius adest mucus, hunc ex ipsa vermibus, potius quam intestinis, profluere credendum est. In lumbricis enim terrestribus, et plurimis hujusmodi animalibus, muci secretandi facultas inest, quo excreto, quotiescunque acco quâdam corpori obveniat, sese rugantur. Sic et glomerati quotquot excreantur vermes, hoc semper mugo obducuntur.

Ex amaritudine quae vermes plurimum solet lacerare, bilem etiam iis necituram fore, et quo sincerior cuique esset bilis iis a vermibus immunior fore, falsum creditum est: et duodenum enim perinde ac caetera intestina lumbricis et taeniis secat, et in ipsis hepaticis ductibus priores nonnunquam comperti sunt. Neque ictერი, quibus omnino sistitur bilis fluxus, simul et obstricta alvus, et infirmum corpus adest, vermibus insigniter laborant. Adeo non ex bilis natura vermium pendet aut ortus aut interitus.

Nec magis digestionis viribus conjunctis nititur, quoniam cibi desiderio, quod validam digestionem potissimum indicat, multum inter se discrepant vermibus affecti. Imo in eodem cibi appetentia indices immutatur, nunc admodum vorax, nunc penitus prostrata. At vim cibi concoquentem in ventriculo omnino inesse, neque eam vermes intestinis latitantes attingere, quis forsitan objiciat. Quam levissimi tamen hoc sit momenti, imo patet, quod saepe in ventriculo diu impune latuisse vermes, pro comperto habemus.

Quoniam igitur neque congeniti sunt vermes, neque corporis praedispositio iis extrinsecus delatis inserviens, aut a muci copia uberrima, aut a cibi tardiori celeriorive per intestina transitu, aut bilis natura aut digestionis viribus pendet, veram corporis praedispositionem, ortui eorum et incremento inservientem, adhuc in dubio esse ingenue fatenti minus erubescendum est.

Quamvis autem adeo in incerto est, quam ex causa corporis ille habitus, vermium saluti favens, pendeat, certior remotis causis fidem adhibuisse videntur auctores; recte necne, parum constat. Haec ad duo fere capita referri possunt; alia, quae corpus afficiunt; alia, quae vermium generationi extra corpus inserviunt.

Illius generis sunt, tempestates anni pluviosae, vita sedentaria, morbi chronici, et quotquot alia corporis prosterunt vires, regiones calidae, vis nimia aquarum circumjecta.

Inter



Inter hujus autem generis causas, ea fere omnia enumerantur, quae caeterorum quoque insectorum generationem promouent, nimirum tempestates humidae, et maxime omnium loca palustria, et aquis saepius obruta. Ita febrem verminosam epidemicam deluvium quendam apud Batavos e vestigio locutam esse, apud Van Doeveren legimus, qui id saepius accidisse testatur.

At ex analogia argumenta petere, donec historiam eorum naturalem magis compertam habeamus, minus licet. Nec praeterea ex iis omnibus causis, quae corpori minuunt vires, vermium generatio promoveatur, necesse est. Neque enim, si corpus atrisque simul laboret, ex illis haec oriri satis constat.

Nihil vero pro causa occasionali habendum est, praeter ea quae aut vermes aut vermium ova in corpus devehunt, cibos nimirum potuisse.

Lumbrici autem testis humani naturam penitus ignoramus; neque, quam extra corpus sede gaudeat, satis novimus. Quam igitur sub forma, aut quo vehiculo, latentibus illis in intestina pateat aditus, nesciamus necesse est.

Male sane hac de re audiant fructus, praecipue immaturi, legumina, farinacea, dulcia, &c. Horum quidem effectus in pueris adeo luculenter patent, ut minus in dubio esse videatur.

Taeniarum et ascaridum origo clarius apparet. Haec in locis palustribus, illas in puteo repertas esse, supra dictum est; adeo in potu latitantes in intestina facile deferri possunt.

De uniuscujusque vermis propria natura dicere, jam progrediendum est.

### DE TAENIA.

Generici Taeniae characteres ex formae suae simplicitate, et ex articulorum numero assumuntur.

Differentiae autem specificae ab osculorum situ, quia caeteri quique corporis ejus habitus, color nempe et consistens, nimis in variis variant.

Genus ergo a Linnaeo hoc modo definitur, "Vermis corpore simplicissimo, articulatus."

Prima species dignoscitur osculis marginalibus alternatis. Haec nota a secunda differt, cujus in uno latere bina foramina patent. A tertia, cujus in latere unum tantum exstat. A quarta, cujus in marginibus duo sunt oscula opposita.

Prima

Primae speciei synonyma sic se habent :

*Tænia articulata* *veres.* *Faun. Suec.* 1367.

*Lumbricus latus.* *Tyson. alt. duplic.* 1653.

*Solium Andeli,* fig. 5.

*Lumbricus latus.* *Consl.*

*Vermis cucurbitinus.* *Plat. prax.* 293.

Varia hujus exhibuimus figurae, sicut a diversis diversimode delineantur. Vide Tab. I.

Cum primum ab intestinis *Tænia* fecernitur, liquore albido nonnunquam adeo turget, ut cylindricam fere sumat formam. Vid. Linn. *Amoenitat. Acad.* vol. II. p. 75. cujus imago exhibetur in Tab. I. fig. 3. Frequentior autem ea est, quae ab Andry et Vallinieri depicta exprimitur in ejusdem Tabulae fig. 5. Postquam vero per horas aliquot in vini spiritu immersa fuerit, omnino evadit plana, in fig. 2.

Singuli articuli longitudine plerimum inter se discrepant. Vermibus his, qui in fig. 2. delineantur, cum primum ex intestinis prodierint, articuli longitudine fere pollicem aequabant, pari, si dimidium tollas, latitudine, figuris 4. et 6. expressi, et Tysoni et Consl. tabulis quam proxime accedentes. At postquam sub die jam paululum temporis mansissent, eadem, qua superiores, forma fuerunt.

Annuli quemque inter articulum, perquam evidenter a Linnæo ac Andry descripti, in figuris 4ta et 5ta Tab. rmae depinguntur. Vermis autem, cujus mihi videndi data fuit occasio, nulli adfuerunt. Nec nisi prominentem quasi unius articuli finem illius cervici paululum incumbentem, videre largitum est. Quod si in rugas postea magis abierint, minime id formae suae proprium censendum est.

Articulorum numerus, et perinde vermis longitudo, nullis enervetur legibus; varia ex autoribus hujus rei exempla collegit Cl. Van Daeven. Unam quidem memorat, cujus abrupta quatuor portis ultra quadraginta longitudine aequavit. Alteram Boerhaavius a Russo quodam excretam, quae trecentas. Alteram autem Tysonus vidit, quae, quamvis tantum viginti quatuor pedes mensurabat, articulos tamen quingentos septemque habuit. Hujus vermis articuli, apud finem latiore, pollicem, apud tenuiorem, pollicis quartam fere partem longitudine expleverunt, atque ad mediam partem semipollicem aequabant. Quod si hoc modo vermis a Boerhaavio descripti articulorum numerum ad calculum subducimus, ex articulis 21600 constare inveniemus; rem sane miram, nec fide dignam, nisi tanti viri testimonio confirmaretur.

Singuli articuli unum ad finem abruptam quasi et angularem, ad alterum formam ovatam induunt. Pars ovata tenuior, magis quam tumidiore corporis partes, pellucet. Illa paululum eminet, quae proximi articuli ovatae incumbit parti. Alteri quidem singulorum articulorum margini infidet papilla, de cuius natura alibi fusius dicetur. Huic fere margini per duos articulos, illi per binos proximos annectitur; quandoque libimet alternis succedunt vicibus, nonnumquam per tres continuos articulos, rarissime per quatuor eodem margini adhaerent.

Si digitus leviter per corporis superficiem ultra citroque moveatur, modo laevis, modo aspera videtur; scilicet ab articulorum junctura, potius quam ab ipsa articuli asperitate, hoc pendet. Hinc, si quando magna pars vermis excernatur, globulus ille spiculis armatus, qui sui tenuiori adhaeret, necne prodierit, videre facile est.

Papillae cuiusque articuli margini insidentis forma, microscopii ope adhaerens, in Tab. II. fig. 7. uti a Tysono depingitur, hic adfertur; quo vero modo hanc pro re nata projiciat vermis, in Tab. ejusdem fig. 8. exhibetur. Annon tentaculi aeque ac oris officium hoc praestet, in dubio est.

Si Taenia aëri per paululum temporis exposita exsiccatur, pellucida evadit; et vasa aliquot lacteo quodam liquore repleta in lucem prodeunt, quae a Valisnieri descripta in Tab. II. fig. 1. repraesentantur. Inter haec et tubulum lateralem in utroque margine, cui nomen ponit Intestini Coeci, communem viam pandere dicit, minime vero inter duos articulos. Hi ramuli microscopii ope in ejusdem Tab. fig. 2. clarius patefcunt, uti a Malpighio delineantur. At Ant. de Heyde, quamvis vasa lactea minus loculenter in figuris suis depinxerit, tubulos laterales optime expressit; nihil tamen omnino de eorum natura locutus eo loci quem memorat dominus Clericus. Vide ejusdem Tab. fig. 3.

Et hic autem et ille, singulorum articulorum structura haud male exposita, quas vermis naturam, omnino in tenetis sunt; nec ullis probant argumentis, utrum singuli articuli pro totidem animalibus habendi sunt, aut ex pluribus articulis unus constatur vermis.

Ernst. in dissertatione de Taenia habita apud Halleri disput. med. vol. III. p. 441. de hujus speciei natura fusius et loculentius disseruit. Huic Taeniae speciei colorato quodam liquore per papillas marginales injecto, vasa, quae Tab. II. fig. 4. exhibet, clarius vidit.

a. a. Foramen externum repraesentat, quod ad alterum  
interius







FIG. 2.



FIG. 3.



FIG. 4.



FIG. 5.




FIG. 6.




FIG. 7.



FIG. 8.



FIG. 9.



FIG. 10.



FIG. 11.




FIG. 12.



FIG. 13.



interius et ex aduerso rectum ducit; hoc invicem ad tubulum intestinalem, ex quo ad tubulos transversos minores patet via. Inter laevales etiam tubulos, quorum ope singuli articulari motum conjunguntur, commune iter panditur.

*c. c.* Locus quo articuli inter se committuntur.

*d. d.* Canales a Domi. Erull. reperti, quibus liquor per foramen immixtus fuerit articulozoni margini.

Eodem experimento iterum facto, vir Cl. simul et humanissimus Alex. Stromm junior, eadem fere omnia quae Erull. memorat, si paucula quaedam minora tollas, invenit. Argentum vivo in Taeniac, quae quatuor jam dies vini spiritui mixtura labens fuerat, foramen externum immixsit, ea lora quae in Tab. II. fig. 5. et 6. delineantur, videri. In 5. 5. vasa longitudinalia et transversa illa ad articuli cusulque sinum posita, omnino impleta fuerunt, caetera chylo surgentia mercurio viam dare noluerunt. In fig. 6. liquore aërio immixto, articuli illius cui inserta fuerat fistula, vasa transversa impleta sunt, nec non parvum longitudinale alterum sinui et transversum ad basin; caetera autem chylo etiamnum obstructa sunt.

Tam ex his quoniam illa experimentis singula transversa vasa tubulum longitudinale ad partem suam extremam intrare nullo videntur, quod neque notat Erull. nec ejus figurae indicant. Foramen autem internum externo illi ex aduerso situm memorat, cuius videndi nulla nobis oblata est singula. Quia subjicit, "Ex istam post orificium hoc minus incidimus in punctum aliquot nigricans, si recens scilicet fuerit Taenia; nam et hoc phaenomenon evanescebat parvum cum caeteris." Neque hoc vidimus, ob hanc fortasse causam, quod pauciores nobis fuerint Taeniae recentes. Haec tere de Teniae structura comperta habemus, quae admirabili simplicitate sua caetera omnia animalia facile superat.

Quod si membrana eadem tota corporis longitudo vestitur; si singulos inter articulos communis panditur via; si, parte altera irritata, caeterae omnes dolentes in eas se emittant, (quae omnia facile apparent); quid obstat, quae minus mira hoc volumina unius animalis nomine dignemur, et Taeniam salutemus? Neque animalis longitudo aut orum numerus repugnat. Scilicet totidem oribus unino opus est, quae saepe molli cibos praebant et incrementum. Alios tamen ad alia se junctos articulos vita etiamnum paululum temporis frui, qui fortasse dixerit. Hoc autem aliis vermibus commune est; et si parte maxima ex-

creta, caetera adhuc vivant valeantque, id omne ex miris partium ejus simplicitate oriri penitus videtur.

Hoc autem animali caput, aut saltem pars extrema altera propriis gaudens dotibus, propriis muneribus vacans nullis, necesse est. De hujus capituli natura pauca dicere, haud abs re esse duximus. Animalia nobiliora ure, naso, oculis, auribus, et nonnunquam antennis gaudent. His autem (ut ita dicam) numerum gentium decem sensuum numerus ille benignus, et acumen exquisitum. Quid enim hoc animali oculis opus est, cui in lucem nunquam prodeundum est? aut naribus, cujus ori victus perpetuo adfertur? Eum quidem capituli structuram esse nobis in animum inducendum est, quae reliquo corpori et caeteris facultatibus potissimum conveniat. In prima specie tres tantum capituli varietates ab autoribus notatas esse invenimus. Valisnieri, hypobelli suscinimis obsequens, singulis articulis capita duobus tribuit, quorum ope cuique proximo adherent. Attamen nil tale ab alio quopiam inventum est: disrupta autem Taenia, nunc huic, nunc illi articulo temere adest abrupta partibus; saepe etiam laevi utroque sine est. Quin et repugnat anatomia; nec microscopio se unquam adjectum esse dicit. Missa igitur hac hypothese, ad Andry sententiam deinceps perveniendum est, qui Taeniae caput ad modum Tab. II. fig. 11. delineat, quatuor aut oculis aut nasus praeditum esse contendens. Nulla vero argumenta aut ille aut alius quisquam praefert, quibus fide adhibita, hoc animal inutiles adeo sensuum copia gaudere concedamus. Fusius autem, et accuratius hac de re in Actis Philol. Anglicis disseruit Tysonus, huc fere modo. "Canem in medicorum collegio cultro subjeci; et vermem in intestino ileo vivum, variis autem ambagibus circumflexum, inveni. Articulorum sicut cum jam accuratius adnotassem, finem tenuiorem versus, quo caput latere existimabam, vermis decursum subsecutus sum, intestina caute admodum secavi. Finem tenuiorem tandem in duodeno, latiore in recto inveni. Hic nulli parti adhaerens, ille autem tunicis intestinorum intestinari penitus adeo adhaerens, ut non sine labore, ungue leviter admoto, possem avellere. Caput proprius aspectui nec bicipitem Tulpii nec tricocton Michaelis Febr. referre inveni; quale vero in Tab. II. fig. 12. et 13. exprimitur. Caput binis hamorum ordinibus confectum est, quorum alteri e centro prodeuntes circuli peripheriam omnino separantur, alteri minores haud attingunt. Foramen nullum, neque aliquid praeter levius notam cuncto inesse vidi. Duorum aliorum vermium capita, haec perquam

perquam similia, videre mihi contigit. Postea autem huius hamos vel nudis oculis accuratius intuenti inspexi." Haec verba viri clarissimi insisque fidelissimi satis per se valent; plura tamen proferre licet, nec levius momenti.

Ita Listerus se Taeniam vidisse affirmat, ejus finis tenuior in parvulam quandam quasi fibulam abijt. Lieuwenhoeck de hac re ita loquitur: "Vidi in duobus anguillis vermes adeo longos ac intra nunquam vidissem. Hos omnes ab intestinis avellere conatus sum, sed frustra, quia caput vermis tam firmiter intestinis erat fixum, ut hoc avellere non possem, nisi corporis anfractone." Clar. Van Doeveren se in anguilla idem vidisse dicit: atque etiam Herenschaad tradit, Taenias sibi visas esse, finem suum tenuiorem intestinorum membranis adeo firmiter insistentes, ut innocuas avellere nequirit. Quin et aegros rarius convalescere, nisi finis Taeniae tenuior expulsus fuerit, observatur. Bunner, qui Taenias plures viderit, semel tantum aliquid invenit, quod capitis similitudinem praese ferebat. Similiterque Dionis sibi Taeniam esse testatur, in qua revera caput videre fuit. Linnaeus autem, in his rebus versatissimus, quatuordecim Taenias in eodem cane reperiit, ne in uno quidem caput potuit deprehendere.

## DE TAENIAE SECUNDA SPECIE.

Taenia (g) osculis lateralibus geminis. Tab. III.

Taenia articulata plana. Faun. Suec. 1266.

Taenia. Schenckii obs. iii. pag. 308.

Lumbricus latus. Spigel. Monogr. Barth. An. 1673. pag. 148. tab. 39.

Lumbricus latus-Taenia intest. Plat. prax. 992.

Taenia vulgaris. Andr. tab. 9.

Talpis. Beverl. Thesaur. 202. fig. 202.

Lumbricus latus. Mer. pin. 206.

Lumbricus latus, Olaut. Borrich. An. Hoff. vol. ii. obs. 47. Tab. epist. ad Sarac. cent. 2. obs. 70.

Taenia primi generis. Le Clerc. d. Lumbric. lat. p. 145.

Quoniam hanc speciem nunquam videre mihi contigit, descriptionem ex Amoenitat. Acad. potius exsumam.

- "Corpus habet album, planum, lineare, et fere membranaceum, articulatum, latitudine vix pollicis, angulis acutis, et mediantibus articulationibus quasi serratis;
- "altera extremitate plerumque truncatus est vermis, altera vero sensim attenuatus.



" Articuli singuli sunt plani, quadrangulares, latiores  
 " plerumque quam longi; oscula subita in latere plano,  
 " singuli segmenti gemino: altero scilicet versus basim  
 " articuli constante foramine minus marginato aut pro-  
 " minulo, et alio foramine minus conspicuo, ante priorem  
 " abbas, in centro fere articuli, longitudinali."

Figura a domino Fabricio prodita, hinc adeo simile est,  
 ut ad eandem speciem referri sua esse videntur. Vid. Tab.  
 III. fig. 3. Eam ita describit. " Vermis laevis erat gra-  
 " tex, crasse vero grana duos a minutissime duorum gra-  
 " norum interstitia habet; ex una parte aliquo modo cili-  
 " vata et serrata. Colore albus, uniusque rangis inter in-  
 " terstitia maculis nigris adpersus, et in medio ex qua  
 " cavitate praeditus erat Lumbricius ille. Ex una parte  
 " in tenuissimum filum dehaerens, reliqua longitudo ejus-  
 " dem est latitudinis; nec caput ullum in illo observavi,  
 " ut nec in aliis hujus generis Lumbricis." Hujus quo-  
 " que descriptionem exhibet dominus Le Clerc; sed ejus  
 " figuras tantum, nempe quartam et quintam Tab. III. ad-  
 " jicere necessarium duxi.

Fig. 6. Taeniae ejusdem frustum est cum annulo capite,  
 quale rocem excruium inspectum fuit.

Fig. 7. Idem caput exhibet calcitatum, microscopio au-  
 tum; hoc autem, simul et

Fig. 10. A Linnæo excerptum, cui finis laevis est fortuito  
 divisus, monstrare esse existimamus.

Quamvis hujus speciei anatomia minus nota est, verom-  
 inen in Tab. III. fig. 1. dom. Linnæi vasa quaedam in-  
 terna adparent; et in fig. 3. et 5. dom. Fabricii et Le Clerc  
 vasa per totam corporis longitudinem decurrere videntur.

#### DE TAENIAE TERTIAE SPECIE.

Taenia (4) ascutis lateralibus solitaria. Tab. III. fig. 2.  
 Spigelius. Lumbric. Lat. de L. L. p. 43.

Cujus dominus Linnæus sequentem dat explanationem.  
 " Constat corpore plano, membranaceo, flexari, antea  
 " truncato, postice lentim in acumen attenuato, artien-  
 " to lino, secundum articulos margine serrato; margines in  
 " hac Taenia plicatae sunt, et superficies utraque, seu la-  
 " tera plana, quaque linea longitudinalibus exarata. Os-  
 " cula in hac longa brevissima, ita ut latitudo vermis fere  
 " decupla respectu longitudinis articuli, osculum seu po-  
 " ros unicus modo conspicitur versus basim articuli, in la-

21 100

FIG. 1.



FIG. 2.



FIG. 3.




FIG. 4.




FIG. 5.




FIG. 6.




FIG. 7.



FIG. 8.



FIG. 9.



FIG. 10.




FIG. 11.



FIG. 12.



FIG. 13.





" fere plano, ut in præcedente." Rarissime simul dicte hanc speciem se invenisse.

Fig. 9. Tab. III. ejusdem figuram a Spigelio delineatam exhibet.

Fig. 10. Tab. ejusdem, Fructum latus et monstruosum a domini Lütke.

Fig. 11. Tab. ejusdem, Fructum finis venulosi cum adnexo capite a *Idem. Fehr.*

#### DE TACIANI QUARTA SPECIE.

Tania osculis marginalibus appellata. Tab. III. Fig. 12.

*Rusch. Obs. 84. Sparg. del. Stuehalm. 1787.*

Tania Spigellii degnat.

Lumbic. Lat. *Cornel. Germ.*

" Hujus magnitudo vix existitiam fili tenuioris superat,  
 " quantum nobis observare etiamnum licet. Pelluciditate  
 " a reliquis distinguitur hinc punctis inter substantiam ab-  
 " seque, et quod articuli ejus lineares scemo glossem lani-  
 " gitudine sequant, quod vigetis longitudo latitudinem  
 " superat, et quod pars antica nulla modo marginem ha-  
 " beat, nisi antecessores species. Oscula ad marginem seu  
 " latera convexa articularum in eorum medio, uti in ge-  
 " ne prima, sed ita ut oscula hæc ab utroque latere arti-  
 " culi reperiantur opposita; quorum tamen osculorum ab-  
 " serui fere semper minus est, et fere obsoletum (1)."

(\*) Fig. 13. ejusd. Tab. eandem speciem exhibet, a *C. Germ.* excerpta.

#### DE VERMIBUS TERESTIBUS.

Ab externa Lumbricorum forma hos ad eandem se ter-  
 restres speciem referre facile adducemur. Proximo adco  
 intervallo a se invicem distant, ut vel sagacem illum Lin-  
 naeum in errorem induerint. Quod si accuratius et hunc  
 et illum intueamur, plurimis tam externis quam internis  
 notis aliuto ab aliis distingui perquam manifestum erit.

Lumbricus humanus est vermis teres, incertae longitu-  
 dinis, rarius pallidibus duodecim majoris; crassitie pennam  
 asperinam fere exaquant; cute sordidifere, lubrica, pel-  
 lucida, vasculis quibusdam albis et tenuissimis sobtus ap-  
 parentibus, et annulis tenuibus et vix conspicuis distincta,  
 hinc utroque mucronato.

Ante-

(1) *Don. Annulat. Academ. vol. 5. p. 32.*

(2) *Vid. Le Clair, De Lumbr. lat. p. 232.*



Attamen vermis terrestris est, sine antrixiore crassior, ephippio subrobescente, glabro et prominulo, ventre plenu-  
usculo, et duplici binorum pedunculorum ordine ad utrum-  
que finem mucronata.

Cl. Redi hujus varias exhibuit species. 1. Cum Ephip-  
pio et Cauda terete; 2. Cum Ephippio et Cauda plana,  
instar olivae foliorum; 3. Sine Ephippio et Cauda terete;  
4. Sine Ephippio et Cauda plana. Praeter alias duas,  
mole potissimum a se invicem disjunctas. Inter has vero  
species propriam quiddam interesse discrimen, minime in  
animum inducere possum; plus quam ducentis enim se-  
dulo examinatis, ne unum quidem ephippio carentem in-  
veni. Haec quidem nota nunquam minus evidenter  
apparet, et ejus loco lucida quadam glabraque superficie  
tegitur corpus; mox caudam versus planus teresque eva-  
dit. Alias notae quae ad molem spectant, potius aetatis  
quam speciei esse videntur. Sed his praetermissis, ad alias,  
quae ad rem nostram magis pertinent, differentias deveni-  
endum est. Quo clarius hoc discrimen elucescat, utrius-  
que anatomiam in figuris, hanc a *Willis*, illam a *Tylone*  
subjungemus. Vid. Tab. IV. fig. 1. 2. 3.

Fig. 1. exhibet lumbricum, teretem, terrestrem, supinum,  
cujus pars maxima aperitur, adeo ut cerebrum, praeco-  
dia, viscera, aliaeque partes in lucem prodeant.

A, Lumbrici os cum mento.

B, Cerebrum, in cujus superficie arteria porrecta ad earum as-  
cendit, et inde ad caudam.

b, b, b, Musculi anulares aperti et explicati cum tendinibus.

C, Oesophagi portio.

D, Cor.

E, Globuli albicantes supremi, tum majores, tum minores.

F, F, Duo globi infimi ovis gravidi et impleti.

G, Stomachus cujus tres ventres sunt.

H, Intestinum a ventriculo descendens, musculorum annu-  
larium tendinibus in quaque sectione constrictum, instar  
coli in perfectis animalibus.

I, Ejusdem intestini portio aperta, quo corpus in eo inclu-  
sum, seu intestinum in intestino conspici possit.

K, Corpus illud interius, quod hepatis et mesenterii hanc  
esse videtur. *Vid. Willis, De Anima Brutorum, p. 66.*

Fig. 2. et 3. ejusdem Tab. a *Tylone* desumptae sunt, et  
effigiem Lumbrici humani referunt.

Fig. 2. Vermis maris corpus apertum dat. a, Os et oris



TAB. IV.

FIG. 3.



FIG. 10.




FIG. 4.




FIG. 2.



FIG. 1.



FIG. 7.



FIG. 5.



FIG. 1.



FIG. 6.



FIG. 10.



FIG. 11.



labia; *b*, oesophagus; *c, c*, intestinum crassum; *d*, penis;  
*e*, vesiculæ seminales; *g*, testes.

Fig. 3. Vermis feminea corpus apertum. *a*, Os; *b*, gula;  
*c, c, c*, intestinum; *d, d, d*, uteri cornua duo; *e*, vagina;  
*f*, vasa spermatica; *g*, anus.

Satis manifeste ex autopsia apparet, hæc animalia inter se discrepare; nec unquam vel hoc in corpore humano, vel illud in terra inventum fuisse compertum est. Cl. autem Redi, in his rebus versatissimus, in errorem incidit dum discrimen inter vituli hominilque Lumbricos inter esse docet; at in hoc tantummodo Lumbricum marem, in illo femineum se cultro subiecit constat. Neque color speciei discrimen notat. Lumbrici enim terrestres, qui pro sua natura rubelliores sunt, in saccum molem putentem conjecti, mox albescunt, neque quavis alia causa pendet coloris in corpore humano immutatio, cujus probandi occasio nonnunquam mihi oblata fuit.

De altera quadam specie apud Le Clerc legimus, et a seipso et a Shalbo visa. Vid. pag. 216. Hæc autem cornu membranaceo ex altero sine prodeunt, seu potius criniculo, ut ait Le Clerc, distinguitur. Pace tamen tanti viri discrim, hoc nihil omnino præter maris penem esset luminibus anim ad maris figuram rectis, penem extrusum cornu formam indicare posse, nemini non apparebit. Vermis tères in corpore humano impari et magnitudine et numero inventus est. Cl. Van Doeveren alios quinque pollices, alios ulnae dimidium longitudine exaequantis invenit. Baglivi autem de Lumbrico serere ad triginta pedes porrecto mentionem facit. Acque discrepat vermium copia, prout pluribus exemplis ostendit Scheenkius. In mendicis ejusdem cadavere viginti reperti sunt. Ex puero septimum annum agente, centum et quadraginta octo exerciti fuerunt. Mulier quædam, sumpta fuera piera, quadraginta vermes excrevit. Senex, octoginta duos annos natus, plures quingentis vermes per anum expulit. E puella ommutefcente, quadraginta duo una cum faecibus exierunt, in nodum compoliti, quæ statim curvaluit. Centum et septuaginta septem, rejectus fuisse memorat Gabucinus. Plura profecto exempla perquam facile est, hæc tamen abunde sufficiant.

Non tantum in homine, ac sæpius in canibus, in tigride, in vitulis, in viperarum etiam intestinis, reperitur hic vermis. Scilicet Redi in una eademque vipera femina plus quam triginta vermes stomacho et intestinis, imo et asperæ arteriæ insidentes reperit. Neque semper eadem gaudent lumbrici sede; crassissimum enim lumbricum in martis rene, etiamque



namque sub pelle leonis, leonum et martium multatamque multitudinem inventos esse Redi ostendit. Idem vero in corpore humano nonnumquam colligit; hæc vero omnia non solum effectus referenda sunt, quiniam alios quoque non nisi septis etosis pleurisque perunt.

#### DE ASCARIDE.

Variae apud autores Ascaridum exhibentur figurae, quæ adeo sibi differunt, ut omnino diversa animalia representare videntur. Consueti, qui maxime omnium in errorem incidit, hæc Ascaridum figura. Vid. Tab. IV. fig. 2. quæ certe nil præter tenuis digitorum cariem referunt, eamque cucurbitulis hoc nomen imminere potuisse satis constat. Proxima figura, nempe 3<sup>a</sup>, a Cl. Redi deturgetur est, qui ea in his rebus perita est diligentia, ut eius rebus summa merito adhibeatur fides. Fig. 4. exhibet leonem, microscope ope auctum, minimorum illorum vermium capidulorum, qui una cum fecibus et intestinis infantum exeunt, quosque Ascarides vocant. Figuris minoribus nullam inieciit notam, easdem autem ac priores valentur: at magnitudine naturali (a). Nilil insuper de his memorat, neque eos in examen se datus vocasse unquam profectus felle ille huiusmodi animalium naturæ indagator, cujus accurata diligentia aliorum labores irritos et pueri supervacuum aliter effecisset.

At Van Phellus, qui plurima de his in lucem edidit, quique sæpius hæc vermes oculis adspexit armatis, longe diversas exhibuit figuras.

Ascaris igitur cujus nomen est *Ascaris* remota, et vermibus parvis et rotundis, circiter sibi tenuioris crassitudo, pollicis quartam longitudine æquans, ad utrumque siccum attenuatus, anteriori autem paululum obtusus. Unde pro magis quam minuis sciet corpus, et colore albido est. Fig. 1. 6. majorem ac naturalis magnitudinis Ascaridem, cum duobus aliis magnitudinis ulnaris exprimit.

Fig. 7. Ascaridem microscope auctum ex latere exhibet, ubi cæcis pelloculis viscera interiora patefacit.

A, Ovis reliquum.

C, Rana annulari capiti terminum faciens.

D, Oesophagus ex A, ad C, tendens, nonnumquam in medio amplatus.

G, Ventriculus fortitan oesophago proxime adherens.

L, Materies albicans secundum V. Phellum generationi in-

(a)

tervens, istmae ovalis, ventriculo incumbens, et plurimis globulis minoribus circumfusa.

M, O, Vasa spermatica canalem intestinale circumambiens sicut in figura exprimitur.

O, Vasis spermatici finis quam plurimis corpusculis globulis flavescens, ovulorum formam exhibentibus, relictus.

Fig. 8. E, E, Corpuscula hinc flavescens, globosa, lateraliter posticae parti corporis incumbens, quae glandularum conglobatarum speciem referunt.

Fig. 10. Ascaridis caput valde auctum, et oris rimae.

Ea igitur sunt figurae: plerumque in crassis intestinis, et praecipue in recto latentes, ex quo una cum faecibus facile excernuntur. Excreti cito ab externo frigore pereunt; si in aquam tepidam injiciuntur, paululum temporis superstitibus circumstant. Hos animalculis in caseo degentibus similes fuisse creditum est. Hoc autem aegri cujusdam historia a Cl. V. Swieten memorata probare videtur, qui nunquam non, postquam caseum degustasset, hos una cum faecibus secundum circiter diem excernere solebat (n).

Inter haec animalia autem ut Ascarides quam certissimum datur discrimen, quoniam illi formam immutant, haec nunquam (s). Quin et Ascarides in paludibus et locis lutosis habitant; idem autem eo verisimilius esse videtur, quia facile adeo in aqua innatant, ut supra dictum est. Extra corpus variis gaudent motibus, quibus et in intestinis symptomata sua produnt. Infantes praecipue, et otiose degentes, et nonnunquam seniores vexant.

Nulla alia, ut opinor, causa variis adeo edit effectus ac vermium in intestinis hospitium. Huic parti affectae ea est sensibilitas exquisita, ille cum omnibus fere corporis partibus consensus, ea in corpore humano munus suum dignitas, ut, ea dolente, vel partes aliae quaedam, vel totum corpus una simul non possit non dolere.

Varia haec symptomata a capite ad calcem progredienti enumerare lubet.

Adest faciei pulchritudo, plumbeo colore obteguntur oculi et collabuntur, inferior tumescit palpebra, caeruleo quasi annulo circumjecto, et dilatat pupilla (p). Nonnunquam autem clari et flavescens adparent oculi, et inferior simul flavescit palpebra. Naribus adest pruritus et frequens vellicatio, et sanguinis aliquando stillicidium,

VOL. III.

G

teste

(n) Vid. Corn. in Aph. 1559.

(s) Vid. Amoenitat. academ. vol. II. p. 72.

(p) Van. Swieten, Com. in Aph. Boerh. 1562.

teste Baglivio (g). Os foetidum acido-dulcem spiritum emittit, livident dentes, sitis modo nulla, modo immanis est. Largior salivae fluxus; nonnunquam et aurium tinnitus adest. Facies fere semper pallens, ita vero ut ex intervallis mire rubescat; nonnunquam livida colore est. Inter somnum pavitant, et excitati valde trepidant; modo delirant, modo phrenitide laborant. Epidemice apud Gallos grassabatur cephalitis verminosa, ann. 1545 (r). Febilis erat amphemerina vespere quovis exacerbata, aut continue erant vigillae agrum ad phrenitidem deducentes, aut perpetuus sopor qui in lethargum abibat. Dolor plerumque capitis aderat in principis, et renum calor, maxima copia vermium vivorum per os ejiciebantur: plerisque exanthemata erumpebant, quae in declinatione apparentia, salutaria erant. Morbus quarto die ut plurimum, rarius undecimo, ad finem ibat. Historiam pueri habemus sex annos nati, qui circa lunae decrefcentiam difficultate loquendi per duos aut tres dies durante correptus est, ex quo morbo plurimis lumbricis caeteris convalescebat (s). Periodicae anxietatis cordis et inquietudinis quotidianae, cum melancholia per horam unam durante, in puerum annum 18mum agente, a lumbriciis ortae, in loco citato exemplum habemus. Saepe etiam pueros, ab eadem causa, dolor lateris pungens vexat ad inferiores costas. Tussis simul adest secca, et nonnunquam fere suffocans. Pulsus autem durus, et respiratio difficilis, comitante singultu. Inter frequentissima vermium symptomata, tussis a Cl. Freind enumeratur (t). In ventre, borborygmis, ruellu, nausea, vomitu, laboratur. Appetitus modo jacet, modo immanem in modum crescit, urgente simul aliquoromlibet ciborum salidit. In Ephem. Germ. exemplum habemus famis penitus insatiabilis a lumbricis ortae, adeo ut, nisi semper ederet, deficeret animus (u). Ab istidem vomitum cruentum ortum esse constat (x). Ventrem quoque discruciant variis dolores, qui cum modo tendunt, modo lacerant, nunc rodere, nunc pungeri videntur, ex loco in locum evagantes, jejuno stomacho praecipue aucti, post cibum capiam aut mitescentes fiunt, aut evanescent. Alvus nunc stricta admodum, nunc laxior. Urina tenuis aut cruda. Sauvages de cardialgia mentionem facit, quae in oppido quodam plures e medio sustulerit, e quibus, secto cadavere, invenit vermes ventriculi tunicis

adeo

(g) Praxis Medic. lib. 1. (r) Sauvages, clas. III. gen. 23. spec. 7.

(s) Ephem. Germ. dec. II. ann. 5. obs. 38.

(t) Hist. Phys. tom. II. p. 100.

(u) Ephem. Germ. dec. II. ann. 6. obs. 25.

(x) Ephem. Germ. dec. II. ann. 2. obs. 7.



adeo adhaerentes, ut vel perforassent (y); atque etiam adolescentulam Ilan affectam memorat, quae omnia per os rejiciebat. Eodem laboravit puerpera, ex quo ruptura inguinis et umbilici orta est; sed, excretis lumbeicis, cessabat vomitus (z). Alium quendam affectum fuisse comperimus dolore violento subitaneo, ex intervallis grassante in abdomine, cum frigoris sensu incipiente, quem vehemens universi corporis excepit motus, omnia in medio et infimo ventre quasi divulsurus, singulis diebus ter vel quater invadente, sed absque notabili dolore (a). Sauvages de dysenteria etiam verminosa mentionem facit, quae ab Augusto ad Novembrem grassabatur, qua quarta saltem turicolarum pars laborabat, pluresque perierunt. Abdominis dolores atroces et subiti aderant, simulque viscerum odor, nausea frequens, vomitus muci spermatis ranarum adinstar, defectiones cruentae et mucosae cum multo sanguine. Anthelminticis remediis curati sunt, et plurimus densum eiciebant vermes (b). Inter universales vermium effectus plurimos enumerare possumus morbos. Hujusmodi habenda est Chorea Sancti Viti ad lunae decrepesceritiam rediens, quae, expulsis vermibus, evanuit (c): atque altera, ubi perpetuus fuit artuum motus (d). De puella quoque septenni legimus, quae nec ambulare nec stare potuit, immota pendebant brachia, rigebant digiti, abdomen in immensam distentum fuit, facies cadaverosa, pedes inflati, et manus foetidissima scabie inductae (e). In Barreire *Obs. Anat.* p. 167. adolescentis Indici historiam habemus, qui in tetanum a vermibus incidit, et decimo occubuit die. Aperto cadavere, lumbrici intestinis glomeratim inhaerebant, et colon perforaverant. Catalepticos speciem a vermibus ortam adduxit Cl. Sauvages. Puella octennis, quae catalepsi saepius affecta fuerat, conquesta de cardialgia et doloribus abdomen pervagantibus, et de sensu corporis cujusdam a ventriculo in oesophagum repentis, duabus calomelanos dosibus adhibitis convaluit (f).

Pro horum symptomatum causa, effectus vermium in intestinis, quales in cadaveribus inventi fuerint, memorare haud abs re esse iuximus. Damiam,  *Synopsis* (g) duos lumbricos vivos intra ventriculi tunicas, alterum circa fun-

G 2

dum,

(y) *Clas.* vii. gen. xx. sp. 10. (z) *Ephemer. Germ.* dec. ii. ann. 8. obs. 118.

(a) *Diss. Encyclop. med.* p. 723. (b) *Clas.* ix. gen. ix. spec. 12.

(c) *Ephemer. Germ.* ann. 5. dec. 7. append.

(d) *Ib.* ann. 6. obs. 117. p. 248. (e) *Ib.* ann. 6. obs. 156.

(f) *Clas.* xi. gen. xxiv. spec. 2. (g) *Parerg. medic.* p. 62.



dum, alterum in parte superiori adhaerentem vidit. Cardiam sanguinolentam et erosam invenit Wepfer (b). Peritonaeum a lumbrico perforatum esse, et sub umbilico exulcorationem rotundam inventam esse, testantur Ephemerid. German. (i). Virginis post multa mala mortem occumbentis venter hic et illic vermibus scatebat. In altera non solum intestina, sed etiam cor et hepatis, vermibus erosa et alte excurvata esse, memorat Riverius (k). Placenta lumbricorum ab inguine prodeuntium exemplum habemus. Unus ex inguine mulieris, quae hernia laborare credita est (l). Ex vesica pueri lumbricos exisse, cui dein mortuo et vesicam et tractum pluribus locis transigi inventum est, testatur Cels. Beneroli (m). Atque etiam taeniae exemplum habemus per abscellum in inguine prodeuntis (n).

Haec symptomata medendi ratio duplex est. Primum, ut vermes e medio tollantur, cura adhibenda est; dein, ut e corpore aut vivi, aut saltem mortui, extrudantur. Plurimi scriptores mucum illum qui vermibus sedem praebet et hospitium, aut solvendum esse, aut foras ejiciendum, itidem tradiderunt: hoc autem penitus omitti volumus, quoniam aut vermium copiam ex hoc mucos pendere, aut mucum ullis remediis tuto tolli posse, parum constat. Quod si ullis ea vis est remediis, iis quae ad vermes foras ejiciendos valent, inesse omnino videtur.

De hac igitur duplici medendi indicatione jam dicendum est. Plurimis autem medicamentis vermes e medio tolli possunt. Hujusmodi sunt ea omnia quae ex asperitate sua, aut complures in angulos abeunte forma, vermium tenerum corpus vulverant, lacerant, disperdunt. Haec inter recensendi sunt rigidi illi et in acutos angulos exeuntes villi, plantae cui nomen *Dolichon pruriens* posuit Linnaeus, filiquis insidentes. Hi crassiori syrupo commisti saepius apud Orientalis Indiae insulas adhibentur, et vermibus, quibus regionem adeo calidarum incolae plurimum abhorrent, quam maxime inimici habentur. Eodem fere modo Corallina pro Anthelmintico olim usurpata agere videtur, quam ideo Gesnerus in pulverem rodigi, neque cribari, recte monuit. Chalybis et stanni limaturae in hunc numerum vulgo referuntur; illam autem stomachi liquoribus solutam, et salinae suae naturae jam computem, seneni instar, vermes trucidare, omnino certum est; hanc itidem perquam verisimile.

Oleo

(b) Gent. aquatic. hist. cap. 13. p. 216. (i) Ann. 3. dec. 2. obs. 10.

(k) Obs. morb. in freq. coll. (l) Medic. essay, vol. 1. n.º xlv.

(m) Van Swiet. comment. in Boerh. apoc. 1367.

(n) Vid. Biblioth. Rason, tom. xlv. p. 25.

Oleo etiam vermes necari solent. Perinde oleorum nitiorum expressorum copia satis magna in corpus immissa vermes illi latitantes tolli posse, creditum est; unde tamen illis ea sit virtus, minus adpareret. Neque enim veluti pluribus insectis, vermibus iis tracheam obstruere aut respirationem inhibere posse oleum videtur, quibus neque tracheam esse, neque respirationem utpote in fluido liquore vitam degentibus, nec aerem externum invisentibus, satis constat. Anne igitur vermibus noccat oleum, propterea quod intus receptum stomachi viribus neget concoqui, aut quod materiem perspirabilem praeire vetet, in incerto est. Haec tamen sententia potior esse videtur, quoniam non nisi assatum oleum exhibito convalescit aeger. Porro plurimis remediis enecantur vermes, quibus veneni ad instar affici putantur. Haec inter enumerantur omnia scilicet corpora salina, sive acida, sive alkalina, seu demum neutra. Minus vera haec valent, quia nonnisi copia satis magna, et proinde in solutius saturata et statu concentrato adhibita, vermes solent perdere: adeo autem in primis viis diffunduntur, et totidem alias subeunt vices, ut ad vermes infirmiora plerumque et soluta perveniant. Quid, quid de hac re bene audit sulphur, praecipue in vaporem conversum, quale oleo attritum, aut in hepar sulphuris mutatum, videre est. Vel crudo sulphure intus recepto, et mire quodammodo immutato, corpus humanum affici monet et experientia, et foetidus ille vapor iis, quibus adhibetur, ex corpore ejectus. Et sulphur igitur per se satis valet, et cum salinis medicamentis conjunctum feliciter agit. Hujusmodi remedia praebent aquae minerales, salibus et sulphuris hepate simul imbutae, quales apud locum vulgo dictum *Harrogate* in com. Eboracensi extant, de vermibus tollendis praecclare audientes.

Remedia vero tam salina quam sulphurea virtute sua superant corpora metellica. Mercurii sane diu inclamavit usus; neque vero mercurio decocto totidem laudibus celebrato, neque Anthiopi minerali fidentum est. Aliae mercurii praeparationes plurimum valent, si copiosius adhiberentur, magis fortasse profuturae. Aurum et argentum saepius nec improspere usurpata sunt; ea vero sunt acrimonia, ut minus toto aegris, praecipue poeris, hoc morbo saepissime laborantibus, adhibeantur. Ex cupro etiam plurima constantur medicamenta, ubi tamen futura, nisi de nausea et pluribus aliis malis concitandis male audirent. Apud hodiernos stannum praecipue in honore est, et saepius sub metalli forma adhibetur. Ex pondere et asperitate  
sua

sua tantummodo valere nonnullis visum est, inter ejusmodi remedia ob eam causam supra recensitum. Quoniam vero stannum vegetabilibus acidis, quibus abundat stomachus, facile afficitur, adeo illic loci id dissolvi, ut vermes veneni adinstar tollat, corpore parum laeso, perquam verisimile est. Neque stanni limaturis magis ea inest virtus quam pulveri ex laevibus sphaericisque, aut calci ex minutioribus adhuc particulis confecto. Utique tamen illa res sese habet, multo hoc praestit remedium, cujus largior copia adhibita minus nocet. Hoc autem summi momenti est in vermibus enecandis, quos in inferiori intestinorum parte latitantes, medicamenta dissoluta jam et infirmiora occedunt. Hanc ob causam chalybe vermibus plurimum nocere solet. Quo minor ei inest vis lethalis, eo largius usurpari potest. Jure igitur Boerhaavius vitriolum viride ad drachmam in aquae illi solutum, et quotidie per dies complures assumendum laudat. Hoc autem cum remediis salinis supra dictis, aut purgantibus jam memorandis conjunctum, valde predest.—Adde quod plurima medicamenta vegetabile regnum praebet, quae vermes aut perdunt, aut foras sedibus relictis prodire sapore ingrato et odore gravi cogunt. Hanc ob causam amara omnia, nimirum absinthium, santonicum, tanacetum, et alia ejusmodi in usu sunt. Quo tamen modo aut aegros vermibus laborantes, aut vermes ipsos a corpore ejectus afficiant, nondum ex experimentis fat manifestum apparet. In vegetabilium, quae odore gravi vermibus nocent, numero sunt ruta, valeriana sylvestris, et assefotida; quarum postrema prioribus illas virtute facile superare creditur. Hanc odore perquam referre, et summa insuper acrimonia gaudere videtur allium, a multis scriptoribus laudatum. Alia quaedam vegetabilia acrimonia sua veneni ad instar vermes tollere videntur. Scilicet plurimum purgantibus rennulis hoc in morbo adhibitis eam esse virtutem suspicari licet, adeo ut priori aequae ac secundae medendi indicationi convenient. Ex hac fortasse sua acrimonia in vermibus tollendis potissimum valent jallapium et gambogia, aliisque purgantibus, ut nonnullis visum est, longe praecellunt. Plurimum etiam vegetabilibus specifica quaedam vermes perdendi facultas vulgo tribuitur: quod si ea quae modo diximus tollas, cetera omnia levioris esse momenti, neque memoratu digna inveneris.

Illis igitur omissis, ad secundam medendi indicationem transeundum est. Hic emetica et purgantia auxilio et salutis sunt. Si ex vermibus nuper ab ore rejectis, et aliis quibuslibet causis, stomachum iis potissimum laborare in sus-



picionem venerit, ad emetica confugiendum est. Rarius autem sese ita res habet; intestinis enim quam plurimum insident vermes, remediis purgantibus ejiciendi. Quod si mortui ibi latent, ipso intestinorum motu, fluida omnia neque similis molis deorsum agente, cito excludantur, necesse est. Teretes quidem et ascarides vel cæteratim glomerati tenui adeo et ductili natura sunt, ut facile demittantur: neque taenise molea immensa prohibet qui minus peristaltico quem dicunt intestinorum motu, præcipue purgantium ope jam adacto, sæpius ex ano extrudatur. Facile adeo mortui ejiciuntur vermes. Vivi autem intestinorum tunica ita penitus adhaerent, ut nonnisi alia quadam vi avulsi, secundo, ut ita dicam, flumine deferantur. Eo valent ea medicamenta quae gravi sapore aut odore suo affectos sedes mutare, et in medium alveum ferri, cogunt; simul et illa quae veneno suo vermes aut omnino enecant, aut gravi turbine laborantes ab intestinorum lateribus divellunt. Ex his omnibus summa in hoc morbo medendo medicamentorum purgantium virtus facile adparet. Nonnulla quidem medicamina vermes sedem immutare, et ex loco in locum ferri tantummodo cogunt. Alia impote quodam paululum temporaria efficiunt; neque mox convalescentes rursus intestinis adhaerere verant. Alia denique, quae assatim adhibita vermes omnino tollunt, aut minus tuto in corpus admittuntur, aut in canali alimentario diffusa, et quodammodo immutata, jam minus valent, nec nisi brevi quodam torpore efficiunt. His omnibus cathartica medicamina mire subveniunt, et vermes jam torpentes et huc illuc temere delatos facile e corpore ejiciunt. Aut illis igitur hæc conjuncta, aut alia aliis invicem præcedentia, summae opis sunt, et ægotantium saluti magnopere conducunt. Iphis autem cathartics remediis inesse vim lethalem, qua aut percunt aut torpent vermes, haud injuria creditum est. Eam illis esse naturam supra ostendimus, quo plurimum prudesse inveniuntur, et utrisque medendi indicationibus optime conveniunt. Non omnia tamen purgantia medicamina æque in honore sunt. Minus valent alnes, rheum, senna, et alia hujusmodi, quam aciora illa et potentiora, jallapium, scammonium, gambogia et colocynthis. Quin et ex his peristaltico motu vehementius aucto vermes e corpore facilius trahuntur.

Hæc fere sunt quae de vermibus tollendis loqui necessarium duximus. Qua ratione varii illi morbi ex vermibus ortum docentes levare possint, haud in animo est subicere. Hoc enim illorum morborum proprium est, et ab hoc sermone penitus abhorrere videtur.



TESTAMEN MEDICUM INAUGURALE,  
DE RACHITIDE:  
QUOD, ADIUVANTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academice Edinburgense Praefecti;

HOC NON

ARTIFICII SENATUS ACADEMICI CRATIBUS

ET SOLAMINIBUS FACULTATIS MEDICAE DOCTRINIS

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORARIIS ET PRIVILEGIIS RITE AC  
LEGITIME CONSEQUENDIS

ERUDITORUM JUDICIO SUBJICIT

JOHANNES MERVIN NOOTH, BRITANNUS.

Ad Diem Julii, hora locoque solitis.

---

*Si filium spectas hominis caput, Hæc eras credis,  
Si patrem visceris, Apparebilla patris.*

HÆC.

*Accurat articulos macies, generosque tumores  
Collit.*

OVES.

---

1766.

---

GULIELMO DUNCAN,  
Equiti Baronetto, Medicinæ Doctori,  
Magnæ Britannicæ Regis Medico Ordinario,  
Ad tantum honoris fastigium meritis  
Ac virtutibus solis erecto,  
Hos primos labores  
Satros voluit

JOHANNES MERVIN NOOTH.

## DE RACHITIDE.

CONSTANS inter omnes fere medicos hodiernus viget opinio, Rachitidem recentiorum propriam, antiquis incognitum morbum esse. Hujus sententiae princeps, ut ego accepi, *Glossenius* medio seculi proximo de Rachitide Libellum conscripsit, eamque procul novum esse malum asserere, ac hujus insulae ipsos, unde primum orta sit, pagos notare non dubitavit (a). Quam ex his in alia Britanniae loca secessisse, tandemque vicinas Europae regiones invasisse, eodem auctore, discimus.

Marbum vero minime contagiosum, tam longe lateque grassari, et a penitus toto divisis orbe Britannia ortum, tugentes populosque adire potuisse, a vero pariter atque ratione alienum videtur. Primum enim quae argumenta sive hunc sive alios, quos dicunt novos, antiquorum morborum nuper numerum auxillis, adferuntur, illa minimum ponderis habent. Enimvero si cum Graecorum ac Romanorum, posteaquam ad summum cultus et humanitatis culmen pervenerunt, ac hujus cunictus perpetuae, luxuria et delicia, invaserunt, moribus, nostri conferantur, profecto illi nobis neque meliores neque paucioribus morbis affixi videbuntur. Et si eadem majorem nostrorum aetatem cum illorum seculis pariter saeculis comparemus, idem dici licebit. Neque genus humanum a virtutibus anteaetorum aevorum degenerasse, aut illis, quod vulgo creditur, nos corruptiores esse, idemque pluribus noxiis morbis, ullum argumenti vestigium aut vestigiū quidem umbra reperitur. Cur igitur *Glossenius* aliisque, nostra vitia eos morbos genuisse, qui idcirco novi videantur, quia literis antiquorum parum aperte proditi sint, et non omni tempore extitisse, dictitantibus credamus? Praeterea aëris pondus, ante *Terricellum* usatum, ideo nullum esse, quia nullus ante hunc animadvertisset, aut animadversum memoriae prodidisset, quis mortalium dixerit? Porro si quis, omnis argumentis, ipsam rem attento animo perpendat, quae illi de Rachitide dixerunt, ea non ita se habere reperiet. Antiquorum enim monumentis diligentius perscrutatus,

VOL. III.

H

tatis,

(a) Innotuit autem primum hic morbus (quantum quidem ex aliorum relatione, diligenti factu examine, colligere possumus) in occidentalibus Angliae traëibus, in comitatu scilicet Dorset et Somerset, triginta circiter abhinc annis. *Glossen. de rachitide*, pag. 3. edit. Lond. 1664.

taris, in omni aëlo, omnique aëro hoc, malum nunc mitius nunc saevius parvulorum corpora afflixisse, haud aliter in animum induxi credere (b). Cur enim mirum est, si causae haudquaquam diversae eadem vel similia efficere comperiantur? Itaque apud antiquos, spinæ curvaturas et ossium aliorum contorsiones, quales nunc rachitidis contingere videmus, passim legendo notavi. Quod si, attento animo, nec verborum sententia perversa, quidam apud Hippocratem vetustissimum medicinae auctorem locus cognoscatur, ille Rachitidem non ignorasse videbitur. Cujus verbum exemplum infra scriptum est. "Verticula vero spinæ quibuscumque in gibbum trahuntur et curvatur, plerumque ut solvantur, fieri non potest.—Et quibus quidem gibba sit spina dum pueri sunt, priusquam corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus juxta spinam coarctari non solet. Sed etiam quidem ac manus perficiuntur, illae vero partes defectuosiores sunt. Et quibus supra septum transversum gibbositas est, his et collae in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partem; et pectus acutum fit, sed non latum, ipsique et difficulter spirant et stridulam lautum asperitatem habent (c)." Praeterque hoc notae atque indicia Rachitidis convenientia passim per ejus opera conspiciuntur.

Quin etiam, si quia credulorum religiosum expecte, fabularum, quas antiqui scriptores de parvulis a daemonibus aut veneficis verarum contextuerunt, verum requisiveris, morbos sic fieri creditos, omnes ex parte Rachitidis similes fuisse reperies (d).

In summum, hunc morbum ultimis his temporibus proprium esse, ac in occidentalibus Angliae regionibus primum apparuisse, neque a vero abhorrer. Etenim si causas ejus consideremus, has omnibus regionibus omnibusque seculis communes dicemus. Qui si in Anglia primam originem traxisset, certe illuc ubi causae potentiores esse debeant, quam alibi, frequentior foret. Quin eundem in Batavia quam hujus insulae pagis multo esse frequentior ipsi mihi observandi copia fuit. Vixitque potest ut

quatuor

(b) Puerulos et dignitos, ut ludibria naturae, malique omnis, abhorrent. *Sart. Aug.* 87.

(c) Hippocrat. de Art. med. cap. ii.

(d) Hunc morbum non tam novum esse ut vulgo creditur, alias in scholasticis docuit, qui ostendi, infantes olim pro a diabolo supposito habitos, revera nihil aliud quam infantes Rachiticos fuisse. *Hist. litt. Program.* pag. 150.

quædam terrarum orbis loca etiam magis ei opportuna sint (e).

Que res et argumenta, quamvis Rachitidis veritatem satis stabilire videantur, cur tamen in antiquorum monumento nihil certius aut plenius de ea offendamus, difficilis ratio redditur. Nihil tamen fallor sic nodus expediendus est. Ut enim apud nos nutricibus et vetulis mulierculis parvulorum Rachitide laborantium cura prave committitur, ita idem illos fecisse non deest suspicio. Quo fieret, ut perito medico eam perspicendi, ideoque de ejus natura rite judicandi ac differendi minor facultas foret. Ad hoc accedit, quod etiam Græcarum elementis eos sortitan ad Rachitidem atque ac alios plurimos morbos minus proclives olim reddiderit, quam locorum septentrionalium situs, qui tum Rachitidi, tum Scorbuto, hic plerumque oriundis, quam maxime favent. Unde fieri potest, ut Rachitis illis regionibus mitior ac obscurior minus a scriptoribus observata, ideoque minus quoque memorie prodita sit.

Nonnulla igitur ad Rachitidem spectantia antiquorum scripta evolventibus subinde occurrere demonstravi, eamque antiquitus existisse argumentis evincere ita conatus sum, ut tamen subtiliorem ejus notitiam *Gliffani* sicut et nomen acceptum referendum fatear.

#### MORBI CURA.

Rachitidem longum morbum esse constat, et illam etiam præpauca ante quartum vel quintum ætatis menses contingere inter omnes medicos convenit. Quo tempore parvuli languescere, a motu alieni ac irritabiles esse incipiunt; dein, animi hilaritati vividæque gratiæ evanescentibus supervenit marcor. Qui paulo natu majores et jam ambulare valentes a morbo primum petunt, pedum plantas solo committere nolunt, eaque omnia oblectamenta quæ paulo ante totos animos occupaverant, nunc prorsus fastidiunt. Omnes inertes sunt, adeoque nonnulli ut quædā cibi somnique solius vivere causa videantur. Plerique tamen a cibo circa primam morbi accessionem alieni sunt, pejus concoquant, et frequenter ingesta ac ventum eructant. Item ab initio universum summum corpus præter consuetudinem pallefcit, solitoque magis mollescit atque tumet. Indices imminuantur vires, ventresque præter na-

H 2

turam

(e) Improprietio nutritionis, ipsiusque capitis magnitudo major viâ, succioneque movent de Rachitide, Angliâ magis observata et descripta, et nostris tamen locis (Scot) non infrequenti. *Georgii Welfgangii Wæschlii*, cap. xxxii. p. 122. De Morbis Infantum.



torem alius, aqua intus undante, alius, sine hac, grandescit.

Max extrinsecus vera Rachitis suam naturam latetur. Caput enim in multum crescit, longiorumque ossium extrema, horum procellus, tarsique et carpi parvula ossa breviter ampliata apparent. Precedente morbo, omnem naturae modum magnitudine caput excedit, ac musculis imbecillis parum amplius mobile, huc illuc, qua corporis positura suo propria gravitas ducat, quasi pondus inertis, inclinat.

Porro etiam proveciente malo anterior pectoris nasacula prominere, dum latera quasi compressa, complanata ac in nonnullis prope cavata fiunt. Collarum baud aliter quam reliquorum ossium extrema, ubi sterni cartilaginibus adnectuntur, tumescunt; posteaque spirandi difficultas et molesta, quasi asthmatica, vixis nascuntur. Haec adeo nonnullos torquent, eoque violentiae procedunt, ut misello proflus suffocatos, vel, quod minime rarum est, convulsionibus exceptos, jugulent.

Quibus vero huic superesse periculo et morbi victoriam differre conigit, illis sumunt undique corporis facies prorsus diversa erit. Cutis enim adeo, non aqua undique suffusa, distenditur, ut nimis jam laxata, quasi pendula malique iusto amplius fiat. Post quod ossium extrema anni aucta indices magis magisque augescunt, dum musculi mollioresque corporis partes omnes sensim tabescunt.

Jamque in pejora omnia ruunt. Ossia insolito breviora atque ubique crassiora varie pro variarum rerum impulso praeter naturam inclinant. Ex omnibus vero spina maxime distorta, et aliter in aliis, perpaucis simpliciter, plerisque dupliciter tripliciterque pro aetate aut magnitudine morbi; modo antversum, modo retrorsum, nunc in hunc, nunc in illud latus, interdum oblique, incurvatur. Cervices plerisque iusto breviores videntur; et inter humeros, more infusa exstantes, caput immensum tamen prope conditum latet. Vox rita atque stridula redditur.

Porro artus, et superiores et inferiores, adeo distorquentur, ut singula ossa sua quasi natura in certas partes iurant. Lacerti brachiique plerisque extorsum, femora scilicet in omnibus, nam horum flexura sensillima est, antorsum, cetera, quae minime certam viam obediunt, aliquando extorsum ut antorsum nisi vulgo obferantur. Genuum habitus multum a naturali situ varie discedunt, neque pedes mali informitatem fugiunt, semper quoque ita viciati ut oblique extorsum retorquantur. Postremo rachiticorum incesses notandus est, qui corpora sua ab altero ad alterum

alterum latus, anatum instar, inter ambulandum, jactitant.

Hæc omnia, licet plerisque communia sint, tamen in aliis minora, in aliis graviora esse inveniuntur. Quin et nonnulli quæ vera Rachitis excipit, sive naturæ benignitate, sive artis auxiliis præter spem convalescunt, paulatim informis corporis vitia superant, ac denuo ad robur ac fucram valetudinem tandem reducuntur.

Alii multorum annorum tædium perferunt vitam per multiplicem miseriam variasque offensas ducunt, et cum sibi tum omnibus suis gravi oneri fiunt. Plerosque languentes, robore fractos, marcentes et vitæ quasi clam excentes, febris hæctica cito satis conficit.

Per totum mali tempus urina parca pallescit. Alvus aliquanto incerta, quæ tamen circa initia haud multum a naturæ ordine discesserat, eadem postea segnior naturali tardiorque, quicquid ore ingestum est haud multum mutatum reddit. Arteriae, incipiente morbo, omnibus oppido hebetes, tardæ, nonnullisque etiam inequales sunt, sub finem deinde morbi atque hæcticis caloribus jam supervenientibus, eadem imbecillæ ac citæ trepidant.

Dentes ante Rachitidis adventum nati cito pereunt, nascentes haud mediocriter turbati multum tardantur, et inæquales admodum ac imperfecti, magnis intervallis interpositis, tandem explicantur, iterumque ipsi carie consumpti cito evanescent.

Sub finem vero cum affectuum plurimum lævities citam perniciem denunciat, alvus salsæ, obiturnæ cibi salidum et frequens vomitus accedens fata ultro properantia impellunt. Postremo paucis jam vitæ diebus superstitibus, mirando illo lepori acrique ingenio, quo rachitici omnes insignes adeo suspiciuntur, ineluctabilis stupor soporque superveniens, omni sensu, omni motu prope perditis, paucisque convulsionibus nec his violentis accedentibus, tantis aerumnis æternum finem imponunt.

Inter varias morbi notas et affectus enumerandos, quæcunque, incisis cadaveribus, cernuntur, ne ordo dicendorum turbaretur, prudens antea omisi. De quibus utique hoc dicendi tempus est.

In primo quasi morbi stadio præemptis tela In locis cancellulosa præter naturam aqua distenta videntur, neque eandem in corporis cavis, ut abdomine et thorace, cernere rarum est. Quos autem morbus diu retentus attenuavit, illorum partes molliores arctius solito, adiposa marcescente membrana, inter se coherentes In locis cancellulosa præter naturam aqua distenta videntur, neque eandem in corporis cavis, ut abdomine et thorace, cernere rarum est. inve-

ingentiuntur. In omnibus vero cutis illique subjacentia juxta pallidiora ac molliora observantur.

Inciso deinde abdomine, omentum retractum, collapsum, multoque naturali minus atque adipe prius privatum, primum in conspectum datur. Huic proxime jecur, ob hujus insolitam molem si ad reliqua corporis conferatur, spectaculo est. Intestina contra naturam attenuata, pel- lucentia, mirumque in modum et ingestis crudis et zee repleta, cernuntur. Neque vermes, colique interdum frequenter, ibidem serpsisse insolitum est. Glandulae mesentericae ac conglobatae ubique toto abdomine induruisse solent. Reliqua abdomine inclusa perpaucis morbi quicquam praestisse ostendunt.

Ubi culter ad thoracem ascendit, hic quoque discissus raro insolita visu sive in pulmonibus seu alibi intus recludit; nisi quod pulmones in nonnullis passim pleuras adhesisse, et glandulae vulgo sed perperam bronchiales nuncupatae, multum induruisse ac tumuisse perspiciuntur. Quin et in membranarum cordi et pulmonibus praeteritarum atque defendentium cavis paululam aquae, sed rarius, perspicuum est.

Haec partibus quae inter thoracem et caput mediae intercedunt, glandulam, quae thymos dicitur, solito majorem notamus; item vasa jugularia in Rachitide peremptoriam quam aliorum cadaveribus quasi ampliora animadvertuntur (f).

Cranium jam nudatum, necdum incisum, ob insolitam latitudinem et insignem circa apicem planitiem aspectu notabile est. Sutures ossa inter se necdentes omnibus prae conformatas, atque nonnullis haec magnis intervallo, praesertim aqua intus distendente, distare conspeximus. Serra cranio discisso ac cerebro et membranis inspectis, plerumque morbi nullum indicium, hydrocephalo autem adjuncto, cerebri formam multam mutatam, hujus ventriculos humore repletos, et membranas quodammodo crassiores, offendimus.

Haec omnia, cadaveribus hoc malo defunctorum scrutatis, in mollioribus partibus fieri vulgo docemur. His postea femotis, ac ossibus, quae precipue mutantur, nudatis, pauca alia, memoratu minime indigna, restant. Quae autem modo varia ossa varie distorqueantur, cum in vivis facile appareat, jamque supra satis sit expositum, praeteribo; ea quae vitia sola, quae nisi ex ossibus in conspectum datis disci nequeant, memorabo.

Rachitide

(f) Glisson. de Rachitide, pag. 13.



Rachitica ossa difformia solito semper crassiora, meatibusque pleniora esse videntur, digitis prementibus cedunt, ac sanie rubram effundunt. Jam deformis pelvis distorta figura memorabilis est. Cavum enim ejus natura ovarum nunc magis minusve compressum quodammodo triangulum refert. Pelvi rachitico conjunctum ossis femoralis collum, a situ naturali in plerisque miris modis deviatum, in aliis ad angulum rectum inflexum, in aliis etiam deorsum, trunci femoris ratione habita, declinatum cernitur.

Plurima alia ossibus Rachitide mortuorum propria videre est, quae omnia percurrere, nec tempus, nec hujus opusculi limites, sinunt; verum, quae denique ossa, quaeque horum partes praeter caeteris premantur, ea magis aut minus fere distorqueri, omnibus esse commune, pro certo habendum est.

Rachitidis jam signis expositis, affectibusque commemoratis, ad eorum deinde causas transeundum est, quod priusquam adgrehar, licet supra relata satis morbi naturam explanent, unam vel alteram notam quibus ab aliis omnibus morbis rachitis distinguatur, interponam. Qui Definitio itaque osium crassitie insolita, contorsione varia morbi, circa articulos tumore laborat, carie nulla, si nulla insigni extrinsecus adnota, hic rachiticus dicendus est.

Si pristinum illorum statum qui Rachitide afficiuntur contemplemur, vel imbecillitatem quandam a parentibus acceptam, vel communem aliquam universo corpori noxam, eam antecessisse competemus. Quocirca Rachitidem ab aliquo malo, corpus ita prius afficiente, ut hoc deinde excipiat, oriri verisimile est. Cumque plures morbi ita incidere possint, ut prius semper posteriorem pariat; ex pluribus hunc quoque effici, animo haud difficile conceptu est. Porro si quis, et signa quae Rachitidis initium praenunciare creduntur, cum iis quae postea sequuntur, composuerit, morbum non esse eundem, ideoque a primo adversae valetudinis ortu ad manifestum deinde Rachitidis conspectum, alia vitia intercessisse suspicabitur.

Omnes morbos qui firmas partes solvendi, Causae re-  
infirmendi, et humores praeter naturam at-  
nuandi facultate praediti sunt, hunc maxime excitare inter medicos omnes censet. Neque sane hujusmodi causae defunt, siquidem omnes morbi plus minusve tales esse videntur. Verum cum omnes sic corpora afficientes verbis



assequi nequeam, summa rerum fastigia sequar, et prae caeteris id efficientes solummodo attingam.

Morbi acuti, et prae reliquis omnium generum febres cum inflammatione, intermittentes (g), contagiosae, maxime variolae atque morbilli, saepius sic semiora humoresque solvunt, et hoc malum postea relinquunt. Infuper longa vitia, licet tardias, eundem tamen habitum creant. Eodem omnia immodica, qualia sunt sanguinis et alvi praefluxa, et similia incommoda concoctionem aut ipsam coctorum digestionem prohibentia, pertinent. Ad hoc puerili aetati magis propria mala, quae corpora eorum manifeste debilitant, accedunt. Ita dentitio violentius reuelus perturbando, convellendo, debilitando, et molis suae affliciendo, ad hunc statum viam sternit. Porro quaedam imbecillitatis nativa a parentibus, quos morborum vis, coactus, vena immodica, in victu aut exercitatione error admittus confecerant, nascentibus insinuat, multos in idem malum conjicit; quod quidem nutricum negligentia aut cura perversa saepenumero augeat. Ut enim cibi bene alentes atque salubres, idoneus motus, assidua mundities, aer purus, huius aetati tenerae ad salutem praecipue necessaria sunt, ita morbos saepe, quorum effectus in hoc debili corporis habitu saepius deinde apparet, illarum rerum neglectus gignit. Mala insuper omnia quae parvulos quovis modo ab exercitationibus consuetis praesertim a pedum usu retinuerunt, hujus periculo obijciunt. Haec omnia varie ad eundem finem, scilicet, firmarum partium resolutionem ac humorum aquosam naturam, Rachitidis veram originem, ducunt; cujus utique pro causis habenda sunt. Quibus expositis ad causam proximam intellectus sane difficilior, transseandum.

In hac exponenda plurimi nodi soluti difficili- Causa  
les occurrunt, cujus, cum multi viri, qui mul- primum  
tum in ea sudaverunt, frustra tamen laborarint, vis com-  
potes fore prope desperamus. Neque vero res ut ut arduo  
non aggredienda est, et si superet verum, in magna voluisse  
satis erit. Nihil dum certum minimeve rationi respondens  
a *Gliffenio*, *Mayo*, aliisque de ea dictum esse, et observatio  
et cadavera incisa docent. Quia et de nostris sententia  
janssam dicentis idem forsitan dici licebit. Quod si nostri  
conatus in proxima Rachitidis causa investiganda atque  
frustra fuerint, saltem verba *Celsi*, "Conjecturalem artem  
" esse

(g) Nisi annis quibus intermittentes guttinales praedominant habent, verae Rachitides rarius occurrunt; quod observatu dignum. *Sydenhami*, pag. xvi.

" medicinam, rationemque conjecturae talem esse, ut cum  
" sapienter aliquando responderit, interdum tamen fallat (h)." p  
profecto confirmabunt.

Verumtamen cum aqua inter cutim rachiticiis reru morsia  
perpetua plus minusve praeat, nihil hic ob stare video, quo  
minus ab ea Rachitidis proximam causam deducamus.  
Quod tamen priusquam aggrediar, quaedam de ratione ma-  
to et ossium tam conditione quae hunc morbo parvulos ob-  
jicere possint, praeponom; eoque magis, quod fibrificae  
haurum notitia ad causas eorundem vitiorum cognoscen-  
das prorsus necessaria videtur.

Ut ossa longo et laborioso naturae opere Recte nota-  
rum ossium  
conditio-  
sunt, ac forsitan aeque maturae ac molliores  
partes absolvi nequeunt, ita circa postique ali-  
quanto nascendi tempus, et numeris et partibus imperfecta  
cernuntur. Infantes pro ossibus adultorum completis, tan-  
tummodo haec passim coepta, partesque horum nondum  
expletas a cartilaginibus occupatas habent. Quaeque iam  
ossa facta sunt, ea neququam tam compacta ac densa quam  
aetate provectorum sunt; contraque tenera fibrosa et mol-  
liora, ubique infinito vasorum sanguiferorum numero cir-  
cumfusa et ubique hñdem repleta inveniuntur. Verum  
cartilaginea sic ossium officio pro tempore fungentes, ossi-  
bus junioribus densiores, minus vasorum habent; ita ac  
nullus, osse nondum in iis inceptum, vasorum ullam vesti-  
gium ulla age deprehendere possit.

Itaque in tenellis corporibus ossa quodammodo mollio-  
rum partium naturam referre, ideoque quibusdam morbis  
similiter obnoxia esse videmus. Quod si aqua ubique tota  
reticulari membrana diffunditur, quid obstat, quo minus  
sefe inter ossum aeque ac muscutorum fibrae infusant? Fa-  
brica tenellorum ossium id certe verisimilimum reddit.  
Licet autem ad ea similes rationes ossa et muscoli habeant,  
quaedam tamen ex diversis utrimque fabricae distinctiōnibus  
oritur. Partes enim, quae masculos componunt, tenues ac  
semper ac flexiles sunt; ossa e contrario semper magis re-  
sistunt, saepeque formae semel assumptae quam illis molli-  
bus tenaciores permanent. Itaque, aqua inter cutem parvulo-  
rum quaecunque modo ablata, muscoli potius hac distenti  
membrana reticulari prorsus collabunt, sibi musculosa  
pariter inter se contigua ut antea licet, ac naturalem pri-  
stinaeque formam recipient. Ossium autem fibris, aqua  
vel quovis liquore interposito, diutius praeter naturam di-  
stantibus, atque osseae naturae interea plus acquirantibus,

post sublatam mox aurescens eadem tamen magnitudo atque figura illis postea semper constabit.

Quam quidem opinionem, raritas ossium rachiticorum insolita (i) observatioque signorum in morbi initio nocuerant, certiores reddunt. Quoque magis rachiticorum vitam investigavi, eo magis hanc mihi sententia comperit est. Neque enim si medici aquam inter cutem semper non observarunt, ideo non verum putandum est; siquidem plurisque parvulis ossium amplificationes magnae prius sum, quam medici opera adhibetur. Porro neque corporis debilitas neque aquae subsistae copia tum maxima est, cum ossa maxime ampliatia atque distorta appareant. Multi quidem convalescere et robur recuperare interea videntur, dum ossa magis magisque, partibus mollioribus, quae aqua ante dissecantur erant, subsidentibus, ad speciem manifesta emittunt.

Jamque morbi causis utcumque expositis, ex affectibus rachitidis, quos supra ordine memoravi, eos qui hanc malo proprii videantur, attingam; reliquos autem quotquot aliis morbis in habitu relaxato positis communes sunt, ut laborem omnino supervacuum, praeteribo.

Cum ossium affectus in rachiticis malis praecipui sint, harum praeceteris rationem reddere conabor. Qui conatus, quo intellectu facilior ac expeditior sit, triplicem sequi ordinem quodammodo decrevi. Primum ossium amplificationes quasdam, deinceps, distortionem dempta, abbreviationem, postremo eorundem cum distortionibus plerisque communes, tum quibusdam proprias, comprehendam. Quasdam etiam alias notas, ut ad ossa non attinentes, ita aliqua ex parte vere tamen rachitidis, nobis postea explicandum est.

Ut igitur ad id quod primum est, redeam, Ossium atque supra de causa proxima dicta sunt, ea cum ossa ampliantur, faciliorem cognitionem rationem reddent. Verum ut alia ossa et aliae eorundem partes, aliter tamen, ita de his propria quaedam dicenda sunt. Quo magis in ossium naturam pars aliqua mutata sit, eo minus illam deinde mutatum iri, ex supra memoratis patet. Firmitas enim ossis quo major est, eo facilius vi dissolventi ac resilianti texturem abitabit. Unde quare ossium extrema, natura illi ossa parum confecta, quam media magis ampliantur,

(i) Ossium substantia in hoc morbo nulla, superficies inaequalis, tuberosa, incrustata, porosa, lacrimis lacrimis rutilantibus si prematur, colore griseo, levi, lacerata, fragilis, torquens. *Savages Nephritis*, Vol. V. p. 303.



plientur, manifestum est. Porro cum recens natum corpusculum basis partim ex osse, partim e cartilagine constet, ut ossum extrema ante quartum mensem, quo tempore aliqua ex parte evanescit cartilaginea non simili modo distendenda natura, viz augeatur, necesse est. Qua quidem re adducti medici nisi quarto jam mense, ipsam Rachitidem non incipere opinati sunt. Verum si huic amplificationi extrinsecus apparenti, mense tertio nondum absoluto, non tam opportuna esset, nequaquam concludere licet, mediaeque aetate ubi vera ossa natura jamdudum manifesta est, non etiam morbum capere posse, praesertim cum partium circum positarum illum jam natum crassitudo celare possit.

Hic ossum affectus ad eorundem, distorsione Abbrevia- in praesentia omitta, abbreviationem exponen- tionis. dam ducit, cujus rei, quae difficilis videatur, tamen si textura ossa jam ante morbo rarefacta ponatur, explicatio sat facilis erit. Ita enim, ut partes minus inter se cohaerescant, multoque minus ei contra resistant, futurum est. Hinc quae pondus incumbens ossa sustulciunt, eo multo breviora solito, finibus propius inter se adductis, evadent. Qua ratione spina multis abbreviata, ut cervicis solito breviores, humerique quasi elatiores, videantur, haud raro facit. Neque ossa ponderi corporis subiecta, sola, sed etiam lacerti brachiaque aliquantum pari ratione afficiuntur. Quod quidem in rara ac tenera ossum textura, etiam musculorum actio, licet minus, quam pondere desuper simul premente, praestet.

Huic ossum abbreviationi haud dissimilis est Distortio- eorundem distortio, ab eisdem causis augefcenti- nis. bus forsitan orta, ideoque de ea ordine proxime dicendum est. Etiam si rachiticorum ossa varie distorquantur, in quam tamen partem singula discessura sint, causis variis attentam mentem perpenas, plerumque praestitui potest. Ossum enim forma quam natura creatrix dedit, primam occasionem distortioni futurae magna ex parte praebet, quam corporis sustinendum pondus (1), musculorumque actio consummare postea solent; praecipuum autem spina exemplum esto.

Sani hominis spina naturaliter, triplicem signa- spinas ram, qua alias partes sustentet, allic spatium distor- distor- praebet, procedens ac recedens efficit. Cervicis vertebrae

(1) Pressae enim incumbens mollis prodestrae Juncituras molles dilatant, itaque parit omnia mala quae Rachitidis evenire quoniam- tibus dolemus. *Adversar. Anatomica*, Dec. 3. *Rachitis* pag. 16.



antrorsum, dorſi, quo thoracis cavum ampliant, retrorsum, rursusque item antrorsum lumborum, inclinantur, pelvis postremo horum cavu imminet. Ita spina quasi columna recurvata, minus firma, minus stabilis redditur, itaque fit, ut eadem res curvaturas naturales, quovis pondere desuper incumbente, facilius per morbum augeat, perinde ac in Rachitide affectis videre est. Praeter has inflectiones vel naturales vel his adhuc proximas, aliae novae ac prorsus a natura alienae, in rachiticis existunt, quae vel a quavis re extrinsecus premente, vel cujusvis habitus diuturniore mora ipsam in situ incurvato diutius retinente, osium molli hinc simul javante, formantur. Hinc spinarum seu librarium rache recurvatae figurae. Una enim parte jam praeter naturam inclinata, puerules, quasi submonens natura, corpus in latus contrarium inclinans alteram curvaturam fingit, quo nimirum pondus libratum mediae insidens pelvi facilius tenere, musculorumque actionem aliter nimis laboriosam sublevare, valeat. His igitur ita se habentibus, cur simplex curvatura nunquam, duae pluresve semper, spinarum rachiticarum fieri observentur, primo aspectu patet.

Porro thoracis utrinque complanatio ac Thoracis flentis eminentia, similes fere rationes, ac utriusque complanatio et flentis eminentia, aliae osium distortionem, habent. Parvulli enim, nunc in unum, nunc in alterum latus, decubitus, qui fere habitus ejus corporis est, ad costas complanandas plurimum facit, vitiumque hoc semel inceptum ipsa postea spirandi actio augeat. Costae quidem, thoracis cavo ad spiritum trahendum ampliato, vim magnam aeris circumambientis, donec pulmones toti compleantur, extrinsecus premientem, necessario sustinent. Hinc tam immensam pondus assidue, inter spirandum, incumbens, thoracis parietes jam ante justo debiliores, ut magis magisque perturbet, necesse est. Neque vera costas solito minus convexas, earumque extrema eo plus inter se, quo rectiores univcrse redditae sunt, distare, in Rachitide pressis reperimus. Cumque costarum morbo rectiorum anterioribus finibus per medias cartilagines adnectatur sternum, ut hoc exterius projectum emineat, pariter nascitur. Quod quo magis usque fiat, ipsae vertebrae, quae primas costas sustulcunt, antcrius recumbentes non raro efficiunt.

Haec thoracis modo memorata conditio, Spirandi dissequare spiritus laboriosior, voxque praeter naturam stridula, rachiticis sint, sane satis explanat (m). Quam

et

et eadem hæc vitia, cervicis vertebriis varie distortis, nonnullis sæpenumero augentur.

Triangularis pelvis figura pari modo ac hæc Pelvis triangularis  
omnes distortiones verbis explicanda est. Quo quæstione,  
autem argumenta illustriora sint, pelvem naturalem circum-  
lum prorsus repræsentare, eique inani corporis pondus,  
idque ipsum artubus inferioribus rursus incumbere, po-  
nam. Cum igitur actio atque reactio partes sint, ideo in-  
ter utramque vim pelvis pariter premetur. Hinc quæ il-  
lius partes supra os femoris utriusque protinus sitæ sunt,  
introsum os sacrum versus angulantur, hæc deinde supe-  
riorum partium pondere pressum os pubis versus flectitur,  
et inde pelvis figura manifesto triquetra fiet. Femoris cur-  
vati ac ejus  
Præterea, femoris ossis cervix omnium, quæ cervicis à na-  
tura alienæ,  
supra sunt, pondere gravata, pro obliquum sur-  
sum tendente posita, aliis prorsus transversa,  
aliis pessime afflicta etiam oblique deorsum, spectat, dum  
ossis ejusdem truncus, ipsa natura aliquantam inclinante,  
musculis autem corporis mole et more sedendi consuetudo  
etiam magis impellentibus, mirandam in modum antèr-  
ius incurvatur.

Quia etiam crurum informitatem ossium Crurum in-  
naturalis figura, partium superiorum gravitas femoralium,  
ac posteriorum musculorum actio faciunt. Quas res, cum  
crura antrosum fere incurvantur, ad id plurimum posse,  
manifestum est. Obliquus pelvis habitus ab iis horum  
imorum ligamentis, quæ tarsi ossicula, quibus tibia insidet,  
sustulcunt, ideoque totum etiam corpus sustinent, relax-  
tis oriri dicenda est.

Lacertus brachiumque licet non ita ac brachii ac la-  
tus inferiores premantur, in nonnullis tamen tertiæ ventris.  
etiam distorta inveniuntur. Hic quoque naturalis ossium  
præclivitas, cum erectiore ac validiore musculorum flexo-  
rum motu, conspirans, illa extrosum flectit.

Ossium infra corporis truncum informitas Inter ambu-  
ac puerulorum imbecillitas, ut crura, quo æ- landum cor-  
qualius corpus liberatum sustentent, ideo dis- poris jactatio-  
pandant, efficiunt. Quo fit, ut ab altero ad nis.  
alterum latus, inter incedendum, sese conjectare hac vi-  
tia laborantes cogantur.

Capitis magnitudinem in crani ossibus cras- Magni capitis.  
situdine auctis, nisi aqua etiam intus ad molem augendam  
collecta sit, prorsus consistere mortuorum inspectus pro-  
bat. Quoniam vero materies ossis in ossium crassitudinem  
sic ampliandam infumitur, ut horum latitudo debito mi-  
nus

nos extendatur, necesse est. Illic erant inter ossa inter-  
valla vacabunt, futurae insolite more laxabuntur, ac capi-  
tis summi planities saepius nascetur.

Hae rationes usum distortorum notatam communem  
mihi explicare videntur, quod siqua sunt, ad hanc rem  
pertinentia, omissa, ea illorum multitudine alisque supra dic-  
tis, in memoriam revocatis, intellectu facillima erunt.  
Neque verbis quidem opus est, ad brevem rachiticorum Ra-  
chorae causam illustrandam, utpote cujus notitia ex distor-  
tis ac abbreviatis ossibus facile oriatur. Unum vero per  
alterum quiddam, ut non ad ossa attinens, ita Rachitidis  
proprium visum restat, de quo paucis differere non ali-  
num erit.

Abdominis tumor ex jecore magnitudine Ventriculi  
aucto potissimum nasci, cum a *Glissonio* tum (d).  
ab aliis creditus est. Verum cadaverum inspectio illam  
ingestorum copiae, intestinis ad haec expellenda ob im-  
cilitatem parum valentibus, ac aëri eis morantibus emul-  
so, deberi, satis superque probat. *Glissonius*, quia rachi-  
ticorum quam aetate adultiorum jecora, pro rata parte,  
majora esse opinatus est, ideo in illum errorem incidisse  
videtur. At nihil hic mirandum est, quippe quod etiam  
in sanis maxime parvulis usa venire soleat (e). Praeter-  
que hoc, reliquarum partium macies, ut hepar majus,  
quam se vera sit, esse videatur, efficere potest. Cum enim  
hoc membranae adiposae, quae sola tabis materia sobest,  
minimum, illae plurimum, habeant, inde sit, ut jecur mu-  
nus, partes circumpositae magis, decrevisse appareat.  
Reque vera quod de jecoris statu retulit *Glissonius*, id pro-  
prias sententias prorsus refellere videtur. "Hepar enim  
" in omnibus ab illis dissectis non male coloratum, neque  
" valde induratum aliove aliquo vitio notabili contaminat-  
" um esse (f)," confiteri postea cogitur.

Vasa jugularia parvulis Rachitide peremptis semper  
quasi majora comparere, siquidem pro rata parte, res in  
omnibus mortuis ita se habet, nequaquam notatu dig-  
num est.

In Rachiticis puerulis multum fere ingenii Ingenii pro-  
multoque etiam maturius, quam in aliis, ut codici-  
diximus, inest. Cujus rei causa cerebrum magnitudinis  
auctum suspectum est. Haec autem ratio nobis minimè  
placuit.

(d) Hepar viscerum omnium vastissimum, multam abdominis par-  
tem supra meocolon occupat, majorem tamen in foetu. *Halleri  
Principia Liberae Physiolog.* cap. xvii. p. 411.

(e) *Glisson*. de Rachitide, pag. 11.



placet, siquidem incisa Rachitide mortuorum capita, nunquam plura, saepius multo minus, cerebri quam sana habuisse reperiuntur. Nonne multo verisimilius est, misellos morbo domi retentos ac inter aetate provectiones semper versantes, ex his dicta sive sacra, sive lepida, sive denique aëria magis, quam pro eorum tenerae aetatis ratione, arripere; et e contrario bene valentes cum aequalibus colludere gaudentes, natuque majorum consortium fugientes, suo ingenio alius addiscere nihil?

Denique maciem rachiticorum a prava con- Maciei.  
 coctione atque glandulis mesaraicis oclusis uriri facile animo comprehensum est. Insuper invalida atque difficilis pulmonum actio, partibus circumpositis prave confirmatis, ut eorum corpora parum alantur, quam plurimum efficit; etenim nisi sanguis per pulmones transiens satis mutatus fuerit, corpus alendi negotiis fungendis prorsus ineptus erit. Hanc rem procul dubio confirmat, quod pulmones ab aorta, non vero ab arteria sibi propria, arterias bronchiales sui nutriendi causa, accipiunt; siquidem hujus arteriae sanguinem, priusquam pulmones sanis transferit, neque corpori alendo neque cuivis alio officio faciundo, aptum esse constat. Nunc demum omnibus, quae ad adfectuum rationes explicandas attineant, absolutis, morbi eventum ac curationem, tradere deinde pergami.

Peritiam medentis nulla res quam morbo- Morbi even-  
 rum eventus praesagium magis illustrat, aut tus praesa-  
 merito magis commendat. In aliis enim flum.  
 medicinae partibus, si quid peccatum est, cum vulgi tum etiam doctorum aliquando reprehensionem fugere licebit; verumenimvero de morbi fine futuro an vera an vana loquaris, omnes mortales disjudicant. Itaque, error admisso, saepe aegrotantis salus, semper medentis fides laborabit. Quocirca cum huiusmodi notitia adeo necessaria sit, observandoque ac prius observata inter se cum cura comparando plerumque mali exitum praedicere possumus, pauca de Rachitidis sine prius exponere, quam ad ejus curationem procedam, operae sane pretium est.

Rachitidi cum aliis omnibus morbis commune est, ut quo gravior est, quo magis inveteravit, imbecilliusve afflicti corpus evasit, eo magis in angusto spes sit. Ubi imbecillitas a parentibus ad natum translata, morbi semina alius jecit, licet omnia meliora fata spondeant, exitum tamen miseros ita exspectat, morsque atra eos ala ita circumvolat, ut pauci huic praescribantur. Contra, si victu, exercitatione, aut per similia levior error admissus huic malo  
initium



positum fecit, harum rerum cura atque diligentia praeter spem salutis multis erunt. Quarum rerum experientia illum, qui modo in usu medendi paulo magis versatus sit, quid sit sperandum, quid metuendum, docebit.

Quo maturius post partum aliquis Rachitide correptus est, eo in maiore periculo versabitur. Hujus enim tenebrae aetatis imbecillitas morbo minus resistere valet, ac medicamentorum impatiens subsidium omnibus recens natas commune, inde omnis auxilii spem aliter haud vanam praecidit. Igitur quo quis natu major ante Rachitide accessione fuit, eo in meliore esse locum judicandus est. Quia etiam licet morbi aetas esset distorta magnopere vitaverit, vivere equidem vitamque inertem et taedium plenam per plures annos ducere potis erit. Quod si capitis immodica magnitudo ac alia aquam intra huc collectam significant, neutiquam a ratione alienum erit, imbecilem atque aetate tenerum tam diris turbis non diutius fore superbitum, fatoque propediem cessurum, pronunciare. Diu inter medicos, quilibet per cutem rachiticarum effluens focus laetum eventum indicare, et morbi materiam sic emolitam ejectari, recepta est opinio. Neque vero id roboris quod certa quaedam per cutis foramina ejicere valuerit, pullo etiam morbum quodammodo tollere ac vitae consulere, dubitandum.

Indiciis jam expositis quae nos vel spe consolentur, vel metu terrent, ad morbi curationem transendum est. Ea igitur curandi consilia proponam, quae naturam nunc deficientem juvent, nunc fatigatam sustentent, adque missellos perveneri, aut etiam, si fieri potuerit, corporis infirmitati eripiant.

In Rachitide, perinde ac in aliis malis, curanda, variae causae potissimum respiciendae erunt, curatio medicusque ad illas tollendas et offensas ignorantia vel incuria nutrimentum acceptas corrigendas, summa ope mihi debet. Itaque si locus quo vitam rachiticam degit, ob silvarum, aquarum stagnantium, vaporum noxiorum, aëris quiescentis, viciniam, aut alios hujusmodi casus insalubris est, ad salubrem, si detur occasio, arger transferatur. Nutricis negligentia, alius, cui fides haberi possit, opera adhibita corrigatur. Immundities prae ceteris cavendae, adeoque *Evitentur*, "nullum in Rachitidem nisi foedae nutritricis foetibus viciatam incidere," testatur. Item lactis tam generis quam copiae ratio habenda est. Ergo ut nutritrix bene valeat necesse est. Aliter hoc bonum aut idonum ad infantem alendum copia frustra sperabitur. Itaque

hæc altera nutritis, et quam primum mutandæ, causa erit. Etenim si morbi cum lacte nutrimentum accipitur, nequaquam remedia adhibebuntur. Qui pueri lactere desiderant, in illis etiam curandis, victus ratio præcipuam curam vindicat. Idcirco ciborum genus, quoque modo datur, spectetur. Quod minus viscidum ac concoctu facilitus est, eo magis stomachis eorum imbecillis certe amicum erit. Neque ventriculus onerari debet, et ut aegrotans, quod ciborum dandum est, id accipere queat, et cæpus satis alatur, exiguum aliquid, sed læpius, ingeri convenit. Quantum autem in his rebus regendis cura nutrimenti discrepat, quæ, quævis vagitibus gestibusve molestiam quamquam senelli significare videntur, ad cibum tanquam auxilium unicui nonquam non confugiant, ac tantum quantum pusilli ventriculi capere possunt, his invitis et reluctansibus, tamen ingerere, certant. Verumenimvero, quemvis morbum molestiamve his rebus curare, quæ illa ab initio fecerunt, quod stultitise majus esse potest? Nequaquam igitur actus periculis semper implenda, contra, bonæ concoctioni consulendum est. Insuper si corporis officina, sine quibus nemo valere potest, fasciis nimis arctis ad vetularum libitum admotis, impedita sunt, his omnibus aegros liberare primum est consilium. Qui pravus mos quantum et sanitati et formæ officiat, apud eos populos, ubi maxime valet, quantum denique laxior barbararum gentium amictus utrique conveniat, nulli sane obscurum est. Faciarum igitur loco curæ sit nutritibus, ut rachitici, si nihil præcipue vetat, quotidie exerceantur; qua tamen in re videndum est, ne exercitatio certis finibus continenda ultra eos procedens noceat.

Jam his rebus, quæ, siue puerulorum sanitatem servare siue malis occurrere velis, utilia sint, dictis; ad ea medendi consilia, quæ ad rachitidem, posteaquam incidit, tollendam, magis pertineant, deinde transibo.

Maxime insignia et manifesta Rachitidi medendi consilia sunt, primum humorum extra medendi-  
Cœcilia  
vasa quiescentium copiam auferre; deinde totius corporis habitum roborare; postremo informia mala corrigere. Hæc in Rachitide simpliciter facienda sunt. Verum si qua mala ab ea diversa comitantur, diversa quoque curatione opus erit, atque illa mala præter ipsam rachitidem intueri medicum oportet. Perumque tamen sit, ut huic morbo addita mala consimili ei natura sint, idemque curandi genus requirant.

Quod ad primam curativam partem attinet, Primum et magnus remedium numerus a medicis præsecundum, caput est, quæ ob hanc ipsam causam secus respondere credenda sunt. Neque vel potentissima, nisi primis viis prius purgatis, auxilio quidem erant (p). Hoc igitur ante omnia, *Hæstiamus* memento, agendum. Itaque leniter supra et infra purgantia conveniant. Si nausea est, ab emeticorum aliquo erit incipiendum, quorum radix ipecacuanhæ lenissima est (q). Hæc nauseam in plerisque tollit, ventriculum purgat, in nonnullis alvum leniter movet, atque hac viâ, quæ intestinorum inertia et imbecillitas, obstat expellere nequiverint, corpore ejectabit. Necesse autem leniter supra purgantibus liberè uri conveniat (r), porce tamen infra purgantia utenda sunt, quippe quæ immodice sumpta plus obesse quam prodesse repertiuntur (s). Ex quo re, quam a ratione alienum sit, humores ciliis corpus purgando ejicere sperare, manifestum est, liquida lenissime purgantia sæpius adhibita potius augent quam minuant affectus. Sudorem et urinam moventia in hac parte agenda multum laudata sunt, quorum tamen inviolata vel potius nostra facultas, ut prius amittantur, secus. Quam rem si morbi naturam perpendamus, neminem mirabimur; nam superans humorum copia quam expellere corpore volumus, sepe extra vasa stagnat, et priusquam ejici queat, ut illi recipiatur, necesse est. Igitur multo humores stagnantes iterum cum sanguine permiscere potius cogito, ut sudorem et urinam moventia deinde quodammodo confugere, liceat. Quæ utique caute adhibenda, ut corpus relaxando ac debilitando non auferant sed inferant injuriam. Cum extra sanguinis vias humores non, nisi in riuus recepti, moventur, his auxiliis uti, quæ hoc efficiant, consilium est. Hoc quodammodo fiet, motus et exercitatio, omnesque corpora firmiandi vibrandi viæ præstant. Itaque licet primum et secundum medendi consilium discreta videantur; cum humorum tenuitos, hinc extra vasa effusioni opportuna, firmorum debilitatem semper et illam hæc coheretur, ad communis auxilia plerumque in utroque fugiendum erit. Ergo in utro-

(p) Ad faciem vultu qui in primis viis residet præterea debent conferri leniora lenientia. *Hæstianus*, tom. III. cap. 9. p. 291.

(q) Non venialis, si opus sit, nec tenera infantum constitutio obstat, lenioribus emeticis. *Hæstianus*, loco citato.

(r) Curatio optima sit vomitibus lenibus alimentis cum prædictis revestitis. *Boerhaave*, de regimine et curandis morbis, par. 1489.

(s) In Rachitide vera cathartica locum non habent nisi ut leniter et bis ad plurimum. *Sydenham*, pag. 407.



utroque vitio corrigendo communem medendi rationem sequi statelamus.

Vasis absorbentibus bene cognitis, quanta sit fricationis et exercitacionis utilitas, cuius scire licet. Motus enim quocunque genus vim impellentem, quæ earent, illi quasi tribuit, quæ porro cum valvarum ipsarum proprio auxilio, contentos liquores in sanguinem protrahit. Quæ actione sæpius præstita humores stagnantes languine recipiuntur, et postea, qui corpore ejiciantur, apti redduntur. Quod quidem, motu atque exercitacione certis legibus administratis, brevi sperandum est; liquidem, corpus roburare, fibris relaxatis et debilitatis firmitatem dare, humoresque tenuitate peccantes saniores reddere hæc remedia posse, fatendum est. Quoniam vero horum nimius usus imbecillitatem ac alia vitia augebit, ideoque nostrum curandi consilium corrumpet, de iusto earum usu quædam sunt dicenda. Fricare vel manu nuda, vel per pannum laneum aliusve modis, pro medici arbitrio licet; verum quantum et quanta cum vi fricandum sit, videndum est. Cumque omnis vehementior fricatio noceat, idem lenior esse quidem, sed constantior ac frequentior, debet. Semperque ubi medicinæ causa rachiticeus exercetur, fatigatio et languor, nimiam fuisse exercitacionem pro certo significantes, omni cura vitandi sunt.

Ad hæc duo medendi consilia medicamenta etiam corroborantia pertinent, quorum chalybeata et amara, quo in numero Cortex Peruvianus est, consuetissima sunt. Quam et Ens Veneris, ob roborantem ejus vim, à Boyle aliisque proprium Rachitidi auxilium habitum est (1). Quod tamen, licet minus hoc tempore usurpetur, pro roborante prodesse potest. Omnibus vero anteponendus est Cortex Peruvianus, quia et gratissimus et efficacissimus longe spectatus est. Neque tamen adeo sæpe in hoc morbo ac fieri debet, eo medici utuntur. Priores enim viæ, glandulis conglobatis occlusis, quod sæpius rachiticeis usu venire solet, hoc remedium venerunt. Verum cum experimenta quædam cum hæc ipsa mala solvere ostenderint (2), quid obstat, quo minus in hoc morbo curando locum, quem meretur, obtineat. Cortex igitur Peruvianus, quem efficacissimum rachiticeis ad salutem monstravi, quo modo adhibendus sit, proximum est ostendere. Sapor ejus insatibus adeo ingratus est, ut tantum accipere quantum opus

K 2

sit,

(1) Boyle on the usefulness of experimental philosophy, cap. ix.

p. 204.

(2) London observations and inquiries, vol. i. p. 203. vol. ii. p. 265.



fit, nulla ratione impelli possit. Quare si licet medicamenta intus et integra data certius ac efficacius agere laud ignorem, tamen, ubi hoc fieri non potest, ut extrinsecus adhibeantur, necesse est. Itaque Cortex Peruvianum extrinsecus corpori adhibitum plurimum auxiliū rachitici posse adferre, verisimilium est; eoque magis, quod febres intermittentes oblitatas sic feliciter sublatis novimus (x).

Postremo, ad duas priores mulendi partes pertinet non viliſſimum remedium frigida lavandi est; eufus agendi ratio, licet perdifficilis reddita sit, tamen ejus in hoc morbo semper periculum, nisi quaedam manifesta repugnent, facien- dum esse, cum propria observatio, tum aliorum auctoritas, fidem mihi fecerunt (y). Ad virum autem aegrotantis mensuram lavandi sit frequentia. Si admodum imbecillus puer est, levissime submergendus est, saepiusque, deinde paulatim, id, prout viribus creverit, facien- dum. Postea vero quum aqua sit extracta, qua ratione curari debeat, ad eos, qui de hac re plenius scripserunt, scire vo- lentes, relego (z).

Tis igitur, quae ad primum et secundum me-  
Tentum  
dendi consiliū pertinent, exposita, ad ea, in quibus ter-  
tia pars curationis posita est, transendum. Ad infirmi-  
tates corrigendas variae falsae ac machinae et inventae et  
adhibitae sunt (a); quae tamen corporibus plerisque vitia  
augere magis quam minuire solent (b). Tot enim in his  
formandis ac fingendis cavenda sunt, ut eas multis no-  
visse, non sit mirandum. Neque vera nisi summa ars tam  
salva

(x) *For.* malienus Londinensis ingeniosus, cum puellulas a Co-  
rte Peruviana intus dato deco abstinere, quod extrinsecus admodum  
adversus febres auxiliū adferret, periculum saepe cupiens, quendam  
indoliam ex duplici summa velle fieri & vultum interosum rursus lavare  
esse et inter utramque Corticis huius indoliam consisti aliquantulum  
interpōni, praecensit. Haec insula quidam parenti febribus aegre-  
tantes eadem proxime, illa curante, perierunt et ad salutem cito re-  
dierunt. Idem iste eadem molles et interosissimas et febres remittentes  
suscipit. *Lond. Observation and Inquiries*, vol. II. p. 245.

Namque igitur statum eadem vel quorundam cortice curatore repletum  
et Rachitide subiectum in quodam posse operationem est.

(y) Of the use of weak limbs and others in children by the cold  
bath, I could give you a hundred instances. *Essay on the Use of  
the Cold Bath*.

(z) Hayward. *Feyer*.

(a) Vbl. *L'Orthopédie*, ou l'art de prévenir et corriger deux genres  
de vices ou de déformités du corps, par Monsieur Andry.

(b) Nec retinendum est, ad quoniam darsi incurvatam et membra  
diversimode distorta committenda esse ligamenta et thoracem  
oppressionem, si multa caveatur, ne loco auxiliū vici inferamus, et  
insuetas ex uno in alterum vici precipitemus. *Higmon*, tom. III.  
cap. p. 472.

fabriscantur quam admoveantur, eas omnino omittere et in aliqua mutatione a constanti corporis habitu tardius, sed aliquanto tutius orta, infirmitatis curationem ponere multo melius erit. Quod tamen de spina distorta potissimum est dicendum. Machinas enim ad infirmita extremorum aruum vitia tollenda comparatas, admotu multo faciliores sunt, idque qua minus adhibeantur, nihil verabit. Verum etiam in his tractandis " cum quis mutare aliquid " volet, paulatim debebit assuescere (c)."

Verum enim vero siue machinis infirmitas, siue medicamentis reliqua vitia curabuntur, si, nisi maturius morbus fegerit, diu erit insiliendum.

Porro quo magis curatio expeditatur ac valetudo certius firmetur, ut cibi quam saluberrimi, sicciores, concoctu facillimi atque bene curati, ingerantur; potui exigua quaedam et rite fermentata dentur; corpus velle siccum et munda modice tegatur; postremo, aer purior ac elementior spiretur, assidua ope nitendum est.

(c) Celsus, lib. 4. cap. 21.

TENTAMEN PHYSIOLOGIUM INAUGURALE,  
DE ACTIONE MUSCULARI:

QUOD, ASSUENTE SUMMO NUMINE,

Et Audientia Reverendi Illustrissimi Viro,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academici Balaichurgensis Praefecti;

HEC NUN

Auspiciis STRATIS ACADEMICIS OMNIBUS,

ET HUIUSMODI FACULTATIS MEDICAE Dignis;

PER GRADU DOCTORIS

SCIENTIARUM IN MEDICINA HONORIS ET TRIVIALIUM RITE  
LEGITIME CONSEQUENTIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

THOMAS SMITH, BRITANNUS.

Prædie Idus Junii, hora locoque soliti.

1767.

---

JOHANNI SMITH,

Patri optimo; nec non

GULIELMO CULLEN,

Præceptoris illustrissimi; illius

Fidelitatis et liberalitatis,

Hujus benignitatis et amicitiae,

Quibus multum usus est,

Probe memos;

Hæc dicta voluit

THOMAS SMITH.

## DE ACTIONE MUSCULARI.

## P R O O E M I U M.

**M**USCULORUM actio tanti est et usus et honoris in oeconomia animali, ut summam, per omnia fere secula, philosophorum et medicorum, in natura legibusque suis investigandis, diligentiam merito sibi vindicasse videatur.

Multi sane huic rei operam strenue navarunt, et plurima de ejus natura, tam specie quam utilitate sua egregia, feliciter eruerunt. Attamen, hujus actionis fontem legesque generatiores ex magna parte adhuc latere, hodiernae medicorum litte satis indicant.

Certa quaedam de ejus natura principia ex experimentis statuere; haec a vanis falsisque probe secernere; certaminum apud clarissimos auctores quam acerrime agitatorum vim et fundamenta exponere; nonnulla quaedam e proprio fortasse penu, qualia qualia demum fuerint, in medium proficere: Haec omnia difficillimum hoc simul et utilissimum argumentum pertractandum nohis in animum induxerunt. Neque infeliciter profecto, si modo hinc nostrum opus, vel systematis animati primariae vires paululum clucescant, vel, quod primum ab hoc est, principia incerta prodita iudicium haud amplius transversum agant. Imprimis igitur hodierna quaedam placita de muscularium fibrarum actione expendere, et in trutinam revocare lubet. Haec inter facile eminet, tam ob illustrissimi auctoris suamque famam, quam ob innumera fere experimenta, et argumenta perquam speciosa, quibus inniuitur, *Irritabilitatis*, quod aliunt, systema celeberrimum.

## SECT. I.

VIGINTI septem fere abhinc annos, celeberrimus ille physiologus *Hallerus*, inter cordis motuum causas sedulo investigandas, illi caeterisque animalium musculis inesse propriam quandam vim insitam, ex quo fonte motus eorum et actiones ortum suum duxerint, tum primum sibi in animum induxit,

*Hallerus* satis pro comperto habuit, nostrum *Glissonium*, haud mediocriter certe ingenii virum, propriam quandam motus muscularis causam, ex ipsis musculis penitus oriundam, olim excogitasse, quam et irritabilitatis nomine insignire



nite voluit. Ejus vero commenta, dogmatibus quibusdam scholasticis potius quam experimentis communita, ipse ante id tempus *Hallerus* et ceteri fere omnes physiologi penitus neglexerant. Tum demum *Hallerus*, hanc opinionem sua vi haud praefus carere ratus, veritatem ejus experimentis sedulo institutis confirmare, et hujusmodi vi naturam, leges, terminosque investigare conabatur. Primus *Cl. Zimmerman*, *Halleri* discipulus, quindecim lxx abhinc annos, plurima de ea re experimenta in lucem protulit. Haec ita multo post ipse *Hallerus*, in Commentariis coram Societate Regali Göttingensi recitato, experimentorum de animalium partium sensibilitate et irritabilitate, tam a seipso quam a discipulis suis institutorum, vim penitus infinitam edidit. Ex his igitur vi irritabili satis, et ipsi videtur, demonstrari, qualis sit ei in systemate animali locus, necnon quantum ejus effectus a vi nervi dissent, explorare conatur.

Plurimis physiologis haec nova opinio minus placuit, et acerrime de ea litris vel ad hoc tempus agitantur. In aliis quibusdam scriptis, et posissimum *El. Phys.* lib. xi. *Hallerus* sententiam suam fufius exposuit, et experimentis aliis confirmavit. Ex his igitur desumpta argumenta, quibus videtur haec opinio, in irruinam revocari, et quid his ponderis insit, singulis ordine expositis, examinare nobis nil in animo.

Ex argumentis quibus *Hallerus* irritabilitatem, "non ut  
" vulgo creditur a nervo nasci, verum ipsi fabricae partis  
" irritabilis insitam esse, demonstrat," hoc fere primum habet locum, nimirum, "quod nervus, a quo omnis sensus ad animam perfertur, ab omni irritabilitate ipse re-  
" motus est (a)."

Pulcherrima hic loci sponte datur occasio quaerendi, quid demum sibi vuluerint vocis illae, *irritabilis* et *irritabilitas*, ab *Hallero* saepius repetitae. Attamen verborum vis ex rerum ipsarum natura omnino penderet; et tum demum illam in examen revocare, postquam haec experimentis rite evicta fuerit, satius esse videtur. Hac igitur in praesenti omni questione, ad argumentum prolatum transeundum est. Scilicet, hoc solum sibi velle videtur *Hallerus*, quod partis cujuslibet ex irritatione oriunda *contractilis* (b) suae cujusdam fabricae a nervorum structura longe diversae accepta meritis referenda sit; quoniam ipsi nervi omnimodis irritamentis sollicitati nequaquam contrahuntur.

De

(a) Acta Göttingenf. tom. ii. ; Oper. minor. tom. i. p. 421.

(b) Vid. *Halleri* partium irritabilium definitionem, l. c. p. 407.

De hoc vero minime ambigitur. Immo, ita se rem habere apud omnes, præcipue post loculentissima illa *Halleri* experimenta in medium prolata, jam satis evidet (c). Hic autem quaeritur, annon contractio illa fibrae musculari propria in ulla alia corporis animalis particula, præter eas quæ nervis gaudent, inesse possit. Simul et quod quaestionis summam attingere videtur, annon ulla musculus vis inest, quæ vel stimulis lacessiti, vel sponte sua in contractionem ruunt, ab illa diversa quæ ex nervis in carne musculari oblique delinquentibus omnino exoritur, et indolis penitus ejusdem est, ac ipsa vis singulis nervorum partibus, per totum suum e cerebro usque ad musculos decursum, perpetuo insidens. Huc spectat tota controversia; huc omnes vires intendamus necesse est. Hoc igitur misso facto argumento, ad alteram festinat sermo. Scilicet, subjicit *Hallerus*:

“ In vivo animali, cum vinculum nervo injectum sit, aut  
 “ nervus ipse resectus, minime vis contractilis tollitur;  
 “ sed hæc sponte et vegeta ex irritatione renalescit; imo  
 “ in ipsis musculis resectis, in artibus aliisque particulis  
 “ de corpore penitus separatis, superest vis irritabilis, effi-  
 “ caciterque agit (d).”

Omnes fere systematici ita cerebrum pro sensationis motorisque fonte habuerunt, ut ejus opera subtile quoddam fluidum e sanguine seceretur, et per nervos, tanquam excretorios ductus, ad musculos sensuumque organa deferatur. Et ab hac sensationem motumque muscularem necessario pendere volunt. Hujus igitur a cerebro itinere quodammodo intercluso, partium eo destitutarum, neque libero commercio cum cerebro amplius gaudentium, non magis sensationem quam motum penitus perire, apud omnes omnium sectarum assensaturos nunc convenit.

His autem principiis pro certo habitis, *Hallerus* argumentum suum hoc fere modo deducit: scilicet, quoniam omni influxu vis nervea a cerebro, immo a nervis ipsis quam proxime ad carnes musculares abscissis, jam prohibito, musculus motu suo adhuc gaudet; hujusmodi influxu motui musculari nequaquam opus esse, ipsique musculo propriam quandam vim inesse, quæ sola perpetuo efficitur motus muscularis, manifesto apparet.

Musculorum actionem motumque, absque omni nervosi, quod aiunt, systematis, nimirum encephali, medullæ ob-

VOL. III.

L

longatæ,

(c) Vid. *Halleri* partium irritabilium descriptio, 2. c. p. 407.

(d) *Elem. Physiolog.* 404. l. v. p. 422-3 et *Præf.* p. 7. ad tom. xii *El. Phys.*

longatae, medullae spinalis, vel nervi partis alicujus sensibilis auxilio adhuc vigere, et quam facillime excitari posse, minime negamus. Ipsa igitur musculis inesse, ut ita dicam, facultatem quandam motricem, quae sine alia quacunque vi, per totum vitae animalis decursum, quantum hactenus pro competito habemus, agat, concedamus necesse est. Longe ulteriores de ea re statuerunt antiqua scholarum dogmata; nec nisi post *Halleri* experimenta in lucem edita, quod egregio illi viro summae laudi merito vetitur, haec ita se habere homines libi in animum induxerunt. Quod si vero haec omnia jure demonstrarentur, vim tamen illam musculis insitam aliam esse a substantia nervosa medullari, nequaquam cum Ill. *Halleri* existimandum est. Etsi enim singulae partes nervi proprie dicti, nimirum medullaris substantiae membranis vestitae (e), immo et omnis fibra medullaris, quantum a fibris contractilibus distingui potest, procul a musculo relegantur; musculo tamen adesse per totum ejus volumen quasi intertextas portiones quasdam nervosae medullae, ei haud dissimilis, " quae prima  
" nervi et maxime propria pars est (f)," neque vi minori in musculi contractione excitanda pollentes, omnino certum est (g). Huic igitur substantiae medullari musculi facultatem motricem haud injuria referamus.

Hanc vero sententiam *Halleri* vulgari de fluido nervoso opinioni, cui ipse benignior faret, et aliis quibusdam rebus infra memorandis adversari objicit; neque parvulam illam nervosae substantiae portionem musculis adhuc insidentem perennes vividosque motus in musculis, a nervis et sanguine dudum sepositis, saepius animadversos efficere posse credit. Quicquid vero de fluido nervoso statuimus, substantiae nervosae in musculis adhuc superstiti hos motus musculares merito tribui, ex plurimis rebus patet, ni fallor, satis manifestum constabit. Interca loci, ubi causas modo memoratas, argumenti illius ab Ill. *Halleri* prolati nulla ratio habenda esse videtur. Subjicit vero,

32m, " In musculis paralyticis stimuli applicati motum  
" muscularem suscitare valent (b), paralyticis vim nerveam  
" destruit, integram relinquit vim insitam (i). A plena  
" demum morte, quando nulla nunc vis nervea superest,  
" superest vis irritabilis, efficaciterque agit (k), etiam ten-  
" tio a morte die, musculis jam semiputridis (l)."

Vitia

(e) Vid. definitionem nervi, El. Phys. tom. iv. p. 183.

(f) El. Phys. tom. iv. p. 187. (g) Ibid. p. 225.

(b) Ibid. p. 418. (i) Ibid. p. 447. (k) Ibid. p. 459.

(l) El. Phys. vol. vii. praef. p. 7.



Vitia illa corporis humani, quae paralytes vulgo audiunt, plurimum inter se discrepant. Imprimis, motus muscularis impotentia, sine musculi vitio sensibili, exoriri potest ex imbecillitate potentiae illius, quaecunque ea sit, quae apud nervorum originem vi nerveae ciendae et in musculum impellendae inservit. 2do, Nervorum musculi vitium quoddam prohibere potest, quo minus vis nervea, a cerebro vel nervi parte superiori derivanda, in musculum rite deducatur. 3tio, Paralytis a defectu illius vis, quaecunque ea sit, quae proxime pendet muscularum uelio, seu vis insitae musculi, ut cum *Hallero* paulisper loquamur, ortum ducere potest. Quinetiam adhuc et secundae et tertiae speciei aliae quaedam varietates adsunt. Scilicet vis tam muscularis quam nervosa male sese habere potest, vel relative, quatenus sensurium commune, vel absolute, quatenus singulas causas motum concitantes spectes. His igitur paralytis diversis seu speciebus seu varietatibus rite perspectis, quid ex iis ad partes vis insitae tuendas jure colligere liceat, jam videamus.

In prima utique illa paralytis specie, ea modo vis laborat, cujus est vim nerveam, integram etiamnum ipsam et valentem, apud nervi ipsius originem eiere. Hic vero stimuli externi motum muscularem pariter adficiunt, sive nervis sive ipsis musculis admoveantur. Nulla igitur musculo propria vis a priori diversa hic adest.

Quod ad secundam paralytis speciem attinet, si nervi partis alicujus compressio, vel alia id genus causa, vi ex nervi parte superiori in musculum descensurae intercludat iter, nervi partem inferiorem irritatam muscularum suum motum eiere, ab innumeris ferme experimentis satis constat. Neque igitur musculi ipsius irritati motus ab alio quodam fonte, praeter nervos illi ubique insidentes, ortum ducere existimandum est. Hujus autem compressionis loco nervus per totum suum decursum vitio quodam ita potest affici, ut vis excitans apud nervorum originem musculi motum excitare nequeat, quem stimuli externi nervos laeserunt facillime etiamnum eient. Id quidem ab hoc exemplo satis constat. Nimirum apud animalia calida sanguine gaudentia, sanguinis per arterias in hunc vel illum nervum aut musculum delabentis itinere arctato vel penitus intercluso, pars illa paralyti ocyus afficitur. Atamen tam nervi quam musculi irritatio motum muscularem concitare per aliquod tempus adhuc valet; adeo ut in hujusmodi paralyti musculi ipsius irritati motus vi nerveae adhuc superstiti merito tribui possit videatur.



Eodem fere modo sese res habet, si quando vi nervi ab origine usque ad insertionem penitus amissâ, musculus quem adhuc incessitus motu suo etiamnum gaudeat. Scilicet, nervi parte superiori vi sua carente, lux inferiori adhuc adesse potest. Immo cujuscvis nervi hunc statum experimento allato facillime ostendere est (m).

Nonnunquam autem ex vitia quodam vis insitæ, sensui vis motum muscularem concitare nequit, dum ipse musculus stimulo incessitus facillime movetur. Hoc vero ex substantiæ nervosæ medullaris musculi vitio exoriri posse, ex eis, quæ de paralyti specie secunda supra distinximus, satis adparet. Neque enim, ut supra memoravimus, si stimulis internis minus afficitur nervus, externis quoque nequaquam afficiatur necesse est. Hujusmodi igitur paralyti a prioribus istis haudquaquam distat, neque propriam vim insitam omnino ostendit.

Ubi vero musculus suâ vi insitâ penitus caruerit (n), morte potius quam paralyti corripitur; et si paralyti nonnunquam immerito auidat, nullum exinde dubium oriri possit, videtur, quoniam nulla irritatio pristinum ejus motum ciere valet.

Aliud autem argumentum Ill. *Hallerus* ex musculorum motu a morte superstiti desumptum in medium profert. Attamen hic loci nil aliud sibi vult præter totius systematis mortem, vel sensationis motusque inde pendentis cessationem absolutam. Musculos enim post mortem vivere sæpius affirmat. Systematis totius interitus abolitioni sensorii communis virium integræ, immedicabilis, haud injuriâ tribui videtur. Vim nervæam tunc temporis omnino perisse, quis solitan obijciat. Nimirum, principio illo, quo manente vitâ a nervorum origine ad singulas corporis partes propellitur, jam sublato, ea vis haud amplius agit. Nullo alio modo vim nervæam perisse, ab innumeris fere experimentis satis constat. Irritatio igitur motum muscularem etiamnum excitare valet, ob vim nervosæ medullaris substantiæ superstitem. Neque si musculi distincti a morte, immo, ut ipse adfirmat Ill. *Hallerus*, jam fere corrupti moveantur, aliter de vi nervæa statuendum esse videtur. Scilicet, corda sunt, immo juniorum animalium corda, vel eorum quæ in amphibiorum numerum referri solent, "in quibus in universum vis irritabilis perennat" insidet, et visceribus exemptis, vitâ toto die et ultra subsistit, et causa quæ periculosos morsus diu a morte inhibet (o). Hæc autem causa nullam aliam præter nervorum

(m) Vid. exp. 54. b. c. (n) Ibid. 33. c. (o) El. phys. vol. 1. p. 174.

vorum operam adhibet, tam in motu edendo, quam in omni motu ex voluntate mundi. Vires igitur nervosae in his animalibus quam subtilissime nument, plurimisque rebus frustra obnitentibus.

Postremo, ad hoc argumentum tanquam arcem inexpugnabilem sese confert, nimirum.

"Quod latius patet vis contractilis, quam vis nervosa.  
 "Quod polypi et quicquid est infirme, et capite et nervis destitutarum belugarum, acerrima vi contractili cidentur.

"In grandibus etiam animalibus, a viris insignibus detectis, nullum cerebrum, nervi nulli inventi fuere;  
 "quod ad demonstrationem usque evincit esse nullum.  
 "Immo, aliquid in ipsis plantis irritabili non dissimile est.  
 "Potest adeo irritabilis natura esse absque nervo (p)."

Plurima vero hujusce argumenti vim penitus infirmare videntur. Imprimis, animalia illa in quibus nervi demonstrari nequeunt, siquidem his qui nervis evidenter gaudent componas, numero sunt perquam exiguo. Ea ipsa illi *Halleri* sententia est, "A paucis tantum animalibus re vera cerebrum abesse se credere," diserte affirmantis, et optimas quasdam notas subjicientis, quarum ope primo intuitu animalibus cerebrum et nervos adesse saepissime scire licet. "In his animalibus in quibus caput est, et oculi sunt, in his omnibus etiam cerebrum et una medulla spinalis reperitur; neque credam oculos absque cerebro reperiri (q)." His praemissis, quam late cerebrum et nervi apud animalia dominantur, jam quaerendum est.

Regnum vatum animale princeps ille in historia naturae *Linnaeus* ad sex classes reducit. Ex his omnia, quae ad quatuor priores pertinent, nervis gaudere nemini in dubio est. Classi quintae cerebrum abesse, *Linnaeus* ipse revera scripsit. Veruntamen hoc solum sibi velle videtur, quod insectorum capiti nulla adsit materiae nervosae portio, caeterorum animalium cerebro similis; neque illis suum esse systema nervorum negat. *Linnaeus* suam hac de re in praedilectionibus sententiam ita exposuisse amicus *Adamus Kuhn*, *Linnaeus* ex discipulis acceptissimus, nuperime certior me fecit. Hoc etiam ex eis satis apparet quae de *Zorphytis* classis sextae tradit, quae systemate nervoso frui, neque alio modo a vegetabilibus magia distare, scribit. De cunctis igitur hujus classis animalibus ne minimus quidem locus dubitandi superest. In sexta igitur sola classe animalia reperiri pos-

(p) El. Phys. vol. iv. p. 150.; Praef. ad tom. vii. p. 8.

(q) El. Phys. vol. iv. p. 1. et 2.

possunt, de quibus ullum de systemate nervoso dubium moveri potest. Haec in quinque ordines dividitur, quarum tres posteriores non nisi ob domiciliorum hujusce classis animalium diverbitatem inter se distingui videntur. Ea autem omnia, quae de ipsis animalibus hic loci operae pretium fuerit memorare, ad *intestinarum* vel *molluscorum* ordines merito referri possunt. Ordinis intestinarum quatuor priora genera mire sibi invicem convenire solent. De Gordii quidem, Furiae, vel Ascaridis nervis, nihil adhuc satis compertum habemus. Quoniam vero lumbrico ceterum nervisque gaudere ex certissimis observationibus satis constat, ceteris quoque haec adesse vix negandum est. Hirudo etiam Fasciulae quam conjunctissima est. Nervos igitur quos in illa laudanda incisorum industria detexit (r), huic etiam aequum est concedere. Sequitur novum genus, nomine Myxine designatum. Illud vero animal, quod unicam hujus generis speciem jam constituit, in prioribus Systematis Naturae editionibus, et in Fauna Suecica, ad genus Pentromyzon, inter *amphibia nautica* jam militans, relegatum fuit. Huic etiam generi *Raius* aliqui historiae naturalis scriptores, ob summam quae illi cum ceteris hujus generis speciebus intercedit necessitudinem, tribuunt. *Raius* etiam descriptionem hujus animalis ita adumbravit (s), ut omni fere notum cum Lampetris convenire plane demonstraret. Huic igitur aeque ac Lampetris omni jure nervi concedendi sunt.

Ad Mollusca jam transeundum est. Harum primum genus, Limax, apud terras aequalque omnes ubique scatur. Huic referri debent, *Limax* duce, omnia terti ordinis genera, Univalvia Spiralia dicta, 6 mudo Argonautam et Nautilum exceptis, simul et ex Bivalviis Pinna, ex Univalviis Patella. Limaces vero omnes, cujuscunque fuerint generis, et cerebro et nervis gaudere hodie satis constat. Testaceorum pars magna Limax est. Hanc igitur ob causam Testacea nervosis organis destituta non bene scribitur (t). Limacum generi Doris habitu externo, motu progressivo, aliisque multis, valde affinis esse videtur; adeo ut quamvis ejus anatome adhuc data non fuerit, ob magnam tamen quam pra se fert cum Limacibus similitudinem, ei nervus datos esse vix dubitandum est.

Proximum genus Tethys appellatum adhuc parum certo talo inniti videtur. Utur vero haec sese res habeat, Cl. *Bohadsch* (r) accurato animalis, quod sub eo nomine intel-

ligere.

(r) Journal des Savans 1697, N°. 18.

(s) Vid. Willoughby Ichthyologia. (t) El phys. tom. vii. p. 8.

(r) De animalibus quibuscumque marinis, p. 9.



ligere videtur *Limax*, factis examine, id pulcherrimo systemate nervico gaudere extra omne dubium evicit.

Huic generi *Limax* animalia Bivalvium vel Concharum ordinis refert, jure necne forsitan dubitabis. Verumtamen vero hujus ordinis genera, Pinnâ quam ad *Limaces* retulimus exceptâ, eodem partium numero, structura, situ, inter se gaudere, insipienti manifeste apparebit. Ita in *Pholade*, *Pectunculo*, *Chama*, *Ostreâ*, *Mytilo*, a *Littora* (u) dissectis, idem partium numerus, similis structura, usus, et situs notantur. Scilicet, similes sunt similes alae corpora tegentes, auriculæ ad ori, rictum sitæ, ventriculus, mesonion, intestinum, stylus pellucidus, bronchiæ, tracheæ, cor ad intestinum rectum situm, vorta vasque sanguinea. Siquidem igitur in uno genere systema nervicum demonstrare licuerit, reliquis idem minus adesse fere extra naturæ legea fuerit. At vero in animali *Solen Siliqua* a *Linneo* nuncupato, totum systema nervicum, ni fallimur, nobismetipsis videre contigit.

Proximum locum tenet *Nereis*, animal oculis et inde ceteris instructum. *Lernæe* speciei *Salmoneam* dictam oculis etiam gaudere, ex observatis Cl. *Koeleri* (x) constat.

*Sepiæ* autem alii hujus ordinis generi oculos, cerebrum, nervosque per omnes suas species adesse, jam certissimis observationibus adparet. In officinali nervosa organa *Swammerdamius* descripsit, et in tabulis expressit (y). In *Loligine* eadem organa sæpe vidi satis grandia, et olim *Clariss. Listerus* (z). *Octopodis* Cl. *Koelreuterus* caput tribuit, et id ratione reliqui corporis digiti impressioni maxime resistens, ob fornicem cranii cartilagineum, oculos etiam duos adesse dicit ad latera capitis positos, subrotundos, pro illius parvitate grandes (a). Huc igitur animal, ab egregio viro descriptum, nervosa organa aliter quam in hoc ipso argumento affirmat Ill. *Hallerus*, instruatur necesse est. Huic generi *Argonautam* *Linnaeus* refert.

Hæc igitur animalia in ipsa *Vermium* classe nervosa suo systemate gaudere satis constat. Adeo non his organis destituuntur (b), ut, quam necessaria sit hæc pars systematis animalis, quam maxime ostendunt.

Ex eis vero quæ restant, plurima argumentum illud Ill. *Halleri* nequaquam complectitur. Inprimis omnia exigua microscopica, ut ita dicam, animalia, quorum nervos ipse Ill. *Hallerus* demonstrari minus expectabis, e numero tollenda

(u) Exercit. anat. 1. (x) Act. Stockh. 1751, p. 185.

(y) Bibl. natur. tab. 52. (z) Exercit. anat. 3.

(a) Act. Petrop. nov. tom. 7. (b) Præf. ad El. Phys. tom. VII. p. 8.





perissime etiam eadem fere illi ac ipsi *Lissers* de ea se sententia esse videtur. Plurimus enim de locu dictis, haec ipsa verba subiicit: "Eo in statu, vel etiam imperfectiori, plurima animalia perpetuo vivunt, tantum ut irritabilitate deventur. Innumeralibus illar species Polyporum utriusque aquae et quae dicuntur Zoophyta et Hydothuria, et minima animalcula simplicia, absque contineantur et vasa tota gelatinosa (f)." Haec igitur animalia, pariter ac pallum gallinaceum, his organa irai, licet ob peculiarem suam naturam demonstrari nequeant, latere videtur. Nervosae igitur eorum partes, propter quod sensibus nostris latent, omnino etiam abesse, nequaquam concedendum est.

Nos quidem, subiecti *Hallerus*, nihil affirmamus (f); illi vero qui has partes revera existere sibi in animum inducunt, "nimis sibi in rebus physicis permittunt, affirmare nempe quae sensibus repugnant (g); affirmanti mecum probatio." Verum e contrario tota vis argumenti ex analogia pendet. Ex analogia profecto ipse hanc animalium irritabilitatem organo muscularibus tribuit. Illam igitur, quam ipse pro musculis suis sibi veniam petit, nobis quoque pro nervis agentibus vicissim det necesse est. Scilicet, ex pari contractione, ex eisdem ipsis causis in illis ac ceteris animalibus oriundis, his eadem esse contractionis organa contendit. Cur non igitur ex eisdem sensationis phaenomenis eisdem ipsis causis in illis ac ceteris animalibus oriundis, his eadem esse sensationis quaque organa pariter constati? Nec aliquid profecto repugnat, quoniam totus Polypus nervus sit, liquidem totus sentit, atque ac quod totum totus muscular sit, si totus contrahitur (h).

Adde quod haec animalia non modo sentiunt, sed etiam complures alacres voluntarios motus, quales sunt quos *Hallerus* citat, edunt. Aut cerebrum igitur sui que nervi adstant, quorum opera muscolorum irritabilitas in motibus voluntariis edendis ex ipsa *Halleri* mente excitatur; aut aliis quibaldam organis hanc vim intercurrentibus Naturae ex instructis. Siquidem posterior haec sententia magis fortasse placeat, vis huius argumenti neque conculcitur ac si ipsi nervi in perissent. His enim vigantibus co-

Vol. II.

M

conque

sen colore, molles, facile extensiles, et mollissimi sunt. Hi mucus, si rursus et nervi ipsorum vel sensui alio quaque modo. In quibaldam igitur animalibus nervi a musculis, non ita et omnes nervi, distinguuntur.

(f) *Ill. Phys. mon. VIII. p. 239. (f) Oper. man. vol. I. c. 483.*

(g) *Ill. Phys. tom. II. p. 458. tom. VII. l. c.*

(h) Vide *Ill. Phys. vol. VII. p. 242. p. 9.*

eunque demum fuerint naturae, horum animalium contractiones aeque pendeant necesse est, ac nervis in caeteris omnibus motus muscularis. Neque igitur his animalibus inesse videtur propria quaedam vis contractilis, ipsi fibras contractili insitae, ab organorum quae motus voluntarios excitant vi diversae.

Quid, quod ex hac hypothese tota perit analogia, quae contractiles horum animalium fibras caeterorumque nervis praedictam inter se consentire videntur; neque aliquid jam obstat quo minus longe a se invicem discrepent.

Etenim quantum musculorum structuram compertam haecenus habemus, nervis ex parte nunquam non constant; neque alia quacunque vi voluntarii eorum motus excitari possunt. Siquidem igitur apud haec animalia nervis destituta motus voluntarii organa a nervis longe diversis ciantur; et ipsas eorum fibras contractiles multum discrepare, et contractiones longe alia structuram pendere perquam verisimile est. Hic etiam argumentum ab ipso *M. Hallero* potius fere occasione allatum suus esset locus (i). Plurimis vero de ea re verbis nequaquam opus est. Scilicet, horum animalium caeterorumque nervis praedictorum motus, vel ipso *M. Hallero* consistente, mire inter se conveniunt. Suadent analogiam utique philosophandi leges, et Naturae et Newtoni legum ab *M. Hallero* nomine ornatae; quae statuunt, "Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae et verae sunt, et earum phaenomenis explicandis sufficientes; nec non effectuum ejusdem generis eandem esse causas."

Aliquid demum in ipsis plantis irritabili non dissimile esse, insuper monet *M. Hallerus*. Vegetabilium structuram interiorum perinde ac animalium ignoramus. Animalium partes moventes, aut a facie externa, aut a motuum suorum causa, vel propria quodam natura, aut his omnibus parum cedentibus, ab effectibus non nisi earum vi tribuendis discernuntur. Et facies et ipsi motus saepius obscure latent, solisque ab effectibus motus organa saepissime agnoscimus.

Vegetabilibus idem fere accidit. Quoniam igitur in illis partes effectibus similibus ex occasionibus editos observamus, eisdem quoque causis facillime tribuimus. *M. Hallerus* hoc ipsum argumentum adhibet, et a similibus tam vegetabilium quam animalium motibus, easdem quoque vires quae vires adesse iudicat. Neque hoc ejus iudicium a nostro alienum est. Adhuc tamen quaerendum restat, quanam

(i) Oper. min. vol. 3. p. 497.



nam motuum vivorum in animalibus proxima sit causa; neque enim, hac latente, quoniam vegetabilibus motus causa fuerit, quis statuat. Quod si motum animale vi nervi omnino pendere satis constaret, vegetabilium quoque motum vi nervi tribuamus, necesse est. Ita vero se sem habere quae proxime sequuntur facile, si fallor, ostendunt.

Regna inter illa duo, quod sunt, animalium vegetabiliumque, quam conjunctissimam necessitudinem intercedere, neque terminis sat manifestis inter se distingui, apud omnes fere philosophos jam satis constat.

Auctor nuperimus qui hanc rem perquam ingeniose tractavit, nec nisi unum ex duobus illis regnum statuit, hoc tamen commercium, quod ad nervos attinet, tollere potius quam confirmare videtur. Principium quoddam vitale utrique regno commune cum celeberrimo suo praeeptum *Gaulle* facile recipit. Sed animali praeterea accessorium, quod vocari potest animale systema, nervicam quippe et musculosam compaginem tribuit, et quod plantis prorsus negatum esse, velit (A).

Hanc vero sententiam omni fundamento penitus carere, inde constat, quod nullum etiam in animalibus principium vitale a nervis alienum adhuc repertum est, veluti infra satis certis, si fallor, argumentis ostendetur.

Quoddam inter duo illa regna interesse discrimen, etiam mirum inter se gaudeant commercio perquam verisimile est; nec id in alia fortasse parte praeter nervosa eorum systemata latet. Annon in ea parte nervi animalium systematis, cui sensatio, perceptio, viresque motrices inde profluentes tribui solent, recte collocetur, haecenus minus pater. Attamen, ex ipsarum animalium fibrarum motibus qui, vi nervi, nulla interposita perceptione, saepius omnino pendunt, plantarum quoque motus perceptione carere posse, judicare licet.

Adjicere insuper liceat, eximium et certe, si quis alius, summo ingenti acumine pulentem D. D. *Gul. Cullen*, in hac academia illustrium medicarum professorem illustrem, in praefationibus suis physiologicis, hac ipsi vertente anno prima vice habita, hac de re monuisse; quod in vegetabilibus structura quaedam, haud ita longe ab ea animalium nervosa aliena, revera obtinere videri sit. Haecenus scitem, quid per totam plantae alicujus longitudinem, ab radice in ultimos ramulos, fibrae simplices, aequales, nervorum instar, porriguntur, secundum quas fluida tam in-

M 2

elastica



elastica nutrienda quam elasticum subtile quoddam, nervo illi perquam simile, et multis vivi vegetabilis forsitan proximum, et necessarium instrumentum percurrit.

Hoc igitur ex plantarum irritabilitate desumptum argumentum, a sensibilitatis systemate haud penitus abhorrens, hanc nostram sententiam hujusmodi motus vi nervosa referentem ne minimam quidem ex parte infirmat.

Ex iis quae diximus Ill. *Halleri* argumenta vis insituae suae existentiam nequaquam probare manifeste patet. Unum et alterum a cordis nervorumque ejus irritabilitate, potissimum desumpta adhuc supersunt, de quibus alius erit dicendi locus. His igitur in praesenti nullis factis, alia properamus; argumenta illa ex quibus singulas fibrae muscularis actiones vi nervosa pendere satis constet, jam exposuerunt.

#### SECT. II.

Duo quidem Cl. *Physi* proponit: "Primo, nulla fibra muscularis, in ordinario corporis animalis statu, vis ul-  
 "lius, a Natura motus suos eiere constitutae, actioni  
 "sponte se praebet, sed potius ab ipsis nervis nunquam  
 "non excitatur. Secundo, vires excitantes multo fortius  
 "agunt dum nervis quam musculis applicantur; nimirum,  
 "hanc ob causam, quia plures fibrae nervae tunc tempo-  
 "ris afficiuntur (f)."

Quod ad horum argumentorum primum attinet, suam vi haud penitus caret, licet ex parte infirmari potest. Quandoque enim causae excitantes ipsas musculares corporis fibras reapse afficiunt. Haud aliter carotum musculorum contenta agunt in distendendis et proinde stimulantibus ipsis fibris muscularibus, ex quibus latera eorum constant. Alterum vero nihil aliud fibris velle censeat Ill. *Hallerus* praeter ea quae et ipse docet et argumentis perquam validis confirmavit. Scilicet, nervis musculorum actionem excitandi vim multo luminosam, immo longe majorem quam ipsi vi insituae, ipse concedit. Quicquid autem prohibere, quo minus musculis vis ut vis insituae, a vi nervosa diversae, ferre negat. "Revera," ut ejus verba proferamus "exilis vi nervosa, sed est quoddam quasi speculabilem naturae contractile, quod et etiam sublato nervorum connexu et ipso tollitur." Quam et perquam ingeniose assentis, quae deusam ratione vis nervosa mutuum actionem, vi insituae non minus non repugnante, sed etiam juvante, valide adeo excitari possit. "Quando a nervo irritato

irritato musculis in convulsionem agitur, tunc quidem nihil impedit, quin excitatum fluidum nervum fibræ muscularem stimuli modo irritet; omnino, uti electricum elementum fibræ muscularem irritat, cogisque contrahit, quando torrens ejus elementi ex humano corpore scintillæ modo educitur; aut, nam perinde est, similis torrens ex corpore nimis electrici in nostros musculos irruit (m). Ab animæ voluntate fluidi nervi stimulantis fumen in musculum sequi videtur, cumque in motum eire (n). Fluidum illud nervum celeberrimum, et subtilissimum stimuli modo se habere, omnium verissimilimum videtur, qui fibræ eamque elementa undique pro sua subtilitate penetrabili ad contractionem sollicitat. Omnino, ut electrica materies, etiam in musculo, maximos motus absque voluntatis auxilio excitat; non quod penitus eadem utrique elemento natura sit, sed quod pariter utrique velocitas summa, et expeditus ad omnia elementa accessus sit (o). Hoc fere modo Il. Hallerus nervicam insitamque vim amide inter se conjurare crevit.

Hæc argumenta nimis subtilitate laborare videntur. Vel his tamen respondere in animo est, quo nullam revera existere vim insitam, totamque muscularem actionem vi nervæ pendere, melius commonstrems. Quo magis hoc elucescat, annon muscoli vis insita a vi nervea quicquam abhorreat; annon et hæc et illa vis ab aliis quibuscunque causis

(m) Element. Physiolog. tom. iv. p. 321. (n) Ibid. p. 215.

(o) Ibid. p. 316. De cordis nervi locutus, hoc fere profert apud apologiam ad D. R. *Waller*. "Nervorum cordis usus est, etsi ab his irritatio nondum visum ut cordis motum intendi. Potest tamen esse, ut absque humeris nervi irritabilitis fibra muscularis non parum remissius sine officio possit defungi."

"Spiritus animales, ut occasionaliter motus oculi considerandi sunt, et miri effectus convulsionem ex irritabilitate nervorum insipientiam, ut a cordis insitis nervi musculique simul sumptis pendentes, a spiritibus totis expectari non possunt." *Zimmerman*, vide *Compendium de rebus medicis*, p. 327.

"La matiere électrique conduite par les nerfs, met le mouvement des muscles en jeu, et les esprits animaux conduits par les nerfs, font la même chose. L'une et l'autre de ces matières n'est pas plus la cause de l'irritabilité que ne l'est un stimulus quelconque qui fait agir également la nature irritabile insérée à la fibre." *Geddes Mem. sur les parties fines des solides*, p. 239. et 240. Vide etiam p. 232. Cf. etiam Fontana de fluidis nervi c. electrici locutus observat, "Que l'une et l'autre matière fait un puissant stimulus par rapport aux muscles." *Mem.* vol. ix. p. 208. Et Petrus nervorum operum pariter illustrat, *Mem.* vol. iii. p. 307. Tum etiam Cf. *Halleri*.

"Le mouvement d'irritabilité n'est point produit physiquement, mais seulement excité par l'énergie des nerfs." *Ibid.*, 411. Vide etiam Van Geuns de vita, § 24. et 25.

causis afficiantur; et quod ultimum superest, annon pariter efficiantur, jam quaerendum est. His demum investigatis, quid de vi insita statuendum sit, facile apparebit.

Potentiae quibus aut nervi aut muscoli efficiuntur, aut Stimuli aut Sedantia habendae sunt.

Hae et illa classis in duos ordines, nempe Vires Spirituales aut Internas, et Corporales vel Externas, potest dividi.

Virium internarum naturas aut differentias hic loci longe sermone prosequi haud operae pretium est, cum ex eis praeter argumentum generale nihil luculentum deducere liceat.

Vires corporales hoc fere modo dividi possunt, initio a Stimulis factis.

Stimuli corporales aut Mechanici sunt aut Chemicis.

Stimuli Mechanici trium generum sunt; nimirum, Tensio, Percussio, et Solutio continui.

Stimulatorum Chemicorum quam plurima sunt genera; quae tamen omnia in Salinorum vel Inflammabilium ordines haud injuria referri possunt.

Salina sunt Acida, Alkalina, Neutra, Sales, Metallici, Terrestris, necnon alia salina ex animalium vegetabiliumque secretionibus, seu variis quibusdam fermentationibus, oriunda.

Ex inflammabilibus sunt varia animalium et vegetabilium Olea Essentia, Ol. Fixa, Olea Empyreumatica, Alcohol.

Sedantia quoque corporales aut Mechanica sunt, aut Chemicis. Ex mechanicis non nisi unum datur genus, viz. Pressio continuata.

Sedantia chemica ex primis sunt acida diluta; nonnulli sales tam neutri quam metallici; plurima alia regni vegetabilis referenda; vapores mephitici.

Haec rerum divisio illa fere omnia, quae vim tam insitam quam nervicam solent afficere, complectitur.

Quid utrique igitur cum illis pariter intercedat, quaerendum est. Hoc experimentis evictis, tum demum, necne vires illae pro una eademque habendae sunt, recte statuamus.

Attamen, in silva rerum adeo infinita, singulis quaecumque in examen revocare plane supereroganeum esse videtur. Paucula quaedam ex singulis generibus seligere, et ab illis caeterorum quoque effectus colligere, magis placeat. Quod si fastidium alicui hoc moveat, ipse cuncta omnia in trutinam revocando errorem nostrum redarguit.

Quod



Quod ad ipsa experimenta et observationes attinet, non nisi a stimulatorum vel sedantium simplicibus effectibus cite deduci posse, satis adparet. Experimenta in integris animalibus instituta nihili valent; neque enim ex his, quomodo aut nervus aut musculus afficiatur, colligere est. His tantummodo fidendum est, quibus nervus vel musculus a caeteris corporis partibus semotus subjicitur. Ex demum ratione stimulatorum vel sedantium effectus manifeste in locum venient.

Quod si musculus a nervis caeterisque systematis partibus quam maxime sejungatur, portionem quandam nervosae substantiae illi adhuc penitus adherere, in animo tenendum est, ne experimentis plusquam honorem suum concedamus. Ex nervo igitur penitus a corpore semoto initio facto, quomodo hoc vel illo stimulo aut sedativo afficiatur experiemur; quomodo musculus eadem quoque vi afficiatur, postea expositori.

His ita praemissis, ad experimenta jam descendendum est.

Potentiae Internae cujusvisque demum generis experimentis nequeunt subijci. Nonnihil tamen iudicii vel ex illis capere licet. Omni enim animali, cujus structura interior haud penitus latet, nervos, veluti instrumenta quaedam quibus actio muscularis efficitur, Naturam tribuisse supra ostendimus. Nervi igitur ex hac saltem parte, nimirum quoad potentias internas, motum muscularem necessario excitant. Ad vires corporales jam properamus; de stimulis ante alias dicturi.

Et ipse *Hallerus* et caeteri omnes physiologi singulis mechanicis viribus, scilicet extensione, percussione, continui solutione, vim nervae, ejusque opera muscoli contractionem, facile excitari, haud aegre concedunt. Quin et iisdem viribus, ipsorum muscularum actiones quam facillime nonquam non excitari, luce clarius est; neque aliud sane datur discrimen, nisi quod multo fortius agunt nervis quam musculis applicatae. Quod ad has igitur attinet vires, muscoli vis insita et nervica nequaquam discrepare videntur.

Duae primariae vires, muscularum nervorumque actionem excitantes, huic stimulatorum mechanicorum capiti merito referri solent; Calor nimirum, et Electricitas.

*Clar. Fontana* experimentum memorat in quo nervus aquae ebullienti immersus muscularum motum excitavit (p). Idem, musculis aqua pariter immeris, evenisse nos vidimus; eorum vero texturam tanto calore destructam, motus cito sistuntur.

Aliud



Aliud Clar. Fontana experimentum minores caloris gradus nervos fortiter excitare ostendit (g). Musculos etiam eadem causâ pariter affici, innumera experimenta testantur.

Quod ad electricitatem attinet, quoniam nervi sunt fluidi electrici conductores, quod aiunt, usque ad musculos, haud facile est ex experimentis statuere quid in eos possit hujus fluidi irritatio. Quod si ulla fides hujusmodi experimentis adhibenda est, tam nervi quam muscoli hac vi quam facillime afficiuntur (r). Ex his igitur, atque ac illis mechanici generis stimulis, nullum discrimen inter nervam vim insitamque plane intercedere videtur.

Atamen in corde ejusque nervis vis insita a nervâ, ex stimulis mechanicorum actione penitus divergât, satis, ut ipsi *Halleri* videtur, distinguitur: "Non vidi irritati octavi paris aliove nervo cordis motum acceleratum fieri illi, pulsum vehementiorem successisse, aut sanguinem validius erupisse; neque vixit *Illust. Senac* (s)," &c. Quin et Clar. *Fontana* plura experimenta commemorat, in quibus nervi cordis, et cutro et fluido electrico lacessiti, cordis motum nequaquam ciebant (t). Quod si his experimentis omnia suis constet honus, ipsi cordi vim insitam adesse minus assendant. Cor enim ipsum his stimulis atque afficitur, ac alius quicumque musculus, immo atque ac nervus quicumque singulis, si modo cor tollas, musculus distributus. Nervis igitur cor invisentibus suam esse propriam statum, qui his stimulis minus irritantur, potius quam cordi vim insitam adesse, ex his licet colligere.

Aude, quod ex eventibus negativis nullo alio argumento confirmatis, positivi nequaquam infirmantur. Is autem auctoribus a Clar. *Weyt* adductis, qui cordis motum a vis suis irritatis incitari testantur, adjungere licet Clar. *Abrahamum Euri* (u), et *Matthæum Van Geuns* (u). Nihil igitur vel hoc argumentum valere videtur.

De

(g) Vid. l. c.

(r) Vid. exper. in nervos insitata. Mem. vol. iii. p. 145. et Van Den Bos de vita corpor. exper. 21.7. in musculo exper. 22. Julii. et Matth. Van Geuns Dissert. de vita, p. 29. not. et Mem. vol. iii. p. 145. et seq.

(s) El. Phys. vol. i. p. 467. (t) Mem. vol. iii. p. 214. 219. et 489.

(u) Catulus junioris subjeti insipello, apertusque thorax, cordis motum fuit secretum per stimulum hujus attentius observari, quem cum immixtum viderem, diffractione, et quod maximum erat cordis exciso, instrumento acuto lacessit oblongatam medullam, quo facto magis acutiusque agebatur cordis motus; *Euri Diss. Anat. de vita et motu cordis*, &c. *Halleri Diss. Anat.* tom. ii. p. 422. §. 3. Vid. l. c. 4. et 7.

(u) Cum super ea suspensa exempta subito areclum, medullar (p.

De viribus chemicis jam dicendum est.

Aciderum concentratorum irritatio, quatenus ex experimentis institutis colligere licet, et nervos et fibras musculares pariter afficit. Cl. Fenzl, extremam ranæ cruralis nervi quæ divisus fuerit parte, ipso nitri contactu, tibiam musculos per 6 vel 7 minuta secunda tremere scribit (x). Apud Hallerum legimus, cor ex quiete tactu olei vitrioli fuscitari, tum ipsam tum auriculam (y). Horum tamen contactu musculos non semper excitari reperit Hallerus, et neque nervis nec musculis applicata, motus fuscitare nobis unquam visa sunt (z).

Alkali fissilis fixi singularem admodum potentiam in nervos pariter et musculos plurimum valere, experimenta ostendunt (a).

Vi eadem gaudent neutra ex hoc alkalino composita, nimirum sal Glaub. (b), nitrum cubicum (c), sal polychrest. Ruy. (d), et præter omnia sal commune (e), quod motum muscularem fortius quam alkalinum fissile excitare videtur.

Tartarus regeneratus parces eductus edo, sive nervis sive musculis applicatur (f); scilicet, nonnihil motus primum excitat, irritabilitatem paulo post minuit.

Sal alkalinum vegetabile fixum nervo musculoque admotum propriis suis vi motum adeo non ciebat, ut eadentis potius quam stimulantis vice fungi videbatur; idque in utroque organo haud ab simili præterius modo (g).

Tartarus vitriolatus, simul et sal polychrestum, nervis musculisque admotus ne minimum quidem motum excitavit (h); dum nervus musculusque vicinus sale communi quam facillime fuscitabantur. Nervus etiam partis illius cui hoc sal admotum fuit stimulo mechanico haud aegre irritatus fuit.

De nitro communi jam dicendum est, quo sedativi ejus effectus nitri cubici stimulo clarius opponantur. Scilicet, motum adeo non ciebat, ut tam nervorum quam musculorum irritabilitatem mire tollat (i); immo in eâ nervi parte cui minus applicatum fuerit (k). Dohrn magnus animal afficere videtur nudo musculo admotum integro adhuc nervo; nequaquam tamen muscoli actionem ciebat (l).

VOL. III.

N

Sal

nuda tractum totum perfunderem, confes pulsam numerum mos. non remissum, sed potius ab hoc valido irritacione pauci observabam. *Matth. Sam. Quam. Diss. de quibus vitam consistit in corpore animal. p. 26.*

(x) Mem. vol. III. 223. (y) Oper. min. p. 121. Exper. 116.

(z) Vol. oper. 1. d. h. v. (a) Exper. 2. a. b. (b) Exper. 3. d. v.

(c) Exper. 4. a. d. (d) Exper. 6. a. b. (e) Exper. 5. d. v.

(f) Exper. 7. b. d. (g) Exper. 3. a. b. v. (h) Exper. 2. a. b. c.

(i) Exper. 9. a. d. (k) Ibid. b. (l) Ibid. v.

Sal digestivum *Sylvestri*, tali communi sensibilibus suis qualitatibus quam conjunctissimum, longe alios effectus edidit, neque moram eiet, nervis musculisve admotum (m).

Sales ammoniaci, nimirum viridolici, microsci, communis, tam nervo quam musculo saepius adhibiti, motum propriam suam stimulantem vi nequaquam concitabant (n); utrique organo vires irritabiles potius auferre videbantur (o).

Sal ammoniacum vegetabile, neque nervo nec musculo applicatum, motum suscitavit (p). Irritabilitatem tamen utrorumvis non valde minuit. Idem de sale ex Acido Muratico et Magnesia composito dici potest; necnon de Ammoniaco Fixo musculis admoto (q).

Infinitam fere experimentarum vim cum variis metallicis salibus, scil. Mercurio Sublimato, Butyro Antimonii, &c. institutorum apud *Hallerum* legimus. Haec inter, quosnam effectus his rebus in musculari contractione excitanda recte tribuamus, minus facile est statuere. Idem saepius testatur *Hallerus*, et effectus eorum a vi causifica plerumque pendere monet. In pluribus experimentis a nobis institutis, ne minimam quidem muscularem contractionem, vel ipsa muscula vel nervi admoti, eiere videbantur (r). Eodem fere modo ac acula concentrata agunt. Quantum possint, aqua jam diluta, minus haecenus statuimus.

Varia Vegetabilia, scil. Senna (s), Colocynth. (t), Aloe (u), Sinapi (v), Oleum Carol. (x), Terebinthinae (y), Sabiniae (z), Piper (a), Zinziber (b), Euphorbium (c), apud illa animalia, quibus in solis nos experimenta institimus, ne minimos quidem motus, vel nervis vel musculis applicatis, excitarent. Quis demum horum animalium status prohibet, quo minus haec suos effectus edant, ignoramus. Nervus tamen musculisque de ea re nequaquam discrepare, satis constat.

Experimenta institimus cum Oleo Succini, et in nervo, et in musculo; in utroque, effectus penitus defuit (d). Tum etiam experimentum, cum Oleo Cornu Cervi non rectificato in musculo institutum, sine effectu fuit (e).

In experimentis cum alcoholis ab *Hallero* institutis, mulrus superest dubitandi locus. Aliis discrete asseruit, alcoholis effectus quam levissimos edere (f); nimirum, hanc esse causam, "quantum hac genus irritationis unum ex levissimis

(m) Exper. 10. a, c. (n) Exper. 11. 12. 13. a, c. (o) Ibid. b, d.  
 (p) Exper. 14. a, b. (q) Exper. 15. c. 16. (r) Exper. 17. et 18. a, b.  
 (s) Exper. 19. a, c. (t) Exper. 20. (u) Exper. 21. a. (v) Exper. 22. a, b.  
 (x) Exper. 23. a, c. (y) Exper. 24. a. (z) Exper. 25. a, c. (a) Exper. 26. a.  
 (b) Exper. 27. a, b. (c) Exper. 28. (d) Exper. 29. a, b.  
 (e) Exper. 30. b. (f) Oper. min. p. 382. Exper. 280.



"visum est (g)." Tam in his vero, quam in caeteris omnibus experimentis (b), quicumque alcoholi concentrationis fuerit gradus, omnino sileat. Quoniam vero haec omnia simplicem tantummodo muscularum contractionem edidisse visa sunt, etsi in his musculis instituerentur quorum contractio, ex stimulis oriunda, relaxatione nunquam non ocius excipitur; exinde licet colligere, has parvulas contractiones non revera musculares esse, sed ex partium quibus alcohol admotum est coagulatione potius ortum duxisse. Alcohol igitur musculis applicatum, motum eorum vix ac ne vix quidem excitare videtur.

Cl. Fontana plurima experimenta cum alcoholi in nervis tibiarum tam musculis insensibus instituta memorat. Alcoholi nervi irritabilitatem, in ea parte quam attingisset, omnino tollere invenit, dum pars inferior vi sua etiamnum gaudebat. Musculorum tamen interea loci contractionem nequaquam vitio; eam saltem haud memorat (i). Nonne igitur ex his omnibus statuere licet, alcoholicum motum muscularem neque vis nervorum neque insulae opera excitare posse?

De Sedativis jam dicendum est. Annon Mechanicum detur Sedativum, dubitandi locus est; huius naturae forsitan est Pressio aequalis continuata. Ea vi ipsius cerebri functiones tolluntur, et deficiunt vires nervosae; neque ei nervi partem, in quam pressio aequalis constans sit, amplius vis adest. Musculi eodem fere modo affici nonnunquam videntur. Scilicet, muscularum cavorum infarctus, vel distentio, paralyti eos citius afficit, vimque haud multo post penitus tollit. Cor, musculum summi irritabilitate gaudentem, ita corrumpi posse, testatur ipse Hallerus (k). Idem quoque ventriculo, intestinis, et praesertim vesicae urinae, acclis. Simplex igitur pressio tam nervorum quam muscularum irritabilitatem tollere videtur. Siquidem nimiae distentioni nonnullis hic tribuendum sit, nervis musculisque pariter nocet.

Frigus absolute amborum irritabilitatem perdere, non ignorat. Aequi vero calorem, ad certum quendam gradum adactum, eundem effectum praestare, salva etiam non tenerrimi nervi structura, experimenta, si fallar, ostendunt (l).

Gallorum vis adstringens nervi irritabilitatem penitus tollit,

N 2

tollit,

(g) Oper. min. p. 288. exper. 125. Mem. vol. 1. exper. 362.

(b) Oper. min. p. 293. exper. 396. (i) Vide Memoir. cit. vol. III. p. 466.

(k) Oper. min. vol. I. p. 161. exper. 175. "Auris dextra pluri-  
fimo non irritabilis est, quod frequens vitium est." Vid. etiam Mem.  
sup. cit. vol. II. p. 405. (l) Exper. 31. 4. 6.



tollit, adeo ut nullus jam stimulus concitetur. Neque alios effectus edit musculo applicata (m).

Saccharum Saturni, sive adstringens sive proprie sedativum habendum est, nervos musculisque pariter afficit.

Cremor Tartari nervi musculique eodem prorsus modo irritabilitatem perdit (n).

Ad Chemica jam Sedativa propria venimus.

Opii vires acerrimis *Hallerus* inter aliosque physiologos litibus antea praeberunt. "Ab opio posse eam vim sup-  
"primi quam nervus in musculum transfert," ipse *Hallerus* fatetur (o). Vim insitam quoque musculorum, si modum excipias, eo affici concedit. Intestinorum irritabilitatem, a corde proximam, opio ita admoto minui, ipse etiam vidit (p). Et, cum cordi ipsi admoventur, quo in casu de ejus in hunc musculum effectibus tantummodo judicium inferre licet, statim hujus musculi vires deficere, ex experimentis *Montei* luculentissime constat (q).

Ciguë nervi quem dissectueram parti extremæ applicata, ejus irritabilitatem post aliquod tempus perdidit; eodem quoque edit effectus, si musculum attingeret (r).

Idem de Hyosciamo (s), necnon de Nicotiana (t) infuso, licet dicere.

Foliorum Pruni Laurocerasi infusum nudo musculo applicatum, post aliquod tempus, irritabilitatem tollit (u): In nervo quantum valere possit, ex temporis angustia, minus hactenus experiri licuit. Quoniam vero in multis experimentis, integris in animalibus institutis, nervorum vires penitus inde abolitae fuere, vis dubitandum est, quin pari ratione et nervum et musculum afficiat.

Theæ infusum, nervo musculove asmatum, vires nutritices minuit, perdit (v).

Alkalini sivi vegetabilis Vapor Mephiticus utriusque organo vires irritabiles magisterio tollit (x).

Ex his igitur experimentis haec fere licet colligere: nimirum, ab his omnibus quibus *Vires Musculares* afficiuntur, pariter affici *Vires Nervæ*; nullamque igitur has inter  
votum

(m) Exper. 21. a, b, c. (n) Ibid.

(o) *Opusc. misc.* vol. 1. p. 254, et 255, &c.

(p) *El. Phys.* vol. IV. p. 429.

(q) Experimentum in tenuissimis physiologis\* retulit *Præceptorum R. Whyti*; quodque etiam, inter plura alia pulcherrima et multo alia experimenta, in *Mss. eximii Præceptorum Montei*, ex summa ejus humanitate, nobiscum libenter communicavit, ipse legi.

(r) *Exper.* 10. a, b, c, d. (s) *Exper.* 33. a, d. (t) *Exper.* 34. a, b, c, d.

(u) *Exper.* 16. (v) *Exper.* 36. a, b. (x) *Exper.* 17. a, b.

\* *Phys. Essays* p. 211.

verum legitimumque interesse discrimen : Eam, quæ motus muscularis proxime cietur, *Vim Insitam* male audire : quoniam ejusdem penitus naturæ est ac ipsa nervis per totum suum cursum vis insidens : Nullam aliam musculo inesse *Vim Irritabilem*, seu, quod aliis fortasse magis arrideat, *Vim Vitalem*, seu divinum *Vim Muscularem*, præter ipsam vim nerveam : Minum denique muscularem a vi nervæ, tanquam a proxima suâ causâ, nunquam non pendere : neque hujusmodi actionem pro *Principio Animali* habendam.

## A P P E N D I X

## EXPERIMENTORUM

QUÆ sequuntur experimenta hanc ob causam instituta sunt, ut nullum inter vim muscularem motricem nerveamque verum interesse discrimen ostenderent. Unam igitur animalium speciem cui hæc organa satis manifesto adsunt, his experimentis subicere satis duximus. Illos ipse *Hallerus*, aliter in cæteris animalibus quam hominibus se habere vim insitam nerveamque, ne dubitare quidem videtur. Nulla igitur præter ratem animalis huic rei adhibuimus ; quæ et facillime comparatur, et experimentis haud ægre subjicitur. Res fortasse adhuc clarius eminuisset, si modo alia animalis, ex præcipuo calido sanguine gaudens, usurpare licuisset. Defuit vero etiamnum et tempus et occasio : Alius, ut spero, præferendi erit locus.

## EXPER. I.

(a) Portæ vitriolicæ acidum, cruralis aliorumque nervorum rectè et diversim parti extremæ quam sæpius applicatum fuit. Nervus ibi vi acidi contrahitur valde, et inorquetur ; ne minimum tamen motum edit musculus.

(b) Nudis quoque sibiæ crurisque musculis sæpius admotum, et integris nervis et divisis, motum muscularem nequa-

nequaquam excitavit. Ea pars musculi, quam attingit, lactis manifesto coagulata fuit. Experimento testis additis Doctiss. *Jacobus White*, M. D. quatenus amicitiae causa hic nominare velim.

(c) Acidum quoque muriaticum utrisque organis applicatum, effectu pariter omnino caruit. Idem fere observat Ill. *Hallerus* in experimentis plurimis apud integra vivaque animalia factis. Internae quaedam et perquam sensibiles partes, ex his acidia diu applicatis, sese placiter contrahere nonnunquam animadvertae sunt. Hoc vero dolori ex harum partium erosione oriundo, potius quam stimulo proprium acidii, nervos musculosive sollicitanti, merito tribuendum est. Hoc vel illud stimulum seu sedativum nuncupare, propterea quod animalia integra hoc vel illo modo afficit, minus tutum est.

Ad alkalina jam transimus. In experimentis cum rebus salinis instituendis, nova quaedam nec opinanti ante nos observabantur. Haec autem, quoniam ex mino quodam discrimine inter alkalina intercedente exoriri videntur, breviter exponam. Salina, quae adhibuimus, praeter acida illa modo dicta, fuisse alkalinum vegetabile fixum, alkalinum volatile, et ex salibus neutris sal Glauberi, sal commune, nitrum commune, et tartarus regeneratus, ea nimirum quae ex alkalino fixo variisque acidis vulgationibus constant. Ex his autem omnibus, ranarum tibiae crurisque nudis musculis admotis, nulla, si modo salem commune tollas, diu saepiusque repetita, motum muscularem omnino excitarent. Sale autem adhibito communi, musculorum vividae et diuturnae contractiones, nulla alia arte modo excitandae, quam facillime ciebantur. Sal Glauberi profecto exiguis quibusdam brevibusque motibus occasionem dedit. Tartarus etiam regeneratus, quem ad musculorum motus excitandos neper feliciter adhibuimus, tunc temporis effectu omnino caruit.

Haec omnia longe praeter opinionem contigerunt; his enim alkalinis neutrisque salibus, tanquam stimulis, nervos musculosque affectos fere, in animum facile induximus. Brevis autem fuit haec nostra admiratio. Res quamplurimae stimulorum loco a materiae medicae scriptoribus recensentur; paucioribus quibusdam generibus, nimirum plantis verticillatis, umbelliferis, alkaliescentibus, terebinthinis, aromaticis, amaris, aliisque quibusdam, a *Cullen* nostro relatae (y). Ex his omnibus generibus unam alteramque

(y) Apud praestantissimi Praeceptoris catalogum Hist. Méd. anno 1761,



amque speciem, necnon varia alia acris, frustra adhibuimus, veluti infra memorabitur. Ubi haec omnia, praeter sal commune, parum ex votis cesserunt, quâ demum propria virtute id praeditum fuerit, nobis in animum venit quaerere. Hac mente aliud neutrum illi perquam simile, eodem acido, nec alkalio, ut creditur, valde diverso constans, nimirum, sal digestivum Sylvii adhibuimus. Hoc autem ranae musculis nudis applicato, ne minimi quidem editi sunt motus; dum sal commune ejusdem ranae musculis locis admotum vividos diuturnosque motus per more concitavit. Egregium igitur quiddam inter diversa alkalina, ex quibus constant, intercedere discrimen, tum demum suspicabamur, neque falso penitus augurio. Alkalinum enim fixum fossile, longe aliter quam vegetabile, motus perquam vividos, neque iis a sale communi editis absimiles concitavit. Hoc inter alkalina fixa discrimine ita compertum, an aliis quoque neutrâ, quibus alkali fossile pro basi est, ut chemici loquuntur, eadem quae salî communi vis fuerit, quaerere statuimus. Puro autem sale Glaub. saepius adhibito, cum quoque motus nonnullos, imbecilliores quidem nec satis diuturnos, semper excitare; neque musculum cui admotus fuerit, sale communi, seu alkali fossili, perinde ut antea affici invenimus. Nitrum vero cubicum et commune magis inter se discrepare videntur, quam sal commune et sal digest. Sylvii. Scilicet, Nitrum commune adeo non alacres illos motus a Nitro cubico editos excitat, ut vires motrices quam maxime debilitet. Neque minus a se invicem distare Tart. regenerat. et Sal Polychrest. Rapellense primo videbantur. Tartarum vero regeneratum motus excitantem nuperrime saepius vidimus; etsi his demum cessantibus, tam nervi quam muscoli irritabilitas ex magna jam parte perierit, aliter quam in Sale Polychrest. Rapell. observatum fuit. Nulla ex salibus terreis, quae adhibuimus, ullos excitant motus. Sed ad experimenta jam redeundum est.

## EXPER. II.

(a) Alkali fossile nervi resecti, a partibus vicinis caute separati, et in vitrum impulsis, veluti in omnibus his experimentis factum fuit, parti extremæ admotum, nervum adeo irritat, ut musculorum quos adit singulae sero libras accerrime agitentur.

(b) Alkali

1757. In usum discipulorum, occasione capta inopinatae mortis Clar. Car. Alston, praedlectiones in M. M. summe castigatissimae, editum.



(b) Alkali Fossile musculus nudis in qualibet corporis parte et illaesis nervis et antea divisis, applicatum, eundem pariter effectus edidit. Alkali in milti, quem dicunt, statim usurpatum est.

## EXPER. III.

(a) Pauillum saturatae veri salis Glauberi solutionis nervi cruralis recenter divisi, parti extremæ admotum fuit. Quinque fere post horæ minutis primis pedis digitorum, paulo post tibiæ musculi moveri coeperunt, et per sex vel octo minuta prima creberrimo quidem, licet minus valente contraherantur. (b) His motibus ad finem perductis, eadem solutione musculis cruralibus qui modo agitabantur, applicata, nulli adparuerunt motus. Sal quoque commune frustra adhibitum est. Pedis digitorum musculis tunc temporis applicatum, exiguos quosdam motus concitavit. Nonne igitur sal Glauberi vim musculorum mortuam minuere videtur, nervi parti procul sitæ admotum? Ex motuum eorum imbecillitate neque brevi, necnon ex motus universi post hos demum absolutos iacturâ, majores illi vires sedantes quam stimulantæ adesse videntur.

(c) Idem sal musculis nudis aliis Ranae tibiæ, nervis antea resectis, applicatum, vixit crebrasque motus concitavit.

## EXPER. IV.

(a) Saturatam solutionem Nitrî Cubici, mediante lin-teolo, extremæ parti nervi cruralis recenter juxta femoris summitatem divisi, et a musculis penitus resecti, adeo ut pollicis dimidium a femore distaret, admovi. Musculi tibiæ omnes, et eorum singulae fibrillae, motibus vividissimis agitatae fuerunt. (b) Dein Nitro Cubico sublato, adhuc bitoque ejus vice Nitro Communi, hi motus statim compa-ri sunt, neque Nitro Cubico, seu Sale Polychresto Ru-pellense, nervi parti inferiori jam admotis, renovari po-tuerunt.

(c) Eodem experimento in nervo femorali prope vertebra diviso iterum instituto, acque agitati sunt femoris musculi. Hæc quoque motus nitrum commune parti ex-tremæ nervi admotum ad finem celerissime perduxit: ne-que renovare potuit Sal Polychrest. Rupellense.

(d) Nitro etiam cubico pluribus musculis saepius appli-cato, modo integris, modo resectis nervis, parca effectus valere nobis contigit.

EXPER.

## EXPER. V.

(a) Vi alkalini fissilis, velut antea memoravimus, compertâ, Sal Commune verum fini nervi cruralis recenter divisi, et a muscullis sepositi, admovi. Tibiæ musculi quam acerrime et creberrimo per viginti quinque minuta prima contrahantur. (b) Experimento in nervo crurali iterum instituto, musculus quam maxime agitabatur, dum sal digest. Sylvi nervo propinquo admotum effectum penitus carebat.

(c) Experimentorum infinita serie vi cum hinc sale instituta, effectus ejus adeo constantes et perpetui fuerunt, ut ejus ad normam omnium serie aliorum vim expendere liceat. Quo purior sit, eo efficacius agit. Rubram musculi colorem imperit, molem suam, si modo vasa sanguinea integra sunt, adaugere videtur. Cutis divisæ labra sanguinem largiter effundunt, etiamsi sanguinis ex his stiblidium antea deflisset.

## EXPER. VI.

(a) Sale Polychrestâ Rupellensi nervi cruralis secti fini appposito, cruris musculi acriter movebantur.

(b) Ita quoque sese res habuit, cum ipsi musculi applicabatur.

## EXPER. VII.

(a) In prioribus nostris experimentis cum Tartaro Regenerato institutis, nulli sensibiles motus, illius vi musculus irritanti merito referendi, observati sunt. (b) In nuperis quibusdam, secti cruralis nervi extremæ parti admotus, musculorum tibiæ pedisque motus vegetos, breves tamen, concitavit. (c) Neque sale communi postea adhibito musculi contrahantur.

(d) Musculis nudis eodem tempore applicatus, pares ciebat motus.

## EXPER. VIII.

(a) Tartari Vitriolati, necnon (b) Salis Polychrestâ solutione nervo femorali diviso applicatâ, ne minimum quidem contraheretur musculus, quem adit. (c) Eodem tempore sal commune uni ex vicinis femoralibus nervis admotum, vegetos motus quam facillime excitavit. (d) Nervi quoque portio, quam Sal Polychrestâ attigerat inter furficis laminas vellicata, musculorum suorum motus conciebat.

(e) Haud alio effectu eadem solutio in nudis musculis adhibita est.

## EXPER. IX.

(a) Postquam cruralem nervum grandis vegetaeque Ranae a musculis quam accuratissime reseceverim, nec vulnerati arteriam cruralem, nec aliam quavis injuriâ animali affecto, Nitri communis solutione ejus partem extremam imbuji. (b) Cum nulli per decem minuta prima ederentur motus, Nitrum sublato, Nitrum Cubicum, Sal Polychrest. Rupell. tam nervi extremitati, quam partibus ejus inferioribus quas nitrum commune non attigisset, admovi. Frustra tamen; neque enim muscoli contraherentur. Nervo tamen inter forfices compresso, languidas qualem exciebatur motus. (c) Nervo alterius cruris Nitrum Cubicum admodum vegetos excitavit motus, a Nitro Communi paulo post haud aegre suppressos.

(d) Idem sal musculis nudis, quorum nervi antea resecti fuerunt admotum, nullum motum ciebat. (e) Si modo nervi omni injuriâ immunes sunt, animal ex dolore multum diuque conflatur, nullo tamen ejus, cui sal admotum fuit, prae caeteris musculis, motu edito; caeteris autem conquiescentibus, iste quoque conquievit. Ille autem musculus pallore quadam inficitur. (f) Sal commune post Nitrum adhibitum vix ullos edidit effectus. (g) Medullae spinali admotum, capite jam abscisso, tibiae extensionem, motumque satis grandem, per totum corpus excitat.

## EXPER. X.

(a) Salia digestivi Sylvii solutione nerva femorali ejus ranae, in qua experimentum cum sale communi modo memoratum institutum est, admota, muscoli penitus conquieverunt; sale vero sublato, nervoque in ea parte quam attigerat forficibus compresso, satis alacriter contraherentur.

Nuda femorali musculo ranae integrae vegetaeque admotum, nullos concitavit motus, dum sale communi tibiae alteri appposito, muscoli valde agitantentur, sanguineo rubro calore jam imbuti, et ex partibus vicinis copia satis magna sanguinis effunderetur.

## EXPER. XI. XII. XIII.

(a) Salia Ammoniaca, Vitriolicum, nempe, Nitrosum, et Commune, aqua soluta nervorum recentiorum divisorum, et summa irritabilitate gaudentium fini, saepius singulatiim adhi-



adhibiti, muscularum motum nequaquam excitabant. (b) Sal commune postea adhibiturum, motum vix ac ne vix quidem ciebat.

(c) Eodem quoque modo musculus nudis, quorum nervi paulo antea resecti fuerunt, applicati, nullos effectus ediderunt. (d) Sal quoque commune postea admotum, effectus caruit. Haec vidit experimenta egregius ille juvenis *Johannes Beffsch*, amicus meus singularis, qui plurimis aliis meis experimentis non solum testem, sed etiam adiutorem, se libentissime praebuit.

## EXPER. XIV.

(a) Salis vegetabilis ammoniaci crystallizati ex aqua solutionem nervi extremitati larga admovi manu. Per aliquod tempus adhaerens, motum nequaquam excitavit. Musculus tamen nervo compresso facile contrahabatur.

(b) Femoris etiam tibiaeque musculis nudis applicatum, et integris et resectis nervis, pariter effectus caruit.

## EXPER. XV. XVI.

(a) Sales Terrei ex Acido Muriatico Terraque Calcareae, (b) necnon ex illo acido et Magnesia compositi, musculis nudis appositi, integris jam nervis, nullos ediderunt motus.

## EXPER. XVII.

Solutione Sublimati Corrosivi musculis nudis applicata, duriores pallidique evaserunt, atque animal prae dolore enixe conflictatum est; nequaquam vero ille quem attingerat musculus praeter rictus agitur est.

## EXPER. XVIII.

(a) Antimonii Butyrum nervi extremitati appositum, nullos excitavit motus, licet ipse nervus valde contrahabatur.

(b) Neque ullam effectum habuit, musculus applicatum.

Et hoc et illud modo praecedens experimentum saepius repetita sunt.

## EXPER. XIX.

(a) Sennae ex aqua factum infusum nervo recenter diviso applicatum, nullum excitavit motum.

(b) Sublata Senna, nervus jam compressus motum ciet.

(c) Nudo quoque musculo et integris et resectis nervis, frustra adhibiturum est.



(d) Sal commune applicatum, motum excitavit languidum, tamen neque pro more vividum.

## EXPER. XX.

Colocynthis infusum perquam amarum musculo admotum, nullus effectus edidit.

## EXPER. XXI.

(a) Ea omnia, quae cum Senna, cum Aloe quoque solutione instituta experimenta, effectu prorsus caruerunt.

(b) Sal vero commune musculo postea applicatum, motus vividiores concitavit.

## EXPER. XXII.

(a) Forte Sinapi nervi recenter divisi summæque irritabilitate gaudentis extremitati saepius admotum, musculorum motum nequaquam excitavit.

(b) Frustra quoque nudis musculis applicatum est, tam intactis, quam divisis nervis.

## EXPER. XXIII.

(a) Operam quoque lusimus, dum Oleum Carui, musculo tam integro quam nervis orbato, adhibemus.

(b) Sal Commune postea admotum, motus facillime excitavit.

## EXPER. XXIV.

(a) Oleum Terebinthinae, nudo musculo applicatum, nullum motum concitavit. Pallefcit pars ea cui admoveatur, mox livido seu plumbeo colore inficitur. (b) Musculus haud multo post mortuus est, stimulo namque minime jam afficitur.

## EXPER. XXV.

(a) Oleo Sabinæ, musculo sive integro sive secto applicato, nullus adparet motus, neque musculus vel minimum mutatur. (b) Sal Commune postea adhibitum, motum facillime ciēt.

(c) Secti nervi parti extremæ admotum effectu pariter caret.

## EXPER. XXVI.

(a) Pungente valde Piperis Tinctura in vini spiritu diluore confecta, nudis musculis applicata, animal oblu-

tari

tari primo videbatur. Postea vero musculos quem attigerat ne minimum quidem contrahabatur.

Largiter usurpata, neque aqua jam diluta, partem cui admoveatur pallore inficit, et mure caustici contrahere et indurare videtur. (b) Si copiosius minori adhibeatur, sal commune postea applicatum, musculi actionem facile excitat.

## EXPER. XXVII.

(a) Zinziberis ex aqua infusum nudis musculis cruralibus, nullâ injuriâ affectis, si modo cutis divisionem tollas, satis larga manu admovi. Musculi per aliquod tempus observati nequaquam agitari visi sunt. (b) Nervo illos invidente dein secto, musculi valde admodum contrahabantur. Linteolo eodem infuso imbuto sectae extremitati postea adhibito, nullus ciebatur motus. (c) Post aliquod tempus, sublato linteolo, et nervi parte extremâ quam attigerat intra forfices compressâ vel resectâ, musculus acriter agitabatur. Dein Zinziberis infusum iterum musculo sine effectu adhibui. (d) Sal commune, jam sublato Zinzibere, eidem musculi parti applicatum, tam integris quam resectis nervis, motus perquam vividus ocys concitat.

## EXPER. XXVIII.

Eadem omnia experimenta cum Euphorbio in aqua infuso instituta, eisdem penitus effectus ediderunt.

## EXPER. XXIX.

(a) Oleum Succini musculo tam integro quam resecto admotum, pallore partem quam attigerit afficit; motum vero nequaquam ciet.

(b) Nervi recenter divisi extremitati applicatum, effectu pariter caruit. (c) Haud multa post, nervo in ea parte quam oleum attigerat penitus resecto, musculus quam maxime agitabatur. (d) Sal commune post oleum succini musculo adhibuit, motum facillime ciebat.

## EXPER. XXX.

(a) Oleum Corn. Cerv. non rectificatum, musculo vel integro vel resecto admotum, luteo quodam colore inficit, in rugas trahit, et satis manifeste indurat; motum tamen muscularem nequaquam excitat.

(b) Sal commune postea adhibuit effectu caruit; neque colluctante animali, ea pars musculi contrahabatur, quam sal attigerat.

## EXPER. XXXI.

(a) Duos fere abhinc annos, quid in Ranae cor potuerit magnus caloris gradus, experiri in animum venit. Corde calori 100 therm. Farenh. gradus paulo superanti exposto, motum post pauculas quasdam violentas pulsationes penitus sisti, nil tale suspicanti videre, contigit. Calore ad grad. 50 diminuto, cor iterum vite movebatur. Post aliquot minuta prima, calore rursus ad gr. 100 adaucto, motus post vibrationes quasdam vividas omnino desit. Illae caloris vicissitudines saepius alterno ordine sibi succedentes, eosdem penitus effectus nunquam non ostenderunt. Hoc experimentum quam saepissime nuper repetitum, effectu nunquam caruit (2).

(b) Fine nervi cruralis solutioni salis communis 56 grad. Far. calorem exaequantem immerso, muscoli tibiae pedisque post aliquod tempus movebantur. Eodem nervo solutioni ejusdem salis ad 100 fere gradus calenti dein immerso, motus imprimis augeri visus est; mox vero paulatim elanguit, et saepius omnino desit. Nervo priori solutioni rursus injecto, muscoli cito more suo contraherantur. Solutio autem calidior, iterum adhibita, eosdem penitus ut antea effectus edidit. Hoc quoque experimentum saepius repetenti nunquam non idem fuit effectus.

Calor 90 grad. Farenh. haud superans cordis motum adaugere magis quam imminuere videtur.

Ex his omnibus satis manifesto apparet, certum quendam caloris gradum ranae musculorum nervorumque motum adeo non cedere ut penitus tollat, structuram tamen eorum nequaquam affectu: Necnon singulos caloris gradus eo minores motum concitare, eoque fortius quo eam propius accedunt, donec ad alium quendam gradum descenderis quo rursus motus sistitur, a caeteris majoribus iterum excitandus, donec ad gradum illum sedantem perveneris. Ignoro sane annon hoc experimentis antea evictum fuerit.

## EXPER. XXXII.

(a) Cicutae folia in pulverem redacta et in aqua infusa, rudia cruralibus musculis ranae satis magnae applicata sunt. Tredecim post minuta prima sublata videntur, musculi jam pallidi lividique fuerunt colore, cruribus alterius musculis simul nudatis pristino suo colore adhuc gaudentibus.

(c) Experimentum iteravi testate proxima coram amico ingeniosissimo Gul. Withering, M. D. qui nunc in agro Staffuriae felicissimo avibus praxin medicam inlit.



bus. Unus musculorum solutione salis communis contactus, duo post minuta prima pulsare coepit; languide tamen movebatur. Haec vena solutio socio in altero crure musculo adhibita, alacres vegetosque motus concitabat. Post tria minuta prima cicuta iterum appolita, et post altera decem rursus sublata, musculi jam lividiori fuerunt colore; neque sal commune musculi quem cicuta attigerat superficiei applicatum, ullos motus per quinque vel septem minuta prima concitavit. Dein vero languidae quaedam pulsationes excitabantur, fibris musculi interioribus praecipue affectis. Toto musculo salis communis solutione postea imbutum, non nisi parvulus quoddam languidusque motus videre fuit. Decem post minuta prima, si a tempore illo quo cicuta postremo sublata est numeres, lincolo cicuta plurimum imbutum rursus appolito, et post 15 min. prima rursus sublato, color musculis adhuc obscurior fuit, neque sal commune largiter applicatum motus omnino concitavit; musculis alterius cruris eodem sale etiamnum facillime irritatis.

(b) Cicuta musculis femoralibus per triginta minuta prima iterum adhibita, sal commune largiter postea applicatum nullos edidit effectus; cū socii musculi eodem stimulo lacessiti facillime contraherentur.

(c) Clariss. *Morre* cor unumquemque motus statim amittere, extracto cicutae aqua soluto et in ventriculum injecto, testatur (a).

(d) Idem cicutae infusum nervi, qui cultro lacessitus tibiae motus facillime concitavit, extremitati admotum est. Post quindecim minuta prima eo sublato, nervoque compresso, tibiae musculi alacriter contraherentur. Cicuta rursus per quindecim min. prima adhibita, nervus itidem compressus motum muscularem adhuc ciebat. Cicuta rursus per decem minuta prima applicata, eadem irritatio eosdem pariter effectus edidit. Rursus denique per viginti min. prima cicuta adhibita, tum demum nervi ea quam attigerat portio abscissa motum renovare nequibat. Nervo vero paulo inferius resecto, musculi facillime contraherentur.

## EXPER. XXXIII.

(a) Solutione extracti Hyosciami turbida nudis tibiae musculis per decem minuta prima adhibita, multo stacidiore fuerunt quam alterius tibiae musculi eodem tempore nudati. (b) Tam sale communi quam alk. fuffili tibiae

(a) In M5. *Sumo cicuto.*



bis musculis largiter admoto, nulli ciebantur motus; dum alterius tibiae musculus sale cum. lacellati facile contrahantur.

(c) Nervo crurali dein resecto, animal valde agitabatur, dolore manifesto affectum; ille vero musculus, cui extract. Hyasciani adhibitum fuerat, prorsus conquievit.

(d) Nervo crurali abscisso, idem extract. Hyasciani applicatum est. Paulo post ejus nervi extremitate resecto, tibia haud ita multum movebatur. Extractio rursus per aliquod min. prima adhibita, musculi nequaquam contrahantur cum nervus jam rursus secaretur.

#### EXPER. XXXIV.

(a) Nicotiana in aqua infusa nudo musculo per decem minuta apposita est. Ea demum sublata, sal commune motum facile concitavit. In alio vero experimento nicotiana per 30 min. prima adhibita, musculus jam perquam pallidus fuit, neque sale communi amplius irritari potuit.

(b) Eadem Nicotianae solutio nervi maxime irritabilis resectae extremitati per 30 min. prima applicata est. Fine nervi tum abscisso, musculi paululum contrahantur. Nicotiana rursus per 15 min. prima applicata, et nervi sine iterum resecto, nulli apparuerunt motus. (c) Nervo vero paulo inferius resecto, musculi alacriter movebantur. Postquam vero huic parti inferiori Nicotiana admota fuerat, illi quoque resecti, motus nequaquam ciebatur. Parte adhuc inferiore resecta, musculi acerrime contrahantur.

#### EXPER. XXXV.

Foliorum Pruni Laurocerasi in aqua Infusum musculis cruralibus nudis per viginti min. prima applicatum fuit; sal commune tunc temporis adhibitum vegetos concitavit motus. Eodem infuso, postquam sal commune diligenter elotum fuisset, iterum per min. prim. 15 adhibito, musculi sale communi adhuc movebantur, minus tamen quam antea alacriter; mole minore fuerunt, simul et flaccidiores quam alterius cruris musculi eodem tempore nudati. Idem infusum iterum adhibitum est. Horis fere una cum dimidio ex experimento instituto, sal commune musculum etiamnum nonnihil concitabat, praecipue vero in fibris interioribus quas infusum minus attingerat. Exteriores sale minus affectae sunt. Tibiae alterius musculi sale communi tunc temporis lacellati perquam vivide contrahantur. Rursus denique infusam fibris tam internis quam exterioribus admetum est. Horis fere duabus cum mi-

tutis primis 20 ex experimento instituto, musculi sale communi vel alkali fossili ne minimum quidem contrahebantur. Et sal commune et alkali fossile ex cutis divisae labris sanguinem etiamnum valent elicere.

## EXPER. XXXVI.

(a) Infusum Theae Viridis nervo crurali resecto, qui la-  
cessitus musculorum motum facillime ciebat, adhibui.  
Post 15 min. prim. ea nervi parte quam Thea attingerat ab-  
scissa, musculi nequaquam contrahebantur. Nervo autem  
infra resecto, vegetae exortae sunt contraactiones. Pars  
nervi Thea imbuta paulo opacior visa est.

(b) Eodem infuso nudis tibiae musculis per 15 min.  
prim. applicato, sal commune postea appositum effectu  
caruit. Idem vero sal laxorum musculorum femoris in  
experimenti initio prope originem suam resectorum motus  
facillime conciebat.

## EXPER. XXXVII.

(a) Femur tibiamque Ranae a trunco modo abscissa et  
cute nudata suspendi in phiala satis magna, cui nonnihil  
Sal Alkalini vegetabilis fixi mitis antea infundebam. Dein  
acido vitriolic. adfuso, Aer Mephiticus ex Sale Alkalino  
sub formâ vaporis oriundus totam implevit phialam. Al-  
tera ejusdem animalis extremitas simul abscissa, et cute  
spoliata, aëri communi expolita est, quo melius pateret  
Vaporis Mephitici effectus. Crure illo in phiala contento  
vaporibus jam oppleto, nullos musculorum motus diligen-  
ter observanti videre fuit. Post 10 min. prim. crure sub-  
lato, et Sal. Alk. Foss. musculis ejus admoto, haud ita mul-  
to post manifeste movebantur. Eodem artu aliis mephi-  
ticis vaporibus per decem minuta prima expolito, Sal. Alk.  
Foss. motum non nisi post longius intervallum ciebat. Ar-  
tu autem rursus per 15 min. immerso, musculi sale Alk.  
Foss. jam contacti vix ac ne vix quidem contrahebantur.  
Alterius interea loci cruris musculi facillime irritabantur.  
Idem experimentum in corde institutum est, neque alio  
effectu.

(b) Nervi cruralis portionem satis longam hisdem vapo-  
ribus exposui, summa cura adhibita ne musculos quos ille  
adhuc attingerent. Post aliquot min. prima, parte quadam  
nervi abscissa, musculi ne minimum quidem contrahebantur.  
Dein alia mox et altera pars nervi resecta est, neque  
motus adhuc apparuerunt. Eâ vero tandem resectâ parte  
quam vapores minus attigerant, musculi jam denique mo-  
vebantur;

vebantur; nervus manifeste contractus fuit, et opacior visus est.

## EXPER. XXXVIII.

(a) Alkali Fixum Vegetabile prorsus mite ut alunt, et crystallorum antequam aqua solveretur formâ indutum, nervi modo resecti extremitati largiter adhibitum nullos conciebat musculorum motus.

Musculis nudis admotum mox admodum contrahit, neque tamen contractionem musculorum propriam concitat. Semel vero iterumque gastrocnemiorum tendineae aponeurosi adhibitum fibrarum illam adnantium vividas quasdam contractiones ciebat. Hoc forsitan mechanice illi contractioni supra dictas fibras quasdam subito tendenti, et proinde stimulant, merito referendum est; quoniam nunquam alias motum concitavit. (c) Sal commune tam nervis quam musculis postea admotum effectu penitus parvit.

## EXPER. XXXIX.

(a) Solutione salis communis nervi cruralis resecti extremitati applicatâ, omnes tibie pedisque musculi plurime agitabantur. (b) Hac vero sublata, et Sacchari Saturni solutione appositâ, hi motus statim fere ex parte cessaverunt, atque haud ita pridem penitus conquieverunt. (c) Saccharo Saturni dein ablato, et solutione salis communis iterum appositâ, motus renovebantur; (d) Saccharo Saturni postea iterum compressi. Haec experimenta in eodem nervo eademque ejus parte vicissim saepius repetita, praesente juvene eximio, omni literarum genere instructissimo, *Johanne Taylor*, A. M. ex Collegio Aenei Nati Oxon, nostro amico spectatissimo, eisdem effectus nunquam non ediderunt.

## EXPER. XL.

Eadem experimenta quae cum Saccharo Saturni cum Cremore Tartari postea instituta, pariter cesserunt, nisi quod Cremor Tartari minus forte agat quam Saccharum Saturni.

## EXPER. XLI.

Solutio Galliarum nervo a sale communi paulo ante lacerato adhibita, musculorum motus quos ex irritatio concitaverat, primo adaugere videbatur, mox minuit, sustulit. Motus sale communi his terve renovari, gallis iterum

rum compositi sunt, donec tandem sal commune effecta jam penitus caruerit. Ea pars quam Gallae attigerint jam opaca fuit, et resecta motus perquam languidos excitavit.

(b) Eadem solutione Gallarum nervo modo resecto applicati, musculi nequaquam contrahebantur; sal quoque commune post aliquod tempus eidem nervi parti admotum nullos edidit effectus; inferiori applicatum motus musculares facillime concitavit.

(c) Gallae musculo nudo applicatae nullos eient motus.

(d) Aliquando postea sal commune eidem musculo admotum effecta caruit; alii vero musculo juxta sito adhibitum, motum facillime concitavit.



DISSERTATIO MEDICA, INAUGURALIS,  
DE  
FEBRE REMITTENTE PUTRIDA PALUDUM  
QUAE GRASSABATUR IN BENGALIA  
A. Dom. 1762:

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,  
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,  
GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.  
Academiae Edinburgensis Praefecti;

Nec non  
Amplicius SENATUS ACADEMICI Comitis,  
Et Honorabilis FACULTATIS MEDICAE Decretis;  
Pro GRADU DOCTORIS,  
IUMNIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE AC  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

REUDITORUM EXAMINI SUBJICIT  
JACOBUS LIND, BRITANNUS.

Prid. Id. Septemb. hora locoque Solita.

---

*Sed septem fugatis sedatis annulus abas  
Per tacitos Gangis, non pingui flumina Nilas,  
Cum refuit campis, et jam se credidit arvis. Virg.  
Aut exstinguunt, at vides ut volucribus fopere  
Per ortum prestat, aut ipse fuit cuncta  
De terra surgunt, ubi puerum humida nuba nectit,  
Interpellex pluviosus, et solibus ita. LOCKE.*

---

1766.

Perhonorifico Domino JACOBO COMITI DE LAUDERALE,  
Vicecomiti de Maitland, Domino de Thirlestane, &c. &c. &c. qui  
liberrimo genere, illustrior virtutibus, dignitatem et fortunam aequa  
moderatione sustinens, admirationum sine invidia comparavit; pro-  
pter innumera in se a primis eique annis collata beneficia:

Nec non

JACOBO PRINGLE DE LEE, Armigero; qui, dum vires spererant,  
artem patriae maxime illustrare feliciter excoluit, et in omnibus  
operibus publicis sese optimum civem praestitit; ingenioso, faceto,  
eleganti; cujus animi dotes, dum ab omnibus coluntur, amicorum  
amorem artius conciliant:

Patriis suis venerandis:

DISSERTATIONEM hanc Inauguralem, studiorum primicias,  
Grati sui animi testimonium,

B. D. C.

JACOBUS LIND.

DE FEBRE REMITTENTE PUTRIDA PALUDUM  
quae grassabatur in BENGALIA A.D. 1762.

PROLOGIUM.

**M**OS ille Academiae Edinburgensae nunquam satis laudandus, a singulis candidatis, ad summos in medicina honores maximaque privilegia aspirantibus, ut aliquid de arte medendi speciminis ergo proferant, semper exigentia; mos ille, inquam, sane laudabilis, nobis exiit causa dissertationem hancce, qualem qualem, in lucem emittendi.

Ut hoc desumpserim thema insuper impulsus sum, eo quod Bengalae anno 1762 degens, morbum hunc longe lateque facientem viderim, ac phaenomena in eo observaverim medicis nostratibus fere prorsus ignota.

Nec mihi potui temperare quin de ista febre tractarem, in memoriam revocans, quantae salutis multis, patriae rei-que publicae utilibus, fuerit Praefecti (a) navis clementia ac benignitas, nihil humani a se alienum putantis; cujus liberalitas, ingenium, ac doctrina, amorem perpetuum omnium qui norunt conciliabunt, facientque ut cuncti eorum habeant, quorum bona, fausta, felixque fors sit sub illius vivere auspiciis. Ejus auxilio ego, juvenis rudis, nec diu nec multum in re medica versatus, plus morbo isto laborantibus profeci, quam reliqui omnes qui ibi agebant, quibus tam beneficus defuit adjutor.

In hac dissertatione, satis habebimus res ipsas ac quasdam observationes practicas enarrare: Novimus enim melius, quid valeant humeri nostri, quid ferre recusent, quam ut occultas febrium causas penitus investigare niteremur. Has medicos bene doctos haud perspexisse, liquet ex hujus artis theoria priore seculo, quae nunc procul exulare jubetur. Si vero partem theoreticam prorsus respueremus, summum adhibimus periculum a scopo aberrandi. Praestaret autem aliquem, quam ducem habere nullum. Theoria igitur, si usui esse possit, ad sinuosos vitandos errores procul dubio adhibenda est; semper tamen memoria teneamus, defectus hujusce rei facilius indicari quam corrigi.

Multa in hoc opusculo satius duximus praetermittere, quam mera conjectura nil; ne, et ipsi decepti, lectores quoque deciperemus.

*Regio-*

(a) Dom. Joannis Smith, navis Drake dictae praefecti.

*Regionis, quatenus spectat ad morbum inducendum, descriptio.*

**I**NGENS ille terrae tractus ad caput sinus Bengaliae fluvio Gange intersecatur, qui in multas partes divisus, ac ex harum quibusdam in locis junctura amplas insulas efficiens, tandem in sinum eundem multis ossis effunditur. Totum regio campestris, arboribusque, praeiore gramine, quod ibi dicitur *jungall*, aut agris paludosis, oryzam colendo idoneis, obrita est: In ea quoque existunt complures crepidines, Ang. *creeks*, quae a fluminibus ad superiora regionis loca pertinent. Ripae fluminum ac crepidinum, quiescuntque nudae refluxu undae relinquuntur, sunt limosae, vaporemque assatim emittunt; aquae quoque, plurimis in locis salae, faciunt ut, iudice *Lancisio*, magis calamitosa haecce sint effluvia.

Cum statum caeli sit procellasus ac imbrifer, ab idibus Junii ad idus Septembris (b), regio plerumque aqua pluvia aut inundatione fluminum abducitur; praecipue sub tempore eluvionum; unde aquae, ad centum usque millia passuum a mari, salae redduntur, agrosque tanto sale marino implent, ut incolae, nimbis remotis, particulas salinas non sine terrae superficie abradentes, salem inde liaivient, cujus tanta est copia, quanta non modo sufficit degentibus illic, sed et multis aliis qui loca interiora tenent.

Haec etiam pars istius plagae, putridis mortuorum animalium membris, insectis, ac vegetabilibus cariosis, repletur. Omnes quoque incolarum sordes in flumen deferuntur; in quod ad tipas ejus nunquam non alvos exonerent, ac indies non modo seipso, quin et vestimenta sua, in eo abluant. In aquam fluentem propiciuntur et mor-

tui,

(b) Annus apud Bengaliā esse in tria tantum tempora dividitur, quorum unumquodque spatium quatuor mensum explet. Ab idibus Junii ad idus Octobris, immensum coelo venit agmen aquarum; ab idibus Octobris ad idus Februarii, existit jucunditas ac frigiditas anni tempus; a parte mensis Februarii ad idus Junii, facies coeli calida, ventosa, atque arida est: per quod tempus, nullus decedit imber, nisi cum tonitruo fulguribusque, quae Septentrionalium nominis veniunt; nam ab ea regione coeli manant; ac Bengaliae degenter magis minove vastitudine fruuntur, pro numero harum tempestatum: Regio autem praecipue sibilis est quando ruit aethere toto turbidus imber aqua.

Ab idibus Julii, (qui secundus mensis est, quo effusus decedit imber aquis), nulla ferme spirat aura, stagnat aer, ac per reliquum spatium mensium Augusti et Septembris atmosphaera suffocante aestu ac humore abducitur, qui foecundi sunt putrefactionis parentes; *Holwell on the manner of Inundation in the East Indies.*



tui(c), ubi hac illuc aliquamdiu innatantes, aquamque putrescine implerent, ni a crocodilis devorarentur, aut luto immergerentur, rursusque in litus propulsi, vulturibus, corvis, milvilsve (d) praeda essent; aut, quando aer siccis fervoribus est exultus, cum mortuis insectis, aliisque animalibus aut vegetabilibus, in aquis relictis putrescant.

Si maxima aquarum copia coelo deciderit, fluminaque super ripas, durante pluvio, effusa fuerint, plurimum materiae putridae in mare destruduntur; ac pauci admodum lectis affixi erant, quando demum ardore solis fontes et flumina arescebant. Si vero, e contrario, minus densi fusi fuerint ab aethere nimbi, necesse est ut plurimi agrotarent.

Quoniam lucus regionis istius magis minusve palustria erant, febris quam tractandam proponemus magis minusve vulgaris erat. De situ igitur locorum, in quibus nobis facultas fuit eam observandi, quam paucissimis absolvemus: Inciperemus autem a locis fluminis inferioribus; de superioribus postea dicturi.

Prima statio navium ad flumen Hugli, quae parva est Gangis in quam naves advehuntur nostrae, occurrit Cajori circiter 80 millia passuum infra Calcuttam. Hic stabant naves plus minus septingentas quinquaginta passus a littore occidentali; campum amoenissimum simul et aridum prospectantes, circiter mille passus porrectum in longitudinem, quingentas vero in latitudinem, ac sylvarum prorsus immunem. Crepida est ripis latis ac lotosis, sursum in hac regione vergens, quae ferme mille passus a statione navium abest. Hic sylvae minime sunt humidae. Vicus de Cajori ad superiorem planitieci partem situs est: Omnes socii navales qui hic erant optima fruebantur valetudine.

Proximus locus est Culpi, ad latus fluvii orientale 30 millia passuum supra Cajori: Littora ibi sunt paludosa ac arboribus vestita. Ex adverso stationi navium, extat crepida in qua mille ferme passus superius situs est vicus de Culpi; naves stant a littore circiter passus mille: Omnes nautae

(c) Hoc fit postquam pedes eorum qui interfere flammis adulti fuerint. Gangem enim per crepusculum sepulchro habent, nec non per Numine, a quo post obitum excipiuntur; dum in vivis sunt, illum, sublati in coelum manibus, venerantur, super lotum ejus aspergunt.

(d) Haec utilissima animalia, quibus regio abundat, littora locaque palustria haud parum putrida materia liberant; religio populi, ac ulus eorum interviunt, illa tota omnique molestiae expertia praestant, adeo ut omnino mansueta sint. Corvi porro apprime utiles sunt, in multis insectis necandis, praesertim formicis albis, volare incipientibus.



mutae qui hic erant usi sunt nulla valetudine. Locus sepulturae destinatus, haud parvum momentum attulit ad tabem diffundendam; cum enim solum palustre esset, putrida ex veteribus in nova sepulchra emanabat materia; unde non modo tumulorum sollores, sed et qui funera celebrabant, afficiebantur; multique, dum supremis erga dilectissimos sociosungerentur officiis, correpti sunt aegritudine. Hic locus (Culpi) semper infamis fuit coeli intemperie; moris enim erat, quosdam ex mercaturae in India Orientali faciendae societate illuc demittere, qui navium onera excipienda ac Calcuttam mittenda curarent: Cum vero tot ex his morbo absumpti essent, munus hocce, utique necessarium, intermittere coacti sunt.

Proximus ordine venit Calcutta, sedes Anglorum apud Bengalam praecipua. Hoc spatiosum est oppidum, cultoribusque frequens. Anglorum domus sunt amplissimae ac magnificentissimae, pleraeque juxta *esplanade* ante veterem arcem posita. Hujus media pars liquida irrigatur aqua; reliquae domus ad indigenas pertinent, pleraeque vix tuguriis meliores; complures etiam incolae tentoria, floreis intecta, in plateis pro aedificiis habent. Quam oppidum ad Caurum vergit, existit fluvius, ex adversa cujus ripa agros bene cultus multasque arbores videre est. Paulo inferius fere mille passus, ad angulum urbis qui ad Notozephyram spectat, nova sunt munimenta in quibus constituunt urbem in usum Anglorum exaedificare. Regio quaquaversum amoenissima est, villisque plena, quas tenent huc ex Anglia advenae. Japygem versus, ab oppido durtum millium passuum intervallo, conspicitur lacus nomine Magnus, qui longe lateque patet, aliisque Gangis partibus intermiscetur. Per plurimum milliariorum spatium, mora palus est, arundinibus ac volucribus aquaticis repleta. Febris quae infestatur Calcutta, ad lacum istum praecipue transferenda est. Ad angulum urbis septentrionalem, nimis ager est humidus, et oryzae colendae idoneus; nihilo tamen Lacu illo Magno salubrior.

Ex hoc situ Calcuttae discimus, eam parum esse salubrem; eamque regionis partem multo magis paludibus ac malo Jove urgeri, quam Chandernagor aut Chinshura, quorum altera Gallorum, altera Batavorum sedes est. Haec modo memorata loca superius triginta fere milia passuum posita sunt, ac fluvii altitudinem longe exsuperant.

Prope Chandernagor habuimus milites castris positos; erant illis pro tentoriis *hungelets*, i. e. tuguria ex floreis fabricata, et arundinibus intecta: Solum quod haecce occu-

occupant saguria, agrie circumvicinae jacentibus fuit editum. In hoc locum vix ulli tenebatur morbo; ad Calcuttam vero, plurimi ex praedictis, multa quoque indiguarum millia, supremum vitae spiritum reddiderunt.

### HISTORIA MORBI.

**SYMPTOMATA** et cursus morbi ita sese habebant: Imperis plerumque subitaneus est, et incipit sensu delirantis, ac ingenti spirituum prostratione; accedunt frigiditas modo major, modo minor, vertigo, nausea, capitis et lumborum acerrimi dolores, manuumque tremores; vultus est pallidus, cutis vulgo arida et contracta, oculi languidi ac graves, celer at exilis pulsus, anhelitus plerumque difficilis et singultibus interceptus.

Progrediente paroxysmo, algorem caloribus vagis intermiscuntur: Hic calor brevi lapsus violentus permanet, augetur nausea, et in quibusdam vomitus supervenit, unde magna copia bilis rejaetur; nec raro per alvum bilis quoque deficiebatur; robescit cutis, tumidi oculi, et interdum haud parum inflammati sunt: Pulsus evadit plenior, et anhelitus difficilior, cum magna inquietudine, et siti importuna; attamen, propter nauseam, potiones aeger facillime amittit; lingua fit sordida; ac dolores capitis et lumborum ingravescent, delirium supervenit; lenis in facie apparet mador, qui sensim deorsum diffusus, decresciente symptomatum violentia, remissionem instare demonstrat, eaque profusa sudoribus perficitur.

Remittente febre, pulsus fere ad naturalem conditionem redit; manent tamen capitis atque lumborum dolores, sicut leviores, ut et sapor oris ingratus, ac prostratus appetitus.

Ingravescente morbo, remissionem vix notabilem mox sequebatur alius paroxysmus, qui sane haud ita magno tremore incipit; majore tamen capitis dolore, summa lassitudine, cardialgia, nausea, vomitu, bilisque defectionibus; vomitus et defectiones tamen plerumque albi coloris erant calce aqua commistae, vel lactis illius quod lactentes evomunt adhiat, quando materia coagulata plurimum contrita est. Fervor, immodica sitis, ac deliria evadunt. Lingua evadit squalidior, ac, una cum dentibus et interiori labiorum parte, nigra crassa obzgitur; spiritus calet foetetque; inchoatur de novo remissio cum sudore; ea tamen spatio temporis est brevior, nec aeque ac prior conspicua.

Alteram hanc remissionem sequitur paroxysmus, in quo symptomata prioribus longe erant violentiora; vomitus

æ dejectiones magis faciebant; lingua, dentes, ac labiorum interiora, non modo ultra intescebantur crusta, verum lingua adeo avellim rigebatque, ut voces parum distincte efferrentur: deliria gravis, inquietudo, et molestia, durante pyrexia, maxime fiebant; nec prius tollebantur, quam supervenerint rursus ac sudores.

Si febris ita invaluerit in tertio paroxysmo ut mori sequatur, quod sæpius oblit, nonnulli aegri comatosi evaserunt; in aliis delirium est vehementius. Sacris foetida, ac haud secus quam cadaver olens; exagitationes sunt involuntariæ; pulsus celer, exiguus, et irregularis, adeo ut rix deprehendere aut sentire quomodo gelidus toto manus corpore fuit, præcipue circa caput et collum; facies fit Hippocratica, et convulsa; aegri stragula carpuæ, et soccos legunt; subit tendinum subsultus; in tergo solum recumbunt; sensim ad imam lecti partem dilabuntur; extremitates evadunt frigidae ac lividae; deus corripimus convulsionibus, quæ tragœdiam claudunt.

Urina in primo imperio pallida ac coloratione paulatim fiebat, sine ulla subsidentia.

Petechiæ rari aut nunquam occurrebant; et sudamina (prickly heat) quæ antea in cute fuerat, statim atque febris apparuit, evanescerebat.

Hæc erat communis symptomatum forma: Interdum tamen aliis in aliis aegris fuerunt phaenomena, diversis ejusdem anni temporibus, e. g. Pulsus in quibusdam initio erat celer, in aliis pro symptomatibus varius. Cutis plerumque paroxysmi principio arida; in quibusdam humida, ac sudore obducta erat ab ipsis morbi primordiis.

Mense Septembri, quando vel maxime grassabatur morbus, remissiones valde fere imperfectæ et obscuræ: Ingressu autem hieme, ac tempore anni salubriori redeunte, remissiones erant magis constantes, et morbus ad naturam febrium intermittentium quam proxime accedebat, donec tandem nihil erat quo ab his differeret: In nonnullis viis remissiones percipere, febriisque per duas septimanas duravit, nec sanatis nec mortuis aegrotis, ex qua plurimi aegrotabant tempestate. Cum morbus in uno eodemque tempore perillabatur, morie plerumque fiebat: Mitescere autem coelo, interdum paucorum dierum spatio ex continua ordinata fiebat intermittens; ac seger, ni jecur affectum esset, quod haud raro accidit, convalescebat. Hepatitidis curatio fuit incerta, nec sine longi temporis dispendio perficienda; nam diarrhoea colliquativa plerumque superveniens aegrum sanare iniecit acerbo.

Paroxysmus



Paroxysmus quisque subsequens praecedente erat periculosior; tertius saepius fuit funestus; nonnulli etiam in primo interiere; tum vernacula sermone *febris pucca*, i. e. vehemens, nuncupabatur (c).

## CAUSAE PRAEDISPONENTES.

Qui rei nauticae apud Europaeos operam navant, cum Bengalam tempore autumnali delati fuerint, huic febris valde sunt obnoxii. Huic morbo quasi praedisponuntur ex victu; vel eo quod conclusi sint; vel quod plurimum caloris inter navigandum perpessi fuerint; aut quod saepius per plures horas continuas frigore nocturno sunt obiecti. De hisce omnibus sigillatim et ex ordine; ac primo de victu disseremus.

Pleraque sociorum navallium cibaria falsa ac saepe putrida sunt. Vegetabiles recentes habent omnino nullas, sed tantum panes bis coctos, ac farinacea quaedam non fermentata; liquores vinosi vel spirituosi tam exiguis his tribuantur portionibus, ut putredinem istam cibi animalis qua utuntur minime valeant emendare. Illorum igitur fluida magis magisque in putredinem sunt propensa, et ad humorem praedisponentem morbum.

Diu coarctatis, et in aere parum salubri versantibus, praesertim si naves adversa tempestatibus in alto fuerint jactati adeo ut spiracula tormentorum ac foros claudere oporteret, humorum putrefactio vel maxime inducitur, morisque hujus fundamenta jaciuntur.

Calores quos dum petunt Indiam perferunt, etsi minus quam in ipsa India flagrantes, nimii tamen sunt cuilibet in Europa nato. In alto, calores plerumque inter Tropicos in thermometro Farenheitiano sunt 84°, qui quidem illos relaxant, nec non et humorum corruptionem promouent, praesertim quando cum superioribus causis coincidunt, ac languorem et inertiam creant, quae quoque faciunt ut augeatur putredo.

Causa huic iogens accedit incrementum, si viri saepius ac diutius nimbis, aëris humiditati aut frigori, inter munera noctu praestanda, expositi fuerint: Ita vero saepissime cum illis agitur, quando navem superiora versus luminis agunt; unde cubilinetur perspiratur, fluidaque recrementitia, per cutem emitti lucta, in corpore retinentur; longe ad putridam hancce febrem vel maxime augefcit praedispositio.

(c) Prof. Alpin. de morbis Aegypt. lib. i. cap. 24.



## CAPITULUM OCCASIONALES.

Ex causis hujus morbi remotis, efficacissima sunt paludum putrida animalium materia, referturque effluvia (f); ex quo autem genere animalis corruptionis hoc virus oritur, parum comperimus; laqueet enim, immo genus putrefactionis hoc effectus non producit, ex illis qui rei anatomicae operam dant, aut his qui per artes suas putridis animalium effluviis obsecuntur; quales sunt, sarii, aut laniones qui lanienas immundas habent; seu toricarii, qui putridis morbis non magis quam reliqui mortaliū sunt proclives. Nec ciborum caratores, qui navis commectus ministrant, quique sere semper inter putrida ac rancida loquorum effluvia in quibus commectus asservantur degunt, febribus putridis magis quam loci sui sunt obnoxii.

Sed utcumque haec se habent, quandam fermentationem putridam noxios vapores praebere, qui humidis paludum vaporibus conjuncti perniciosiores redduntur, conpertum habemus ex testimonio *Pringlei*, et aliorum qui de medicina practica scripserunt. Huc igitur causae tribuimus repentina illa ac violenta mala quibus premebatur illi quae negotium datum erat mortuus apud Culpin inhumandi. Ex magnis Nilis Gangisque inundationibus tempus anni sit salubrius; eo quod putridae animalium ac vegetabilium res in mare devehantur: Ex hoc igitur satis constat, quantum putredo spectet ad effluvia paludum perniciosiora reddenda.

Namque vapores qui paludibus emanant haud longe patent (g); nam perbrepe naves a littore haud multum remotas a labe prorsus immunes vidimus: Licet haec palustria miasmata morbum primo invehant; is tamen contagione diffusus magis sit epidemicus (h). Ita navis illa quae nomine Drake venebat, nullo adhuc commercio cum infectis navibus habito, per duas hebdomadas a morbo immunis fuit; statim vero atque malum invehebatur paucis diebus multi correpti erant, ita ut pestifera ejus natura nobis satis fuerit spectata.

Inde evenisse auguror, ut morbus iste crebrius esset inter navium praefectos, ut et inter eos qui militibus ad Calcuttam praerant, eo quod ex officio oporteret illos saepissime inter suos versari. Si enim contagio non fuisset, illi valetudinem sedulo curantes, nec multum praedisponentibus aut excitantibus causis expositi, multo saniores fuissent quam re vera erant.

Inge.

(f) *Pringle's Observations*, part III. chap. 4. § 2.(g) *Lancet*, de mor. putrid. effluv. lib. II. epid. 1. cap. 3.(h) *Cirrhorn's obiter*. chap. II. p. 111.

Ingeniosus *Jacobus Bodnoch*, M. D. in Nottinghamia nave Indica chirurgus, in dissertatione sua MS. de febre qua socii navales ad insulam Johannam correpti erant (i), febrem hancce minime judicat esse contagiosam: "Nulli enim," inquit, "ea corripiebantur, nisi qui in terram egressi ibi dormiebant, quos, cum febris pergrasset, peritus evanuit." Idem accidisse memorat in nave Ponsborne, in febre biliosa qua correpti sunt apud insulam Mohilam (h). Etsi illi labem contagionis omnino nullam animadvertunt, ita tamen interdum rem se habere nullus dubium; nobis saltem satis constabat, nostram fuisse contagiosam. In medio tamen nos hanc rem relinquimus, minus dubitantes, quin certiorum ejus descriptionem in apertum aeris prolatura sit.

Notatu tamen dignum est, posse nos venena tanta copia sumere, quanta, si his prius assuefacti fuerimus, de medio statim nos tollerent; eodem prorsus modo, si perpetuo in regione paludosa miasmatis repleta vivatur, illorum miasmatis minus sumus obnoxii: Hinc qui ex Europa naviter advenierunt, citius in morbum inciderunt quam milites ad Calcuttam praesidarii qui aliquandiu ibi manserant.

Fervor febrem hancce vel maxime excitat; unde multi ex tenentur qui Solis flagrantis exponuntur ardoribus.

Algor proximum locum a miasmatis paludosa obtinet, tanquam causa efficacissime excitans; ac plerique censent, hunc solum, modo corpus praedisponatur, valere morbum efficere, ei omnino qui paludum miasmatis pignus simillimum. Agit forsitan debilitarem inducendo, ac perspirationem tuercendo; unde putrilae materiae miasmata, aliter a cute ejicienda, in corpore remanent; atque hinc oritur febris.

Inter causas occasionales ac praedisponentes hujus febris numerandus est et somnus: Per somnum enim tota relaxatur fabrica; unde facilius afficitur miasmatis noxiis quam cum quis sit experrectus, aut rem aliquam studiosè prosequatur. Si somnus extra navem in locis palustribus capiat, licet nulla alia intercedat causa, haud raro naves multis operariis privantur; quod quibuscumque supra memoratis accidit, scilicet Nottinghamiae navique Ponsborne dictae, et Britanniae: Plerique enim vectores qui ad Johannam dormiebant febre quam inter egrediendum contraxerant interire. Haec occasionalis causa adeo certa ac potens est,

(i) Lecta soc. philof. Edizenf. Julii 7mo 1763.

(h) Johanna et Mohila duae sunt ex Commoro-insulis inter angulum de Madagascari septentrionalem et oram Mozambique.

est, ut praefecti navium qui aliquos suorum, nisi ultima urgente necessitate, navibus egredi dormiendi gratia sinunt, magnopere sint culpandi. Est etiam quod aegri praesertim singulis noctibus navibus imponuntur; quippe maribus debilitati longe facilius incommotis afficiantur si inter humidos nocturnos vapores somno indulgant.

Affectus enervantes, quales sunt moeror, metus, atque horror, causae excitantes hujus morbi existunt; eo quod perspirationem subducant, ac debilitatem afferant.

Exstat et alia excitans causa, viz. crapula; nimia enim ingurgitatione carnis bubulae in stabulis saginatae quae in cibum recepta est, antequam palatres febres cessant, sit bene notum est, plurimum apud Bengalam febrem istam sibi ipsis peperisse.

Vis solis ac Lunae ad Bengalam mirabiliter ad recidivam hunc morbum perpellos proclives efficit; unde hanc inter causas excitantes morbi annumerare possumus; est enim ita insignis, ut aegrotus, qui octo aut decem diebus convalescit, in summum recidivae adductus fuerit periculum, antequam lucidum coeli decus plenum orbem impleat, aut sub interfunium, ni cortex Peruvianus inhibendi causa detur. Documenta tam multa sunt, ac res ipsa ita cunctis Bengalae degentibus innotescit, ut modo dixisse sufficiat (V).

#### Quos-

(I) Decimo sexto kalendas Novembris, anno 1764, tempore pomeridiano, Solem haud parum lumine defectum vidimus; ac cum vix sub terra potui facie, ex nimia aestu laborabamus, non inter maximam obscuritatem res multum algebat. Tunc temporis, remittens solis quae tenebatur *D. Musgrave* a praefecto in consilio testis subente solis defectu, exortebatur est; eodem vero transiit, evanuit, iterum vero qui tum nulla sub cura erat non admodum asseriebatur.

Subites ac violentos Lunae effectus tum praecipue observavimus 4<sup>ta</sup> Nunas Novembris, hora circiter secunda matutina, quo tempore terra interposita radios interrupit fulares; in eo tempore articulo haud pauciores oculo nautarum ex Nave-Deake, qui ad Calcuttam ex arlibus praefecti navis ex febrili convalescebant, eodem fere tempore periclo, vehementissimo paroxysmo sunt correpti; et idem plurimum evenit qui in nave fuere collegae nostri curae demandati.

Quicunque hanc rem ad primum medicam adhibere velit, studium omne suum conferre debet in hunc observandum quare in hac regione & Luna perficiantur. Hujus mutus, et aestuum ex his pendendum theoriam, ideo generalis ex scriptis *D. Jacobi Fergusson*, h. S. S. optime parari potest. Hinc igitur perspecto, arti medicum adhiberi facile cognoscere possent, quo potillimum tempore vis lunaris maxima sit, et qua praecipue tempestate effectus ejus praecavendi sint. Nos quidem nauticam illam ephemerida commendamus, publici juris & Reverendo *D. Maskelyne* factam in usum eorum qui in patenti occhio longitudinem explorare velint, quaeque motus omnia lunares exacte



Quosdam ipse vidi, qui non nisi sub ipso plenilunio et interlunio paroxysmum, et tum unicum tantum, habuerunt; qui tamen facili negotio arceri possunt, si cortex Peruv. paucos dies ante expectatum accessum tempus exhibitor, ac usque quo illud sit elapsum continuatus fuerit, in hujusmodi casu febrecitanti puero cuidam Mauro ipse ferantur perfrigebam manus, morbum usque ad quatuor paroxysmos quovis plenilunio et interlunio tuto redeuntes permisi, ut prius rem ipsam exploratam haberem, quam surticem coarctantem admovebam.

#### DIAGNOSIS.

Si magna debilitas quam subsequuntur horrores, capitis ac lumborum dolores, pulsus exilis asclerque, vomitus et purgatio bilis, pyrexia quae effuso sudore sublevatur; si haec in paludosa regione eveniant, qua vis caloris intensi vix tolerabilis est, dumve frigora Zephyris mitescunt, aut statim post acclivior calores, praecipue circa tempus autumnum; haud veremur asserere aegrum palustri febre teneri.

Quod ad hanc febrem attinet, si tanquam speciem consuleremus, satis constat, ex remissionibus quae sere semper occurrunt, atque eo quod saepius regularis intermittens typum induat, ad hanc classem illam esse referendam; aut si aliquid intersit discriminis, inter eas esse annumerandum quas scriptores practici remittentes appellaverunt. Nihil autem opus est, ut has ab intermittentibus secerneamus; facile enim distinguuntur ab his febribus quibus inflammatoria jungitur diathesis, quarumque remissiones vix participas; adeoque genus continuarum efformant. Si rem altius reputare oportet, ac febres istas ad aliquod genus intermittens potissimum referre, ipse quidem libentissime eas ad tertianas retulerim, eo quod in hac forma plerumque appareant; quando remittunt aut brevioribus recurrunt intervallis, eodem prorsus modo sese habent ac tertianae duplices, aut aliae febres quae naturam tertianarum planissime indicant.

Febris palustis haud difficile distinguitur a febribus malignis et pestilentibus; eo quod ab effluviis paludosis originem trahat, quodque vomitus ac purgatio bilis eam vulgo

persequitur. Intra Tropiciis laminae coelestia saepe verticalia sunt, ac proinde majores vi agunt quam in regionibus altiorum ut vocant latitudinum; laterrissimum autem *Mead* exempla collegit virum solis et Lunae sub caelo Britannici; et in India Orientali et Occidentali, ut in quavis alia intra Tropica regione, multo plura et instabiliora facile colligi possunt.



vulgo comitentur, ut et ex intermissionibus ac remissionibus.

Discrepat a synocha, quod illa a causa evidenti oritur, hæc non item, saltem rarius; quod in illa abunde diathesis phlogistica, quæ in hac magis manifesta typum febriæ continentis exhibet; quod hæc denique sit morbus regionum et tempestatum frigidarum.

A febre ista distinguenda est quam comitantur phlegmasiæ simplices quibusdam symptomatibus huius morbi propriis, quales sunt remissiones, &c. quæ vix unquam occurrunt quando phlegmasia sola æger urgetur.

#### METHODUS MEDENDI.

Ut sanitatem illis qui hac febre laborant restituamus, sequentia observanda veniunt:

1mo, Nimiam febris violentiam oportet mitigemus.

2do, Humores putridi sunt evocandi, ac ne corpus nimium ad putredinem vergat sedulo cavendum.

3tio, Aegrotantium vires, durante morbo, quam maxime sunt sustinendæ.

4to, Postremo, Paroxysmorum reditus quamprimum sunt prohibendi.

Ad febris vim leniendam, curandum est, ut omnes causæ quæ morbum irritare aut stimulare possint, quales sunt ingens calor, lux nimis oculis affusa, clamor, motusque, summa ope evitentur.

Si, dum adest paroxysmus, caput et lumbi vehementer dolent, si pulsus sit plenus ac durus, calor intensus, venæ sectio, at summa cum cautela, admittenda est. Huius summa ejus utilitas in locis frigidioribus a *Pringle* et *Paisot* abunde demonstratur: ac licet *Cleghornius* in regionibus etiam calidioribus eandem usui esse posse ostenderit, ausim tamen affirmare, tum ex propria experientia, cum ex animadversionibus *D. Badenoch* in dissertatione sua de febre apud *Johannam*, successum remedii hujus haud dilucide patere, ac potius ægrum sæpe inde in maximum periculum adductum fuisse. *D. Badenoch*, et chirurgus in nave *Ponborne*, uterque duorum aegrotantium sub illorum cura, morbum misso sanguine levare tentabant; unusquisque vero unum morte perdidit, alterum uterque servavit.

Nos quoque duorum venas incidimus, viz. *D. Richardson* a præfecto navis primi, cui capitis dolor acerrimus erat, plenus et durus pulsus, et sanguinis circiter quatuor aut quinque uncias detraximus; quo facto, non parum sub-

sublevatus est, neque inde retardata fuit medela, et postea quidem febris minus inordinata erat. In altero venae sectionem adhibuimus, eo potissimum tempore quando vel maxime gravabatur et vehemens erat morbus. Vir ille sanguinis emissionem tantopere flagitabat, ut reliquos omnes easdem cupiditate ascenderet, fidemque faceret nos, unicum illud subsidium negando, cunctos ad imos manes demissuros; nos ergo, ut animos eorum sedaremus, nec amplius sollicitaremur, his morem gessimus, ac sanguinis circiter quinque aut sex uncias sollicito illi viro in intermissione detraximus: prosternebantur statim vires ejus, ac intra horae spatium, cum testamentum fecisset, proximo paroxysmo morte praereptus est.

Quidam artem medendi penitus callens censer, si viri modo memorati vena secta fuerit in pyrexia, ac non inter remissionem, feliciter sortalia ejus eventum futurum fuisse (m).

Acri in ventriculo bili haecce febris excitatur; si aegrotus in vomitionem pronus sit, calida aqua, ut facilius fiat, est praehenda (n).

Liquores acidi, refrigerare aegros inservientes, acrem in stomacho bilem et intestinis diluunt, sitim sedant, caloremque minuunt; ac preinde, quo minus febris plus satis faciat, inhibent, putridos quoque emendant humores: Ex omnibus maxime idonei sunt qui cum farinacea materia admisceantur; tales enim facilius cum fluidis nostris coalescunt; hinc etiam aeris in primis viis obtegatur materia, ac nutritur aeger ex liquoribus acidis et fructuum acidorum succis; tum acida dissilia, ac crystalli tartari, pro varia aegri conditione, usui esse possunt.

Quantam salutem in hac febre, ut in plerisque aliis, modo dictum medicamen, crystalli, scilicet tartari, asserere possit, primum ego dilici ex solertissimo amico meo D. Gul. Fordyce, in terra pedestrium satellitum cohorte chirurgus. En ille inter milites illius cohortis non sine fructu maximus utitur. In febribus enim putridis, non solum putridos corrigit humores, puta solito commissum, verum etiam, si cum rhamnalis et manna exhibeatur, antisepticum praebet purgamen, putridam bilem ejiciens; et cum illius, tum Italorum medicorum (o), et Doctoris Menchy successus, hujus medicamenti abunde demonstrant utilita-

Vol. III.

R

tem;

(m) Clegg's Observ. p. 183. Pringle's Observ. part III. chap. 8.

(n) Clegg's Observ. p. 184.

(o) De hoc certior factus sum a Doctore Gerardi, haud ita pridem Bot. Professore Romae.

tem; et si vires ejus antisepticae tante fortasse non sunt ac limoniorum succus et acidorum foetilius (p); ingens tamen ejus utilitas experimentis satis patet: Cumque tam facile asservetur et administretur, summae esse curae debet omnibus qui in claustris aut exercitiis aegrotis prodesse volunt, ut semper praesto sit; cum quavis multis simul aegris prospicere debeat, ejus maxime interest medicamentis facile parabilis ad manus habere.

Salus nervi ex succo limoniorum parati in ardore febris adhibentur. His minuitur nausea, rite efformantur paroxysmi, pleniorque sit remissio; praecipue grati sunt si in statu effervescenti propinentur (q): In eundem finem alkali fixum cum triplici crystallorum tartari quantitate ac sacchari exigua portione conterere, ac in pulverem subtilem redigere possumus (r); et si hujus drachmae pars dimidia in cyathum aquae inficiatur, perfacile conficitur et exhibetur mistura neutra et effervescent; mistionum hujusmodi effervescentium vis antiseptica experimentis D. *Macheide* liquidò apparet (s): Nitrum plerisque ingratum inveni; atque ideo haustibus tantum salinis usus sum; nondum enim pulveres illi salini *Lindii* mihi innotescerant.

Humores putridi, tum supra cum infra, praesertim inter primam remissionem, expurgandi sunt. Utrum vero hoc perficiendum sit vomitu et purgatione alvi simul, an hac sola, sub judice lis est: Videtur hoc praecipue niti praesentia aut absentia inflammationum in visceribus abdominis. Si nulla inflammationis appareant signa, vomitus sat feliciter cieri potest. Dentur ergo quinque seu sex grana ipecacuanhae, cum uno aut altero grano tartari emetici. *Joanni Pringle*, Eques Baronettus, necessitatem tartari emetici addendi ostendit; quippe sine eo diuturniores ac vehementiores existunt paroxysmi (t). *Huck*, M.D. exiguas ipecacuanhae ac tartari emetici doses exhibet, ita ut vomitus non statim excitetur; eas autem propriis intervalis repetit, nec prius ullum aegris potum concedit, quam aliquot doses exhibitae fuerint, ut, scilicet, interkina ingrediuntur, atque adeo simul et semel bilem alvi dejectionibus ut et vomitu ejiciant. Tartarus emeticus non solum putridos ejicit humores, verum etiam virtute quadam praesentia (u) est qua tollitur febris; si doses enim usque ad nauseam adhi-

(p) *Macheide's essays*, p. 210. (q) *Town*, p. 26, 27, &c.

(r) De *Lind*, formula medicamenti, facil. parat. quantitas tantum crystalli tartari ad penam saturandum augetur; adjicitur sacchari aliquantulum, ut gratius sit.

(s) *Macheide's essays*, p. 225.

(t) *Pringle's Observations*, part iii. chap. 4.



adhibeantur, non modo faciliora reddunt symptomata, sed saepissime morbum prorsus summovent.

Si in quibusdam abdominis visceribus topicae inflammationis existant symptomata, quae non accidunt nisi morbus inveteraverit, vomitus evitandus est; ac necessaria bilis evacuationis purgationibus alvi solis perficienda est, quae in curatione hujus morbi semper utiles sunt.

Cuncta acris ac fortia purgantia cane pejus et aegre sunt fugienda; ac mitia et antiseptica adhibenda, qualia sunt crystalli tartari, aut tamarindi manna seu sale cathartico Glauberi commixti (t).

Humores turgescerentes, atque erumpere annitentes, secundum Hippocratem (u), purgationem indicant. Eadem quoque indicatur ab ingratis ac amaro oris sapore, nidorosis foetidisque eructationibus, alvo suppressa, tumido abdomine, borborygmis, torminibus, &c. (x).

Purgantia omni tempore remissionis vel paroxysmi dari possunt, nisi quando aeger frigore et horrore premitur; crystalli tartari, tamarindis, ac manna, potui ordinario commixta, potiones gratas praebent; his uti possumus quoties purgatione opus est.

Ad vires aegri sustinendas, sedulam navare operam debet medicus; quippe non minus inde oritur utilitatis, quam ex ipsa medicamentis: Longe pauciores ad Bengaliam morte praerepti sunt in nave illa Indica quae Drake nominabatur, quam in reliquis omnibus quorum singulae non minorem aegrotantium numerum continebant. Dehebatur hoc humanitati praefecti navis D. Joannis Smith, qui omnia necessaria nobis praebenda ac aegros rite tractandos curavit: In illorum ulum, loca navis salubriora assignavit, ac aedibus ejus in oppido, quasi hospitio quo convalescerent aegrotantes, utebamur, ubi nil illis idoneum desiderabatur; victus ilico curam agentes, vires sustinuimus, quae secus magis magisque inter morbum deficerent; et in hunc finem aegroti exiguis panadae portionibus, ex oryza ac hordeo coctis, cum avis Cocinthiacis, seu passis, ac prunis vesciebantur, quae omnia saccharo et vini aliquantulo, praefertim vini rubri (vulgo claret dicti) condita fuerunt. Tempore paroxysmi ex farina et oryza confectis pulmentis, acidorum fructuum succo ac saccharo conditis, sustinebantur aegri: Sitis etiam inde sedabatur; et, subeunte remissione, vini aliquid hisce potionibus admixtum est.

R 2

Indusa,

(t) Huxam on fevers, p. 112.

(u) Aphor. li. 5. 1. et lib. de humocibus.

(x) Huxam on fevers, p. 112.



Indussa, Iodices, ac stragula, saepius sunt mutanda, ne aëri exponenda; soeces fordesque quamprimum removenda; oportet etiam ut loca quibus aegri decumbunt sint salubria, et aëre conspersa; denique ut aegris cura quanta maxima prospiciatur. Compertum ego habeo, medicum haec sedulo observantem, quique ea exequi potest, multo magis aegris profuturum, quam medicum peritorem hisce commodis destitutum.

Vebeciora nunquam admovenda sunt nisi febris diutius duraverit, aut spiritus pulsusque aegrorum defecerint. Pessima quaeque ex praematturo eorum usu sequi demonstravit *Huxham*, artis suae peritia ac solertia nulli secundus.

Ex cortice Peruviano solo assulget ipsa morbum coercendi viresque aegro restituendi; quo autem citius coercetur, eo melius: Inde enim non solum aegrotum periculo mortis eripimus, in quod unquamque paroxysmo adducitur, verum etiam obstructions istas fugimus quae in visceribus abdominis accidunt, quaeque ex diuturnitate morbi, non ex cortice in curatione adhibito, proveniunt: Ipse quidem semper tempore secundae remissionis corticem administravi, inter priorem ut primae viae emundarentur unice sollicitus.

Ni ante siniantur necessaria purgamina, quam adhibeatur cortex, labor omnis irritus perit: Nunquam fallit hoc remedium nisi inhibeamur, praesertim vomitu vel diarrhoea supervenientibus, quo minus id ante reditum paroxysmi satis larga copia ingeramus. Ne vomitus aut purgatio alvi cortice excitentur, paucae guttae liquidi laudani unicuique dosi commiscendae sunt. Quantitas dari soleta erat drachma in cyathis aquae (j), singulis horis, incipiendo quamprimum vis febris lenta erat, ac pulsus ad naturalem modum quodammodo accedebat, quae plerumque accidunt ante sudores penitus paratos. Unciae corticis non semper ad febrem cohibendam sufficiens: unciae vera cum semisse certissima erat efficacia. Quotidianus usus corticis in exiguis portionibus continuandus est, usque quo aeger vires recuperet; ac postea major ejus quantitas praebenda est, praecipue sub tempus eluvionum; ea enim tempestate, recidiva maxime extimescenda est, quae plerumque vi solari ac lunari efficitur.

Est cortex in febribus regionum frigidarum nimis cito  
datus

(j) Hanc corticis Peruviani exhibendi methodus gratissima in tenui supulata, aut generosiore cerevisia aqua commissa, peragenda est. Hoc genere potus horatus (apud omnes tollitur; hinc quod ad rhubarbarum effugere docet doctissimus obstetrici Professor.

datus adeo febrem non cohibet, sed etiam aegrum in summum periculum adducit, hoc fit quod his febribus conjuncta sit diathesis inflammatoria: Citius autem vim corticis respuentibus eam ingerere in febribus regionum calidarum licet; quippe hic adest diathesis putrida illi inflammatoriae opposita vim antisepticam corticis prorsus exarscens; et tuto simul ac utilissime adhibuitum fuisse, usus et experientia plurima jam docuit. Hoc etiam magis *D. Badenoch* haud ita pridem confirmavit; qui comperit posse se, sine periculo, quovis tempore morbi, vel etiam in paroxysmo, corticem admove, in putrida ista febre in quam impliciti erant ad Johannam in Nottinghamia nave Indica simul vecti. Corticem, accipiti eo statu, exhibere impulsus est; eo quod remissiones parum distinctae appa-  
 rent, quodque morbus esset maxime funestus; adeo vere prospere cessere illius conamina, ut postea ne unum quidem aegrum amitteret.

Quo genere ciborum statim a febre utantur, nobis vel maxime est curandum; nulla enim ex re alia magis imminet recidivae periculum quam ex cibi animalis praemature usu.

Junioribus medicis, qui in hoc morbo prodesse volunt, sequentia nostratum opera lubentissime commendamus, viz. *Cleghornii* Observationes de morbis Minorcae grassantibus, cujus praxis non solum in hac plaga, sed et ad Bengalam, longe optimam fuisse deprehendebatur. Perlegere etiam debent opera *Joannis Pringelii* Equitis Baronetti, Observationes scilicet ejus de Morbis Castrorum accuratissimae; ac demique legant utilissima illa scripta dignissimi amici ac cognati nostri *Jacobi Lind* apud *Hasslar*, M. D. tractatum ejus, sciz. de Nautarum Sanitate Conservanda, ac de Contagione; nuperum quoque ejusdem opus de Europaeorum morbis in calidis regionibus degentium, quod de-  
 leo non nisi post hanc dissertationem absolutam in nostras incidisse manus.

Jam tempus est ut huic dissertationi finem imponam: Nec tamen possum, quin prius nos quamplurimum hujus Academiae Professoribus debere agnoscam, et pro officiis quibus omnes qui sub illorum auspiciis studis incumbunt nunquam non summa cum comitate et benevolentia prosequuntur, quam maximas rependam gratias. Cuncta itaque felicia atque fausta illis omnibusque litterarum fautoribus cedant, corde atque animo exoptamus.

COMMENTARIUS  
DE FEBRIBUS ARCENDIS DISCUTIENDISQUE:

QUEM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AULICIS REVERENDI ADMONUIT VLG,

GULIELMI ROBERTSON, & S. T. P.

Apud eundem Edinburgense Praefectum

REC. NUN

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consilio,

Et Notissimae FACULTATIS MEDICAE Decretis,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ALEXANDER MONRO DRUMMOND, BRITANNUS.

Ad diem 12 Septembris, Hora hincque solitis.

---

*Miseram habito, vixi quare sit vixi certa sapientia.* PERE.

*Sed hanc et huiusmodi, utique universa aut existima erant, hanc o  
magis quoniam perire distinxit.* LXX.

---

1770.

Sui Studiorumque suorum Factoribus:

GULIELMO DRUMMONDO DE CALLANDER, Armigero, Parentis  
optime merito.

JACOBO MURRAY DE DULLAY, Armigero, PATRICIOQUE  
Fratri, avunculis meritissimis, paternis in se amore animatis:

Valetudinarii Regii Edinensis Moderatoribus, a quibus tandem tamque  
benigne in ipsius quasi medicinae domicilio exceptus est; Professores  
bus Academiae Medicis, qui solutiferae sibi artis praecepta consum-  
matissime transfuderunt: Societati Medicorum Studioforum, in quo-  
rum disceptationibus, ad nullius arboris accomodatam, traditas a  
praeceptoribus disciplinas expendere primum didicit, et persequuti  
Valitudinarii Regii Medicis omnibus, qui antea, philosophiae li-  
berae captum, ad ipsas aegrum curationes revocarunt, exem-  
pla, ut quae ipsum postea competeret, egregia sese praebentes:

COLINO DRUMMONDO, Valetudinarii ejusdem Medico, nonissi-  
mum, diuturna insuper consuetudine, diuturnis potissimum prome-  
ritis, sibi devincto: Denique,

GULIELMO CULLENO, viri optimi, medica assiduitissimo, singu-  
lari sibi praefata pietate semper adamaunda, perpetuo usque suble-  
vantia suscipiendo, cui utique, quae per alios singula est assecutus,  
conjunctim penes universa debet:

Haec, quintula et canque sint, scribat

AUCTOR,

Talibus sine, tamque indignis, intercessurus, si aliter unquam asili-  
munda essent, quam ex amica sacrantis voluntate.



## DE FEBRIBUS ARCENDIS.

**M**AGNAM hominum partem febres absumunt. Facile ad fidem est, in tam vaga re, quot inde perierint exacto affirmare numero. Audet tamen Sydenhamus conspiciere summas; rationemque ita habet, ut, si mortuos ad centum mille ponas, amplius sexaginta sex mille febres perisse contendat. Modesteque satis hoc modum mihi statuisse videretur. Habendum igitur in votis est, febres arceri posse, a quibus tantae ruinae impendeant.

Quod si corporis beneficio pro remedio excitarentur, potius arcessendae essent. Sit gravissime quidem valetudines inde fugatae sunt; adeo ut circumspicere quandoque medici sit febres accendere. Verum enimvero in sanos fere saeviant: Opem aegris tulisse raro vidi, rariusque sponte accessisse cum expetiveris: Medicalque tantum arcenderet quod non acceperat. Plurimum sine fortuitae sunt, ab evidentibus causis profectae; quod quoque a Stahlio, et ab eo deductis viris, propositum est, quorum potius interesset cum Erasistrate facere.

Haud itaque a febribus arcendis abstinendum est; si modo sint quae arceant. Evicimus vero febribus cum occurrurum qui evidentes causas cavere docuerit.

Alii tamen, et fidem alias, post evidentia ista, non febricitant, ut quaedam quandoque subesse possint quae resistant. Arcendi idcirco rationem is demum consecutus fuerit qui quoque, quae corpus minus obnoxium injuriis efficiant, praeceperit. Quae febrem omnino arcent, eadem et recidivae occurrunt.

## DE CAUSIS EVIDENTIBUS CAVENDIS.

**P**ROTINUS in initio scire licet, ea ante omnia attendenda esse quae maxime per se moveant; adversus quae quippe curantis in primis consilium dirigi debeat. Atque haec in stagnorum auris corruptis, contagione, frigorisque et caloris varietatibus, posita mihi esse videntur.

## DE STAGNORUM AURIS VENENATIS CONTAGIONEQUE CAVENDIS.

**H**is nominibus significo venenum quoddam quod ex hominum corporibus fertur, vel ex terra sic humidata ut putrescentibus foeta sit: Quod solum non nocere, non idcirco tenendum, quod hyeme fere innocuum est; id enim non perpetuum, et ea tunc absunt quae vim satis intendant.



Venenum igitur utrique commune est, quod cavere debebit medicus. Atque id quidem praestiturus est, si operam in primis dederit, ut oriendi occasionem praecidat; deinde ut ortum deleat; rursus ut ortu nec delecto alitum praecidat; post ut accessum purget; mox ut ostendat quomodo aliquis, venenum injecto, periculo se subtrahere queat, et denique, si ne periculo se subtrahere liceat, ut venenum plane adhiberi eludendi rationes praecipiat.

*De Veneni Originibus praecidendis.*

STAGNA primum exequat, ut ex quibus quandoque contagio est; febres a stagnorum auris venenatis profectae, Livio Clephornioque auctoribus, aegrorum contactu manant latius. Quod an ideo quaque faciendum sit, quid nocentiora sunt, haud satis scio. Commentitiis antiquitatis fabulis veritas saepe implicata. Pythone infecto, primum inclamavit Apollo; Python vero paludum aestu tumentium pulsiferi progenies. Stagnorum aurae, etsi mitius, in plures forte laeviant; contagio truculentior per hos saltem dicitur in pauciores.

Stagnorum aurae venenatae vel ex terris feruntur vetere humore odis; vel ex sylvis; vel ex paludibus; vel ex putrescentibus alienubi congestis.

Terrae fere nudae imbribus e coelo demissis. Quibus retinendis, aliae atque aliae soli species sunt magis minusve aptae. Linnaeus olim id sibi negotii datum esse ratus, ut unde febres quae intermittunt coeperint inveniret, rem ita expedivit, ut argillae omnia tribuat; et argilla quidem retinet, non sic tamen ut febres, etiam quae intermittunt, non ibi frequentissime sint, ubi nihil argillae tribuendum; ibique fere ignotae sint quo argillae maxima vis est, sicut quaque in Glottiana nostra. Dolendumque eo magis est artem in terrarum sic nudantium noxis tollendis tantulum sibi vindicare posse, quod ex hoc quasi fonte tertianae profluunt, quae, in aestuosis praeseptis locis atque temporibus, per totum pene terrarum orbem vulgantur. Neque nihil proficeremus ducendo fossas, consilendo agros, aliisque haud invalidis auxiliis quae Agricultura promittit. Quam igitur in his salutarum sociam sibi atque moderatricem Medicina debet adhaerere.

Sylvae praecidendae sunt. Atque hac sola arte saepe effectum est, ut sedes pridem derelictas Salus aliquando reviseret.

Siccare paludes, opus est et arduum et honorificum. Ad Hydram Lerna lacu interficiendam, Hercule olim opus fuit. Lyncis, pluribus haud ita pridem civitatibus detegendi

tergendi lacus auctor, salutem caeteris maximam sibi inde fumam conscivit. Siccandi ratio ab architectis et agricolis potenda. Neque hic quoque medica consilia nihil profunt. Siccationem per frigora valentissimum praesidium qui in calidibus praeceperit, ut is Camarinam iterum insuallo omine moveret, felaresque inde adeo non arceret, ut latius funderet. Januarius Februariusque menses huic rei, ceterum in Italia, opportunissimae Lancelis vitae sunt. Tabernaculis pulvisci loco consistentis, insas circumdare convenit.

Putrescentia congeruntur fere in urbibus: Ex quo scire licet medico hic politico opus esse; quippe cui nisi faventes habeat quibus summa rerum permittitur, consilia omnia incipiaque assidue frustra forent. Igitur huic acriter adnoscendum est, ut urbs prius amplitudine, quoad ejus fieri poterit, vacua, aedificia habeat laxa, disjuncta, nitida; plateae patulae fiant, saxisque stratae; humationes profundae sint; sepulchreta, macella, lanionum tabernae, animalium cadavera frustra corrupta, Berquinioia, stagna in quibus cannabis maceratur, atque genus alia, quam longissime amoveantur, deoique, ut cloaca maxima immixtis aquarum canalibus eluenda, omnium, quae amoveri nequeant, purgamentorum receptaculum sub terram agatur. Putrescentium aëunde congelatarum eadem fere ratio est. Haec de stagnis.

Contagio a sanis oriunda serius mitiusque seipit; frequentia aegrorum concepta celerius infestat, et vehementius. Huic igitur in primis occurrendum.

Protinus exinde perspicere licet, valetudinaria ipsa nostra omnino fugienda esse. Plurima, sane et aegrorum et medicorum commodis intervenientia, inde quaesita sunt; non tamen idem quaerenda quod aegri a sanis segregati confertiores ibi consistunt; ab hac quidem parte malorum irritamentum, immo fontem, nodum lenimen, consecuti sumus. Tabernacula ergo militibus; omnibus aedes singulae, quoad ejus fieri poterit, singulis accommodandae sunt. Haec tamen facilius praeceperis quam consecutus fueris. Valetudinaria saepe instruantur, necessum est. Reliquum est itaque, ut parva sint, rara, frequenter mutata, paucorum aegrotantium. Quod si ne haec quidem liceant, omni tunc ope contendendum est, ut malum, quod tollere nequaquam possis, utcumque minuas, ut valetudinaria omnia magni multorumque hominum in locis maxime salubribus sint; tumultuaria in horreis, navigiis parvis, vacuis, deorum templis, spatioisque aliis, perflatumque habentibus.

Sanctorum multitudinis minuendae causa, inutiles primum alio amandandi sunt. Opera deinceps danda est, ut reliquae quam minime contigant. Per lasas igitur aedes habendi sunt; conyentibusque hoc nomine sacrisque abstinentium est. Concludendi quidem necessitas quandoque urget, sicut longae se navigationi committentibus. Ex his quae adduximus patet, aliter malis inde metuendis subveniendum esse, quam augendo conclusorum numerum: Qui id fecerunt exitum pro subsidio paravisse vix sunt. Neque nihil interest quos concludas; diutina conclusio contagionem pignorat minus opportunus est, nisi locus conclusionis ejusmodi sit ut satis magnam frequentiam capiat. Parva certe navigia majoribus fere in experimentis salutiora visa sunt.

*De Veneno delendo.*

De stagnis continuo delendis despero. Subjicere natura potest, quae non quasi Imperi funditus evertant. Medicina vero Lemnia etiam artibus auxilia, materiam fere tanto incendio sufficere nequit.

Contagio confundi potest. Comburenda igitur sunt quibus haesi, si modo comburete liceat; Id tamen nisi in ipsis initis fieri nequit, cum in paucis hactenus delituit, et nihil subreptum. Animalia quoque interficienda, uti lege de bobus sancitum est. Lex quidem eo consilio lata est, ut ipsorum morbis occurreretur, de quibus non ago. Ego vero animalia idem praecipio ut interficiantur, quod contagionem adportare possint hominibus solis noxiam futuram: Felas alienas Berlixae obruncant, tanquam pestem adportaturas quae ipse non conficiantur. Leges hominibus parant, arcuola continentur.

*De Veneni Aditu intercludendo.*

ANTE exequat quae his servanda sunt, qui graves regiones habitent, vel apud quos contagio genita sit; tum quemadmodum eos agere conveniat ad quos venenum aliunde ortum importari possit.

Stagnorum auras aditum intercludere possis, cooperiendo his quae spirituum adfoculi officiant. Nilus in alveum conditus se fossas Aegypti noxias relinquit; exalluans salubres reddit. Aquae vivae fontes vel ab Empedocle vel a Lanciso deducti, et ad temperandos lacus immisi, feliciter viderunt. Quo remedio medici, etiam per ardores, periclitantibus subvenire possunt, quum a paludibus exsiccandis vel detergendis omnino abstinendum esset. Nec  
fussat



fossae tantum vel lacus immissa aqua salubres sunt, sed omnia mephitis exhalantia. Paludes quas nec detergere nec exsiccare, nec aqua temperare licet, tota ad summum usque complendae sint: Idque ipsum in consilio etiam habendum est, in fossis longa vetustate oblimatis, in cluacis, ubiginosisque aliis tabaque foedatis.

Contagioni occurratur quae iudaveribundine vel cessibus, si alte satis humaveris. Cogitatum est quoque, ad accensum contagionis cavendum, de claudendo aegrotis ab omni cum sanis commercio. Et quidem medicis annotatum est, melius in valetudinariis caeterorum saluti prospectum esse, si, in omnibus qui contactu aegrotum vulgantur morbis, sua cuique cubacula constituta sint. Quibus murem eo aliquis studiosius gesserit, quod nihil plurimum huius sit, quod non consentientibus ipsis aegris factum est. Non illico tamen habendum, insigni aliqua calamitate instante, omnes contagione tactos in valetudinaria conjiciendas esse, et vi etiam ibi et armis coercendos. Quae res a Gallia primum, et Italia profecta, ab his etiamnum servatur, quibus libertas pluris facienda erat, nuperque etiam, ut valetur, a homine Britanno. Ex hoc profecto Gallia Italicisque dandum, tum forte magis e republica esse civium jus aliquibus adimere, cum intra paucos adhuc se continet contagio. Verum enimvero, cum longe lateque perrepata est, nequidquam e suo et complexu suorum avulsas, extorres quasi, penatibus atque congressu aequalium esturbare: Gliscit indies contagio, quidquid contra nitare, civitatisque moestiae alloqui, trepidataeque rerum suarum, gravis inde terror locatur, malorum omnium in praesens irritamentum et cuculus futurus.

Venenum quoque aliunde ortum importari posse, supra posui.

Stagnorum spiritus aliunde invectus sic nocuisse, et gravibus regionibus profugis salubrioresque sedes quaerentibus aditus prohibendus sit, haud accipi.

Contagionem in quibuscumque fore delitescere posse, importatamque contactu undequoque vulgari, omnibus in confesso est. Memento igitur et vallanda loca sana sunt contra omnem huius accessum, appulsus navium prohibendus, custodes ad firmandos introitus dandi, omniaque alia constituenda quibus ultra citraque commercii facultas ex toto circumcidatur. Sunt quibus pergravidissime inhaerescit, quae ideo maxime cavenda. Per trecentos fere annos creditum est quadraginta dierum commoratione, securitatem consequi. Quam nunc inde profereris experien-



tia docuit; neque adhuc compertum, qua tandem tarditate profectus expletur. Contagia enimvero, cujuscunque ex generis sit, in suppellectilib, vestib, mercibus, aliisque, non solum per multos dies, sed per multos annos, latitare possunt, infractis nocendi viribus. Quod crebris adeo tamque illustribus exemplis evidum est, ut nisi purgandi copia facta esset, aditum his in perpetuum inhibendum esse, proponerem. Animalibus quoque accessus interdicendus est. Felis, dianas, dixi, Berberianos trucidare. Arrent quas interfecte non licet, suasque errabundas tanquam, et huc illuc per infecta loca pervagaturas, vel domi retinent, vel alio ablegant. Homines vero tempus praesidio est. Contagione tacti, vassibusque exuti, plurimum fere intra quadragesimum diem aegrotant. Quod si igitur sani tandem persisterint, accedendi venia danda est. Consultandi tempus corrigi posse memoriae nuper proditum est. Linds dies quatuordecim, Chenotus suis quoque experimentis fretus dies septem, ille sui expectatione febris quae a diutina conclusione est, hic sui expectatione pestis etiam ipsius, sufficere proposuerunt. Quae ita a medicis bene de civibus suis merituro tenenda sunt, ut, si alteratro modo peccandum sit, peccavisse maluerit plurimorum salutem prospiciendo, quam inserviando paucorum commodum. Contagionisque actum, in aliis aliisque, alia est atque alia; sicut in variolarum etiam infectionibus cognitum est. Neque non pro virili parte de mitigandis commemorandi legibus existendum est; ne recte nimis intendendo in causa sit, ut, clausis custodiibus, reipublice frustra praesidium esset.

#### *De Purgationibus.*

Quae haftenus reperiantur medicis consilia scriptis precipere potest. Proxime igitur deveniendum erit ad ea quae venenam omnino accessorum purgent.

Non nequidquam praesentis lustrandi mos id expianda fœda quaecunque usurpatas. Es fere adhibuerunt in quibus praesentissimum auxilium inesse deprehensum est, post experimenta scilicet de hac re capta. Nec frustra etiam religiones implicatae, ut postea indicabo. Aquae igitur, aëre et igne, ubi sunt, quae nunc quoque potissimum adhibemus, et ad purgandas stagnorum auras, et in purgandis hominibus, rebusque quoque venenatis quibuscunque, suppellectilib, vestib, mercibus, domiciliis.

De Aqua in stagna pestifera immissa antea dixi.

Fluvium quoque rivum abluentiae fontes sunt, quae ipsa hominum corpora foedaht. Cavendaeque maxime quae ex

alvi purgantibus sunt, utpote potissimum noxia; neque alienum est id quoque cavendum quod forte in capillis vel barba promissa delituisse conjectaveris. Frigida igitur perfundi his convenit quibus a contagione metus est. Beluane convenirent, dubito. Abstergant quidem, sed infirmo officisse cognitum est. Chenotes, discussa peste, bis ante vel ter adhibet quam homines societati reddat.

Supellex, vestis, merx, domus, navigia, ejusmodique alia, aqua quoque purgantur. Haec alia misceri solent quae vim intendere putantur. Indusia ex sudore periclitantium madida aqua cui acutum est adjectum tinguntur. Iteratam lavationem ex luxivio cinere valente Chenotes praecipit; ignarus forte vel oblitus quam dira Noviomagenes experti essent ab aquae usu quae ex sapone inferbuerat. In hac re igitur a Chenoto desistere oportet, et cum Lido facere, qui cum spiritus tetros calore diffundi propulsasset, terdes primo semper frigida abluendas esse, praeiit.

Ante, quatenus Aer auras quomodocunque venenatas purgare posset, ostendam. Apollo olim, Chrysaee precibus victus, Achivorum pestilentiam excitato vento profligavit. Quod ars quasi imitata et ipsa quoque ventus excitare nuda est. Medicinaeque etiam parentis laudibus accedit, accensit eum per plateas ignibus, cum peste in urbem faceret, haud mediocrem opem Atheniensibus attulisse. Quam rem veretur ut is qui Clerici Scholasticique argumenta latis perpendere, omnino Graeciae scholis accensendam esse putaverit, cui nunquam talis mentiendi occasio vel facultas desuit Remedii fama minime mirum si apud medicos percrebuerit, quibus nihil fere antiquius quam ut Hippocratem consequi videantur. Nescia vero an facultas ejus experimentis accuratioribus cognita plane et perspecta sit; ignes certe per plateas accensos praeter omnem opinionem facius nocuisse, compertum est. Venenum quidem igne miscuit, et ventus per se salubris est. Publici vero ignis venenum undequaque sparsim domare non valent. Ventos excitant; sed venti gravia loca verrentes venenum volvunt, obviisque afflant, alius evasuris. Aura est quaedam aerem mephiticum vocant, flammiae, ipsaeque animantium vitae, adversa; Huic spissior gravitas est, ut interiora plurimum petat, et alia etiam irretire queat. Latetque in puteis quandoque, similibusque aliis. Tormenta bellica quaedam immissa et disrupta fragore suo faciunt, ut celeri violentoque turbine lata, undique erumpat. Restat tantisper fumus, cui etiam purgandi vis est.

Ad ipsa hominum corpora purganda, quatenus ab aere purgari possunt, sufficit, sub divo versari, vel vento ejusmodi perflari, qui in cubiculis salubri loco obviis, adaperitis fenestris, excitari potest.

Perflatus solus ea purgat quibus contagio haud ita pertinaciter inhaeret: velli etiam stragulae argentantium, frequentius modo mutatae, venenum ventus everrit. Lotaque omnia aere siccanda sunt, supellex, navigia, caetera; nihilque non attendendum est, ut ventus salubris undique perfleret. Neque tamen aliquis facile gossypion perflato solo purgaret, sicut legibus constitutum est; immo, quamvis, Chenoto auctore, glomeres sulveret, et diligenter discerneret. Quod inde purgatum memorant, videndum, num infectum fuerit; ea enim quibus contagio penitus insolet, nequidquam saepe toto etiam aëris oceanus persuaderes.

Vel solus Ignis adhibetur, vel ad purgationes.

Lota quoque igne calefacienda sunt. Ignis gravibus locis accensos non nisi aëra concire proposui. Vitium tamen subinde per ignem concoqui, inutilemque humorem exundare, haud negaverim. Fornaces, in quibus lateres excoquant, loco uliginoso salubritatem conciliavere. Si igitur aëre venenatae pertis iisdemque artibus spatia finiuntur, sicut quandoque in arboribus vel fossis vetustis sit, igne subvertendum est. Contagionem, summae ruti adhaerescens, si ignis pellere possit, facta vento pellit. Ad sapellectilem, merces, similiique omnia purganda, ignis conveniret, si ejusmodi plurimum essent quae calor consumeret vel corrumpere. Ea etiam quae decoquuntur calor forte acque purgat ac aqua deterget. Venenum domicillis inhaerens summis caloribus excoquere, quibus quandoque ad torrefaciendos cineres, animalia foedissima, utimur, eos forte juvaret quibus placitum est contagionis causam in insectis quaerere. Oppido rarum est tamen nihil impedire quo minus hoc experiri liceat: Animalcalorumque ora calores impune ferunt, quos exitio fore praesagivimus.

Sufficiantibus veteres quoque, cum lastrabantur, usi sunt; nec immerito. Purgant enim quibus ignis vehementior noceret, et caetera frustra ferunt. Mephitisque exhalant, quo sit ut perflatus quandoque et lavationes attentius adhibeantur.

Satis constat ampla regionum gravium spatia, vel connotos lacus, etiam qui late patent, suffiri non posse. Neque tamen nulla facusculos suffiendi facultas est, aut regione gravis cum portionem quae cubiculis vel tentoriis continetur. Acronem medicum multos olim juvasse ferunt, ignibus



ignibus prope aegrotantes accensis. Dormientique etiam in Guinea homini, tenui moilo fumo involutus sit, venenorum plurimum innocuum esse, Lindus memorat. Quod igitur infuetis diligentissime servandum qui in gravibus regionibus habitare tenentur. Persuasumque habeo, densissimum illum fumum, quo priscorum Sctorum vulgus in tuguriis suis involvuntur, nonnihil momenti asserre ad reos spiritus dampnandos, quos foeda illuvie obstiti aliquando ducerent. Architectonicae peritiores facili, nisi ignaviam simul exusserint, cultique ex squaloribus redditi sunt, solertiae ab hac parte temere ante diem consecratae poenas lucent.

Habuerit et fulcris in priscarum religionibus locum ad homines ipsos purgandos. Cujus rei, si Propertium, Ovidium, Juvenalemque rejectis, an alii satis idonei auctores sint, non perquisivi. Ad corrigendas venenatas auras, valere diximus, prolesseque etiam, in febrecitantium cubiculis adhibitos. Purgant quoque cutis sordes, venenumque vestibis irretitum. Aliis hominibus auxiliari nondum compertum.

Compertum vero, et experimentis quam clarissime evictum, vestes, supellestiliam, navigia, domus, ejusmodique alia, suffusionibus probe peractis, perpurgata esse in sincerissimam integritatem. Suffusionisque probe peraguntur, si fumi volumina satis densa sint, et exitus diligenter clausi. Neque non suffundi tempus longius producendum est; siquidem denarum horarum spatium ad navigii purgationem requiritur. Quae ad suffumigandum opportunissima sint, haud adeo in promptu est. Achla, nitrum, salem ammoniacum, spiritum ardentem, olea, sulphur, carbones, quae inflammant omnia, arsenicum, cinnabarin, stibium, herbarum decreta quae corruptioni contrariae sunt, innumera ex his composita, in annalium suorum monumentis medici celebrant. Alia atque alia quoque de more venditant, prout cuique cesserant. Sulphur Ulyssis Haemericum placuit, et Pringelio adhuc placet; pulverem qui ex sulphure, nitro, et carbonibus est, Helmontius et Lindus caeteris anteponeere videntur. Omnia nimirum ita praeferre, ut singulorum inter se facultates contendere difficile sit. Ex quibus aliquis colligat, suffusionibus quidem summopere insistendum esse; parum ad rem pertinere per quae suffoveris. Scireque inde licet, suffumigandum esse, si quae optima videantur non sint, etiam ex deterioribus; si omnia contra sint, ea potissimum a quaque seligenda esse quae experimentis utilissima competerit.



*Quamvis aliquis, Veneno invectis, Periculo se subtrahere possit*

Quoniam si alleui sibi soli consulere liceret, hac is confectum, venenu illibato innecto, penates defereret, fugamque sibi ex eo loco conscisceret. Et Sydenhamus quidem, Londino relictō, effuse fugientium civium agmen secutus est: ratus nimirum, non esse cur eadem sanellionem adhuc sal morte faceretis: satis forte sine hoc luctus et lacrymarum fore. Ejus vero est qui medentis numen meretur, animum constantioribus exemplis firmare, non ad Sydenhamum respicere, foecordem sane ab hac parte, et ignavum, atque turpiter dissidentem: sed ad Bayeros nempe vel Diemerbroeckios, aliosque plurimos, quos excitare me posse gaudeo, medicos, qui se semper minoris quam sempublicam fecere. Neque, hercule, perclitā sic omnino spem fovemus, caputque temere exitio obiectamus: timor quippe animi saluti officit: audacia pro muro habetur. Haec de calamitatibus gravioribus: Medici quotidie inter mitiora venena versantur, quae non timent, et quorum saepe ignari sunt. Verumenimvero, si in graviores hos aliquando casus incidant, viam illam aliis manire tenentur, cujus se comites esse posse negant: capiendus scilicet aliquis, tanquam exilio voluntario, locus est, quum lata fuga anceat.

Igitur in usu et experimentis positum est, aërem aquilae purio incumbentem, salutis esse praesidium commune et perflugium, per universum terrarum orbem. Quod per varios potissimum in bello novissimo Gallico Hispanicoque eventus edoctus, post Celsi et Pringelli quaedam aliorumque monita, ultra omnem tandem dubitationis aëram Lindas constituit. Quamobrem, medici est perflugis auctor esse, ut in apta navigia conscendant, non ut littora legant, e quibus aërae venenatae aspirare possunt, sed ut passis velis in mare altum se conferant, vel, si id non est, in flumina, si quae sint, profunda<sup>4</sup> fatis lateque effusa. His ergo sic constitutis, oram solventibus bene praecuratur, rogati, si aliquando in optatos exitus tanquam in saluterum quoddam templum provecti fuerint, ut Lindo, vero sere loci numini, solennia pro incolumitate vota persolvant.

Veterem jam vulgataque esse rem video, eos qui, longe a tetris siaguerum vel finitimarum vallium adspirationibus semoti, frigidiora alterum saxosorumque montium latera incolunt, in gravibus etiam aestuosisque regionibus, sanos ferè in summam senectutem vivere. Ejusmodique ideo sedes amantibus sequi hominibus olim etiam a Davide rege promissae sunt, si Helmundum audiamus, si diis placet, sacra-

ficarum literarum interpretem. Quamobrem, aliqua re navigationem prohibente, haec praeterea effugiendis possent, penitusque peritum geographiae medicum est talia penitus aliisque terrarum indicare. Siu aliquis requirit, quo politissimum muniam se recipiat, scire licet quique in eam altitudinem ascenderit, quo plantae animantiaque regionum partem maxime salubrem hauri proveniant. Ejusmodique receptum studiis fortis fuerit, si quando Joannem ipsam Boeckacium sic conservatum fuisse credideris, virum prolechi a cupido quoque literatum in perpetuum colendum; quippe qui inter eos erat qui inveteratum olim barbariam Europae excusserint, non contagione Graecorum regentes, quemadmodum ceteri, sed insitis ingenii viribus nisi.

Nec terra etiam marique clausis desperata penitus et complorata res est: Effugiendi quidem spes praeterea est, sed non refugium. In quibusdam civitatibus, urgente aliqua periculossima valetudine, moris est locupletiorum primariorumque hominum ut sponte careant publico, et intra suum quemque limen se contineant. Nihil tam clausum ad aditus exitusque, nihil tam tutum ad custodias, nihil tam curiosum in purgationibus, quo non se undique sepiant. Siccine aliqua periculo se subtrahere queat, quando anniverfari instant gravibus regionibus morbi, curatius per experimenta videndum; aegrorum quoque contactu hos vulgari antea proposuimus. Sed usus hoc cunque modi sit, sunt sane, quando vitium evidentissime contactu contaminat, quibus plaris aestimatur paratius hoc in aedibus refugium, quam amveniat ille in montibus receptus. Eo quippe rarissimum, quin salus aliquomodo perreptet, et alia minus secuta sint. Et Bertrami quidem, quam invenissent peste se praeter omnem speciem vitiatos esse, Cardorumque insuper incursionibus laetissimi, (genus id hominum agreste est qui rapto et latrociniis vitam agunt) haud amplius Bayanos montes concedunt, sicut alii, sed inter urbis se moenia continent. Neque enim conclusioni suae defuit solatio: Anticillissima quaque, atque amicis conjugalissimum, in hospitii societatem adsciscere possit, tempusque a contemplatione abstractum republicae status varium, benevolentiaque multos jucundissimisque eruditionis et literarum oblectamentis, securo otio contectis.

*De Peneis eludendi.*

Ita igitur conclusis, aliisque in mare vel in montes profugis, medicus eo se conuertit ut aliquorum saluti prospiciat.

Stagnantique aëre et contagia aliter nunc caveri nequeant, nisi quatenus venenum quocumq; omnino verifandum est atque eludatur. Multatque quoad ejus fieri potest, vel cavendo id quod ad summum corpus accedat, vel aditus precludendo ad interiora.

Abundatque imprimis venenum vel fontem juxta, vel aere vivoctum.

Magistratus est, legibus de munditia laetis, de mensuris fopellectis veteris, similibusque aliis, cavere ne veneni fons augeatur. De his quae praecedant vel purgent jam diximus. Omnium est eo imprimis versari quo veneni quom minimum teneantur haurire. Minime certe hic juvat fontes integris accedere.

Auras venenatae matutinis temporibus magis abundant, vel precipitante in occasum die. Omnibus igitur antelucana et matutina officia aliena sunt; in quae incidere adeo impune non licet, ut experientia etiam in palustribus quibusdam locis adnotatum sit, eos qui prima luce exsurgunt, immatura, ante diem, morti succumbere. Vulgoque istam notum est, aestate aestuosisque plagis, auras ingruente nocte basias esse. Sol nimirum discedit et lustrat. Ex quibus colligitur, illi qui graves regiones habitent, nunquam tam vespere domum revertendum esse, neque tam mane egrediendum, quin adventitia effluvia vel non obveniant vel dissipata fuerint. Aurasque venenatas variis ibi cavere oportet, quo cubare convenit. Cubituro igitur prospiciendum est, ut lectus in superioribus aedium partibus sit; vel, si humi sternere necesse sit, ut ea paucis multis instrata sit, vel tegminibus pice indutis.

Contagio contractu nocentior. Contractusque rerum venenatarum nocentior est quam hominum; qui mycei naviumque vasa tractant, vel velles aegris detrahunt, vasa radum conspuendae opportunitates sunt quare hi qui corpora carent. Quare scire licet, hujusmodi tractationem regulari studio cavendam esse; quod quisque eo asque evitare debet, ut ne vel lectis aegriantium insideat, ne dandus al vultum det. Contagio in quibusdam regionibus ad contubernales fere solus periclit. Sayerique omnia illa impune ausus, tandem cum perveniente quodam qui aëre singulariterque asus est, cubare haud veritus, et ipse, repente omnium bonorum lectu, interit.

Quocumque venenum sic aëre adsit possit ut noceat, non dum finitum. Trecentes usque pedes contagionem adeo Chimotus prohibet, longiusque processu, quod a stagnis effluat aëreum in coele ferens sunt, et vel loco non auventur,



ventus, vel per aëra ita funduntur ut cito sonocui fiant. Auxilia adversus aëllam vel ea sunt quibus efficitur aliquis ut minus nosius sibi accedat, vel quibus se ab ea protegat.

Aëllamque minus noxiosam, si ea quae venenunt spargant ita contra ventum constituamus, ut longe illa ab hominibus eorumque domiciliis queat depellere. Quocirca valuerudinarum, cloacae, marta, tenebraeque alia quae conseruanda sunt, ita constitui expedit. Neque aliud dero agitur, si aliquis ita seipsum ponat, ut ventus adversus se tenet venenunt effluentibus, et sibi a tergo sit. Quid, ut in caeteris, ita servandum est qui in publicum prodeunt, ita quoque, cum aliquis a quo contagionis metus est, ipsos conveniat. Impedimenta obiecta, vel domiciliorum constructio, sunt quibus aliquis se ab ea protegat. — Impedimenta parum proficere exinde facile comminisci quæ, quod spiritus, in quibus effluarum causa est, necesse est in sublimi ferantur. Ute verò multoties exploratum est, spirituum visioarum regionum incelsa propugnaculo fuisse et praefidia. Si in quo igitur auxilium id suum fuisse deprehendatur, cum adeo non, ut alias, proficere oportet, ut religione contra colenda sit tanquam locus sacri. Empedoclesque, obstructis montis faucibus per quem nec passurus in campos incidit, gravissimè morbo pariam liberavit. Quare in impedimentis obiectis videndum est quæ spiritus a pelutibus locis advenientes extorquant et repellant, quos ita contra igitur, si placeat, huc vel gravitate depressus non ascendere, vel in sublimi locus emissa naturam suam manifestare. — Permagis quoque et etiam hinc interit, qui postea villas sunt, si quis huc fortasse pestilentiorum fundum nactus fuerit. Salubriorem potest hunc pro demissis, quandoque, aliter minus salubri, mutandum esse. Caetera quæ domiciliorum constituendum sunt, ex Vitruvio beriporitisque rei rusticae, plene ediscant. Omnes scire vel sciri consulant, quam longissime a palude vicina stare oportet, acedinem, fronte aëris in infestis huc regionis ventis, et amicissimis obvia. In salubresque etque vitiosas sunt, quod si sit, nec alicuius sit, si maris lucum conspiciat, vel profluens damni potest. Insuperque, fenestra novis, allata salubri, et obstructis pestilentibus, et janua parietibus, imolibusque ejus generis alia, graviores etiam sita. Varronem condocant, diligencia quoque nostra, leviores faciet possumus. Quæ quoque qui graves regiones pervagantur certa sedibus delictis, domus in capiendo cultis locis, alia in constituendo sibi quisque tabernaculo, quam casuallus fore



vare debebunt. Atque haec fere sunt quibus copiam venient carere, quod ad summum corpus accedat. Ad ea nunc transibo quibus aditum praecludat ad interiora.

Quod quandoque et posito etiam corporis consequi possis. Qui per Syrtis iter faciunt Samielem eludunt, si averso vultu in terram procedunt, tandiuque ibidem lateant, dum status ille pestiferus deserveseat.

Vestitusque etiam ratio habenda est, quem saepe et immutare et purgare convenit, vel potius renovare. Ejusmodique esse expetiveris ut venenum quam minime irretiat. Lineam vellem axillae lineae vel pellice praestare credideris, quasi contagio illa pertinacius inhaeserit qui calorem tardius redidit. Quis sericum valeat, a veteribus Romanis vis valuisse, apud quos, Aureliani etiam tempore, ut Vopiscus verbis utar, libra serici libra auri fuit. Diemerbroeckius vestes sericas divitiaribus Nivionagenses praecipit; quae perfecta non invenio.

Sic neque salis pugnatum est. Medicus partes ipsas ad interiora ducentes occupat, et quasi praefidiis firmat. Curiositas huiusmodi aliquid visum fuerit obstruere foramina aurium, si forte vereatur ne contagio sanilibus tanquam in visum inhaeresceret. Compellendum sibi igitur laque paululum est, ex medicamento quodam vaporifero, eodemque innocuo madidum, ut noxae securus sit. — Nares vero patulae ipsae et flexuosae, per foramina vultuiformis ossis in cerebrum tendentes, in laqueos quoque, et igitur in pulmones, et in ventriculum pervia, diligentius occludendae sunt. Acetum cui Theriacum adijcitur maxime in experimentis profuisse, compertum est. Spongia igitur vel simile quoddam ex eo expressa admoenda est; vel linimentum involutum, vel herbae copulatae solum in tingendum, et in nares demittendum est. Quae et via munire convenit quae in pulmones quoque et ventriculum docant. Qui cum spiritalibus nocentibus versantur, his salivam deoriatam usitatem esse, omnes auctores consentiunt. Quod igitur cavendum maxime. Salivam mandendo exprimimus, eoque facilius exspuimus. Quae circa usum rei in his potissimum quaesita sunt quae mandere cogunt. Beneque ejusmodi alia atque alia valuisse, memoriae praeditum est. Mali vitrii putamine munire se saevit Paracelsus. Si is parum credideris, non igitur et huic parum credendum, salivam exspuendam esse. Wenceslaus sane Dobitzensky se se ab omni contagio tutatum esse prodidit, et artem hanc tanquam antidotum generalem illi vendidit. — Nocentes spiritus potentibus summe entis quandoque vis infundit.

infundi, si non negaveris. Vestimenta jam crectus sum. Sintne quibus spiramenta linere ita possis, ut contra contagionem impune claudas, nescia. Majores profecto nostri pigmentis se infecerunt, Indique adhuc Ameritani corpora sic inscribunt diversisque imaginibus variant, homines utrique sanissimi.

*Stagnarium auras Contagionemque cavere, quatenus Edinensibus utile sit.*

Quae omnia quam diligenter tenenda sint in gravibus regionibus, et ubicunque terrarum contagio sit, experientia satis probaturum est. Attendenda ibi quaque ubi noxa minus infesta videatur, Edinenses modicus velim.

In Scotia quartanas rarissimas esse, Baglivius olim prodidit. Edinenses adeo male non habent, ut, toto ferme novennio, quartanas trea tantum vel quatuor origine Scotticas viderim; neque hoc ita in omnibus ratum, ut nequaquam in dubium devocari poterit. Tertianas vero quotidianasque febres Edini raras esse, minus recte statueris, si fure ad cultiores respicias, et qui salubria loca habitant. Plebem sane Vere quotannis et Autumno infestant, eosque fere qui in uliginosis versantur. Quibus auxilio jam proposita praesidio fore confido.

Contagionem excipiunt febres cujuscunque fere generis sint. Et Edini etiam, praeceptorum Scottorum plebes tertianis quotidianisque magis obnoxia est, et eadem squalore praerequirit infesta. Febres earum similes quae a diuturna conclusionis sunt, vel quas putridas vocare amant, rarius vidi; quae tamen a contagione fere omnes sunt. Febris equidem, cui ex inflammatione nomen inditum, fere ex caloris frigorisque varietatibus est, quas postea exequat: In Landi tamen experimentis positum est, evidentissimum ejus quodlibet indicia contagionis culpa facta esse; et variolae a contagione sane profectas, et inflammatio et suppuratio excipit. Quo intentius cuique circumspiciendum est, ne forte praeter opinionem accesserit. Febris Edinensibus infestissima eo plurimum est quae ab indicibus ejus, quam ex inflammatione nominant, incipiens, secundo vel tertio septenario, ab his excipitur quae, tanquam propria eo generi quod nervosam febrem vocat, Huxhamus proposuit. Rariorque ipsa nervosa, quatenus usu comprehendere potui, non quaeque ab aliquotus inflammationis nota incipit. Verum enimvero, in nervosae hujus priorisque causas quo sollicitius inquisivi, eo saepius inveni, quid contagioni tribuere debebam. Contagionem equidem, unde febres sunt,

ejusmodi fere inveniri, quae viâ, nisi alia junda, moveant. Quae factum est, ut Edinenses febres raro sanos inferant. Sunt quibus ea proprietas est, ut febribus facilius remittant. Atqui, in his, a contagione coeppit, quam altissime evictum vidi. Imponeque saepe Kalini licet hospiti consuetudine cum febricitante conjungi, rarios in eodem cohabitare lecto.

Quae febres omnino arcant, ea proposui, et revolvit neccurrere. Argue coeli hic ratio tanti habita est, ut pessimum omnes fere medici ferant, aegri esse coelum quod aegrum fecit; adeo ut in id quoque genus quod natura posuit est, in hoc statu, salubris mutatio sit. Omnibus coeli mutandi copia non est. Contagionem utroque effugere cuique fere licet. Saepe numero experimentis cognovi, his qui, simul atque febre liberati fuerant, hospitium, forte fortuna, vel etiam cubile mutaverant, residuam multo minus timendam esse, quam si eisdem uti perreperant. Quocirca, et hoc etiam apud Edinenses, tenendum esse censeo, ut quam primum febris consisterit, medicos necessarios petulantius auctor sit, ut eum in aliud cubiculum deferant, vel, si id non est, ut vetustum saltem lectum, stragulamque potissimum vestem, omneque id cui contagio inhaerescit, purgationibus diligentissime lustrant. Quod si quis saluti suae prospectum fore merum fecerit, nec si forte fecerit vel in hoc statuerit, his nimirum qui eum alio, febre finita, concesserant, recituaeque inde occurrissent, in aëre praesertim qui natura peior erat, multo minus plurimum coeli quam hospitii mutationem profuisse.

#### DE FRIGORE CALORISQUE VARIATIONE CAVENDO.

DE Frigore solo cavendo non ago, qui exinde febres fieri dubitem. Frigore satis intento, eamquam fere resolutionem nervorum vel ganglionum fieri, facile crediderim. Si istos vero, et febres id quoque accipere contendas, exempli flagito. Frigidissimis etiam regionibus homines tantum febribusque praeter reliquis minus obnoxii.

Febres viâ etiam a Calore solo verendi, durius forte videatur. Si quis calorem infusciat, is velim primo prospiciat, ne alia quoque accendant. Uligo rarissima adest. Hanc Columella praecipit, non contentos esse nos oportere prima specie summi soli, sed diligenter explorandum esse inferioris materiae qualitatem: Avulsam minime saluandum; ductis solis, humor, autem laetis, saepissime offendit; ubique viridaria, ibi humor; utpote qui plantis pro nutrimento est. Febres aestus non antea excipiuntur quam



quam auras venenatas ortas esse conjectaveris. Saniel ventus, si laudum audias, Ægypto prodest; officitque alibi, Ivelin auctore, aliter quam quod calidus est.—Calores sunt summi sine febre. Qui vitum coquant, fabrique ferrarii, nisi corpus caloribus fatigatum frigori committant; cum milites in castris, rusticique, licet solis radiis maxime succedant, mundo aequaliter colescant, nubilumque caelum stagnorumque auras caveant; febribus vacant. Pestis denique sub maximis caloribus Smyrnae exstinguitur, et ante etiam Ægypti quam Nilus superfunditur, et Byrrhæ quoque, sicut, post multorum ibi annorum moram, idoneus certe auctor memorat, Russellus.

Ne cui verò nimia fere haec videantur, suscipiendum nunc est id in quo omnes conveniunt, caloris, scilicet, frigorisque varietates quam maxime nocere. Id cuius varietas movet, ad haec proxime accedit, quae per se movent: Calor frigusque, medico diversa, philosopho eandem quasi scalarum gradus sunt. Igitur, a stagnorum auri contagio-neque initio accepto, proxime caloris frigorisque varietatem exequor.—Proposueris forte, neque hanc varietatem solam movere. Quod verò minus simile forte putaveris, si mecum senseris, nihil fere interesse feбри, cui ex inflammatione nomen inditum, et rheumatismo, quem acutum vocant, nisi quod in illa inflammatio fegacior sit, nec ita commissuris insidat: Illam profecto, quoties hanc, toties ex caloris frigorisque varietate ortam vidi. Sydenhamus quam plurimarum ibi febrium evidentem causam esse petendam, pluresque inde sane, quam peste, gladio, atque fame, simul omnibus petere, memoriae prodidit. Febres, scilicet, quae Sydenhamus executus est, plurimum fere erant ejus generis quae nomen ab inflammatione traxerunt. Minime tamen ne ex hac quidem causa negaverim, vitiosarum regionum contagionisque noxam a caloris frigorisque varietate tantum intendi, ut, cui plus tribuendum sit, saepissime ambigam. Utroqueque sit, varietatem hanc studiosus exorandum esse, manifestum est.

Noxium semper est, corpus, calidius relaxatum, subito et indutus frigore excipi. Quare ea anni tempora periculosa sunt quae maxime vacillant; autumnusque idem quaeque periculosus semper habet: est. Aequalitas spiritus, quod ejus fieri potest, consequenda est; quod fere in creationis redeuntisque rationibus potissimum ponitur. Molestias quae ex anni temporibus sunt, et tempestatum periculis ea vel citius perceptoris. Occiderendi alii faul-tas haud adeo denegata est. Et primum in quoque sitio



est, ut nec, intermissa exercitatione, calefactus frigori se committat, quod diligenter ita Sydenhamus cavet, nec cibos potusque calidos coenatur, ut Edinensibus nostris nimis adhuc familiare est. Vestem temere immutatam, tanquam alteram noxarum fontem, Sydenhamus consilioravit. Familiaribus suis auctor fuit, ut nullo alio tempore quidquam vestibus quibus assueverant detraherent, nisi mense uno ante solstitium. Ex quidem ex dictis primum est colligere, vestem istiusmodi esse debere, quae pro valet temperie varia, calorem pertinacius coarctet, vel celerius transmittat. Quod tamen tantam sollicitudinem exigit, ut si semper mihi magis valere vili sint, qui vestitus rationem nunquam quam qui nimis anxie mutaverint: Intercurrentisque molestiae remedium aliunde quaeri potest. Autumnum varium diximus, et ideo periculosum. Quam varietatem, quasi ne sic satis infesta esset, produximus, nuper et hyemi etiam nocentius anneximus. Architecturae, scilicet, et luxuriae curiosiores, salutisque negligentiores facti, meridianum autumnum temporum caloribus domi frangimur, matutino assidue vespertinoque ejus frigore foras excepti. In domibus sane, numerosus olim divitis, laxitatis nuper cura adhibita est; atque sic equidem spiramentorum omnium diligenti nimis conclusioni allevamentum quodammodo consecuti sumus. Quod si quis extinctis ignibus efficeret, ut artificiorum temperies eadem omnino esset quae circumfusi aeris, nunc in eodem malum ipsam radiatus excuteret. Vestimentis inquit satis adversus frigus praesidium. Scythia, pellibus tegminibusque aliis probe velatus, etiam inter solitudines valde constitutus, altissimis nivibus pressas, et perpetuo gelu constroctas, gratus et salubrius calet quam Britannus, qui in cubiculis hybernis suis, vel potius laconicis, juxta lucum et ignem totus fere dies consumit.

His fere prospicere possis, ne si quis calorem exolpat, calorem quoque cavere queas, vel domiciliorum vel tui ipsius ratione habita.—Servandum est, ne quis nimium aprigetur, vix opus est dicere. Si quando meridiana solis ardores recta caput petant, frigida forte, vel aceto in guttam insito, intolerabilem alioquin aestum, vaporibus haurum temperare poteris. Calor cuique proprius celeriter satis per vestitum tenuous dissipatur, linteum vel xylum. Quem si istiusmodi etiam quis efficeret, ut radii ab alieno calore procelli inde resultarent, satis forte proposito factum foret. Quod, philosophorum disciplinis fœvus, chemicorumque etiam et artificum experimentis adjunctus, haud immerito

Immerito forte consecutus videare, si aëtiorem illi candidissimum induceres, simul et laevorem expolitissimum. — Edificio laeo habitare convenit, perlatum aestivum ejusmodique, quoad ejus fieri potest, temperiem habente, quam quis maxime in patria salubrem expertus est. Intercurrenti aestui subveniendum, frigida, vel pura vel salibus condita, in pavimentum fusa, vel panniculis quae humorem excipiant in eam demissa, ante fores vel fenestras suspensa, iterumque cum inaruerint madefaciendis. In tabernaculis eadem profant: In quibus quoque, ne opacum frigus captandi facultas desit, adhibenda opera est, ut humori salubri obvia sint, chlamydeque ramorumve umbra protegantur, vel aliis quae calorem excludant.

### DE CAVENDO HUMORE.

HUMOR quoque primum quaerendum est, num solas febres faciat. — Aquae in terra intincta cito putrescit, praesertim si calor accedat. Neque ideo, nisi calor et corruptio aëtheris, febres protinus ab humore sunt, quamvis, quo plus humoris sit, eo crebriores fuisse deprehenderis: Stagna vicina febres faciunt, quae forte humori tribueres; navibus vecti ad littora applicati febricitant, in alto mari haud item. Quinetiam humoris in aëre mensura haud ita in promptu est: Maschenbroeckius omnibus instrumentis ad id accommodatis parum tribuit, utpote qui eorum alias atque alias proprietates esse perspexit huic rei adversas: Tenendum quoque, effectus pro humida inhaerente variare, sic et crassius humor hodiernus similis diversa faciat: Nec facile excogitaveris cui fides habenda sit, nisi quidquid sit quo utare incorruptum adserves, ejusdemque novam partemque simul portionem quotidie adhibeas; quod non adhuc factum, nec factu expeditum est. — Nec alia tantum adfuit quae in accusationem non merentis humoris habeas; sed etiam, humore maxime abundante, non illico febris est. Lotrices piscatoresque praeter alios hominibus haud obnoxii. Aestivi imbres fere ubique salubres. Civitates quoque salubres juxta flumen sitae, si nocentia caetera abint. Quinetiam lacus pestiferus, aquis jugibus immixtus flamenque factus, salubris evadit. Maris aspergo quidem salina est; vapor non item; siquidem pura, ex marina, aqua flamma sola elicitur: Aëtem autem mare jam demonstravimus saluberrimum esse omnibus febricitantibus receptum per totum terrarum orbem. Dixerit forsitan quispiam, humorem equidem per se non movere, sed calore conjunctum maxime. Itaque operam doli ut homines, qui febr-

bus tenebantur quae ex toto intermittunt, sub expectatione futurae recessionis in balneum deducerentur: Aliquotiesque experimentis comperi, qui in balneum descendunt, his accessionem non obvenisse, factum esse ut rediret quo die proximae expectanda erat, si abstinuissent. Sunt qui febres quae intermittunt omnes humori tribuant, Lindum aliosque summus virus ferunt. Tui quidem rationes afferunt, ut sibi profecto persuasisse, caeteris velle videantur. His vero potissimum inducili, eorum ite in sententiam aliquin prior, paulisper substiti.

Neque humor non cavendus, qui corruptus auras venenare et vapores frigus intendere possit. Et vulgus quidem aliudque agens populus, et vellem omnem maledictam fugiunt, et aedificia humida et recentia constructa. Calceantque se bene, et partibus his corporis imprimis prospiciunt, quae frigori minus assuetae sunt. Ventos etiam fugiunt vaporiferos: Et quam scientem se ab hac parte statuendi villam salubrem Varro praecellenter, inbecillo quoque Britannico, ad orientales praesertim incolae oras habitanti, nimis comperitum est: Curandum, contendit, ne adversum aurum ponas; quo minus hyeme fiat vehementer frigida, et aestate non salubris. Caetera ex his disci possunt quae jam executus sum.

*De Febrium Causis summam quae maxime per se moriantur.*

Aegri haec ferè sunt unde febres plurimum coeptant. Sane ego, qui in amplius sex mille aegris valetudinum causa scrutatus sum, flagrantem auras contagionemque, frigorisque et humoris varietates, praecipua esse, post quae febres factae sunt, in usu et experimentis evidenter comperi.

Non eadem tamen omnibus infesta. Gravissimae Guineae orae incolis vis insalubris sunt: Europaeus advena vis quippim prius terrae applicuit, quam illico saepe moritur. Malarum contagio in multa millia saevit: Lindus chirurgusque suo, sicut Jodacis olim in fornacem coniectis, nulla inde casit laesio. Alexander, quondam diei servidissimo tempore, liquore fluminis invitatus, vix dum in Cydonum amnem descendisset, cum gravi inde morbo implicatus est: Romana juvenis, post quotidianas in Campo Martio exercitationes, pulvere simul et sudore persusa, Tyberi impune lassitudinem auribus natandi labore deposuit.

Mali nimirum assuetudine duramus in his, sicut in ceteris rebus omnibus.

De



DE INGLUVIE CRAPULAQUE CAVENDIS, ALIISQUE  
QUAE NON NISI ALIIS JUNCTA MOVEANT.

FEBRE a Britanno homine Inglatiæ non imputari mirum videretur; et nunc præsertim, cum, libefacta maiorum disciplina, lautæ copiosæque vitæ studium, epularumque denum inexplebilis cupiditas, blandimentibus etiam ingeniarum artium lenociniis, in omnes pene ordines incubuit. Et sane minime a vero alienum est, id, cuius quotidianam confectiorem, quotidiana etiam febris imago excipit, inordinate immodiceque assumptum, febrem tandem ipsum accendere. Nec profecto quid respondeam habeo, nisi sic se rem rariùs habere, plurimumque corporis beneficio fieri, ut his qui vel nimium se repleverint, vel parum confecerint, superacuum omne, quæ via primum expelli potest, ejiciatur. Et materia quidem retenta multipliciter infestat, sed non quod febres accendat: Sermoque de eo est, quod sæpius sit, non de eo quod aliquando fieri potest.

Similem sero Ebrietatis rationem esse, et ipse Scotus affirmare possum. Nec amor hujus vulgo nostro, exolecente paulatim vetere in cibis continentia, adhuc excusatus est. Edurimque plebes crapulam et exhalat, in qua quandoque etiam adversos nocentissimas offensarum causas, haud parum præsidii est. Apud proceres, elegantiorumque quemque prisca usurpata mos exolevit, ut rure præsertim temperantia hupercillitatis vicem exlibere videatur: Nec sic tamen minus nunc quam antea febricitant, aut alius inde fructus perceptus est, quam ut morum in convictu frequentius sobillent, et vorandi iude facultatem magis moliantur.

Infinium foret in cætera, quæ non nisi aliis juncta moveant, descendere; nec operæ pretium, cum eadem sæpius dicenda essent. Rebus quidem multum inter se differentibus alia atque alia propria sint, necessum est. Unum tamen ubique servandum est, quod antea quoque proposuimus corpori subesse solur quoddam posse, quod contra omnes externas causas firmat. De quo idcirco, quantum in quaque detraxeris, tanto minus resillet, ut somnium sit et imbecillitate periculum sit. Quæ imbecillitas non ex his tantum efficitur, quæ evidentius vires libefaciunt; sed omnia quaque excipit quæ agitant et convellant. Ex quo Afeci potest, quam innumeralia sere sint, quæ febris ipsas favere videantur, quam aliis tantum injuriis vlam expellant. Quare, quæ ante de contagione cæterisque ex-



posita sunt ita præcipio, ut fatear, tanta ea non esse semper ut febres sola concitent, sed, contra, hæc sæpe tunc solum invasuras esse, cum aliorum aliquid accesserit.

DE CAUSIS CONTRA EVIDENTIUM CAUSARUM  
INJURIAS VIGILANDO.

Evidentes causas vel eas esse possunt, quibus cum sano impune interesse licet, vel quibus sanissimus resistere nequit. Sanitati fere sufficit ratio victus, quæ ideoque utrobique servanda est. Verum equidem, si resistendi facultas constanter requiratur, quam quæ victus prestare queat, præsidium ab his medicinarum partibus petendum est, quæ medicamentis vel manu utant.

DE RATIONE VICTUS.

Victus ratio plus posita est in nocentibus cavendis, quam in curiosis eorum selectione, quæ, his ablatis, restiterint. Prævisis tamen his quæ ad nocentia pertinent, ea potissimum quæ cavenda sunt jamjam executi sumus; nec de cæteris fere habeo quæ proferam. Sed, quoniam minus ex populo videator penitus de re adeo vulgata scire, pauca brevissime indicabo.

Atque longe fugiendas esse tetras stagnorum contagiosisque aures, Cœlumque id saluberrimum esse, quod ad frigiditatem aliorum sazurosque montium latera sit, vel quod aquis puris fluminum vel aliis ipsius maris incumbat, haud profecto opus est ut iterum iterumque præcipiam.

Robur requiritur: Cuique igitur prodest. Cibus quam plurimum capere, dummodo hunc conscriat. Modus desiderio naturali finiendus est; scireque licet, cum nillem esse, quem neque corporis languor nec ingenii tarditas sequitur. Socrates, auctore Gallo, propter summam temperantiam in illius etiam pestilentiae vastitate quæ Atheniensem civitatem depopulata est, insensum valetudine vixit. Atque scilicet satietas nocet: ac abstinentia. Nocetque plus, inopia aquæ premiente; sicut in longis navigationibus cognitum est. Gallus, in aquas suas, de morte invehens, questus est, famem non vixit, sed cibum laxa ante capere. Sed rem sic se habere civium necessitatum ordo requirit; eoque intermisso, corpus assligitur. Utendumque cibo sapius, ut plus ingerat, et exigat, ut melius conficiat. Evidentes causas, serpentina etiam ista, jejuno magis nocent. Utilissimumque est igitur, ubi ex his metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpserit. Corrupta omnia fugienda esse, cuius  
in

En promptu est. Animalia, ut integerrima sint, eo in aestuosis locis attentius providendum, quo id illi factu difficilius est, et nocentius negligitur. Olera, Germanorum more, si bene de nautia mereri in animo est, sale condicienda sunt. Valentissima materia per se semper prodest; quippe in quo plurimum alimenti est. Cibus ex animalibus, qui excitat simul et alit, frigoris calorisque varietatibus inventius officit. Quae non ex animalibus sunt, contagioni stagnorumque virus inimiciora esse, facile credideris: Infirma nimis tamen saepe sunt, quam quae parum assuetis resistendi facultatem praestent; quo minus mirari licet, corruptioni quandoque favere id quod natura sua corruptioni adversa est. Neque non, quandoque facultas his inest ad roborandum accommodata, valentioribus modo utare; robustus inde factus quotidie cernere licet. Indi, Pythagoreis disciplinis imbuti, qui animalibus abstinent, quatenus inde contagioni invaturae occurrant, nescio. Quae adscititia animalium noxa carent, ea equidem in aestuosis locis studius praepareris. Satis roborare posse libentius forte dederis, si hoc quoque non dederis, nullam scilicet ejus facultatem esse quod in tritico valentioribusque ejus generis alit, quae non eadem omnino pene sit, quae glutinis animalium. Profecto Beccarii Kesselmaye-rique experimentis, qui inde similem ipsi nullum fructum perciperint, aliisque quoque inductos sum, ut, de confectione ciborum lentens, in Asclepiadis fore partis transeam, qui caetera supervacua esse contendens, nihil concoqui proposuit, sed crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne deduci. Quae in ventriculo peraguntur ejusmodi esse, igitur conjectaveris, quae utile hoc a supervacuo discernant, et hujus noxia officiant; ni forte statueris, ea quoque peragi, quae efficiant, ut nutrimentum in corpus accommodatius dividatur. Sane, ei quod confectum jam est, nihil aliis opus est, ut conficiatur. Conficitur in farina haud ferus ac animalium glutine alboque ovis; conficique mihi videtur in oleo et gummosis. Saeculari facultates scitius scrutandae sunt. Aliis tamen satis valentis sunt necne, haud omnia credere oportet. Cibi usui, qui ex animalibus, non penitus, etiam in calidioribus regionibus, circumcidendum est. Quid meruisti piscoes, ut Celsus vos gravissimos doceret. Jurulentos, etiam hi quos limosa ferunt, quam praesentissimo praesidio esse adversus febres, aestuosis etiam Senegalliae oris alibique comperit. Sed, hi ne corrumperentur, cautio erat: Frigisque sere coquus, et pinguis alienaque alia admiscet; quo magis

gis videndum, si quando effectus visus sunt, ne falsi criminis positali. Varietate abstinendum; non quod varietas ipsa adeo nocet, sed ne hac sollicitate, homo assumat plus quam conficiat. Ovidius quaerit, unde homini tantis ciborum vitiorum fames sit. Stomachum varietati allucfactum, non postea nisi majore varietate sollicitare licet.

Aqua ad empericendam sitim sufficit; sed aqua pura opus. Non ea pura est, quae ex nive, quae ex flumine, quae fontana, quae fluvialis, non etiam quae levissimis; haec pura est quae alienis quam maxime caret. Aliena haec porosis inhaerescunt, lapidibus quibusdam, arenae, spongiae. Aquas quae ne sic quidem expurgantur acida expurgant: Aceio Romanus miles, alumine luesus alique, usi sunt. Aqua putrescens sibi ipsi pro remedio est, alienis fundam petentibus. Flamma sola puram a marina equam discrevit Londus, ne ab omni parte navigantium desideris non mederetur. Aqua pura satis quidem sit accommodata non Putioni. Quae immiscetur gratiorem reddunt, vel meraciorem. Grata cuilibet pro ingenio seligere licet; potiones meraciores ad medicamenta refero, licet quoque ea quae custodiant.

Quae citra fatigationem exercitatio corporis est, semper roborat; ideoque omnibus febrium causis obstat. Haec arte majores nostri, homines vino dediti, nil inde incommodi perceperunt: Nos, qui tantum de mali remedio quantum de causa detraimus, temperantiores quidem spero, sed non re, scilicet sumus. Nec ingloriosi minus quam crapulae exercitatio occurrit; sicque forte etiam nunc occursum esset, si, quae luxuria invenit, penes rursus alique, id tandem effuissent, ut inertia et mollitia fracti, nec remedia nostra, nec mala pati possemus. Desidia, in calidiorum regionum inha, haud secus morborum incursiones quam hostium invitat.

Raro animi Exercitationes officiant, nisi ingenti acie studio alicui serio et difficili impensius adjungatur, et pertinacius inhaerescit. Atque ab hac sane parte noxae fecari sumus, nisi forte ad aleam species. Id profecto, inter alia Germanorum morum vestigia, retinemus, ut ubi hanc adhuc inter seria exerceamus pari lucrandi periculique temeritate, parique in re prava periclitia. A periculo litterarum studio nil metusendum. Annotatibus odorum capiti, qui ex scientiae floribus allantur, libamus ex omnibus. Nullum nos desiderium tenet ullius otiose disciplinae.

Concitatioris Animi Affectus fovendi; remissioris concitandi. Mente motore gravata, omne ciborum desiderium



rum in sanctissimo fere quoque tollitur; quod tamen instantis morbi indicium est. Quanta oris a metu imminuant, jam in transcurso attingimus. Quam maximum et periculum sit, qui maxime timeret, vel ex hoc apparat. Rivinus summum auctorem testari, se nullum in pelle Lipsiensis aegrum vidisse, qui non ex terrore illam contraxerit. Calavera igitur, urgente malo gravissimo, necesse efferenda sunt, et sepulchro etiam condenda. De invitis in valetudinaria cujuscumque, antea dixi. Quanto, cujusque animo audacia natura vel moribus, tantum illi spes ad defendendum majores. Turis audacia ubi confirmatur; indeque forte increvit, quod lato omnia contineri credunt. Audaciaque haec tanti est, ut, ad hominum animos confirmandos, multa alias vana et superstitiosa praecipienda sint. Non nequicquam itaque, in lustrationibus suis, Jovem, Apollinem, deosque alios, adhibuit antiquitas. Gliscereque morbo, operam dare etiam oportet, ut contagionis ipsius opinio infra et vetusta etiam, quoad ejus fieri possit, radicibus evellatur. Quod si hoc fieri nequeat, quod rarissime potest, tum amuleta, innocuaque alia, plebi venditanda; deorumque templa, antea clausa, iterum aperienda. Nihilque, gravi calamitate grassante, tam ad praesidia utile est aut alienum, quam non, metus amolendi causa, negligere quandoque, aut permittere, necessum sit.

Vires Vigiliae evidenter convellunt; et vigiliae praesertim aleatoriae. Somnum longiorem fere gravitas dolorque capitis excipit, inertiaque ad solita officia exsequenda, sicut quoque in febrium initis. Quam non mane in gravibus regionibus surgendum sit, vel certe progrediendum, non est cur saepius praecipiam.

Contra frigus defendunt calceamenta idonea, amictusque laneus vel pelliceus, strictus forte, et singulos artus exprimens. Laxiores forte fluitantesque vestes, tenues, laeves, candidae, calorem minus retinent et admittunt. Quae fere, quatenusque, Vestitus ratio ad contagionem habenda sit, satis quoque antea executi sumus.

His propositis, Res Venerea minime praetercunda est, quo fonte derivata mala nostra quoque aetas vidit. Quae, quanta sint, et quomodo infecta fuerint, melius forte perspicies, si quae proceres urbanique a rusticis in hac re deduxerint paulisper expendaris. Seta his et rara est matuta aetas venus; spontanea cupidine turgescens, valili et inexhausti, miscentur; et rubora parentum liberi referunt. Proceribus, contra, et urbanis praeterea est pubertas, largiorum epularum irritamentis anticipata; praeterea etiam virgi-



virginibus ab eadem causa protervitas; petulantia lascivae deservescens libidinis uestum excipiens, impudicisque continention lectionibus, scortorumque consuetudine exstimulata; coitus, quos inflammatis sic desiderijs concupiscunt, molles, languidi, corpora animique vitiis omnes prostermentes; complexus denique steriles, vel vitiosis parentibus progenies vitiosior.

Nec concubitus tantum immundicus perhibescendus est, sed omnia alia, quaecunque alias horum facultates sint, quae Hominem Infirment. Cujus generis numerus quam magnus jam accesserit, indiesque major accessurus sit, cequis non perspiciat? Populoque in procerum mores converso, his, nisi me fallit animus, aliquando effectum erit, ut nullibi robustioris improbitatis vitia, sicut olim, offendere licuerit, vel alia quibus praevaletis sanitatis vires se ipsae consiciunt; sed ea solummodo quae corpus contaminaverint, contra tunc nitendi facultatibus orbatur, et ad nullos alios fere usus superstes, nisi ad poenas intemperantiae perferendas. Et ut in aliis medicus versum hunc praesentium morborum statum attendere debet, ita quoque in arcendis, haud secus ac depellendis febribus; quas ne frigus quidem per eos dies Sydenhamiani generis adgnoscat, suique mediatrices, excitare valuerit. Nova contra vereor, ut incubuerit nervosarum, putridarum, aliarumque cohors, a causis antea minus noxiis, agrisque forte insuper curiosis conscriptis ideoque gravioribus, profectae, natura sua perniciosiores, perniciemque certiorum adhuc adlaturae liquefcentibus multitudine hominibus.

Atque haec haecenus, ne populo deessem, de ratione victus protuli, haud ignarus, eos, qui medicorum se legibus obligant, celerius saepe aegrotare, quam qui varium habent, spontisque suae, vitae genus. Et sic profecto causarum evidentium omnium patientior evadas, quam fere cuique credibile est. Nec modum huic rei facile finis, nisi tunc forte liberam cuique, legibusque solutam, vitam agendam esse proponas, si cum minoribus assuetisque versetur; cum graviora accesserint, vel insolita tentant, rationem ejus a medicis petendam esse.

#### DE MEDICAMENTIS.

MEDICAMENTA ea primum exequar quae propria quibusdam casibus sunt.

Cathartica praesidio sunt incolis salubriorum regionum, ut quibus bilis plurimum uberior et nocentior est. Sed medicamenta omnia, *Quae vomitum vel alvum efficiunt, stomachum*

machum fere laedunt, hominemque infirmant. His igitur non pugnandum est, nisi cum supervacuum materiam ejicere convenit.

Pro consilimento acida sunt. Præstunt alias, forte quæras. Sylvius ex aceto solo præsidium sibi contra contagionem gravissimam quæsit. Hausto hujus quotidie cyatho, sanus exstitit: Hoc dum fieret, octo abierant menses, quibus exactis, decrescenteque morbo, remedium omisso: Tum, quoties insecram ingrediebatur domum, capitis illico dolore correptus est, quamvis contagionem illi latuisse ignoraret, et nil sibi inde metueret. Diemerbroeckius ex aceto quoque solo pauperibus multis valentius perceptum esse auxilium, quam ex pretiosissimis antidotis alijs, memoriae prodidit. Supervacua ergo sunt quæ ad acetum calefaciendum adsciunt, sive ea quibus Massilienses latrones uti sunt, sive cætera quæ undequaque medici conquiverunt. Innumerabilia alia mitto. Scilicet usus ipse docuit, acida, quamvis refrigerandi vim habeant, habere tamen et contra contagionem resistendi. Quo magis cuique tenendum sit, si causam hujus rei querat, se ratio ab eis absterreat, quod utilissimum experientia docuit. Acida corruptioni obstant: Eorum quædam stomachi resolutioni adeo non officunt, ut auxiliator maxime: Parva ejus rei copia corpus sæpe excitat, quæ largior certissime solvit. Quæ si minus placuerint, confessionem ego ignorantiae pro causa afferam. Interim, acidis insistendum, si quando contagio terreat.

Quæ sequuntur, omnibus fere evidentibus causis contraria sunt.

Plurima eorum exempla qui ebrii periculo subtrahuntur: Nemo tamen committet, ut semper ebrius sit: ebrietatemque alienissimus status sequitur, evidentium causarum noxas intendens. *Potiones igitur meraciores* sic dandæ sunt, ut corpus quiescat, non ut pollea solvi necesse sit. Quandoque sic utendum, urgente graviore aliquo metu, ut hilaritatem exinde consequamur, quæ tristitiam temporum tandem possimus, haud negaverim. Ex multis quoque, hisque, qui ipsi experiri suorum, cognovi, signis quibusdam adversæ valetudinis futuræ ortis, se, potinibus meracioribus sic haustis, noxam, quod magis quiddam est, vel discessisse vel elusisse. Meracum vinum omnibus venenis contrarium esse, Celsus præsulit: Unicum hoc Sæyer præsidium fuit. Nec tamen multum interest quibus utamur, sive ardens spiritus sit, sive vinum, sive humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus. Valentissimum in omnibus ad defendendum opem esse

et auctores medici ferunt, et in quotidianò usu possum est.

Vino inest gratum quiddam, et quod aliis aliis, nutrimentorum aliorum simile, quibus *opium* caret. His vero ablati, vini spiritus praesidio sunt. Vis igitur quae excitat et inebriat ea est quae defendit. Haec vero ipsi cum opio commune est, quod ab hac parte est quiddam quasi vini compendium. Quam gravissime opium quandoque alienus etiam status sequatur, Haescliquius docebit. Antidotis Mithridatis vix est nisi opium, superchiali titulo audum. In antidotis ea, ejusque generis aliis, quam certissimum esse adversus venena auxilium, omnes pene auctores consentiunt. Utendi ratio ex his intelliges quae de vino protuli.

Nec alia *peti* ratio: Cui vis quoque excitandi et inebriandi est. Diemerbroeckiusque, antiquiores aliquos secutus, sic usus est, ut et corpus suum inde quotidie utrumque excitaret, et instantem identidem valetudinem eluderet. Quem quoque alii recte secuti sunt. Veni, ut supra posui, prava loca verrentes, venenum abvitiis affant. Diemerbroeckius, cui fumum haurire placuit, domi semper haustit. Chirurgus, cujus Chenopus meminit, qui flocci id fecerat, audacis ignorantiae poenas dedit. Somnifera medicamenta alia mitto.

Hac quoque *condimenta* distuli; ut quae et cibis vel potionibus admiscerentur, et sola saepe adhibita sunt. His fere idonea sunt, qui oleribus aliisque id genus vescuntur, vel quibus contra febris obfirmatio resistendum est. Cuique regioni sua sunt. Sit Indica vel Arabica tellus cinnamomi suis, ejusque generis aliis, dices: His parum invident Laidus, Rulli, dum patria ipsi ulli fecat. Linnaeus censu plantarum recto multas in classem descripsit, cui Tetralyanthae nomen indidit: Allia, et quae ad hanc pertinent condimenta, Europae propria sunt. Quod si non fini, auctor sum ut Ala Foerida his suffragetur. Similes ipsa facultates esse, experimentis frater, contendo: Nec difficile est, aliam foetidam sic temperare, ut ab alio acrye distinguat: Allium ceteroquin est et valentius et praeslantius. His quae Mithridatis antidoto, aliisque quae opium habent, junguntur, consimilis sere facultas est. Tantula saepe sunt quae boni nil vel mali praestent. Nec aliter ratio quae calcitranti causa cum aliis macerant.

Naud alienum est, *Peruvianum Cardium*, qui tanta vi resurgere accessioni obstat, et febrem omnino arcere possit. Idco non adhibuit Lancinus, ne in secunda valetudine al-



verisae praesidia consummeret. Ei vero qui sanum se inde praestiterit, adversae valetudinis praesidia adeo non consumerentur, ut superflua forent. Scire tantum interest, an hominem sanum praestet. Bonnevallus, suisque, qui his rebus de die exigua portione vini spiritus, in quo cortex Peruvianus immectus fuit, uti sunt, sanitas incolume permansit, omnibus fere circumvinctis morbo implicitis. Cortici vero ea est plurimum proprietas, ut tantilla ejus copia parum prosit. Nec tamen, omissa cortice, Bonnevallus non aegritasset; eo quippe detracto, in quo forte spem posuerat: Spiritusque ipsi praesidio sunt. Alia experimenta sunt ex quibus corticem plus praestitisse efficias, cum hoc tamen ut confitere necesse sit, *Amara* quoque vices ejus eadem profectu supplere possit. Quibus tamen, si quis longius insisterit, stomachi hinc totiusque corporis resolutionem imminere, omnibus notum. Cognoscendum igitur per experimenta scitis, quanta copia corticis ad arcendas febres valeat, et quam tuto hanc adhibere liceat. Interim medicamento sic fidendum, ut alia magis praestitisse agnoscas.

Si quis cortice Peruviano aliisque destitutus in *Galeham* incidere, nae ei omnis praesidi abjicienda spes esset. Medicamentum ubique fere peritum, vix laudiori usui nociturum, tantulaque portione ad infirmatum hominem reficiendum efficax, haud medivrem opem periclitantibus promittit.

Toto corpori firmando, nihil fere neque prodest atque *Aqua Frigida*. Quo magis haec quotidie lavari debet is, cui cum evidentibus causis gravioribus vel insolitis versandum est. Diemerbroeckius iritationes noxias esse prodit. Neomagi vero fluminum ripae ventumatae erant, et aliena accedebant alia. Subito aqua perfundenda et curiose abstergenda est. Et rubor calorque in summam cutem erumpunt, mens erectior fit, sibi desiderium intenditur, corporisque excipit labilissima agilitas. Quae si cuique accesserint, bene sibi cessisse scire licebit. Nec frigida proinde fugienda vel calida temperanda, quomodo cibus pallida aliquantisper fiat, vel leviter aliquis inhiuerit. Si excelsitatio antecedit, quae citra lassitudinem et sudorem est, haec facile evitari posse experiendo discies. Et fere, si nil aliud obstat, quam ante quilibet plus incohaerit quam aquam intraverit, cu calidior emergit. Si quis infirmo stomachi sit, succurrendum satis comitas parti maxime laboranti esse. Atque hanc fere frigida potio juvat. Stomachu vero excitato, toto corpori prospicitur, utpote cui cum stomacho tantum consortium est. Lapsulique auctor est, nullum,



quo palustris coeli incolae a febribus totentur, praedictius adhuc invenimus esse remedium ipso nivis usu.

AUSILIA QUAE AB HIS REQUIRUNTUR QUI MANU  
CURANT.

Nunc ad ea ausilia ventum est, quae ab his requiruntur qui manu curant. Ex quibus contentus uno ero.

At nullo re fructuosius eorum quae corporis quandoque beneficio sunt, imitatrix existit, quam cum *Ulcera* excitare instituit. Longiusque progressa est, excitavitque sic ut morbos inde non tantum depelleret, sed arceret. Heinsum senatus Venetus eo honore prosecutus est, ut statum ei ad Diem Marci cum inscriptione decerneret, quod patriam a peste liberaverat. Is omnibus auctor fuit, ut excelsis ulceribus praesidium inde sibi quaerere. Neminemque ferunt, qui excitaverat, correptum esse. Quod ita a superioribus auctoribus probatum est, ut valentissimum in his, sed non certissimum, auxilium invenerint. Et observationibus quaque cognitum, cum terrentia aliqua aderant, impetum fere in novam hanc paratoremque viam factam esse, ibique deseruisse. Quo facilius in spem adducere, profecturum id adversus leviora mala, quod in gravissimis adeo profectis. Neque plus profectio ulceribus quae arte sunt credituris, quo fueris ab usu instructior.

DE IIS, QUIBUS CORPUS MINUS OBNOXIMUM INJURIS  
RADDAS, SUMMATIM.

Haec nos de his quibus corpus minus obnoxium reddas. Quae potissimum attendenda esse, ubi causae evidentes adsunt quae maxime per se moveant, facillime dederis. Quando causae istiusmodi sunt ut non nisi aliis juncta moveant, istdem ita insistendum est, ut, cum alia non nisi difficulter fieri possint, his pene omnia credas.

Quo forte in Scotia factum est, ut, febre quiescente, aliquibus fere ex his quae supra indicavimus, hisque solis, recidivae occursum sit.

A QUIBUS POTISSIMUM FEBRES ARCENDAE SUNT.

FEBRES in quemque incidere possunt, si causae harum violentissimae anteceperint. Quocirca, quae de febribus arcendis proposui, omnibus equidem servanda sunt, in gravibus locis atque temporibus. Sed, quemadmodum sunt qui evidentium causarum offensis resistunt, senes, melancholici, assueti, scorbutici; sic quoque qui opportuno illis sollicitior observatio supervacua est. Illi fere sunt qui  
con-

conquiescunt et dormiunt, tantum non omnes; imbecilli quoque sunt, balneo, venere, aliisve causis, relaxari; quibus noxae subitae infusae sunt: juniores, repleti; seminae potissimum gravidae et puerperae. His omnibus acriter cavendum est, ut et causas evitantes caveant, et corpora sua harum injuriis minus obnoxia reddant. Quae ex temperamento tenenda esse censeo, ut his, qui minus obnoxii sunt, circulosorem quoque cautionem praecipiam, utpote in quos febres, quo rarius, eo plerumque perniciosius saeviunt.

Habui haec de febribus arcendis quae dicerem.

Quam rem medici vereor ne, iniquiori cuiusdam judicii, adhuc sic excoluisse videantur, ut, particulas passim quidam subcillus effususque persecuti, universitati minus attenderint. Quia itaque, operae haud profecto nullum meritorius foret pretium, qui, sparsa undique colligens et inter se contendens, breviter ita olim digereret, ut certiora quacumque et simpliciora proficerentur, quae commodis utilitatique hominum latius servissent. Ad ejus labores, aliqua, sed parvula saepe, ex parte, levandos haec dicaverim, nisi quod laudaverit, nihil inibi inventuram perspexissem, nisi voluntatem.

## D E

INCIPIENTIBUS FEBRIBUS  
DISCUTIENDIS.

**E**CCE iterum Stahlum morandi causas nescientem: "Valentinus hoc genus nunquam fuisse per se pestiferum; febrem actum esse, statuto semper ordine, statimque viis medicatricem; huic vere intellectae nullam praestitam artificiosam curam satisfacere posse, sed omnia dirigenda ad optatos eorum eventus quae discernenda demum et excernenda sunt." Stahlumque adduxi, utpote in his omnes propemodum medicos adfuerunt habentem. Sed medius fidius quorsum tandem eorum praecptiones

ceptiones pertinent? An, uti homines eam febre e medio sublimis esse falsi, & febre sancta omnia semper et feliciter mitigasse, perpulchre emendaverunt? Quasi quis per res ipsas non moverent, eus eliam per verba quam manifestissime data permoverent. An, ut ad diligentiam eorum imitationem accenderent, quæ corporis beneficio sunt? Scilicet, est eis in opere Hippocrati successus suos prospectus invidemus, qui, postquam in venditara hac imitatione consenserat, & quadragesis et hinc fabricantibus sibi commisisse, quinos et vicinos morti tradideris. Divum hercule senem, licet sacros vetustate lucos, adoramus, in quibus grandia et antiqua robora jam non tantam habent speciem quantam religionem. An denique, ut, præcisa omni aliter perfundendi spe, medicus, haud ultra addubitant aut inquirunt, quasi sic in intima scientiæ penetravisset, vixit imitatoris partes patientius præsaret, ac serenus ageret? Hoc minime mihi insiciendum sumo. Maxima, ultra proficere, in constructione corporis, adfuit adversus terribilissimas etiam febrium causas præcidia; quo minus mirum videatur, si aliquis, his solummodo intentus, hujus solius ministerio cuncta crediderit: Natura, omnium profecto consensu, curandi capacissima esset habitata; nisi curavisset.

Tota, si quis video, huic recidit disputatio; Artem consiliorum ad summam moderatricem esse, nec in seculum curationibus quidquid vel posse sibi vendicare vel debere. Cui rei ego, febrium perniciosissimam ubique naturam medicique circa ægros officium nunquam non ob oculos versans, sic respondeo; tum demum curationis in se summam suscipere non debitorum, cum nullo cum profectu potuerit. — Quocirca in id mihi unum incumbendum esse censeo, ut incipientes febres discutiendi spem, non tenere quidem, sed ex re ipsa conceptam esse, ostendam. Id aliter non consequi me nequire doleo, quam si nudam scire, turbationemque eandem, eorum expositionem proferam, quæ experientia me in ipsis curationibus docuerit. Quam ideo postulo, ut tu, pro candore tuo, paulisper meum velis expendere.

#### *De Vitiis Ratione.*

Letum victus in primis rationem habiturus, febri tantum hominem, simulque accipi, sic tenendum præcipio, ut frigidulum Aërem ducat; frigidulumque volo, utpote qui uis cognovi, calorem etiam per horrores febrium intendi; nec tamen frigidum, quippe cum idem uis

ostendit,



ostendit, id utique non perpetuum esse, ferreque, ut fallor, quo propius insitis experimentum factum sit, eo magis vera frigescere. Caveturque curiose a varietate, cum aliquae earum alium, quas quis habere possit, incipientis scilicet notae; secus sane ac verascerne modis ignis est. Et frigidulus etiam aer, aequalitatis causa, febricitantium convenit; quippe apud quos saepius longe fieri possit, ut calorem subito frigus, quam ut frigus subito calor, exciperit. Sed plurimum ante omnia interest, ut aer quam maxime purus sit; calidior plane aer nocuit, sed frequentius multo impurus, non equidem tam suo, quam calidioris nomine. Quae de noxiis effluviis cavendis superius a me tradita sunt, et hic locum habent. Teneturque potissimum in amplissimo conclavi seger, ut multum aërem trahere possit; singulis ideo momentis renovatum, nec tetro, quem cum spiritu assidue emittimus, veneno infectum. Nec totas aperire fenestras jubeo, ex quo nimium in hoc statu totius cubiculi frigus sit; nec parcius junctas laudo, per quarum spiramenta venorum rivuli, necopinantium membra aliqua perant: Tutius aër superne demittitur; dandaque etiam tunc opera est, ne recto in febricitantes feratur impetu.

Carnibus piscibusque abstinetur, ne febrem incitent. Nullaque varietate imbecillae etiam matetiae sollicitatur aeger, si cupiditas desit; quo nihil profectu apud mulierculas celebrius est. Atque sic quidem consequuntur ut aegri tandem stomachum offendant, medicique saepe conturbent rationes omnes; non ut hominem ita nutriant, ut longum affecturi mali spatium sustineat. Nunquam vidi cui opportuna abstinencia nota fuit; plurimos quos cibi alieno tempore dati afflixerunt.

Quae ita tamen non tueor, ut anxii inde aegri cupiditatibus abisterem, quae, vel etiam quod molesta sunt, laedere possunt. Pro remedio enim voluptas est, cujus consequutionem ipsa molestiae detractio avertit. Libentiusque subscribendum erit, si cupiditates caecae sint et praecipites, quas ejusmodi saepe corporis constructio excitat, ut res solummodo expleturi, depulsionem simul morbi assequamur. Quibus aditus ab intelligentiori aliquo judicio est, ut minus fidendum; et de his facillius quidem cum aëre ratio est, quoniam stomachus saepe ea respuit quae mens concupiscit.

Vestium quoque ratio sedulitatem exigit. Quod tanti est, ut haud semel in valetudinario nostro adnotaverim, febrem, quibus cum primum delati sunt penitus insedisse  
prac-

praelegiveris, veteri veste stragula relicta novaque in ejus vicem suscepta, subito adeo, sine ullo alio remedio, defecuisse, ut periclitantium necessarios admiratio ceperit, velut si ipsum valetudinarii coelum eos restituisset. Sed quae ad hanc rem pertinent supra satis comprehensa sunt.

Nemo nunc concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam, in hoc morborum genere prodesse contendit. Recentiores medici Aesclepiadis haec, non solum ut vana, sed ut superflua, jure fastulerunt. Etenim ulterioribus non solum diebus, sed primis etiam, nubantis ita luxuriae adreperunt, ut gratissimum in cubuli dormitorioque cubiculo quod diem, clamorem, sonum, excludit, haberi cum praecipiant, erigere se, voce contendere haud satis tuta esse proponant, lectionem, negotiosam actionem omnem, cogitationem quoque, quantum potest, circumvidant; omni denique modo molendum esse contendant, quo minus sensus aliqui ingrati vel turbulentiores animorum motus concitentur. Quorum nihilo secius non semper eadem et ubique ratio est; potissimum inter febrium initia. Scire utique unumquemque decet, nihil sibi antiquius habendum esse, quam ut aerem vestitumque purum adhibeat, horumque evadendi gratia in aliarum quoque offensarum periculum incurrendum esse. Recognitis quippe quae in medicorum monumentis, perpensisque in quae in quotidiano usu, apud valetudinaria praesertim, collocata sunt, apparere cuilibet potest, optimo et hic cessasse, quibus, tantisper, dum ex gravioribus ad turciora loca deportabantur, parum prosum est, ne per plurima etiam fatigarentur et convellerentur. Multiplici etenim experientia constitutum est, medicinas inde locum factum esse, quem immunditiae antea impediverant, periclitantesque, vel subito sic, ex toto, febre caruisse, vel curationem, quibus frustra olim fuerat, celeriter tunc haud secus ac feliciter processisse.

Caetera quae hujus loci esse videantur, vel misce, vel jam exsecutus sum, vel postea exsequar.

#### *De Sanguinis Detractione per Venas.*

Sanguinis detractionem melius in valetioribus sustineri, in plenioribus, in junioribus, infantibus demptis, in frigidiore locis atque temporibus, usus ipse videtur satis docuisse. Interesse inter valens corpus et obesum, celeriusque qui nimium est pinguis affligi, et apud Celsum invenias. Obesis omnibus pinguedo abundat; quibusdam et

et sanguis quoque. Hoc in quoque, si ex arteriis, ex ipsa specie, vel aliter, assilare poteris, in promptu est, plus huic sanguinis nutriendum esse. Quam etiam inter valentes et plenos quosdam interit, quam maxime quosque, auctore me, accurate addecer. Alius quippe longe vixit exercitatus humilibus fabelli, modicaque victus assuetis, ac ebriosis nequam vel voracibus, sed potioribus etiam luxuriae vitiis, aliisque quam cupiditas vita plenos fecerit, prioribus similis est et stabilis, posteriusque speciosior quandoque, sed fugacissimus. Quinctiam ipse pleniores ejusmodi vidi, quibus sanguis vixitum missus est, vel alia quae demendae materiae sunt adhibita, cum vires hoc modo vixitum continuo labactatae contiderunt, retroque omnia quasi ruina quadam revoluta sunt. Suspectissimaque his eorum huius habenda esse, eo acius commoneo, quod haud oblitum est tate, ut mascula vulgatissimaque horalli disciplina, non solum apud Gallos suos, quod sit, exultare incipit, sed ut medici Britannorum quoque, quorum regio frigillior robustioraque corpora accommodatius huic patere videntur, gliscente lautioris victus studio, magis eandem magisque indies abstinere cogantur.

Neque solum haec consideranda sunt, sed etiam, morbi genus quod sit, ejusdemque quae habeantur indicia. Erravi kraestatus, qui febrem nullam sine inflammatione esse dixit. Quod si quis febrem quae intermittit primariam esse febrem contulerit, et in quam caeterae alias, dempto quae obstitant omnibus, verterent, in nequaquam, haec de Celfo collibuit, in antiquiores quosdam medicos invehetur. Hi, quippe nullam febrem, nisi aut ex inflammatione, aut ex vomica, aut ex ulcere, inordinatam esse proposuerunt. In qua re eos haud adeo oscitanter hallucinatos fuisse, incisa deinceps mortuorum cadavera repraesentasse videntur. Haec si sequimur, in proctivi erit, ut hoc auxilio magis in febribus succurrendum sit, in quibus notari neque tempora eorum neque spatia possint. Febres vero quae incipiunt omnes vix quidquam aut nihil remittunt, sed uno aliquamdiu tenore continuant. Ex quo tandem colligere alicui licuerit, sanguinem, potissimum in principis, detrahendum esse. Quod profecto usus, etiam in febribus quae postea intermittunt, confirmavit; velut, videlicet, inflammatio id exegisset, quod febris ipsi alienum est. Lubricum vero quodammodo hunc locum esse, moderatius nunc subsiciendum est; siquidem cadavera mihi etiam in conspectum dederint, quibus febris uno propemodum tenore continuavit, nec tamen ali-



qua signa aderant, unde inflammationem vel esse, vel fore  
scire, constiterit. Non plerumque tamen id fidem non ha-  
bere debet, quod per plurimos homines respondeat.—  
Ipsa morbi indicia magis eo corporis visenda sunt, qua  
castela morbi certa habeat. Viminisque sanguinis detrac-  
tio videri debet, si simul aliquid atque febris invadat la-  
chrymae sine voluntate profluant, anima deficiat, vel nervi  
dissimulantur. Pejusque est, intentionemque observationem  
postulat, si quibus pora sunt, si quibus vallis corporis est,  
si plenioribus quae mori memoravi ea accesserint. Si tem-  
pus ullum iure sanguinis mittendi est, certe illud iustum  
est, cum aliqua inflammationis ipsius signa adsunt. Quae,  
quatenus inter istia Edinensium febrium adesse consueve-  
runt, supra proposui. Raroque quemquam vidi, cui in  
toto corpore solummodo, et non simul in parte specialiter  
aliqua, vitium fuit: Quo magis huic medicinae insulen-  
dam duxi. Per frigorisque et horrores, Mouronem, quem  
honoris causa semper nominabo, secutus, sanguinem ef-  
fudi, nec hominem jugulavi. Morbus scilicet id deside-  
rat, quamvis homo vix pati posse videatur, id ex quo fu-  
tura plerumque inflammatio est penitus insidit: Sanguis  
missus vehementiori ejus impetui obicit, corpora efficien-  
tiam salutarem non tollit. Sed haec utcumque sint, mini-  
me reticendum est, id quod res habet, sanguinem, nimi-  
rum cum nihil aliud prohibebat, nulla frigoris horroisque  
ratione habita, adeo non, quatenus usu comprehendere  
potui, nocuisse, ut mala id quae erant, aliqua lege semper  
ex parte, allevaret, et medicamentis quae proxime dan-  
da erant viam cepeliverit.—Neque nihil interesse putari,  
quo ferramento emitteretur. Cujus rei cognitio, cum ad  
plura loca pertineat, et etiam ad hanc pertinet: Inciden-  
da vena est scapello minore accipiti, in mucronem acutissi-  
mum, ad hunc utrumque modum, longe extendito.  
Quin, si sicut Alexandro Wood, manu stabili, prompta  
evulsionem ferramento ejusmodi, qua est in omnibus in-  
feris, est quoniam interfueris, nec in exemplis, pro inge-  
ni tui docente, caetera quolibet alia in perpetuum ab-  
dicare. Sic enim vena simul et vasis proculdubio mole-  
sta quam levissima excitatur, sanguis pro plaga laetissime  
erumpit, utique ejus, quod usu comperi, sine deligando  
saepe necesse est, prouti cernit. Cane igitur prius  
singul videri sunt, quae aegris, percussorem adiuvet, ad-  
sum, scapella magna sua, vel pugnones potius, cetera in  
brachium adsumi. Qui, quam turpiter humilis, difficul-  
terque saepe sanatura vulnere indigent, quam cunctis de-  
nique,

nique, eorum contraria quae supra scripsimus, consequantur, quotiesse profecto apud chirurgorum vulgus cernat. Cui demum ferramenta sua accommodatiora esse, minime negaverim. — Delicere animam in ipsa curatione pessimum videatur. Qui sic deliciunt, is haud raro sanguinem iterum tertioque mittere necessum esse, Whytum olim juventuti in scholis transluentem audivi: Quod item post mihi ita usus ostendit, ut sic sit quidem, quandoque, omnis inflammatoria indivium excederet. Utilius sanguinem effusum esse iudicavi, si subalbidam superne glutinosamque speciem induerit, nuperrima medicorum experimenta parum moratur; qui hoc quidem demonstrasse videntur, sanguine ejusmodi absente, inflammationem illico minime abesse, non coloris ejusdem habitusque sanguinem febricitantibus, sine inflammatione detrahi. Infirmamque ego in recenti re cunctis securior, cui omni confestim studio contendendum erat, quo infirmitatis causa occurrerem.

*De Slibio per se dato.*

VOMITUS in febriam protinus principia elictor, sanguinis modo detractio antecesserit, tutissimum esse semper febricitantibus, idemque praesentissimum saepe praesidium, in quotidiano aperte usu ponitur. Quo minus de medicina moveri videntur, qui eam rem suspiciosius et conjecturis amarguere maluerint. Cogitanti profecto mihi, memorisque eos, qui plurimi hanc sunt, quibus slibium adhibuit esse videtur, speranti, quam paucissimae quis discesserit febres esse videntur, ubi vomitiones non emicaverint. Nec de omnibus loquor qui post slibium melius se habuerunt, sed de illis quibus inter vitia effectus subito ita erat et evidens, ut, quid potiori fore medicamento vendicandum esset, clare consisteret. Optime etiam his cessasse vult, quibus alveae quoque descendebat. Et, quavis alvea simul vomitusque morbo, sedat sere aegrius procedat, slibium, quae discessit febres, quoad longissime recordari possum, non sumam sic video, sed somno in sepe et fudore discussit. Ex quo curiam forte in praeceptum est, quod idem memini, cur vomitus ipsoque, defectionisque alii doctrina nullius, cum slibium ejusmodi esset, ne manifestam solammodo vel sudorem eleret, medicamento huius, illius minus valenti, discutienti facultates imperitille viderentur. Quae sic accipere velim, ut, nec ei tantum quae acta sunt sint proferre, quisque intelligat; integrum omnibus servare, ut, quid inde agendi ratione veritas promissum, ipsi statuant. Solum febribus ingreditum esse,

cujus vires ob aculas positae non fuerat, aperte proloquor. Penitus etiam insipientium curationes sic saepe perfici, sunt qui perhibent. De quorum decretis, meam qualemcunque sententiam interponere non necesse est, qui de febribus penitus dissentiendis agam. Hanc cum multum fortuna conferat, rerumque diversitas aciem intentionis abrumpat, exploratius cuique advigilandum est, ne quid forsitan fraudi sit, neve observationum quisque suorum, observantis etiam gratia, studiosior, secundam valitudinem medicinae tribuat, quae corporis beneficio contigerit.

Sibium ejusmodi sunt, quae prius in valitudine assunt. Sulphuris, quantum satis erat, paulatim primum igne vaporaverit; tum metalli quod superfluit, ejus tunc cineribus utcumque solutis erat, nitrique contriti partium modum commiscuerit; hujusque plussculum assidue in fictili mundeferre conficere pergentes, totum denique, praestita flamma, ex aqua abluerunt. Cujus post in vivam, quod opusculum fieri videretur, expeditum hoc, ad idem, suffusionem est. Sibium habet partes quatuor, nitri partes septem; quibus separatim contritis, et in unam mixturam junctis, ignis, perinde atque priori medicamento, adhibetur. Metallum ejusmodi rursus plerumque datum est, et post mercurium, rursus mercurio quoque. Namque maxime, sicut alia plurima, movet; adeo ut, si quando medicamentum valentius pactus fuerit, minus tunc dari conveniat. Spem interdum frustratur: siquidem omnia quae ex sibio sunt haud eadem apud omnes praestant. Neque praeterea crimen generis est, si quod metalli naturae sit, vel hominum proprietate. Per multos plures aegros respondet, postea efficacius in aliquo quam experimentis comperti sunt. Atque inde quoque, quod deorandum est, colligitur, quod, modo, ad scripturam duo est, vel unum vel ad decemnam tantum, saepius. Nec aliterum fere alia ratio est. Quod ex sibio sit, et crystallis rursus, fore aliquando, ut certius habeatur, spem est possessione ex medicorum industria facta. Tunc in quod vulgo adhuc adhibuerunt decipit, quod est ipsum metallum; quin etiam facultates ipsa via aliter cogitatae sunt, medicamentum tamen fide ideo facta, quod longe saepius responderit. Atque huc quoque adversus febres potest. Arcummodis quoque parula ejus paulatim portio ex aqua sumitur et gratius. Cujus atque, ex quo usus apud mediam percrevit, sibium febres efficaciter satis moderari videtur, in ipsis primis principiis discutisse rati. Quia profecto a sibio febres proprie certiusque solutae vidi, eas plerumque metallum testibus, nulla ab acidis



perdidit auxilio accita. Sudori etiam magis movendo est, cum ad cætera minus valet, convenientiusque his est fere, quibus alvus ante inferior fertur. His tribus vero simul facultatibus, vomitiones extrahendi, liquandi alvum, sudores eliciendi, unum omnium maxime florere videtur.

Hæc enim librum laudibus extuli. Quod, si vitia quoque ejus conarguere præterivero, officio male functus essem. Igitur, si miores ejus facultates sint, quamvis moderando proficit, febricitantes diu tractus antea fere non expedit, quam febrem sponte quiescentem credideris. Neque illius valentius quodlibet non anceps est. Modo actio evitentissima est, profectus absensibilissimus; rarius vires tantum convellit, ut non solum imbecillos, sed valentiores etiam, opprimat. Sæpius denique læta remissionis spe, atque in ea curationis facta, in pristinam confestim pravitatem omnia de improvido recidunt. Pro vitili igitur parte monendum est, ut certius curationis genus, ilemque tutius ac jucundius, consequamur; ea tamen moderatione, ut omnia ista contingant, prima semper salute habita. De quo prolixius dicam.

*De Stibis simul vel Doveri Pulvere, cum Balneo vel Fomento.*

Quæ experimenta diluissimus balneum febris accessioni occurrere, in comprehensibilis loco, ubi de cayendo humore præceptum est. Sed cum, balneo omisso, febris plurimum repetere perrexerit, alia conjungere visum est.

Sanguine scilicet prius detracto, vomituque, si opus fuerit, elicto, febrientis humo, ante fere quam gravior accessio instare solet, in balneum ducitur; sic tamen ut initium interitum capiatur, quo famulorum commoditas ministerio medentiumque consiliis uti queat. In aquam calidam sic demittitur, ut a pedibus hæc ad cervicem tenent, coacte cooperta, vaseque ipso in quo aqua est curiose ita vestimentis involutum, ut ne ad eum frigus adspiret. — Quod si balneum non est, calidis, silemque humidis fomentis, fovetur. Linea nimirum omni velle amota, æque in cubili resupino jacentis, panni lanci, ex calida pora, vel cui æcerum adjectum est, prius succidi, fortiter mox expressi, corpori circumdantur; et capiti etiam, si id ante ad cutem consuevit fuerit. Ac, hæc mature sublatis, alique viosissimæ atque alia, in eorum ante locum quam priores infrikerint, suffectis, usque eo res continuatur, dum tempus ejus præteriverit. Daturque inter hæc quoque diligentia, ne frigus in ipso opere excipiat; quod tamen,

men, nisi culpa vel aegri vel curantis, fieri fere nunquam potest.

Horum utrobique per horae dimidium praevisto, et calore tum plerumque prodente, febricitans cum stibii vim levaret, quae alias vomitui movendo esset; vel pulveris quae Doveri est drachmam semis aut scrupulos duos, vel similem ad idem valetudinarij Edmendis compositionem. — Quod datur stibium, id est, quod, nitro juncto, expeditius fieri dicitur. Vomitiones nunc raro elicit; sed nauseam solummodo movet, eamque fere levissimam. — Nec alia est Doveriani remedia ratio, omnium forte nobilissima quae ad modicam referantur auctores. Febres sunt, quibus dolores ejusmodi accedere consueverunt, ut fere pro rheumatismis habeantur. Ad quas juvandas, cum huius maximam inesse gratiam observaveram, in aliis quoque insillere institui. Et adversus rheumatismum equidem, quomodo per se sedari, sudor modo plurimus oritur, nec febrim excitat, nec calorem intendit. Sudor, si pro votis non profuerit, alios non faciat, ut alias, in propinquo est; ut, quod hujus causa quaesitum est, in offensionis etiam acensationem incutiat. Cui offensioni valde sic vel fomenta obviari eunt, ut sudori etiam movendo medicamentum periculosum reddant. Quod, his rationibus permotus, nunquam desinens ab illis, ad febrium curationes divellere decrevi. Ubi omni facultate ac laude stibio id par adeo ac simile fuisse deprehendi, ut, cui potissimum in hoc genere palmam deferam, anceps adhuc cum animo trahere cogar. Stibium in specueuqbae vim danti, recentiores quidam, haud sine causa, desiderium tenuit. Vinum vero, quod Benedictum vocant, cum tinctura simul raebois haustum, vix, quoad vidi, tantum praestitisse videtur, quantum antiquius id et pervulgatius quod Doveri ipsius est. Stibium ipsum, cum opio ipso confectum, quod prodest, incertiori adhuc nititur conjecturae solo. Majorem quam de hoc concipio spem, meritis olim superatum fore, dies constituet.

Haec dum sunt, balneo nihilo secius vel fomentis tandem insillitur, donec integra in his hora expleatur, vel quoad frigando offenderint. Quorum ad finem ubi ventum est, humore omni amoto, aeger novissime detergetur, indusium induitur, et stragula veste multa, rara, et levisima, velatur. Curiosaeque prospicitur, ut omnia haec ex lana fiant; non sic tamen, ut, qui hanc perhorrescant, linteam his indusium permitti nequeat, non ex alieno quolibet detractum, hujusque fœdibus succidum, sed puris-

Simum semper et siccum, et, sicut cætera omnia, ad ignem impetactum. Cujus inter et hominum calorem, nihil quæ hujus rei sit interesse, idonei etiam auctores ex populo sunt; siquidem Feijous hoc jampridem, inter plurima illiusmodi præjudicia, Hispania sola excutere annis est. Pedesque insuper panniculis, ne infrigescant, involvuntur, vel calida repleri utriculi his admoventur, vel arena lavicis excepta.

Inter hæc, ingens fere sudor, ilque gratissimus, per omnia febricquentis membra effunditur. Cui, ex quo hoc incidere, nec motorius, aqua calida potui datur, ex farina vel pane prius decocta, vel herbis gratis quibuscunque superinfusa.—Frigidane recte abstinuerim, dubito; qui animalia, quorum arterias exercitatio concitare continuat, rusticusque homines, quibus febris est lætænis exercitationis æmula, impune quotidie ingerentes videam. Neque frigida non præ medicamento adhibita est; siquidem qui sub cautionibus medicis trahebantur, non desunt qui sic expediverint. Ad quos spectans, sacrificium maluerim Sylviadensem imitari, quam Petronem, quorum utriusque temeraria quidem medicina erat: Illius vero tutior eo et probabilior, quod frigidam non ante præcussit, quam sudorem plenius movisset.—Aqua calida interea datur, et satis liberaliter. Propter imbecillitatem quoque, vel ægræ cupiditatem, elbo subvenitur, sed ex levissimis; cum eo tamen ut jusculum ex pulli gallinæ, vel meraculum quoddam, nec multarum virum nec ingentium, vel alia ex media materia adiciantur, si necessitas urgeat. Et sic sudor producit, spatum ejus sustinetur, et somnus fere obrepit.—Ad quem prohibendum vel abruptendum, Meemerbroeckii plus sæpe apud me auctoritas valuisse, et sacrificuli Sylviæensis sui, à Sydenhamis, viginti quatuor horarum sudationis aspiciatissimus auctor, illam ejus rei mentionem injecisset. Qui sub diva dormiunt, somni sudori obrepissent et insisterent: Non itam velle multa in cubili cæsi, qui tunc fere sudore dissuunt. Et Asclepiades æmuli eo consilia vigiliæ concessisse videntur, Labrumque, ut jam dixi, eo sæpe effectum datum est, ut ex utroque plenior tandem somnus, et in eo sudor, et ex hoc sanitas, fieret. Quæ tamen non tanti facienda sunt quanta æger; cujus causa, si alia minus proficiat, experiri aliud atque aliud convenit, ut tunc quod experimentum approbaverit, quamvis sic etiam tortoris vicem exhibeat. Quod tamen hic non opus est.—Sive somnus, enim, obrepit, sive non obrepit, res fere eadem resti: sudor



sudor in multas horas porrigitur, longum ejus spatium sustinetur, arteriae minus minusque inordinatae sunt, accipit ipse in melius meliusque inclinare valetudinem sentit, terrena omnia sensim sine sensu evanescunt, donec, sudore simul et mela finis, ad integritatem tandem ventum sit.

Aeger tandem in lectulo continetur, nisi magnopere aliqua res prohibebit, donec sudor sponte constiterit; et quo tempore eunque hoc fuerit, dum viginti quatuor horarum spatium sit ex quo principium captum est. Si tunc, si febris superstit, vel terrentia maneat, non desistere convenit, sed iterum omnia experiri, sicut supra praecepta sunt; siquidem, quod primo vel secundo die curationem non recepit, tertio demum juvenis pertinacia vicit. Num, si primis diebus discussa febris non sit, incidatque in vrsutatem, sero nimis medicina haec pareatur, aliudne non deinceps ex toto sequendum sit medendi genus, cum experientia non comperiverim, nec confirmare argumentis nec refellere in animo est; pro ingenio suo quisque demat vel addat fidem.

Neque sane ista nova sunt, si cui forte nova displiceant, siquidem, ne alius reperam, ante Sydenhamum in Britannia quoque reperti sunt, qui sudores inter febrium initia, sed calefacientium opo, moliebantur. In quorum remedia peritissimus ille medicinae dux tanta merito indignatione exarbit, ut, minus sic quid victoriae obllaret sentiens, prudentiores quosque ab omni illiusmodi evagatione in pulchrum absteruerit. Cujus placitis, mordicus semper atque, eo adhuc in his libentius devincimur, quod, inaequales coercentes sudores, qui per primos sponte febrium dies, cum insalubri plurimum effectu feruntur, quam consilium illi cogitateque fiat, quotidie sane ornamus. Minus tamen ideo oblivisci deoet, temeritatem saepe proferre, inter plures male habidos, plures quoque adjuvare. Suique, scilicet, tantum ad discutendum profuit, ut contraria aliam remedia parum noverant. Sydenham qui rationes istas expendens, easdemque artes excoluerunt, via est deo temere suspicari volumus, quin si sumi hoc fructum reportare queant, ut prospicere alium eventum, nec pravi consilii, rem gesserimus.

*De Chalphe Peruvianoque Cortice.*

RICHARDUS III.—*REX:*

*But shall we wear these glories for a day?  
Or shall they last, and we rejoice in them?*

*Duc.*

## BUCKINGHAMIOS:

*Still live they, and for ever let them live.*

SHAKESPEARE.

Id votum est. Frustra venit integritas, nisi immoratur. Sæpe tamen in hoc genere valetudinis jam finivisse febris videtur, et rursus intenditur.

Quod si remedio nusquam fere non reperiendo, pauperum uniique facile comparando, tuto eodem nec ingrato, efficaciter occursum esset, dubiis medicinae rebus haud male consulissemus. Igitur tertianarum accessiones providere ne accederent, aggressurus, oculos in CHALYBEM conjeci. Sal ejus stomachum facile offendit; quem idcirco Laghiana machina ex inferioribus partibus in alvum infudit. Metallum limatum, id in corpore emissurum quod ex aquis haud paucis aliquamisper exhalans in laudem immerito sulphuris habetur, valens adversus ea quae intus concessere solent auxilium, et, in morbis quamplurimis longis, roborantis vicibus quam efficacissime fungens, devorandum praestitit. Sed, quatinvis duobus hominibus sine noxa maximam utriusque vim ingesserim, nec semel id tantum vel iterum, sed saepius, nihil inde boni confectus sum: Neuter a febre liberatus est. Et Peruvianus quidem cortex, in eo qui metallum devoraverat, paucis admodum horis morbo plane occurrat; idque ejus idem et etiam minus pondus, quam quod metalli incassum, simulatque accessione levatus est, per quatuordecim fere continuos dies datum fuerat; quatinvis febris circuitus esset certus, finis integer, et liberaliter satis quieta tempora. Quod non profuisse, alicui forte in Galeati Menghiniue partes propensiori, idcirco visum fuit, quia, in urina, id nec Borussicus cinis nec gallae demonstraverint; nisi utique Wrightii contraria utcumque existerint experimenta, et Menghinus ipse, ferreis ploribus in hominum sanguine quam quot ante ineant particulis repertis, vix ac ne vix quidem in urina offendisse se falsus sit. Quibus factum est, ut Chalybem a medicamentis quae febribus occurrant avellens, ad ea tantisper differam quae feriant arceant, dum comparata aliquando fuerint quae facultates ejus sic intendant ut celeriores sint. Quam inanem interim lusitanti operam, quam falsa spe ductus sim, res ipsa locuta est.

Medicis utique majorem umbrino in modum CONTRITIONEM opus est.—Propitius in quem voluntate aliquis forte fuerit, jam inde ex quo apud medicos increbrescere coepit, ut, veterascente re, in omnibus propemodum febribus li-

lentius darent; siquidem quae in vetustis duntaxat imbecillitas vincat, et eadem fere in infantibus occupet. Quod idem, ut praetermittam quae integritas vel remissio excipit, in lentis minus difficulter putridisque etiam febribus adlenteris. Fidentius porro, et in illis quoque quibus inflammatio subest, adhibendam censui; utpote, qui rheumatismorum doloribus ante sudore discussis, alias vero mox reversuris, corticem occurrissile compluries comporiverim. Quae, quamvis mihi dederint ad unum omnes, abstinendum omnino, si tussis exerceat, prout est contendant. Et tussis sane formata febrem quandoque antecedit, quam cortex exasperet. Male haud tam tamen per febrem solummodo accessionem habet; nunquam fere non tunc ingravescit; est denique, si me audis, febris saepissime ipsius indicium, una invadit et una tollitur. Quinetiam cortex adeo non officit, ut quod aliunde etiam profectae tussi a febre, ut fere sit, accesserit, plerumque finiat. Medici a cortice abhorrentes, si tussi quis consisteretur, quid huius consequantur, nescio. In periculum certe eorum incurrunt, quae nec pauca sunt nec levia, quae longa febris asserere solet, et, tussis vel intendendae meto, huic morbo opportunos, in veram etiam phthisin quandoque praecipitant. Quae, si ad insitam forte animae tuae evellendam opinionem, parum, quod veri nimis simile est, valuerint, aegrorum causa dolebo. Vellem tantum, quam lente quae de hac re protuli amplexus sim, vidisses, quam non in uno porro homine, nec semel, sed in multis, observaverim, aliunde volens quam ab ipsa natura auctoritatem quaerere.—Haec ut ut fuerint, causae profecto nihil apparet, quin, simulatque corpus integrum sit, ad corticem decurramus. Materaeque hic facti opus est, rapiendaque sunt cum quadam etiam temeritate auxilia; si enim in occasionis momento cunctatus paulum fueris, nequidquam mox omisum quaeras. Hujus ergo uncia quem ocyssime possit devoratur, idque vel per se vel triticea quadam chartula involutus; vel, si stomachus parum contineat, ex aqua menthae prius piperitidi superinfusa: Eiusdemque deinceps drachma, quater indies praestita, sufficit. Atque sic tandem debellatum est, ac ad ea devenit quae cuique fere tenenda sunt, ex quocunque demum convalescat morbo. Solliciteque quis inter alia custodire debet, post omnes febres, potissimum post eas quae continuantur, ne in vitia phthisin inferentia incidat; post eas quoque quae intermittunt, ne in hydropysem. Adversus quas, quemadmodum adversus multos alios morbos, quantopere tartari

cristalli



crystalli valere expertus fuerim, non Menghini more dati, sed sic ut maxima eorum identidem daretur vis, in praesentia exsequi nequeo. Desinente sic febre, ut multum quidem ex ea minuatur, reliquiae tamen quaedam remaneant, totiusne sit cortici insistere, quam in balneum iterum ducere, vel somenta circumdare, et caetera de integro adhibere, quae supra comprehensa sunt, consulendum erit ex his quae usus ostenderit.

Miram equidem videatur, medicos, quorum saepe remedia incipientibus febribus tantum proficere, ut spes inde haud levis salutis affulgeret, committere unquam potuisse, quin, consilii inopes atque incerti, eo confestim confugerent, quod, dum in malis versabantur, fidem toties his, idque etiam praesentissimum tulisset auxilium. Corticem his, videlicet, continuo ingerere, haud secus ac Hannibali, statim post Cannensem victoriam, Romam contendere, nimis forte laeta res est visa, majorque fere, quam ut statim eam animis capere possent. Non omnia atque iisdem data sunt: Vincere utrique sciebant, nesciebant victoria uti.

HAEC sunt fere quae de febribus nos incipientibus discutiendis pericula ipsa rerum docuerint. Quae nimis sane pauca sunt, quam ut in re gravi adeo ac praecipiti aliorum voluntates alienas allicere queant. Me profecto, quae pluribus sic opitulatus sum, nocuerim nemini, tanta ultro progressiendi cupido incessit, ut tum tantum cessandum putem, cum omnia alidie frustra fuerint. Quod si, tanto praemio proposito, medici eadem quoque via insistere decernerent, curationemque, quam supra inchoavi, perficere dignarentur, sedula eorum tandem peritiusque navata opera effectum inter, ut medicina inde aliquando fructum haud vulgarem, nec parvam lucem, foeneratura esset. Operam hanc interea his passui qui febres noverint, quae intermittunt vel remittunt omnes quomodo in calidioribus per hos dies reponibus discutiantur; usque potissimum qui in Pringelii versantur, Londique immortalibus monumentis. Quin, si praeterea persequi licuisset, quae si quoque, quorum doctrinae interiores altiorum spectant, aliud agentes, protulerint, quae ad eandem quasi metam nisi passim videntur, atque conspirare, dictis utique graviorem auctoritatem pleniorumque fidem conciliaverim. Et Stahlianos etiam adferre potuissem, apud quos praepudicata opinio non tantum poterat, quin amicitiarum quasdam voces veri vis eliceret. Sed intra eas subsisterunt. Ab aëtuosis

Chemiae artibus instructi, sed in ignaviores simul Hippocratis doctrinas jurejurando adacli, paratissimi hi medicum milites arma nequidquam data deponere. Sydenhamus quoque, mitto caeteros, de febribus pusillulis agens, medicum omnino naturae auspiciis renunciare debere, proponere sustinuit. Gravissimas quae medicinae fortunarum jacturas factae sint, quod non in aliis quoque viam sic sibi expediverit, alienique periculi cautos extiterit, citius sane deploraveris quam percontaveris. Sed averſi a medicina illi in diversum abstulerunt. Quem omnium potissimum artis vindicem constitueremus, et ad victorias naturae extorquendas sequeremur, et ipse vitro cecidit, sub jugum abiit, turbaeque obsequentium immixtus est. Sed querelae de tanto viro, nunquam gratiae futurae, a sine longe opusculi abſint. Quia potius in eum penitus insidentium febrium corationes exsequenter animorum paulisper aciem protendamus. Ubi, singulari quadam ac pene incredibili sapientia, post homines natos, tantum profecit, ut nunquam profecto aetas futura sit quae de laudibus ejus conticeſcat, donec henus bene merentibus ullus confiteſcit. Et sane in his neque ipse, neque Britannii qui eum insequuti sunt medici, quibuscumque sic disciplinis addicuntur, ut patriae non ubique libertatis vestigia persentiscas, hactenus nimirum domiti ut parant, nondum ut serviant.

Habes quae nunc potui, non quae volui, de febribus argendis discutiendisque, proponere. Qui ostentant quae per initium fuderunt, limaque lente sua et aliena profecuti sunt, qui quaestui nimirum serviunt, famulae ambunt, ab his expositior doctrina requiratur. Nequidquam sane a nobis exegeris, consiliorum socio omni adiutoreque destitutis, quibusque raptim ac temere, et ob hoc ipsum longius perſcripta, expreſſit neceſſitas. Quaeſceas, nisi tu nos, lector, multarum, earumque gravium reprehensionum conviceris, satis te, nimis ſcio, vel ſaventioſorem nobis temeripſam arguere, vel parum ſane in his intelligentem. Errorem tamen noſtrum miſerum, etiam quam par eſt fructum perceperis, niſi vel inde tibi adhuc expeditior parſis ad meliora quae ſunt poſſint.

EPISTOLA PHYSIOLOGICA, INAUGURALIS,

DE

ELEMENTARIIS MUSICÆ SENSATIONIBUS:

QUEM, ANNUEMTE SUMMO NUMINE,

EX Auctoritate Reverendi Illustrissimi Vni,

GULIELMI ROBERTSON, B. S. T. P.

Academiarum Edinburgensium Praefecti;

NEC NON

Amplicius SENATUS ACADEMICI Consilio,

ET NOTISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PER GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS DITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

PUBLICITATE EXAMINI SUBJICIT

LUDOVICUS ODIER, GENEVÆ REIP. CIVIS.

Ad diem 12 Septembris, hora locaque suitis.

---

*Ubiq. ubi comit. septem affertur. V. 1.*

---



VIRO PLURIMUM REVERENDO

THOMÆ BLACKLOCK, S.S.T.D.

CHRISTI MINISTRO, &amp;c.

S.

I. **P**HILOSOPHO naturam contemplanti et scientiis incumbenti, nulla, Vir Spectatissime, magis attentione digna videtur, quam quæ hominû syllema docet; physiologia, videlicet, inter cujus partes nulla magis arridet, quam quæ de movenda voluptate agat. Variis autem voluptatis fontibus mecum recensitis, nullum ego Musica magis constantem ac certum occurrere putavi, qua omnes delectantur homines, omniaque fere pathemata jucunda representatione describuntur, immo et in nobis cientur. Exinde, multum mihi fuit animo, ut, quibus tandem elementis constaret Protheus ille, inquirerem; cumque Ductoris gradum alma hæc in Universitate appeterem, hanc disquisitionem, pro inaugurali dissertatione, eruditorum examini subicere decrevi. Verum, quoniam mihi, in illis præcipue quæ ad Musicam spectant, Præceptor primus et amicissimus fueris, cumque te semper Alumnum suum agnoverint Musæ, Laurisque optimis tempora cinxerint tua, hæc prius dissertationem tibi, Vir Clarissime, offerre, benignæque animadversioni subjungere, non dubitavi. Si enim, te mihi plaudentem sim conciliaturus, parum curæ fuerit,

*Quis legat hæc? Num duo? Num nam?*

II. **Sonus**, physiologice assumptus, cum sit sensatio, vis accurate definiti potest, nec usquam illia quæ ab ortu sunt sunt innotescere. Cum vero pauci tales sint miseri, alii sic definiendus venit sonus: Sensatio simplex ab impressione, quæ aure vulgo percipitur, nec tamen ad aurem, sed ad externum quid, ut plurimum, refertur. Ea quæ sonum actu gignunt, sonora dicimus corpora. Soni duæ præcipue species credimus posse distingui, quarum

1. Quam proprie *sonum* dicimus, est sonus quem comitatur sensatio a conscientia, qua illius percipimus acuminis

nis relationem cum aliis quodam sono qui vocē humana produci potest.

2. Autem, quam *Bombum* dicimus, Gallice, *Bruit*, est sonus quem non comitatur eadem sensatio a conscientia quae sonum proprium. Bombus ad musicam non pertinet, atque tantum ut combinatio multarum soni proprii varietatum a plurimis physicis consideratur \* (1.) Plurimae sunt aliae soni differentiae. Sed vel in gradu tantum consistunt, ideoque species non constituunt; vel specifico charactere accurate carent (2.)

III. Ut sonus producat, longa requiritur causarum catena, cujus primas annulas, quatenus humanum systema necdum attingerint, physici potius quam physiologiæ est considerare. Cum tamen de illis externis soni causis omnino tacere non possimus, liceat hic breviter exponere, quid, omnibus bene consideratis, de illis concludendum putemus.

1. Soni prima vel remotissima causa in conflictu quodam, sed non in omni conflictu, ponenda videtur.

2. Quamvis elasticæ vibrationes molecularum, constituentia corpora constituentium, sonum fere semper comitentur, illae tamen ut soni causa considerandae non veniunt; quia,

a. Saepe dantur tales elasticæ vibrationes omni in gradu frequentiae et impetus, nullo tamen sono producto, ut in igne, luce, electrico fluido, aëre, &c. Dantur etiam tales veluti mutae vibrationes a sympathia; dantur et in sonis harmonicis, ut postea videbitur, &c.

b. Sonus datur, etiamsi nullae apparent elasticæ vibrationes. Conventum furca (Anglice, *Concert Pitch-fork*, dicta) percussa, datur sonus, et vibrantur ejus crura. Sed cum in aquam illa immergerem, subito cessabat sonus, brevique tremulos motus aquae impertire definebant: Nihilominus autem, si statim tunc ex aqua furcam educerem, dabatur iterum sonus, cum minimū quidem tremorem percipere jam dudum desisset oculus.

c. Si elasticæ vibrationes ut soni causa prima considerentur, datur (quod absurdum est) causa quae nullam habet proportionem cum suis effectibus, et quae multa soni phaenomena explicare nequeat; ut patet ex consideratione differentiarum quae sonos distinguunt, compositionis mirae quae sonum simplicem e natura excludit, renovationis  
extincti

\* Vid. Notas ad finem.

extincti soni, contactus simplicis ope (3.), consonantiarum, imprimis Tartinianarum (XIII.) &c. (4.)

3. Ergo, quidpiam aliud requiratur, ut conflictus sonum producat, nec, quid sit illud, novimus.

IV. Hactenus de prima soni causa. Nec minor de intermediis hanc cum ultima seu proxima connectentibus causis difficultas. Etenim vis soni productrix aurem humanam ad maximas distantias, immo et ad 200 Anglica miliaria, ut legitur (5.), assequi potest. Quomodo hoc fiat, nunc inquirendum.

1. Vis illa trans manigena corpora nota (6.), nec tamen trans omnia pari facilitate, propagatur, ita ut inter ejus conductores alii sint meliores, alii vero pejores.

2. Neque ab illorum elasticitate, mobilitate, densitate, vel alia quavis nota qualitate, prius pendet haec inter illos differentia; etenim, trans aquam omni elasticitate fere destitutam, et trans vegetabilia juxta fibras longitudinales, longe facilius quam trans aerem ipsum producit sonus. Immo et trans aerem sic rarefactum, ut in recipiente pneumatico vix talis obtineatur, vis sonatrix quoque facile propagatur (7.)

3. Num illi conductores semper moveantur ipsi, id est, num suarum molecularum motu vim sonatricem propagent, omnino incertum videtur. Etenim calculos Newtonianos de velocitate aëris motus superavit vis sonatrix velocitas experimentis capta (8.); velocitatem ventus superat acceleratio soni ventus ope (9.); flamma levissima, in campanae sonantis centro posita, neutiquam movetur (10.); cum legibus motus notis non consentiunt soni phaenomena, &c.

4. Ex illis omnibus magis probabile mihi videtur, sonatricem vim trans aetherem Newtonianum propagari (11.), de quo aethere magis infra dicetur. Nec obstat quod in recipiente pneumatico bene purgato non producat sonus, testante BOYLEO et pluribus aliis ipsi posterioribus. Obijcit enim MERBENSUS contraria observata (12.); de facto nusquam constitit apud BOYLEUM ipsum, et tandem alia ratione explicari potest (13.) (14.)

V. Tandem trans suos conductores vis sonatrix aurem humanam attingit, mirum organum, cujus partes ita variae et occultae disponuntur, ut physiologistae harum functiones et usus certo novisse vix sit possibile. Nec nostrum est consilium singulas perpendere. Satis sit observare, quod  
catena



catena conductorum externis conductoribus analogorum propagetur via sonatrix a membrana tympani meatum auditorium externum terminante, trans ostiolo, atque etiam fuisse trans aërem et mactum in tympano contenta, ad fenestras ovatum et rotundam, indeque ad cochleam et vestibulum, semicircularesque canales, quae cavitates cum pulpa nervae a septimi paria portione molli oriunda dicerentur; hinc tandem pulpam via sonatrix trans fluidum in vestibulo contentum, eodem modo qua retinam, in fundo oculi sitam, lux trans varios illius humores, afficit. Hic autem notare dignum venit:

1. Quod sonus plurimum ab illarum partium statu pendeat; ita ut, v. g. si trans aërem inclusum in meatu auditorio externo per solida propagetur via sonatrix, longe majorem impetum, immo et magis acuminis differentias induat, multumque diversis modis varietur pro variis organi affectionibus (15.)

2. Nec tamen ad sonum producendum est omnino necessaria unaquaeque pars, cum vix ulla sit quae nunquam defecerit, quin exinde auditus quoque periret; immo et trans reliqua systematis usque, destructo live impedito auditus organo, via sonatrix mentem quaque afficere potest, pulpa tamen nervae, in vestigia auri camera, probabiliter adhuc integra, et suo munere fungenti (16.)

VI. Si jam haec rem ulterius prosequamur, de sensationibus ab impressione in genere, paucis verbis est dicendum. Nec umquam a proposito nostro alienum erit illa consideratio. Quotiescunque pulpa nervae, vel semicus nervi cuiusdam extremum (17.), externis corporibus afficitur, si bene constituentur organa, sit sensatio. Hujus autem propriam sedem non esse pulpam illam, sed alteram potius nervosae medullae extremum, sensorium nempe commune (18.), per ligaturas, compressiones, aliasque interruptae communicationis vias, novimus. Hoc vero, apud homines et aliorum animalis, potius in encephalo, vel paulo ulterius in medulla oblongata et spinali situm, conjectura omnino probabili assequimur. Sed quomodo fiat haec communicatio? Alii dixerunt, per nervos ipsos, oscillatorio motu agitato; alii autem, inter quos BONPAAVIVUS (19.), per aquosum subtilissimum, in cerebro secretum fluidum, &c. Sed haec omnia, utpote minus cum nervorum natura molli, cumque systematis nervosi phaenomenis, secreto fluido repugnantibus, congruentia, rejicimus. Verum, per fluidum subtilissimum, elasticum, cerebro et ner-

vis inhaerens, oscillatoriis motibus seseipiendis, et summa cum velocitate propagandis, aptissimum, institui communicationem credimus. Cum autem, in multis, hoc simile videatur Aetheri illi per naturam unum diffuso, "omnia  
" loca in Mundo, ab aliis corporibus relictis, adimplenti,  
" et penetranti, qui aditum ad profundissima naturae mysteria aperire potest (20.)," et cujus ope, magnetismi, electricitatis, lucis, caloris, attractionis, atque etiam, ut dixi, soni miracula produci videntur; eumque "natura  
" simplex sit, et rerum causis superfluis non luxuriet  
" (21.);" NEWTONUM merito affirmasse, per eundem,  
" Sensationem omnem excitari, vibrationibus, scilicet,  
" hujus spiritus per solida nervorum capillamenta ab externis sensuum organis, &c. ad cerebrum propagandis  
" (22.), nos concludere necesse est." Quae opinio summis nominibus, analogia omni, et ratiocinio solidissimo, confirmatur; ut lucide, in praedicationibus suis, probavit CURTENTRUS noster, optimis simul et ingeniosissimis attentionibus discipulis.

VII. An igitur sensatio aethereis oscillationibus in sensorio communi factis immediate perficitur? Sensatio est mentis functio. Sed quid sit mens? Quomodo cum corpore connectatur? Quomodo ab illius actione afficiatur? Quomoduque idem afficiat? Non nostrum est tantas componere lites. Hoc satis est observasse, quod aethereas oscillationes inter et sensationem interponi possint plurimi causarum annuli; immo, juxta Leibnitzianum Harmoniae praestabilitate systema, et sensatio, extra physicam catenam praegressam jacere posset. Nos autem ad corporis statum solummodo attendere cogimur, nisi medicinae practicae omnino valedicere velimus. Si vero, hoc etiam concessu, quaeratur, quomodo sensationes simplices inter se invicem differant, quidni, v. g. vis sonatris opticum nervum afficiat, quidni lux et aurem? &c. Nam extrema nervorum sentientia organizatione sua ita inter se differant, ut alia aliis tantum impressionibus genere diversis afficiantur; num, e contra, haec tantum inter illa occurrat differentia, quae a situ pendeat? hoc plane nescire respondetis.

VIII. His praefatis, ut nunc ad sonorum differentias deveniamus, illae ad tria praecipue capita referri possunt, quatenus soni distinguuntur:

1. Acumine, in acutos, vel graves. Quid sit acumen soni omnibus notum est. Nec definiti potest; quippe  
quae

quæ sit sensatio simplex. Sed mensuratur chordæ sonoræ,

a. Longitudine,

b. Crassitie,

c. Tensione.

Scilicet. { Quo minor chordæ longitudo; } eo acutior sonus.  
 { Quo minor diameter ejus; }  
 { Quo major vis eam tendentis radix; }

Quod facile ad cætera sonora præter chordas applicatur.

Sed, præter eas mensuræ rationes, nonne quidpiam sit in vis sonatrici impetu, vel etiam in sonori qualitate, quod acumen soni determinet (23.)? Observandum hic quæque venit, quod, ultra limites quosdam, non amplius minui vel augeri possit acumen; ita ut, v. g. si chorda sonora ultra limites illas longitudine augeatur vel minuatur, vel nullum sonum, vel solummodo bombum, ediderit. Juxta EULERUM, intra 8, juxta alios, intra 10 septenarios, omnes includuntur soni.

2. Robore, nempe, impetu in fortes et debiles, fortiter etiam quantitate in magnos et parvos, prout vis sonatrix sit major vel minor, multiplex vel simplex. Non accurata datur impetus quantitasive soni mensura. Vis enim sonatrix non bene determinari potest; nec, si duplex, triplex, &c. ad eundem sonum producendum concurrat, duplo vel triplo, &c. major sonus, sed minori potius proportionem exinde produci videtur. Verum, in genere, nil certi affirmari potest de sensationum vi, ab impressione deductum.

3. Tenore, (Gallice, *Tymbre*), in asperos et suaves medullatos et siccos, canoros et obscuros, &c. Innumeræ sunt hujus generis differentiæ, inter quævis prope corpora sonora occurrentes, ita ut vix sit sonorum ullum, quod ab aliis omnibus, respectu tenoris, differentem sonum non edat, acuminis, et impetus, quantitasive, abstractione facta. Explicarunt philosophi acumen soni frequentia vibrationum, quæ illius productrices putant; impetum, earundem latitudine; sed tenorem nusquam, quod ego norim, explicare valuerunt.

Ad illos tres differentiarum inter sonos fontes attendit musices; sed tamen, in systemate musices harmonizæ, primus tantum, acumen nempe, consideratur et accurate mensuratur.

IX. E supra dictis liquet, diversos dari sonos, quoad acumen, numero infinitos; quoniam illius mensuræ infinitas



numero, pro materiae divisibilitate, gradus admittere possint. Sed tantum abest, quin tota sonorum series, gradus suos omnes profecta, auri humanae arrideat, ut, contra, nil forsitan illi magis horridum, vel magis ab omni gratia aversum, in natura dari possit. Dempis vero quibusdam gradibus, aliae efformantur series quae voluptatis plus minusve producere aptae sunt; originemque generibus Diatonico et Chromatico, apud recentiores acceptissimis omnium, praebent. Si, nempe, chorda sonora secetur juxta proportionem sequentes,

$\frac{1}{1}$     $\frac{2}{3}$     $\frac{3}{4}$     $\frac{1}{2}$     $\frac{3}{5}$     $\frac{4}{5}$     $\frac{6}{5}$     $\frac{1}{1}$   
 Interv.   T.   t.   H.   T.   t.   T.   H.

et ex illis sedimilibus successive prolucatur sonus, datur series quae ulterius octies, vel in summum decies, repetita inclusive, regulis tamen temperamenti servatis, genus *Diatonicum*, per omnes sonos a gravissimo ad acutissimum usque insectatum, efficit. In hoc tria inter sonos intervalla distinguuntur; *Tonus major*, nempe, *tertius minor*, sonusque minimus, alias *Hemitonus* dictus; sed, in systematibus recentioribus, tonus major et minor, ut unus et idem tonus, fere duplex hemitonii considerantur. Si vero tonus bisariam secetur, datur sonorum series per hemitonos, quae genus *Chromaticum* efficit; ita ut, cum genus Diatonicum, de serie sonorum 36, vel in summum 70 tantum, genus Chromaticum 96, vel juxta alios 120 gradus, admittat. Observandum est autem, quod, etsi intervallum singulum in genere diatonico magis quam ullum aliud auri placeat, totius tamen omnium seriei, pluries repetitae, dantur extrema quae cum sese invicem non diatonicè conveniant; et hinc, de modo quodam totam seriem corrigendi per intervallo singulorum majorem minoremve adulterationem, cogitandum fuerit, quod *Temperamentum* dictum fuit.

X. Alia sunt quidem genera, ut Enharmonicum, quod per intervalla chromatica fere bisariam secta; Diacommatum, quod per intervalla etiam minora, commata nempe ( $\frac{2}{3}$ ), procedunt, &c. Remi et inter Graecos plurima alia genera, prout sonos mobiles in tetrachordis suis diversè ordinarent. Sed haec omnia vel nunc ignorantes, vel, in systemate musicae recentiori, quoad compositionis theoriam, negliguntur. Immo, et omnia genera praeter Diatonicum, ne chromatica quidem exceptis, nusquam diu sustinentur; sed praecipue transitionibus et transpositionibus, pro rariorum instrumentorum natura efficiendis, inserviunt;

ferriant; solumque tandem Diatonicum genus venit affumendum pro illa sonorum a gravibus ad acutos successione, quae longe ante alias auri humanae ardeat, musicæque efformationi profuit (25.) Quid ergo? Qui fiat, ut ejus potius quam ullius alius ferri intervallic ardeat homo (26.)? An inter animalia ullum sit aliud quod eisdem præcipue voluptate afficiatur? Hæc prorsus explanare non tentabo, quippe quæ captum meum superent: Sed observare liceat,

1. Quon quamcumque originem generi diatonico dederint systematici, vel etiam illius principium in harmonia invenerint; semper tamen, si ulterius illud prosequamur, ad physiologicum quid devenimus, quo natura ipsa omnes illud genus plus minusve edocet: Nec enim arbitraria est successio diatonica. Nam, si foret, cur apud omnes hactenus notas gentes, illa, si ulla, præcipue nisi reperitur musica quædam? Quidni ad aliam quamvis successiorem æque propenderemur? Cur hanc semel auditam tam prompte et accurate teneremus (27.)? nil tamen, nec de de proportionibus geometricis, nec de seriebus harmonicis gravioribus, suspicientes? Cur, contra, chromaticam, enharmonicam, et alias successiones, æque regulares, æque a seriebus harmonicis, ut dicunt (28.), adortas, tanta difficultate modulareretur? Cur et plurimi vix consonantiarum sensiculo pollentes, vel harmoniarum principia omnino ignorantes, melos tamen diatonicum ita optime calleant, ut gratissimos cantus componere valeant (29.)? &c.

2. Quod mira sit hic inter sonos et colores analogia. Cum enim 7 sonus diatonicum systema generet, sic quoque 7 colores systema prismaticum producit; cumque inter 7 sonos occurrant inæqualia intervalla juxta quasdam proportionibus, sic quoque simile quid NEWTONUS in colorum prismaticorum latitudine invenit (30.), cujus ordo, chordæ sonoræ applicatus, dat sequentes proportionibus:

	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{7}{8}$
Interv.	T.	H.	t.	T.	t.	T.	H.

Quarum regularitas, et magna cum systemate diatonico proprio analogia patet. Cumque tandem, ut diximus, successio diatonica, ulterius in serie sonorum infectata, dec sonos, qui, quantumvis gravissimos acumine superent; cum illis tamen omnino conveniant, et illis omnino sint homologæ: Sic quoque prismaticam successiorem, in serie colorum ulterius infectatam, colores dare derivativos, primitivis homologos, deducit EULERSUS (31.), ita ut, a rubro primitivo ad violaceum, sint 6 intervalla simplicia; scil,

et violenter ad rubros derivativos subsequentes, sint intervalla 1. 2. 15. 22. &c. prout minus magisque in serie colorum removeantur.

3. Quod difficillimum sit judicare, an inter animalia solus homo diatonice successione praecipue gaudet. Etenim pauca in hunc scopum facta fuerunt experimenta (32.) et, ex notis mulieris effectibus in quaedam animalia, nil deducendum venit; quoniam ad rhythmum et sonos in genere, eorumque vel impetu, vel tenore, diversitatem referri possunt. Si vero aves cannae quaedam successione diatonica accurate modulari doceantur, notandum est, hoc ab illarum imitatrice propensione, potius quam a voluptate diatonica, adori, quoniam nec corrigunt successiones inaccurate diatonicas, nec et quavis alias successiones, pari modo, doceri recusant, sed omnes caeco iudicio imitantur. De voce autem, venit observandum, hominis ipsius nec articulata, nec naturalem vocem successione diatonica procedere; sed intervallis irregularibus, ut plurimum minoribus (33.) Idem de plurimis quadrupedibus dicendum est. Inter aves, quaedam, ut Cuculus canorus, Gallus gallinaceus, &c. diatonice intervallis quidem loquuntur. Harum tamen diatonice cantus artificiosis limitibus includitur, et raro ultra unum intervallum simplex compositumve extenditur. Quaedam autem, ut lusciniæ, et aliae quarum suaves moduli naturam sylvestrem exhilarant, diatonice suis intervallis alia chromatica, enharmonica, vel magis etiam incerta, miscent. Verum, inter Mammalia Bruta, primum occurrit animal mirum, nempe *Bradypus tridactylus Linnæi*, cujus vox clara nocturne frequenter diatonice ascendit et descendit juxta sequentes proportionis:

1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{11}$ ,  $\frac{1}{12}$ , 1.  
Interv. T. 1. H. T. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Quae totius diatonice seriei maximam partem efficiunt (34.) An semper eadem voce sua miseritimum animal jactat? An sonis, an praecipue mulieris, moveatur? An alias series, vel an totam seriem diatonicam, doceri possit? An quidpiam in auris vel laryngis illius anatomia notabile occurrat? Tacent auctores. Dicunt tamen quod auricula externa caret, quodque cum summo pere tanto gradu incedat, unde Ignavi nomen acceperit, nullis quantumvis ingentibus sonitu et clamoribus ad celeriores motus excitetur (35.)

Liceat igitur hic cum HALLEO concludere: "Quare  
" hanc quidem gratiae in successione tonorum causam ad  
" ea



" ex refero, de quibus per experimentum constat; phy-  
 " sica vero ratio ignoratur. Neque magis hoc in exemplo  
 " crebro a nobis requiri, ut causam mechanicam expona-  
 " mus, quam quidem tenemus rationem reddere, cur certi  
 " colores placeant, cur certis acrimoniis gradus lapida  
 " corpora faciat, cur papillarum cutanearum in definita  
 " proportionē frictarum tremitus voluptatem eliciat (36.)"

XI. Non fortis est, diatonicis intervallis distantium so-  
 norum dari successionem quandam, ut exinde musica sen-  
 tentia vel melos aperiatur. Etenim, oportet etiam ut in  
 tali sonorum successione, ex illis quosdam, per regulares  
 temporis periodos, magis emphatice sentiamus; et hæc  
 emphasis periodica *Rhythmus* dicitur, in musica ita omnino  
 necessarius, ut, illo destructo, illa statim sit nulla. Sed  
 in omni musica successione plurimi rhythmorum typi dan-  
 tur intermixti, vi et periodi suae longitudine plurimum  
 inter se discrepantes, sed ita ordinati, ut alter alterum ho-  
 mologice similem semper aequali temporis spatio conse-  
 quatur. Qui typus majori pollet vi, ordinem rhythmici  
 constituit; qui proxime sequitur, genus; sequentesque,  
 speciem, innumeraeque alias varietates quas vago tantum  
 modo denotarunt musici. Rhythmus apud antiquos nexum  
 constituebat poësis inter et musicam; et, in illorum lin-  
 guis, ita omnino cujuscunque syllabae emphasis relativa  
 seu prosodia statuebatur, ut nullum in musica, carminibus  
 semper stipata, fuerit opus rhythmico peculiari. Contra au-  
 tem, cum linguae recentiores, etiam si aliquali vocalatione  
 ditatae, sic tamen variae et irregularis sint prosodiae, ut  
 cum musica vix nosci possint, necessario fuerunt excogi-  
 landae quaedam rhythmici leges, quibus musica nostra diri-  
 geretur, et regulariter ordinaretur. Durationem igitur so-  
 norum ita relative mensurant, ut illius divisiones dichoto-  
 mas et trichotomas tantum in musica admitterint. Has,  
 suo nomine ornatas, relativis ad communem mensuram  
 quandam, dictam Semibreve (cujus sint illae per dichoto-  
 miam vel trichotomiam aliquotae partes) signis expresse-  
 runt. Ex illis Tempora formarunt, et in illis omnes rhyth-  
 mi minores typi inveniuntur. Typum autem rhythmici  
 praecipuum Mensuram dixere, quae exprimitur fractione,  
 cujus denominator, quae sit aliquotarum, in illa mensura  
 contentarum, species; numerator autem, quot ex illis in  
 mensura contineantur, indicat. In illo praecipuo genere  
 dividitur mensura, prout numerus duplicis vel triplicis  
 multiplex semibrevis aliquotarum, in illa continetur; quae  
 genera

genera itidem pro temporibus suis (sive proximis rhythmis typis) in species plurimas dividuntur. Nonne aliud etiam genus, et triplici et duplici mensura compositum, in musicam nostram eleganter introduci posset (37.)? Mensurae variae sunt durationes pro diversis cantibus; sed in eodem cantu semper apud nos eadem est. Nec sic apud Graecos. Quorum poetici pedes, licet in versibus quibusdam, ut in hexametro, pentametro, anapaesto, &c. essent aequales; inaequales tamen in plurimis aliis admittebantur, ut in scazonze, choriambis, &c. praeterquam quod sua tempora non sic inter se aequalia constituerent, ut nostra sunt, unde summa et mirabilis illorum rhythmum distinet varietas, qua noscere careat. Tandem observandum venit, quod, etsi semibrevis pro mensura communi assumatur in duratione sonorum aestimanda, et quavis ejus duratio sit constans, et in eodem cantu fixa; nihilominus tamen in diversis cantibus ita variatur, ut nil certum hic remaneat, praeter practicum musici judicium. Unde quidam de Chronometro cogitarunt, quo gradibus accurate determinaretur, quae debeat in singulo quoque cantu semibrevis esse duratio, ita ut, post auctoris mortem, posteris melius innotesceret verus ejus cantuum motus. Ab aliis autem obijciunt difficultas boni chronometri inveniendi; et major etiam difficultas, ad illius motus, musici attentionem conciliandi.

XII. *PERCUTATA* physiologistae de rhythmis consideranda videntur. Cur enim sonorum per diatonica intervalla successio sensu omni careat, nisi periodica emphasi adornetur? Curque, inter innumeras sonorum quoad durationem inter se proportionem, dupla et tripla tantum, illarumque multiplex admittantur? An hoc, ut *CANTORIUS* exponit (38.), ex illarum facili perceptione venit explicandum? Porro, emphasis periodicae, quae rhythmum constituit, quodnam est principium? Sed haec omnia nos longius in metaphysicos labyrinthos traherent, quam volumus. Satis sit igitur observare,

1. Rhythmicam emphasin signis non dubiis sese manifestare. Motibus enim corporis nostri, vel aliis sonis, vel etiam bombis, typis ejus praecipui plaudere natura impellimur; et quo vividiori sensu, eo etiam fortiori rhythmum pollet melos; ita ut exinde, apud populos omnes notos, Terpsichores ars elegans arte revoluta immiscere choreas orta fuerit. Apud Graecos, quorum rhythmus plurimum variabatur, *Coryphaeus* in musicorum medio staret, cujus officium fuit, manu pedibusque scabellis armatis, typos

rhythmū præcipuos pulsare. Ac etiamnum, apud Gallos, quorum cantus emphasin periodicam non regulariter admittant, ideoque rhythmus non bene percipiatur, stat quoque Coryphaeus in medio, baculo ad unam quamque mensuram percussio, rhythmum quantum possit, ut milicos dirigat, expressurus.

2. Omnis musicae successionis animam esse rhythmum, ita ut illius quam ullius alius cantus partis imago tenacius mente reposita maneat: Unde poeta:

*Numeros memini, si verba tenerem. VIRG.*

Immo, et sine ulla acuminis differentia, sed sola rhythmū ac impetus varii gratia, musicam dari posse, probat et hoc mirum instrumentum, tympanum nempe bellicum, cuius stimulantē effectus qui nescit, sese rerum Martis omnino ignarum manifestat; probant et haec musica quaedam instrumenta a Barbaris adhibita, quae rhythmū tantum et impetus discrimina admittant (39); probatur etiam exinde, quod apud omnes populos rhythmus reperitur, etiam si forsitan non apud omnes in instrumentali musica ipsa occurrat diatonica successio. Nonne inde deduci potest, quod nec canerarum avium cantus, nec Brasylpi suspiria, mulieres numen increantur, cum rhythmū careant, licet diatonicis intervallis procedant?

3. Non sic necessario simplicem et uniformem rhythmum, ut quidam auctores velint, in musica semper requiri. Etenim, apud antiquos, inaequales versus, immo et inaequalia metra, in eodem cantu saepe admittebantur; et apud Barbaros Canadenses, Iroceses, Hurones, &c. datur rhythmus compositus, qui, licet hospitibus primum ingratus et perceptu difficilis appareat, post certum tamen quoddam tempus sensum gratus evadat, et Barbaros ipsos summa cum voluptate afficiat (40). Ac licet in musica nostra desint exempla cantuum mensuris inaequalibus, vidimus tamen esse quaedam mensurarum ita compositarum, ut proximi rhythmū typi sint dupla et tripla inter se ratione. Tympano demum bellicum tempora magis composita plaudere, et nova mensurae genera addere, ut major exinde diversitas magis sensum occuparet, proponebat ipse CARTHAGUS (41).

4. Silentia quoque in rhythmū comprehendendi, ac sonorum adinstar mensurari. Sunt enim silentia signa quoque expressa, quae quod durationem omnibus sonorum mensuris respondeant; immo et quibus emphasis rhythmicæ præcipui ut et minores typi, suppositione, vel etiam sonorum qui præcedunt et sequuntur specie, adaptentur.



5. Non prius ab executione, vel a soni impetu perinde ausculto, pendere rhythmum, ut summus volucis CASTELLUS (A2.) Non,

a. Saepe tale non datur incrementum, rhythmus tamen bene percepto.

b. Si ab ausculto impetu semper penderet rhythmus, omnino arbitrarius foret. Sed, e contra, unicuique cantus est suum quid, quo rhythmus ejus proprius facile ab alio omni musico distinguatur, et percipitur. — Saepe tamen sciendum est, quod rhythmus multum ab executione pendeat, ita ut, genere mensurae servato, species ejus aliquatenus, et sensus omnino, parvo, sed semper aliquali, cum cantus damno, mutari possit. Sunt etiam in instrumentis musicis motus alii quidam temporibus primis, alii vero temporibus secundis, melius adaptati. Sic chelys plectrum, bene ut exprimat mensura, descendat necesse est.

XIII. HAETENUS de singulis egimus sonis. Nunc autem pauca quoque veniunt dicenda de illorum compositione. Quotiescunque duo vel plures soni una producti, cum voluptatis sensu, quasi sonus unus, percipiuntur, haec amica conjunctio *Consonantia* dicitur. Si vero insacunde et necessaria disjuncti percipiuntur, *Differentia* vocatur. Ea autem scientia generalis quae consonantias et dissonantias docet, *Harmonia* dicitur, in qua consonantiarum, quinque species praecipuas distinguimus: videlicet,

1. Consonantias artis. Si nempe choros sonorae partes aequales una percipiuntur, ita ut sonus multiplex exinde adoriatur, pro uno assumitur ille, ea enim quod consonantia fiat. Hujus, ut plurimum, compositionem, sed jucundam, percipit mens, et haec omnium simplicissima consonantia, Homophonía dicitur, (Gallice *Unisson*). Si autem ultra septem sonos primitivos inflectitur series diatonica, primus alihinc sonus, ut supra dicebamus (IX.), alium septenarium incipit juxta eadem proportionem, ita ut in tota serie non ultra decem septenarii includantur, quorum primi soni una si produantur, consonantiam efficiunt quae Diapason, vel Adiphonía simplex, replicata, duplicata, &c. dicitur, prout ejus extrema unum vel plures septenarios includant. Demum primus septenarii diatonici sonus cum quarto consonantiam dat Diatessaron dictam, cum quinto Dispernte, quibus utrique consonantiis Paraphoníae nomen dederunt Graeci. Illis recentiores addiderunt consonantias quatuor, nempe Tertiam majorem, quae primo cum tertio sono septenarii afficitur; Tertiam

nam minorem, quæ secundo cum quarto; Sextam majorem, quæ primo cum sexto; et Sextam minorem, quæ sexto primi cum quarto proximi superioris septenariæ datur (43.) Porro, hæc omnes consonantiae per suorum extremorum antiphonias in alias iidem consonantias magis distantibus existens componuntur.

3. Consonantias sympathicas, vel resonantias. Si nempe, corpora sono producenda apta, sint ad certam quandam a corpore sonoro distantiam sita, et tensione (44.) illi ad homophoniam, vel antiphoniam, vel paraphoniam, vel etiam tertiam majorem, et illarum consonantiarum, per antiphoniam replicatas, duplicatas, &c. in superius proportionata, sunt illa, ut plurimum, nisi semper, sonora, et illorum percipiuntur vibrationes.

3. Consonantias naturales. Si nempe sonus producat, invenerunt practici alios sonos acutiores una percipi, qui exprimentur proportionem harmonica et monadica chordae sonoræ (quæ primitivum sonum dat) sic sectæ, 1,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{5}$ , &c. Cum autem antiphonias pro eodem sono reputentur, sequitur omnem sonum superi duobus aliis; tertia nempe majori duplicata et diapente seu recentiorum quinta majori replicata; qui tamen, in acutis sonis, magna cum difficultate, et etiam in gravioribus non facile, nisi exquisitis et bene exercitatis auribus, percipiuntur (45.)

4. Consonantias melodas. Cum de sono quodam in alterum transcat, non ideo definit primus, sed aliquamdiu continuatur, et sic cum succedente unitur. Immo, sic corporis ejusdem molliis ope, incipiente secundo sono, primi externis causis subito sonis imponatur, sonus tamen ipse ita in mente remanet, ut illum per quoddam tempus revera percipiat mens, et ille ideison cum succedente in consonantiam vel dissonantiam uniat. Hujusmodi consonantias Melodas dicimus.

5. Consonantias Tartinianas. Quippe, Ill. Dom. TARTIN accuratis invenit experimentis, quod, si duo soni una producantur, proprio cum gradu impetus et *urgencie*, ex eorum conjunctione vertitur quidam sonus productivus, exquisitis auribus eo distinctius perceptus, quo simplicior inter generatores sonos sit relatio; homophonia tamen et antiphonia exceptis. Scilicet diapente seu quinto, producit sonus homophonicus gravioris generatoris; quarta, sonus gravior ad antiphoniam acutioris; tertia majori, sonus gravior ad antiphoniam gravioris, et sexta minoris ejus complementi, sonus gravior ad replicatam antiphoniam acuti; tertia minori, sonus gravior ad replicatam tertiam

maorem gravioris; sed sexta majori ejus complemento, datur tantum sonus gravior ad replicatam tertiam majorem acuti; tono majori, sonus gravior ad antiphoniam replicatam gravioris; tono minori, sonus gravior ad tertiam majorem duplicatam acuti; hemitono majori seu diatonico, sonus gravior ad duplicatam antiphoniam acuti; hemitono minori sive chromatico, sonus gravior ad triplicatam dissonantiam gravioris, &c. &c. Sed, ut experimentum distince sequatur haec phaenomena, tentandum est duarum tiliarum altisonarum (Gallice *Hautbois*) ope, acumine accurate convenientium, tibicinibus quorundam passuum intervallo distantibus, et auditore in amborum medio stante, Chelys eadem quoque dabit, minus distince tamen percepta.

XIV. De illis autem singulis consonantiarum speciebus alia quidem bene multa veniant observanda, quorum praecipua recensere: Ac,

1. Igitur, de consonantiis artis dicendum est,

a, Quod, quotiescunque non perfectae sunt, sed producuntur proprio cum gradu impetus et durationis, pulsibus quibusdam periodicis stipantur in serie harmonica injucundis, de quibus plurimum dissentiant auctores. Alii enim (46.) eos pulsus dicunt esse tantum quasi soni inflationes (*Resonnement de Son*), aurem afflicientes eodem modo quo arteterarum pulsus digitorum medicar. Alii autem (47.) hos fatuos tantum bombos pronunciant, quorum acuminis gradus nusquam determinari possit. Illi rursus eo frequentiores pulsus illos dicunt, quo magis ad consonantiae perfectionem approximetur intervallum. Hi autem, eo frequentiores, quo magis a consonantiae perfectione recedat. Si vero fas sit cum tantis viris judicium quoque in trocinam injicere, et paucis experimentis, tecum, Vir Clarissime, capitis fidere, nonne ad primam sententiam potius accedendum sit, quoniam nobis vili fuerint illi pulsus ad harmoniarum naturales antiphonias alterutricus pro consonantiae ordine generatoris extremi, pertinentes, et eo quidem frequentiores, quo consonantia perfectioni fuerit propior (48.)?

b, Quod, etiam si quaedam artis consonantiae quandam, ut vidimus (IX.), patiantur alterationem; sunt tamen quaedam, ut homophonia et antiphoniae, quae nullam omnino admittant. Ceterae autem eo respectu quoque differunt; quoniam tertiae, v. gr. minorem patiantur quam quintae, et inde regulae temperamenti deducantur.

Musicos



Musici hac in re dirigere possunt pulsus jamjam memorati. Etenim hoc potius temperamentum est eligendum, hæc potius intervalla sunt alteranda, quæ hac alteratione minores numero et impetu producant pulsus.

c. Quod ex consonantibus artibus, illarumque differentiis, componitur genus diatonicum. Etenim tonus major dissonans cum diatessaro differentia obtinetur; tonus minor autem, diatessari cum tertia minori, hemitonoque, ejusdem diatessari cum tertia majori. Chromaticum autem genus componitur hemitono diatonico, alioque hemitono qui differentia tertie majoris cum minori obtinetur. Aliæ autem illarum differentiarum differentie alia genera, ut enharmonicum et diasemmaticum, dant. Sed, in præxi, ut plurimum nunc temperamenti ope rejiciuntur. Immo, et per idem temperamentum, hemitonus, diatonicus, et chromaticus pro uno et eodem hemitono sumuntur (IX.)

2. De consonantibus sympatheticis observo,

a. Quod graviore præcipue soni sympatheticas consonantias producant, cum robore majori ut plurimum polleant.

b. Quod sympatheticæ vibrationes eodem tempore observantur, immo in chordis ad inferius acumen tensis. Sed multum mihi in dubio est, utrum illæ sympatheticæ vibrationes semper sono ripentur. Etenim, in confesso stat, quod saltem non graviorem sonum edant quam generantem; sed sonare dicuntur ad illius homophoniam, vel antiphoniam superiores, proportionali suarum partium divisione. Verum, nonne exinde augeri deberet quantitas et impetu summa sonorum in unum concurrentium? Ad sonos organi, ecclesiæ fulcrum, immensam quippe columnam vibrantem vidit Ill. HATLER. Quantus exinde sonus debuisset oriri! Talem tamen dari sæpius divisionem non negamus; et per illam explicandas censemus historias quæ de voce fractis scyphis ad antiphoniam inferiorem sensu narrantur. Verum illam divisionem non ignorabat Ill. RAMEAU; sed exinde sonum oriri negabat.

c. Sympatheticis consonantibus plurimum nituntur instrumenta musica, et ab illis tenorem suum et robur magna in parte accipiunt; ut patet in clavicymbalo, chely, tibis, &c. Ex illis quoque nonne multum pendunt pleraque phaenomena vis sonatricis longius atque in eadem fortius quam vulgo propagatæ, atque echus, atque tubarum vocem augmentum, atque tandem omnium quæ ad sonitus percussione et auctum robur pertineant?

## 3. De consonantibus naturalibus notandum est,

a. Quod, etiamsi ut plurimum harmonici naturales sono generatore sui longe debiliores, tamen summa observator mobilitas praevalentiae inter generatorem et ejus harmonicos; quod sequentibus probò experientia. Si percutiantur concutuum furcae erura, statim sonus acutus et parvus praecipue percipitur. Verum, si proprius ad aurem admoveatur furca, sonus praecipuus sit ad diapente gravior, debilissimus; qui idem quoque sonus longe alius praevalentibus, si, post percussione, furcae, manubrium in corpus quoddam durum, vel in galtram castoreum, (Angl. a *Har*), &c. ligatur; sed tunc tenore suo plenissimus, aequabilis, vel undulatorius, prout pressio eadem continetur vel varietur. Si suspendatur furca filo quod digitis auriculae externae simul claudenribus teneatur, et percutiantur sic suspendae furcae erura, idem gravior quoque sonus produciatur; sed tenore suo non ita pleno, nec non robore majore ac magis undulatorio diversus. Verum, si aperiantur auriculae, idem subito sonus praecipuus sit ad diapente acutior, ut antea. Denum, si calefiat furca ad vividam inflammationem usque, suspendatur ejus sonabilitas, donec refrigeretur; ac ejus erurum percussione bombus tantum nullius durationis creabitur. Si vero calefiat tantum ad ruborem nigrem, percussione sonus gravior idem produciatur, siue manubrium ad corpus quoddam durum ligatur, nec ne; quoniam solum tenore sic paululum varietur. Omnia tandem fere corpora sonabilia, quantum mihi videtur, acutos suos harmonicos ante sonum graviores proprium aliquatenus edunt; ac exinde saepe ita combinari possunt harmonici naturales cum generatoribus sonis in chordis harmonice tensis, ut veras artis consonantias mentiantur; ut in *Acolico* instrumento (Angl. *Acolico Harp*) patet.

b. Phenomenon datur in musica quod forsitan hic referendum est. Scilicet, si chorda sonabilis in partes duas secetur ex illo cum tota chorda commensurabiles dividatur, sed levi tantum obstaculo, ita ut ab altera ad alteram non omnino interspiciatur motus; quoties haec sonora fiet, sonus dilabitur nec tunc chordae proprius, nec majori ejus parti, sed minori, si modo majorem accurate mensuret; quod nisi, sonus ille produciatur qui majori aliquantulum utrique parti communium sit proprius. Ac ejusmodi soni tenore sunt multo suaviori, quam si pleno obstaculo dividatur chorda; illisque construuntur instrumenta quaedam, ut *Tuba marina*, &c.

4. De consonantibus melodiis venit observandum,

a. Quod saepe, ut in homophonia, distinctius percipiuntur, quam ipsae artis consonantiae: & scilicet soni consonantiae extremi, unus post alterum, potius quam si una producantur.

b. Quod exinde quaedam Meli regulae deducuntur, ac imprimis in illis simplicioribus cantibus observantur, qui consonantias artis conquisitores non facile admittunt, quales sunt plerique Scotici queruli cantus. In illis scilicet, sonorum successio, ut plurimum, per equidistantia intervalla procedit, dissonantibus, nexus tantum gratis, insertis (49.)

5. Tandem de consonantibus Tartinianis &c. dictis sequitur observandum:

a. Quantum differentiae in sono generato oriatur ex levissima intervalli generatrix mutatione, quod praecipue in parvis intervallis patet.

b. Quod si sic regulariter disponantur consonantia intervalla, ut dissonantiae extremum acutum sit gravius diatellasi superius dispositi, et tertia majori ac ipsidem tertia minori superati; illae omnes consonantiae singulae producant sonum eundem, et eundem quasi pro basi suae agnoverint.

XV. Varias consonantias, illarumque phaenomena, miratur physiologia, ac, ut par est, explicare tentat. Verum, in naturae contemplatione, saepius ignorantiam fateri cogimur, quam doctrinam jactitare datur. Quenam sit in genere consonantiae causa et origo? An concursus vibrationum? Sed cur paululum alterari quaedam consonantiae possunt, aliae vero omnino recusent? Cur et paulo differentes respectu concursus vibrationum sonorum conjunctiones diversissimas tamen producant effectus, ita ut, v. gr. ex ratione 5:6, suavissima oriatur consonantia, cum e contra ex ratione 6:7, dissonantia injucundissima? An regularitas quaedam in successione vibrationum, ita ut ad symmetriae ocellariae leges perveniret (50.)? An, ut CAKRAEI fuit opinio, simplicitas adeoque facilis perceptio relationum acuminis? Sed hisdem objectionibus subjiciuntur illae opiniones. An harmonicorum naturalium concursus, ut putat EREVIUS? Sed cur inter tertiam minorem et septimam, quae hoc respectu conveniunt, respectu tamen distinctus et consonantiae tantopere discrepet? Nonne igitur ad conclusionem HALLAZI supra memoratam (X.) redituri sumus? Rursus, quomodo duos vel plures vibrationum ordines eodem tempore distinctos suscipere et propagare possit vis sonatrix conductor, non bene patet;



patet; nisi cum Illustrissimo De Mairan supponantur innumeri illius particularum ordines respectu elasticitatis et magnitudinis quorum singulus singulo cuique tono vel ejus harmoniis suscipiendis aptus sit: sed demonstrat EULERUS (51.): "Medium elasticum quodcumque, ad omnia generis vibrationes recipiendas aptum esse accommodatum." Si vero ad consonantias sympatheticas et naturales nosmet converteriamus, non facile quidem concipiemus, quomodo illarum phaenomena cum legibus motus notia congruant. Cur enim ad certos sonos certae tantum sonabiles chordae fiant sonorae? Si sonitus causae primae in motu vibratorio sonabilium corporum jaceant, quid variarum vibrationum mobilitatem ita determinet, ut sono cuiusdam omnino resistant, dum sono acumine proximo moveantur? Porro, quid ita chordam sonabilem modifcet, ut proportionaliter in partes plurimas dividatur?—Nonne dubitandum est, an et haec divisio consonantias naturales bene explicet, cum non possit concipi quomodo eadem chordae sonorae pars simul vibretur quatenus recto distincta, et quatenus totius chordae sonorae pars formalis, ut dicunt metaphysici? Quid pulsus Sauvencianos imperfectarum consonantiarum producat, quoniam nec bombi sint, nec numero pauciores cum ad perfectionem approximetur consonantia, nec ideo pendentes a concursu vibrationum, ut contendebat Illustrissimus SAUVEUR, nec ab interruptione periodica successione illarum brevium cyclosum, ut asserit D. SMITH (52.)? Quid soni praecipui, per harmonicos suos mobilitatem? Quid tandem consonantias Tartinianas? Si concederemus enim, quid negamus, vibrationes ipsius chordae sonorae primam soni causam esse, et omnia alia phaenomena per eas explicari posse; nusquam tamen, ut ego puto, hanc gravioris soni per acutos generationem explicare valebit haec doctrina (53.): Atque tandem nostram hic summam ignorantiam fateri cogemur; hoc tantum ex phaenomenis collecto, quod nempe chordae sonorae vibrationes illis explicandis sint impares.

XVI. In omni successione musica, est sonus quidam ad quem alii modulantur, ita ut ille vel ejus harmonici praecipue recurrant, ac tandem cantum ipse dirimat. Ille vocatur *Tonica*, ejus proprietates praecipuae est, quod ad illam solam pertineat perfecta consonantia, diapentes, nempe, et tertiae majoris vel minoris cum diapaso; cum, e contra, aliis in eadem successione sonis consonantiae minus perfectae compositionis, vel cum dissonantiis junctae, sint melius

medias adaptantur. Regula autem modulationis exinde consequens *Tonus* (§4.) dicitur, cujus distincti gradus successivè nominibus sequentibus adstantur: *Tonica*, *secunda*, *medians*, *subdominans*, *dominans*, *sexta*, *septima* (quæ *senilis*), *Oct. sensibile*, dicitur, si sit dominanti ad tertiam majorem (§5.) Quoad intervalla, secunda *toni* ad secundam majorem, subdominantem ad diatessaron, dominantique ipsa ad disipente univæ semper esse debent; unde, si nullam omnino mutationem in successione diatonica (§IX.) admittere velis, quatuor tantum *toni* in illa reperiuntur. Verum, genere chromatico admissò, duodecim *toni* adstantur, non tantum suo acuminis gradu, sed etiam temperamenti ope, pro variis intervalloꝝ alterationibus discrepantibus, ita ut, etiam variante acuminis gradu, exercitatis auribus *tonus* adhuc distinguatur; unde summa in modulatione varietas. *Tonica*, *dominans*, et *medians*, quæ *toni* sunt præcipui soni, cum suis consonantiis propriis, sed, varietatis gratia, diversimodum inverſis et ordinatis, sæpe in eodem cantu recurrere debent, et pauſæ, vel clausuræ (*Cadenæ*), illis præcipue riti debent. De *tona* quodam in alterum transire fas est, et sæpe necessarium; sed ita ut quidam, saltem ex præcipuis sonis, quatenus præcipui adhuc remaneant. Sic a *tonica* ad *dominantem*, vel ad *mediantem*, pro *tonicis* assumptas, concorditur transitiõ. Si *medians* sit, ad tertiam majorem *tonicæ*, *Modulus* (*Mode*) inde major; si ad minorem, *Modulus* minor, oritur. *Modulus* autem major a minori præcipue differt: 1. Quod ejus *medians* sit ad tertiam majorem *tonicæ*. 2. Quod eodem modo descendat, quo ascendit. 3. Quod nec tertias, nec sextas minores, sed majores tantum, in suis consonantiis admittat. In *modulo* autem minore, 1. *Medians* est ad tertiam minorem *tonicæ*. 2. Ascensus differt a descendu. Cum enim ascendenda a dominante secunda majori distet sexta, et tertia majori septima, eodem soni descendende, ad hemitoniam et tertiam minorem a dominante distantiam reſtituuntur. 3. Tertias et sextas minores tantum admittuntur in consonantiis. Formula *moduli* majoris datur in successione diatonica supra memorata (§X.); *moduli* autem minoris, in eadem incipiendo, per sextum sonum pro *tonicâ* assumptum, et exceptiones jamjam dictas in sextam et septimam in ascensu notando. Aliquando, sed raro, ex *modulo* majori in minorem, et vice versa, transitur; et semper ad *modulum*, ut ad *tonum*, præcipue revertendum est, ita ut eodem *modulo*, sicut etiam eodem *tono*, incipiat et desinat cantus. Generis chromatici ope,

24 moduli obtinentur. Sunt enim 12 *toni*, qui singule modulos duos admittunt. Cum variis *tonis* pro modulo sonis variae competant consonantiae, formula inventa fuit regula, Diapasi dicta, quam in auctoribus videre est (56.), juxta quam harmonia dirigenda sit, nisi notentur exceptiones.

XVII. CAETERAS modulationis regulas docet harmonia; easque hic recensere longius foret. Verum, quod majoris est momenti, ipsius harmoniae principium quaesiverunt systematici, unde et moduli majoris et minoris regulae deducerentur. III. RAMEAU, cujus systema longe clarius facit Celeb. D'ALEMBERT, ex consonantiis naturalibus modulum majorem deducebat; en nempe principio natus, quod natura per saltus non incedat, ideoque, quod, ut ex consonantia quadam in aliam fiat jucunda transitio, utriusque communes esse debeant quidam harmonici naturales, per quos melos transeat; sicque melos, quod ut plurimum in acutioribus datur sonis, a basso sive gravioribus deducebat. Quoad minorem vero modulum, primo hunc deduxerat RAMEAU ex vibrationibus sympatheticis ab acutiori sono generatis; sed deinde melius ad idem principium, consonantiarum nempe naturalium, hunc etiam modulum revocavit D. D'ALEMBERT (57.) Dissonantias idem, ex distinguendi *toni* necessitate, in praecipuis *tonis* consonantiis, supponendo subdominantem unum e praecipuis *tonis* sonis (*Cordes essentielles du Ton*) esse. Huc autem suppositioni objicit Dom. ROUSSEAU, et dissonantias et serie harmonica quae consonantias naturales dat ultra ipsas consonantias infectata deducit. III. vero TARTINI (58.) cum suis invenisset consonantias, sonum nempe graviorem acutioribus generari, in illis principium harmoniae fuisse; cumque ex his phaenomenis, et ex serie consonantiarum naturalium harmonica sequatur, harmoniam totam in proportionibus harmonica comprehendit, quae monade componente et monade plena seu composita evadatur; eumque tandem hac proprietates nec lineis rectis, nec solis numeris abstractis, sed circulo tantum quoque competant, ex circuli analysi omnes harmoniae regulas deducit. III. Auctor, modulum nempe majorem ex divisione Geometrica diametri chordae sonatae comparat; minorem vero ex ejusdem arithmetica divisione, ac dissonantiae tandem ex quadratorum ordinatarum a diametro ad peripheriam ductarum relationibus. Sed haec omnia in ipsis auctoribus videnda sunt. Nonne vero hoc systema melius judico,



tioces, in quo bassus a melo, quam illud in quo melos a basso, deducatur?

XVIII. Nec tandem sufficit, ut juxta omnes modulationis et harmoniæ leges componatur, vel compositus efficiatur cantus, ut placeat. Nisi enim operi suo compositor hoc nescio quid significantis addat, quod a recreationibus Expressio dicitur, quousque totius difficillimam partem non immerito judicant, Lydiumque ingenii veri lapidem, nisi quousque hoc in executione pateat, frustra laborat uterque; nil præter vanos sonos, ne vel levissimas quidem affectiones, movebunt: Dum, contra, expressione peritus musicus vel etiam omnino irregulares cantus magna efficiētes reddere valebit, omnia significanti et accurata descriptione pinget, omnique humanos affectus exhibet. Expressio datur alia in compositione, et alia in executione.

1. In compositione, musicus ita partes omnes dirigit, ut cum maxima varietate in unum concurrant sensum, qui semper prævaleat, atque sub omnibus aspectibus pateat. In illum pingendum concurrunt cum acuminis sonorum variis proportionibus, successibus, suspensionibus, &c. cantui proprius rhythmus, rhythmoque propriæ alterationes, ita ut aliquando quedam tempora, immo et quasdam mensuras, impleat unus sonus, generalis cantus motus, quem Itali exprimunt verbis *Adagio, Grave, Andante, Allegro, &c.* Concurrunt et ipse tenor sonorum, ita ut instrumenta bene eligantur, tubæ et tympanum bello et pugna, tibia amoribus et gratiis, organum magnis et majestate plenis rebus, chelys, et longe ante nomina vos, omnibus pingendis; concurrunt robor generale, Italia *Forzissimo* dictum. Concurrunt transitiones et mutationes *Tempo*, modularumque, immo et exceptiones harmoniæ legibus, &c. His omnibus, pro vario meli sensu, nisi cantus suos nativum compositoris ingenium dirigat, nil ex splendidissimis nasceretur consonantiis, nisi nullus pondus soni, nugæque confuset.

2. Idem de cantus executione dicendum venit, in qua, nisi omnia quæ compositoris movebant pathemata recurrerint, ille frustra pulcherrima ingenii sui speculosa prodegerit. Connexum et impetum sonorum (a cujus cum rhythmî vi quantum expressivis pendeat, ex tympani bellici effectibus bene notis patet), præcipue dirigit verum in executione ingenium, ita ut vel distincti, vel leviter alligati, vel plene copulati, vel fortes vel debiles, vel in magna sint; ita etiam ut rhythmos apte exprimatur, ac im-

primis ut idoneus motus generalis bene reddatur, et nunc amoris lepores, nunc benevolentiae calor, nunc multarum gemitus, nunc et superbiae elatio, &c. digor atque pigantur et moveantur, nisi velit musicus ut prorsus inopes rerum pulcherrimi cantus evadant (59.)

XIX. Si non haec satis sint. Plura bene multa his subjungere primo suis animus, de soni musicæque in systema humanum effectibus. Stultus ego! qui non haec longiora et caprum meum superanti aviderem. Si enim has ambages resolvere tentarem, primo dicendum fuisset de soni effectibus quatenus sensatio sit, quod maximam nervosi systematis partem exhauriret; dein, quid sympathia in cortice et medullare vivum nostrum possit sonus; tum, quoniam ex acuminibus oriuntur effectus diversi, quoniam ex tenuitate, ex impetu, quantitate, robore; quid deinde ex successionebus varietas sonorum, quoniam arte musica omnia pingat, nec tamen mechanica imitatione ut locuste probavit Celeb. HAUNIS (60.), sed nescio qua mentis et fluidi nervosi excitatione. Inquirendum quoque foret, cur et quando lesitivi vel stimuli vires agat, quibus virtutibus polleant harmonia, melos, rhythmusque; quos tandem morbos levare et curare valeat musica, et imprimis quos reapse curaverit; quid de tarantula censendum, et quoniam de hac bestiola BACCHIO fides? Et haec quoque, Vir Spectatissimo, perpendenda foret hypochondriacis inveterata, quam saepius mihi tenuisti te mulices ope curasse, cujusque, mihi roganti, historiam benignus scripto mandasti. Sed quoniam haec omnia hocce tentamen jam longius quam par erat ad ponderosum librum adangerent, restat ut tibi, Vir Optime, pro beneficiis omnibus tuis, et praesertim pro amicitia qua me honorasti, de pectore gratias agam; neque fortunatum iester, quod hic uno eodemque tempore, te norisse, immo tecum habitare, summiQUE CULLEN, hujus academici decoris, doctissimi honoris, datum fuerit. Ut ille, Tugur, Conjuxque tua amabilis, mihi quoniam, Vir Clarissime, dia Caledoniam adornetis, plurimum valeatis, meique identidem munificentis, ferventer ac flacero animo precor.

LUDOVICUS ODIER.

Disam Edinburg  
 6 die Kalendas  
 Jul. 1770.

NOTA

## N O T Æ

Ad quæ referunt numeri minores in parentheſibus.

(1.) Rouſſeau Dict. de Muſique, art. *Bruit*.

(2.) Ill. Nob. Verulamius bombum in internum et externum diſtinguit, per enumerationem, ac præcipue prout ær percutitur, vel percutiatur. Vid. Sylv. Sylvarum, Cent. II. art. 187—191.

(3.) Malcolm's Treatiſe of Muſic, p. 9.

(4.) Sic apud philoſophos ipſos incertum eſt ſystema vibrationum pro cauſa ſoni acceptarum, ut alii illarum frequentiae acumen ſoni tribuant, alii autem hoc minui conſictus vi pæſſu maſſarum conſiſgentium majori minorive ratione, referendum contendunt, vibrationibus ipſis pro eſſectu concomitante habitis, quo magis minusve diſtinguatur ſonus proprius a bombo, prout magis minusve frequentes ſint. Vid. De Buſſon, Hiſt. Natur. 410, t. 3. p. 336. et ſeq.

(5.) Haller. Elem. Phyſiol. t. 5. p. 261.

(6.) Kircherus tamen, (Muſurgiae lib. 1. cap. 6.), de ſaxo ſordo mirabili in Scotia loquitur, ſub quo latentes, reſerente Hect. Boëtio, quantumvis ingenti ſoni excitati, nihil præter æris agitationem percipiunt.

(7.) Franklin's letters and papers, &c. let. 44. p. 435, ſc. Vid. etiam W. Jones on the firſt princ. of nat. phil. p. 128. Philoſ. Tranſact. N<sup>o</sup> 360, p. 972. Sic de his ſictis concludit Celeſt. Dr. Halley: "What may be ſaid to the propagation of ſound through a medium, according to the received theory of the air, above 300,000 times rarer than what we breathe, and next to a vacuum, I muſt confeſs, I know not."

(8.) Vide Leon. Euleri Opuscula, De Propagatione Soni. Nec ſolvis difficultatem Vir. Illuſtriſ. hanc accelerationem pulſuum frequentiae tribuendo. Derhami enim experimenta omnes ſonos, ſive acuti, ſive graves ſint, pari velocitate propagari probant.

(9.) Franklin, loco cit.

(10.) Le Cat Traité des ſens, p. 261.

(11.) Sic



(11.) Sic partim censuerunt Du Hamel, W. Jones, Lovett, &c. Vide Lovett, Philosoph. Edays, p. 49.

(12.) Kircherus etiam in vacuo Toricelliano dicto, plumbi tubi ope facto, *limpidissimum sonum* excitavit. Vid. Musurgiae lib. 1. cap. 6. digr. &c. Numne tamen dubium sit experimentum, cum *aq̃a ad 10 tantum pedes sese steterit*?

(13.) Franklin, loco cit.

(14.) Aliam ingeniosus Th. Willis, De Anima Brutorum, cap. 14. ibensiam protulit, sonatricem vim propagari trans sonorificas particulas aëri intertextas et cum illo vibrantes. Hanc doctrinam relatate profecto non novisse est.

(15.) Vide Halleri Elem. Phys. lib. 15. sect. 3.

(16.) Immo, si fides Ill. Auctori, (Vide Instit. Medicæ ex novo Med. Consp. p. 97.), sonum etiam sine palpe illius auxilio percipi posse, videretur.

(17.) Dr Cullen's Syllabus, Mss. on the Nervous System, § IV. 3.

(18.) Dr Cullen's Syllabus, IV. 1.

(19.) Instit. Med. § 277, 278.

(20.) Euleri Opusc. N. Theor. Luc. et Col. cap. 1. § 23.

(21.) Newtoni Princip. Mathem. lib. 3. reg. 1.

(22.) Princip. Math. p. 484.

(23.) Allert Col. Albrecht. (de Effect. Music. § 71v) quod, cæteris paribus, sonum soni est in reciproca ratione subduplicatione specificæ gravitatis chordæ sonoræ. Sed videre est in Merfenni Harmonicis, ni fallor, tabulas quibus huic regulæ contradicatur.

(24.) Commis est intervallum inter duos sonos chordæ sonoris productos, quantum longitudinea sint inter 6, ut 51 : 36.

(25.) Observat tamen nuperimus auctor, quod quartus successioni diatonice sonus aliquantulum gravior sit, si ab acuto ad gravius extremum descendendo procedatur, quam si ascendendo a gravi ad acutius. Observat quoque idem ingeniosus auctor, cum Ill. D'Alembert, aliisque, sextum iidem sonum sæpe aliquantulum graviorem occurrere. Vid. Holden's Essay towards a Rational System of Music, P. I. art. 23. and 24.

(26.) An series diatonica deduci possit ex hoc principio physiologico, quod nempe propenditur in consideratione magnorum numerorum, hoc mente in numeros plurimos minores dividere, quorum ope totum concipere valeamus? Dom. Holden ex hoc principio, et seriem diatonicam, et rhythmum

rhythmum musicum, et harmoniam, explicare lentat, et ei eodem fere modo quo Cartesius olim. (XII. et XV.) Vid. Halden's Essay, &c. p. 111. et seq.

(27.) Miram vide historiam in Ligon's history of the island of Barbadoes, p. 48. and 49.

(28.) D'Alembert, Elements de Musique, part. 1. cap. 18, 20, &c.

(29.) D'Alembert, Réponse à Mr. Rameau, p. 234.

(30.) Optics, book 1. part 2. prop. 3.

(31.) Nova Theor. Lucis et Col. cap. 5. § 127, 118, et seq.

(32.) De Trichecho Manato, atque etiam de Mure Musculo, narrat Ill. Linnaeus, musica hos delectari, primumque veterum Delphinum fuisse. Mihi idem narravit Dom. T. T. Tucker, amicissimus, mecum Candidatus, Lacertam Iguanam in Indis Occidentalibus, musicae gratia (ut putant) fisci, et laqueo deinde capi. Sed haec omnia non satis accurate fuerunt observata, ut inde ad diatonicam voluptatem brutis quoque inferam concludatur.

(33.) Afferunt tamen quidam auctores in Persia provinciam dari in qua vagitus infantiles diatonicam sucessionem accurate servant. Vide Memoirs of tria juncta in uno, &c. P. III. § 5. Sed credat Judaeus Apella.

(34.) Immo totam, ut olim putabatur; etenim Guido Aretinus hexachordam illum tantum admittebat, ejusque sonos tantum denominabat; septimum vero diatonicum sonum quasi ab alio Tono pendentem considerabat. Vide Halden's Essay, P. I. art. 55. in nota.

(35.) Vid. Kircher. Musurg. lib. 1. cap. 14. Linnaeam, De Buffon, &c.

(36.) Haller, Elem. Physiol. 1. 5. p. 303. et 304.

(37.) Elegantissimum hujusce generis exemplum vide in Rousseau, Dict. de Musique, pl. B. fig. X.

(38.) Ren. Descartes Musicae Compend. p. 2.

(39.) Ligon, Hist. of the Island of Barbadoes, p. 48.

(40.) Laffont. Moeurs des Sauvages, 1. 2. p. 213, &c. 12mo.

(41.) Compend. Musicae, p. 4.

(42.) Compend. Mus. p. 3. Vult (scimus ille vir exinde deducere saltationis artem quam etiam bruti docentur, per mechanicam necessitatem & suaviori sympathetica concussione spirituum nallorum ad unumquemque battum. Sed si sic sit, cur idem ad arbitrium saltationem et participare et contemplari tantum possint?

(43.) Graecis instrumentum fuit, Magadis nomine, quod binis

binis chordis ad diapason iuxta quosdam (Rousseau, *Dict. de Musique*, art. *Alagadiser*) ad tertiam iuxta alios (Dr Brown's *Dissertation on Poetry and Music*, p. 62. and 69.) tensis componebatur. Ad primam sententiam potius propenderem.

(44.) Tensionem hic in genere assumimus pro omnibus causis quae acumen mutare possint.

(45.) Observat. Dom. Holden longe plures esse consonantias naturales pro natura conflictus et configentium corporum quae sonum quendam edunt, ita ut, inter illas etiam si quae hic notamus ut plurimum praevalerent, non desint tamen aliae bene multae, quae imaginationi nostrae opem ferunt, ut sonum totum quasi unum ex aliis soni fundamentalis naturalibus harmonicis consideremus, et illi adjungamus perceptionem aliarum consonantiarum, inversarum hujus alius soni perfectae, unde et diatessaron et sexta adorianitur. Vid. Holden's *Essay*, &c. P. I. art. 137. et 138.

(46.) Rousseau *Dict. &c.* art. *Batte-mans*.

(47.) Smith's *Harmonics*, p. 107, 108, &c.

(48.) Clar. Sauvages ex pulsibus illis, quos Sauvagenianae pulsationes denominat, proximam causam deducit illius morbi quem Serignum Sufurcum dicit, ingeniose supponebat organa exigua auris cum mentu brevi harmonice tendi, ac continuo vibrari, sed tunc tantum exinde perceptionem quandam oriri, cum harmonia destructa, pulsationibus Sauvagenianis, minus usu familiaribus, datur locus, unde morbus. Vide Nosul. *Method.* t. 2. p. 196. &c.

(49.) De consonantiis melodis, vide Franklin's *Letters and Papers*, let. 57. p. 467.

(50.) Haec ingeniosissima me communicaverat opinio. Dom. T. T. Tucker, et tabulam elegantem variorum ejusmodi symmetriae mosorum pro variis consonantiis tabula ostenderat, eodem prioris modo quo Ill. Leon. Eulerus (Nov. Th. Luc. et Col. 87. 88. 89.) colorum impulsivum explicaverat.

(51.) Nov. Th. Luc. et Col. 59. 60. 61. &c.

(52.) *Harmonics*, pag. 110, 114, &c.

(53.) Dom. Holden consonantias Tartinianas (quas confundit cum pulsationibus Sauvagenianis) explicaturus, observat, quod generatus sonus idem est qui obtineretur differentia vibrationum quae generatores constituunt duplicata; unde deducit vir ingeniosus, quod, abstractione facta omnis vibrationum concursus, mens illarum relativam velocitatem percipere possit, unde consonantiae Tartinianae produ-



producuntur. Vid. Holden's Essay, &c. P. II. art. 75. Verum cur antiphoniæ nullum generent sonum? Cur et dupla, non simplex, vibrationum differentia percipiatur? Non facile est enim intelligere, quid sibi velit auctor per itum et reditum singulæ æris particulæ, aurem assicienti, quasi duo pulsus essent, ut explicat ille. Quomodo, a relationis judiciaria perceptione, sensatio ab impressione oriri possit? Tandem, quomodo et relatio illa percipi possit, me non intelligere fateor.

(54.) Ne confundatur *Tonus* (*Key*) cum *tono* (*Tone*), primum Italicis characteribus notamus.

(55.) Observat Dom. Holden, P. I. art. 21. quod in serie diatonica, qua modulus major exprimitur, effectus relationis sonorum a tonica successorum, sic datur, ut tonica et dominans, quæ tetrachorda disjuncta incipiunt, imperium et audaciam exprimant, secunda et sexta sint querulæ et sebiles, mediana et sensilis quasi supplices, subdominans autem quidpiam solennis et gravis, exprimat. Cum his affectibus apte congruant quatuor pathematum genera quæ Dom. Webb a musica per harmoniam sympatheticam cieri observat (*Observations on the Correspondence between Poetry and Music*, p. 9. and 10.) unde deducit auctor subtilis musicæ effectus generales tantum dari, nec unquam specificos, nisi in illius auxilium vocentur quædam aliæ vires, qualis poësis apud antiquos. In modulo autem minori, tonica querulum, mediana vero grave quid, exprimit.

(56.) Rousseau Dict. art. *Règle de l'octave*.

(57.) *Elémens de Musique*, p. 22.

(58.) *Traité de l'Harmonie*.

(59.) De expressione musicali vel in compositione vel in executione, consule celeberrimos auctores Avison, Rousseau, Geminiani, Brown, illustrissimumque Prof. nostrum Gregory in libello suo ingenioso ac elegante, cui titulus, *A Comparative View of the State and Faculties of Man with those of the Animal-world*.

(60.) *Discourse on Music, Painting, and Poetry*, p. 67.

DISQUISITIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

CYNANCHE STRIDULA:

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academicæ Edinburgensis Præfati;

HEC MON

ANNO DOMINI MDCCLXXV. ACADEMICÆ PRIMUM.

ET UNIVERSITATIS FACULTATIS MEDICÆ DEFENDIT

PNE GRADU DOCTORIS,

YUENISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS AITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ARUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

THOMAS CRAWFORD, BRYANNUS,

Phys.-Med. Soc. Edin. Sod.

Ad diem 14 Septembris, hora locoque solitis.

1771.

---

Viro præclaro

IOANNI ELLIOT, M.D.

Apud Londinenses,

Summo cum civium commodo,

Sæpæ gloriæ,

Medicinam probe exercetis,

Hæc calami juvenilis prima curamina,

Ob beneficia in te suosque collata,

Dicata valeant

THOMAS CRAWFORD.

# STRIDULA CYNANCHE.

**H**UJUS dissertationis argumentum seligo, neutiquam gloriola perlustrus, quidquam me aliis profuturum; attamen haud parvi esse existimo, quamvis non datur alios edocere, si hanc rem accuratius evolvendo lucrum nobismetipsis fecerimus; praesertim cum ii, qui de morbo scripserunt, de quo verba facere volui, haud multi sunt; morbus vero peritissimis insidias instruit; et, quoniam in solo meo nativo quam maxime grassatur, hac per se valet, ut ad hanc rem omni studio incumberem; "cari enim sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares." Morbus de quo tractaturus sum, vulgo per vocabulum *Croup* cognoscitur; et nuperrime depictus fuit Dr Millar, sub nomine *Asthmatis Infantum*; et Dr Home, *Suffocationis Stridulae*.

Haud mirandum foret, si paululum ab communi ordine divertam, et comperindinata sit hujus morbi definitio, donec facta et historia morbi relata fuerunt; ex his enim depromenda est definitio, et per haec tantum, locum, quem obtinet morbus in Nosologia, statuere queamus. Hoc vero inter medicos adhuc disceptatur; fortasse lux quaedam afferenda est ex analogia aliorum affectuum, haud multum dissimilium, et jam, ne diutius moremur, faciem morbi, sicuti plerumque se monstrat, depingere conabimur.

## HISTORIA.

SECUNDUM auctoritatem, quae accepta fuit, aggredietur tunc praecipue morbus, quum frigus, et anni tempestates uvidae adint, quo tempore catarrhi, tusses, et anginae, maxime grassantur, et in humillimis humidisque locis, littora quoque prope maritima: Cuidam aetati ferme proprius esse videtur morbus, post ablactationem, aetatem tenellam, et raro post annum decimum vel duodecimum, invadens. Accessus ejus est per saepe tam subitus, ut infans vesperi facie externa sanus, ante summum mane in maximo periculo versatus erit. Ut plurimum adoritur cum respiratione difficili, mox citata; facie subrubra; nonnunquam una cum tussi misi; non semper vero comi-



tatur tussis, et, quando adest, plerumque est sicca, clausa, atque rauca, aliquando: Vox stridet, aliquantulum galli cantum referens, quod evenit sub inspiratione; non semper tamen patet hoc symptoma in exordio morbi, nisi dum vagatur, vel voce intensiore loquatur miserimus aeger, vel alio quovisunque modo musculorum laryngis actionem augeat: Quando aeger ea est aetate, ut querimonias edat, modum quo tentatur designantes, plerumque de dolore obtuso tracheae arteriae partem afficienti superiores queritur; et sulcande externae tument fauces, amygdalaeque inventae fuerunt tumidae; urina limpida; alvus plerumque adstricta, et cutis arida, simulque oedema afficit manus atque pedes, rari autem; et idem de vomitu molimine dicendum est. Sitis adest, et pulsus citatior, solitoque fortior; postea autem fit debiliior, sed velocius et vacillans. Si morbus ultra diem tertium, quartum, vel quintum, vel diutius pertendit, materies purulenta mucocommissa expuitur, et aliquando membrana tenax faciem tracheae internam conservans: Urina jam sedimentum depunit fuscioraceum: Lingua alba est, et crassa nonnunquam cooperitur: Citatior devenit respiratio, eodemque tempore difficilior; et, dum peragitur inspiratio, assurgunt humeri; inquietus valde, animoque demisso, opprimitur aeger; facies colore livido; mens adhuc sana; parvae vel nullae eduntur querelae, et brevi aut mortem edulia deglutiuntur aliquando; e vita plerumque demigrat infans, die tertio, quarto, vel quinto: Morbus veruntamen saepius evadit lethalis intempestive, vel in primo aggressu.

Ut absolutior sit morbi historia, cadaverum satisfactio adjuncta sunt; et hic cluserunt cura atque diligentia sagax Cel. Homii, qui novem et unicas sectiones, quae captae fuerunt, tradidit.

Cadaverum Extispicia.—Aspera arteria referata, imprimis transpiciunt membrana alba, crassa, tenax, atque tubularis, quae facile a partibus circumpositis sejungi potest, ob materiem mucosam atque purulentam illam inter et tracheam positam: Illius partem inferiorem versus pedentem nimis firmiter asperae arteriae agglutinatur, et fit tenerior; ubi vero desinit, trachea rursus purulenta obducitur, qui maxima ex parte scaturit vel in pulmonum bronchus, et vesiculis aëriis, quae haud raro omnino oppletur: Haec membrana nunc majori nunc minori est longitudine, et tanta tenacitate saepe numero gaudet, ut macerari in aqua per plures dies patitur, et neutiquam dissolvitur: Ex novem casibus Cl. Homio memoratis, in sep-

tem inflammationis symptomata in propatulo veniebant, membrana praeternaturali sublata; et nobis forsitan licitum sit ex illis, quae in alteris duobus casibus (a), apparuerunt, concludere, inflammationem praevisse: In quinto enim glandulae apud linguarum radicem se praebuerunt turgidae, et amygdalae solito grandiores erant. Pars interna atque posterior tracheae cum membrana semiformi obtegebatur, et materies puriformis inter illam et membranam tracheae extabat; et cum deorsum indagatio facta esset, major materiei purulentae copia detegebatur: Pulmones tamen illaesi se commoustrabant. In casu octavo, membrana omnibus numeris tubularis deprehenditur, a glutide per tres pollices deorsum descendens, nec cum trachea conglutinata, et tracheae tunicae integrae, nec exulceratae, videbantur, illaesis simul pulmonibus. Venticulae vero sinistri pulmonis flavo et ipso pure plenae erant, quod in aquam coniectum fundum petebat. Invenitur porro nonnunquam gangraena. His conspectis, ex morbi symptomatis jam recensitis, et phaenomenis propalam sectione collocatis, quaedam observatu veniunt, ad morbi ingenium spectantis, et ex quibus definitis constanda est.

Sunt qui contenderunt, hunc morbum vel in principio totum asthmaticum esse, et phlogosin sequelam duntaxat ipsam. Praeceptor vero noster Homius verosimilius forsitan inflammatorium esse arguit: Ab re minime foret anni tempestatem notare, in qua praesertim aggreditur, frigidam esse; frigus autem vix morbis spasmodicis amicum existimandum est; e contrario, hi in regionibus calidis, calidisque temporibus, saepius occurrunt: vel, si ex genere spasmodico esset suffocatio stridula (b), certe remissiones majores evenirent. Alterum argumentum asseri potest ex casu pleuritico, quod in superficiem sanguinis nonnunquam se effert: huic tamen multum confidere nolui; res enim ejusmodi sunt fallacissimae. Dr. Millar iudicium suum confirmare tentat per methodum suam medendi, et neutiquam equidem tale aspernandum est ratiocinium; veruntamen haud tanti habendum est, ut exinde de natura morbi decernere omnino debemus; nam antispasmodica, talia sunt moschus et asafœtida, aliter prodesse potuerunt, quam spasmus vi quadam propria solvendo, sudorem nempe alliciendo, vel alvum sub-

ducendo,

(a) Vid. cas. 5. et 2.

(b) Home on the Croup, p. 37.

ducendo, quietem aegro conciliando, et sic motus musculorum laryngis contiguarumque partium imminuendo, quae ex levissima causa jam motum assumunt abnormem, morbum atrociter insidentem; probabile videtur haec medicamenta ita potius proficua esse, quam ex quadam vi spasmodum solventi; et ea medicamina cum maximo fructu certe adhiberi possunt; quoniam aliter vix censendum est, quin levis inflammatio partibus glottidi vicinis insidens in systematis infantum irritabilibus, paroxysmos asthmatis suffocativi validos facile excitare potuisset. Restat adhuc alterum argumentum, quod comprobatum venit, hunc morbum inflammatorium esse, nempe membranae tracheae arteriam involventes; nam illae in cavis corporis post phlogoses, maxime pectoris, pleuram, externamque faciem pulmonum cooperientes, inventae fuerant, et in omnibus partibus, ubi istae dantur conditiones, conformationi illarum faventes. Haud mucro forte evanescenti has membranulas relegare liceat; membranarum enim superficies, ubi nullae glandulae collocantur, velant; quapropter haud necesse erit mucro patrocinari. Oriuntur (c) potius ex lymphâ coagulabili per ora vasorum exhalantium exudanti; cur haec lymphâ non penitus in pus convertatur, pendet fortasse ex parva sciti copia commixta: Porro, morbum adesse posse, absque hac membrana haud improbabile videtur, quamvis saepius offenditur; amicus meus, et in re medica nulli secundus, Dr. Aulst. mihi praebuit casum, in quo, cadavere lustrato, nusquam deprehendebatur membrana; trachea tamen inflammationis signa praese se tulit: Haec ob causas membrana haecce minime causa, quasi effectum potius morbi censenda est; si enim morbi causa esset, semper eam offendi oportet: referantur autem strangulationis stridulae complures historiae, in quibus sanitatem recuperabant infantes, quando nulla membrana exspuita fuisset, et vix constet clarum, vocem stridulam ex membrana pendere. Occurrit enim, tametsi in hoc morbo quasi pathognomonice ducta sit, alius in affectibus laryngis et tracheae arteriae, sicut in cynanche tracheali vel laryngea, cuius protulit exemplum (d) Cl. Eller, in quo ex improvise e vita abreptus fuit puer, postquam convalescere visus erat: Secto cadavere, pars tracheae superior inflammabatur; interior autem erat rubedo in laryngis musculis, et membrana

(c) Vid. Morgagni Ep. 16. 20. 21. Haller. Elem. Physiol. tom. 2. p. 228. et De Haen, Cleybornium, aliosque.

(d) Vid. Eller, p. 174.



nis, præcipue in illis quæ crivoideam obtegebant, sed major inflammatorii tumoris apparebat in hinc arytenoidæis cartilaginibus, epiglottide, &c. Opponat nannullus fortasse, quod in strangulatione stridula tracheæ, larynx, &c. non semper inflammatae deprehenduntur: Difficile verò est tale affirmare, quandoquidem, ob colorem musculorum naturalem, vix pro certo dicendum est illos inflammatione haud tangi, et potissimum quando afficiuntur partes contiguæ; haud nihilominus denegandum puto, quodvis obstruens asperam arteriam potuisse idem edere effectum: At in ambiguo restat, an hoc magis efficit aeris iter angustando, an laryngis musculos stimulando, actionemque illorum intensiorem reddendo: Porro, vix concipiendum est, quidquam in quavis asperæ arteriæ portione potuisse infixum ibi manere, nec inflammationem excitare, quæ plus minus tracheam angustiores reddere queat; sed eodem tempore glottidis et laryngis musculorum tensionem intenderet; et quoniam sic maxime valent in vocem tonosque illius modulandi, actione illorum aucta, vel ex propria affectione, vel ex consensu tracheæ patienti, hoc forsitan causa maxima est soni singularis, qui evenit dum respiratur. Sed, ut illuc redeamus unde divertimus, ex analogia aliarum tracheæ affectionum, ut in catarrho suffocativo, ubi vox valde a solita aliena est, strangulationem stridulam speciem tanquam cynanches ducere suademur; et maxime quoniam sic censere videtur Præceptor noster Collenus, cujus auctoritas sola satis esset ut hic morbus inter inflammatorios conferberetur.

His obiter perstrictis, proxime tentanda est definitio, illa symptomata morbum maxime ab aliis discriminantia segregando. Et, ut ordine exordiamur: Stabilire jamjam enixi fuimus, ex familia inflammatoriorum morbum nostrum esse; indeque ad classem Pyrexiarum relegandus est, cujus characterem asciscam (c): "Post horrorem, pulsus frequens, calor auctus, viribus artuum imminutis;" et quoniam morbus tantum topicus est, inter Phlegmasias, quæ ordinem secundum classis pyrexiarum constituunt, inseram. Præstabit forsitan phlegmasiarum etiam prædicti characterem: "Pyrexia cum phlegmone vel dolore topico, simul læsa partis internæ functione: Sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens." Classe morbiq; ordine detectis, symptomata, quibus maxime stipatur morbus, nunc seligenda sunt.

Qui-

(c) Vid. Synop. Nosolog. Galleni.

Quibusdam placuit vox stridula, tanquam diagnosticum, vel sonus quem nonnulli galli cantui assimilant, sub inspiratione obtinens; idem vero fere obtinet in pertussi, et in tracheae inflammationibus; exinde ambigitur. Sed in cynanche stridula plerumque absque intermissione perdurat, et cum inprovescat morbus, intenditur; morbum praeterea comitantur respiratio difficilis, vox rauca, cum tussis clangosa. Dum autem de definitione hujus speciei cynanches in dubio haerebam, a Praeceptore meo charissimo Cullenio unam accepi, cui grates summas, et ob hoc, alique beneficia a me accepta, habeo, atque memur habeo; ecce deinde definitionem Cullenianam:

"Pyrexia; respiratio difficilis, inspiratio strepens, vox rauca, tussis clangosa."

Nonnullis visum fuit cynanchen illam stridentem novum esse morbum, Scotiacque proprium, cujus regionis quaedam loca sunt ubi crebro inest, sicuti prope littora *Fife, Argyre, et Galloway*, et saevissime in locis *Perthshire* orientalibus; et in illa planitie vulgo nominata *Garse of Gowie* praecipue, quae juxta flumen Tayum late extenditur. Haec planities vero nuper desiccata fuit, et raris occurritur morbus. Ex sequentibus tamen fortasse elucebit, morbum nec novum esse, nec cuivis regioni proprium: Nam extat in Nov. Act. Nat. Curios. morbi narratio, quae penitus ferme consentanea cum strangulatione stridula est; hanc nobis optimus Cullenus, dum publice lectiones academicas proferebat, indicabat. Ut dilucidius sit oratio nostra, historiam illam exscribam (f).

"Infantes duorum, trium, quinque, et plurium annorum, primis hujus anni, 1758, mensibus, aut coryza vulgari, aut tonsillarum et uvulae tumore correpti, et difficulter deplurientes, aliquot sic dies sine metu insidiarum et latente graviore morbi transigerunt; dein gravi tussi corripiebantur, ubi nihil nisi phlegmata aquosa cum summo nisu rejiciebant, et, sicuti in tussi serena, clangor sub inspirationis momento adest, sic in hac tussi peregrinus sonus sub expiratione se manifestabat. Huic tussi se sociabat febris continua, cum majore difficultate respirandi, quae indies aucta, tandem in asthma suffocativum transibat, ita ut infanter, ex defectu aëris, suffocarentur; quod symptomata coloris plumbei in facie, frigoris in externis membris, et febris ac caloris imminutio comprobabant,

(f) Vid. Act. Nor. Nat. Curios. tom. 1. p. 157. observ. 41. Dr. D. Caroli Augusti a Bergen, de morbo truci infanum Francfurti et in vicinis grassante.

bant, sere ut fieri videmus in illis, qui hydrops pericardii et pectoris moriuntur. Hanc tristem experientiam in propria filia septenni feci, in qua hoc singulare simul se obtulit phenomenon, quod duodecim circiter horis ante mortem tussi et serena rejecerat tubulum membranaceum. Hunc tubum iussit esse portionem membranae tubulosa per ramos bronchiarum durante morbo generatae, quod figura conica ejus, et ipsi inhærentia vascula sanguinea declarare videntur: Cylindricus vero oesophagi tubus, hujus membranae sedes esse non potuit. Atque, cum semper de dolore pressorio ventriculi conquereretur, et vermes suspiciter colludentes, tubulum huncce exquirit perstruxi, et nihil inveni, quod cum structura vermis consensientiam ostenderit."

Hic idem morbus esse videtur ac strangulatio stridula, et rationes quae morbum antiquiorem esse probant, probant itidem Scorinae minime proprium: Apud veteres enim perfunctorie describuntur morbi strangulationi stridulae similissimi. Hippocrates, de affectionibus gutturis et faucium differens in suis prognosticis, sic loquitur: "Ex anginis, gravissimae sunt et celerissime intereunt, quae neque in faucibus, neque in cervice quovisquam conspicuum faciunt;" et descriptio catenus cum nostra congruit. Coelius Aurelianus eundem fortasse in mente morbum habet; "[g] Gravari, inquit ille, asthma, atque premere magis mulieribus viros, et juvenibus senes, atque pueros, et durioribus natura corporibus teneriora, hiemino atque nocte magis, quam die et aestate: In quibusdam ex initio generatur; in quibusdam perfectis irruit passionibus; sed magis ex profundo frigore sequitur patientis spirationis difficultas, et frequenter natura celerior magis quam tarda." Hic vero Aurelianus in sua narratione haud omnino cum seipso consentit: "Gravari autem magis mulieribus viros," ait ille vir; postea vero addidit, "hoc asthma" "teneriora corpora magis durioribus premere;" quod, si reapse morbus de quo narrat idem sit cum nostro, verum est; nequiquam tamen cum parte narrationis primi convenit. Catarrhus suffocativus Etmulleri in quibusdam cum suffocatione stridula congruit; in aliis vero differt: Meadus, inter tres anginae species, quas recensuit, ponit strangulationem faucium, et de hac refert, "Nervi omnibus convulsione distensis, aeger sulcata concidit mortuus."



Dr Starr (b) morbum infantes interficientem descripsit, et cui nomen dedit *morbi strangulatorii*. Cornwalliae comitatum infestare, secundum illius opinionem, in anno Christi 1744 coepit, multasque strages fecit; signa pathognomonica sunt tussis brevis (*becking cough*), et respiratio difficilis, sonora, atque strangulatoria.

Quod expuitur, est gelatini simile cum materie alba et opaca, et filis quasi commistum; nec multum discrepat a sacculo putrido et membranaceo, et partim reapse est membranacea, ex tunica mucosa laryngis atque asperae arteriae conflata, cui adhaeret magna viscidulae materiae copia, visci adinstar.

In Hybernia (c) morbum certe eundem invenimus infantes trucidantem, quem Dr Molloy apud Dr Rutty denotavit, et cum superiore omnino convenit, in illis symptomatis, quae diagnostica censentur, in respiratione nempe quae est difficilis atque sonora; et in vi lethifera, nam saepissime ex improviso aegrum enecat; in materiae exspuita; in his quos aggreditur; et postremo in sede morbi, quam Dr Molloy in glottide et aspera arteria posuit; nulla adest deglutiendi difficultas, nec internae nec externae ullus tumor apparet; rubent vero glottis, et partes vicinae.

Dr Russel, in sua oeconomia naturae, morbum designat inter infantes grassantem a secundo ad octavum aut decimum aetatis annum, sed praecipue juniores laedere solet. Porro addidit, "Fluxio nullas non trachae glandulas occupat, ita ut universa fistula pulmonalis inflammatione teneatur. Nullus tumor in externis apparet; at, si fauces intus intuearis, in posteriori palati parte, et in epiglottide, rubor percipitur; glandulae inflammatae, siccuae, mucosae secernendo parum aptae, reperiuntur. In his etiam tonsillae nonnunquam afficiuntur, et ulcuscula quaedam serpentis laryngem cingunt, et vocem impediunt. Febris quoque oritur; quae quanquam remissionum tempora satis libera habeat, tamen singulis accessionibus respiratio crebra difficilisque urget, ita ut infans non nisi recta currice spiritum ducere, et vir lecto se continere possit; nonnunquam etiam surgere coactus sit. Sonum inter vagitus rauceum edit; et stridulum quoque clangosumque aliquando spiritum intus ducit." Ex per totam hanc narrationem summa apparet contentientia cum cynanche stridula; si ullum adhibe discrimen, oritur solummodo

(b) Vide Philosophical Transact. N<sup>o</sup> 435.

(c) Vid. Rutty's History of the Weather, p. 110.

modo forte ex morbo eodem graviore autem, vel ex quibusdam in climate, vel in solo, corpus disponentibus ulceribus facilius affici; et accendit in regionibus calidis præcipue. Sed annon necne, descriptiones illas utpote eodem morbi una cum cynanche stridula considerandas sunt? vix tamen credendum est, posteriorem solum pauculos abhiac annos enaseci: Nam, si in memoria teneamus illas, quas sæpius adoritur, quorum morbos, quamvis perbene calleamus, tamen iudicium hic est difficile; narrationem vix enim queant proficere claram, et, quum optime proferunt, haud raro equidem manca est: Præterea, morbus ipse ex sua natura indicium quodvis præcipit clam invadenda, et absque multa ægitudine, et propter magnam inter illum et catarrhum, aliosque gutturi affectus, similitudinem; nam facile inde oriri potest error. Ob has causas, tum solas, tamdiu oblitiscere a nostro inspectu potuit. Restat adhuc altera, nec minoris momenti illis jam supradictis, variat nempe in magnis urbibus, sæpiissime in vicis rusticis, ostenditur, quæ olim observantia præditis carebam. Quod Horatius de illis heroibus cecidit, qui ante bella Trojana vixerunt, et quorum fortis facta jacerunt, de morbis nonnullis apte prædicari potest, quorum historias nunquam accepimus propter honorum medicorum inopiam:

*Vixere fortes, ante Agamemnona  
Multi, sed omnes illachrymabiles  
Urgentur, ignatque longa  
Næve, carent quia vate sacra.*

Denique, ii, qui novorum morborum nomen merentur, ut variola et morbilli, sunt contagiosi, et per contagium in omnibus regionibus, et omni tempestate, diffundari queant.

*Diagnosis* in hoc morbo haud clara sunt; et facile decipi possumus, quoniam tam magna est inter morborum gutturi similitudo: A cynanche, uti Cullenus definita, distinguenda est, faucium tumoris absentia, et deglutitione parum laesa: In Grecorum cynanche vera, dolor exoritur inter deglutendum; nullus tamen tumor, vel tumor, explorandus est fræcis inspicendo; et valde conformes esse videntur strangulatio faucium et cynanche supradicta. In illa vero glottis et epiglottis gravius alligantur; indeque dolor inter deglutendum, propter ascensum et descensum laryngis. In peripneumonia et pleuri-

tide, doloris sitis, cum tussis humida, et saepe cruenta, morbum distinguit, cum tot annos habet aeger, quos sufficiunt ut molestiam suam devarret: Quando teneriori est aetate, difficillius sit diagnosi. In peripneumonia citius forsitan apparet sacculus cunctorum, qui non semper adest in suffocatione stridula, sonusque singularis quem edit infans, dum flet, et interdum per respirationem totam, laryngem labrare designat.

In hoc morbo capiti aegri periculum semper imminet; quia etiam et velociter progreditur: Mortem enim saepe affert, antequam infans morbo laborare gravi animadvertit: et quum leniter aggrediat, quantum observare valemus, ex improvviso tamen, priusquam adstantes tale expectant, mors ingruit: Stadium primum vel illud inflammationis transit aliquando minime detectum, et quando eo invaluit morbus antequam aegro succurratur, in magno periculo versatur. Sed, cum mature auxilium petatur, morbo adhuc in herba exiliente, nec multam opprimitur respiratio, nec valde laboriosa, nec enervata, et si arteriarum ictus potius fortis sit quam debilis, et vox stridat tantum, cum magnum molimen efficiatur, sicut in tussiendo vel flendo, exitum felicem auspiciari liceat, etiam si semper in incerto est. Post diem tertium vel quartum, quo tempore vel citius membranam adesse suspicandum est, si respiratio velox sit et difficile peragatur, si pulsus vacillet, et facies rubore suffundatur, si aeger inquietudine et anxietate opprimatur, etsi fortiter minuitur, sed interrupte modo ulsiat, non datur bonum expectare eventum: Quod si fortius deveniat tussis, et matres ejiciatur, et pulsus, quamvis frequens, sit fortis, et respiratio facilius concitatur, vel si aeger membranam cum symptomatum levamine exspuat, valetudo fortasse cito aderit.

Hujus morbi principia in duo genera dispartiri possunt; vel, prout in systemate ipso humano adunt, originemque morbo prodeunt; vel, prout externe agunt, et morbum in illis, qui semina habeant, excitant. Antea jam observatum fuit, cynanchen stridulam quandam praecipue invadere aetatem, nempe ab anno primo aetatis ad duodecimum, haud saepe postea: Haec semina in infantibus adaugent potissimum variolae, rubeculae, catarrhus, et pertussis. Omnes hi morbi respirationis organa afficiunt; et quodammodo catarrhi consimilis esse videtur cynanche stridula, praecipue illius qui nomen audit *suffocatio*, utriusque morbi partes ferme easdem usurpant, et eadem anni tempestate



tempestate adoriuntur. Quare infantes infestat cynanche stridula putillimum, difficile est dictu: Hoc ex mucro in illorum corporibus superabundanti pendere, anceps est; mucum in sanguine, et partem hujus simili efficere, adesse, ex scriptis Illustrissimi Senac et De Haen manifestum apparet: Mucilago vero hæc multum a lymphâ, vel parte coagulabili sanguinis, distat; lymphâ enim, vel in vivis animalibus, necessariis conditionibus concessis, scilicet effusione, quiete, superficie scabra sicut in vulneribus, &c. in coagulum abit: Porro (k), igni subjecta, "in speciem gummi fragilem et friabilem convertitur, neque solubilem, ut summam denique duritatem acquirat, et cogitur etiam alutule, acidisque liquoribus. (l) Mucilago, e contrario, facile cum aqua miscetur, inque ea prompte diluitur, et penitus odore caret saporeque; neque etiam igne, neque ulla stillatiorum liquorum, etiam acidissimorum, violentia cogitur; neque in albumen abit, sicut pars lymphatica feri." Exinde apparet, mucum et lympham multum inter se differre: Præterea, si etiam mucum in systematis infantilibus scaturire probatum fuisset, hanc illico sequitur causam esse morbi; nam in membranas transire minime (m) pronus est, et cito in aqua evanescit. Nec omnino assentiri possumus mucilaginem in hoc morbo posse in pus degenerare: A putredine adeo aliena mucî natura est, ut integro anno conservatus absque foetore manserit (n.) Et hæc de causa hanc opinionem saltem improbabilem esse, credere impellimur; simulque ne quidem aliter sentire datur, quin membrana interior tracheæ faciem invellens ex lymphâ effusa proveniat, et pus illi repertum, ut ex eadem scaturigine nonnihil solummodo in aqua diffusa enascatur. Et res ita esse, comprobatur eunt Pringelii, Gaberi aliorumque experimenta, quibus constat vel extra corpus pus produci posse. Quamprimum hæc eveniat transmutatio, doses suas statim amittit lymphâ (o): "Exuit enim omnino naturam suam coagulabilem, ut neque ab igne, neque a vehemente acore, neque a stillatio vini liquore cogatur, et igne dissipetur penitus." Quis forsitan denegabit corium pleuriticum, quod est pars sanguinis lymphatica, in sanguine infantum inesse. Jam vero cognitum est, lympham sanguinis cujuscunque generis partem efficere,

(k) Haller. Physiol. t. 2. p. 129.

(l) Ibid. t. 2. p. 168.

(m) Ibid. t. 2. p. 124.

(n) Senac tr. du cœur, t. 2. p. 201.

et Comment. Acad. Scient. Petrop. v. 14. p. 209.

(o) Haller. Physiol. tom. 2. p. 124.

efficeret, et in sanguine etiam (p) infantibus cynanche stridula laborantibus distractio apparuit.

Lympham magnam duritiem adsequi, cum calori exponatur, dudum memoravimus; Quapropter facile est concepto, quod, cum pars quaecvis inflammatione tentetur, ibi augetur vasorum actio, et pro halitu fere emissio, effunditur pars lymphatica major, sic in trachea, ibique manet assida, interea loci pars aquosa vel spiritu dessetur, vel resorbeatur, vel in pulmones distillet; et illinc lympham fiat spissior, et ad concrendum sibi que induendum membranae speciem apta, quae brevi talem firmitatem atque densitatem, consequatur, ut cohibeat serum posthac effusum, vel lympham cum aqua admistam, quae, inter membranam et tracheam stagnando, transit in pus; hocque in modo membrana ab subjacentibus partibus sejungitur. Nec necesse est ut ad opinionem Celeb. De Haen confugiamus; sentit enim *puogentiam* in vasis ipsis contingere; quia absque ulcere conspicuo in ventum fuit pus. At, quamvis nullum inveniatur ulcus, oriri potuit ex effusione et stagnatione serii in vesiculis ipsis pulmonalibus pus verum. A nostro tamen proposito alienum foret, an pus intra vasa nec ne formetur, inquirere. Sed, ut ad rem redeamus; compertum est quod frigus mucii secretionem auget, uti caciuras internas secretionem; tale tamen mucii augmentum vel in semibus. Restat igitur adhuc incertum, quod illud est infantes huic morbo subiecti, praecipue cum phlogosi haud saepe sint obnoxii. Res haec pendet tantum fortasse ex majori infantum systematis nervosi irritabilitate, vagiendo frequenter adacta, quo trachea et larynx vehementius afficiuntur, et frigori inter respirandum obiacente, facilius inflammatione corripitur possunt. Frigus cum humore conjunctum morbum facere potissimum censetur, et hac accedit saepissime apud aeras maritimas, agrosque humiles et madidos.

*Causa* cynanche stridulae trachealis membranae inflammatio est forte, et musculorum laryngis, vel propriae affectorum, vel ex consensu ob tracheam contiguam ad actionem intensiorem facillimum. Vix enim probabile est has partes semper inflammatione tangi; nam deglutitio difficilis raro tantum comitatur; haec autem aegre perfoctus functio, et cum magno dolore, cum inflammetur larynx. Rationes, ob quas dubitamus an membrana plerumque post sectionem inventa causa sit morbi, jamdudum protulimus, neutiquam audacter quasi decreturum, modo vero

quasi probabiles. Haec membrana mortis causa certe evadat, laryngis iter angustando, quo superveniant symptomata peripneumonica; cum cadavera vitamen lustrantur, pulmones illaesi maxima ex parte cernuntur.

Ut aegris facilius feliciusque medeamur, ponendae quaedam sunt intentiones, quibus expletis, praecaveatur ne lethiferae oriatur sequelae, quibus ansam praebet membrana de qua jam diximus, vel ne, propter inflammationem tracheae, excitetur paroxysmus spasmodicus laryngis, quae subito aegrum praefocet. Hoc enim facile eveniat quamvis cadavere inspecto, partes haud reperiuntur spasmodice affectae; nec expectandum est, ut talis constrictio post mortem inveniretur; nunc enim jacet vis animalis et nervosa quae actionem musculorum fovet, suscitaturque, et sine qua nulla contingit musculorum contractio. In talibus casibus summo jure Celsus assensendum est: "Neque quidquam est stultius quam quale quod vivo homine est, tale existimare esse moriente, immo jam mortuo."

Imprimis tunc consilium est nostri, ut semoveantur diathesis phlogistica.

Secundo, suffocationem praecavere.

Ad primam intentionem explendam, flagitanda est V. S. quae in hac, sicut in omnibus inflammationibus, in principio morbi cito et libere celebranda est. Dr Millar phlebotomiam forte acriter reprehendit, dum cynanchen stridulam nimis arcte quasi generis nervosi affectionem ducit. Dixit enim sanguinis distractionem parvam duntaxat comparare intercapedinem, paroxysmum autem viribus redire majoribus; porro addidit: "That, when even a small quantity of blood was taken, the effect of other medicines was neither so immediate nor certain. Finding, therefore, that no benefit could be reasonably expected from a remedy which, under the appearance of mitigating the violence of the symptoms, had upon the whole a tendency to aggravate the disease, it was in the sequel entirely laid aside." Sed difficile est distinguere, in his casibus, ubi Dr Millar existimabat venaesectionem nocuisse, an culpa esset remedii, an morbi. Cum autem cadavera lustrata clare ostendant morbum de genere phlogistico esse, et cum febris adsit saepe cum pulso veloci et nunquam duro quae sectiones patrefaciunt, confirmat. Praeceptor noster Clar. Momius discrete venaesectionem laudat in studio morbi inflammatorii, ejus haec sunt verba: "Bleeding appears to have been attended with immediate good effects, and to be a powerful remedy in  
" this



" this situation. This ought to be done expeditiously and  
 " plentifully, while the pulse will allow it. It is best to  
 " take blood at first with the lancet, so that a sufficient  
 " quantity may soon be drawn off; and afterwards by  
 " leeches, applied to the upper and fore part of the  
 " throat." Si forte hircines frequentes gutturi applica-  
 " tae essent, ne tanta venesectionis necessitas fuisset, præ-  
 " fertim in senilibus atque junioribus, et quando aeger pro-  
 " vectior sit, cucurbitula cum ferro valde prodesse potuit;  
 " in angina hoc laudat Celsus: " Cucurbitula quoque, (in-  
 " quit ille), recte et sub mento et circa fauces admoveatur;  
 " ut id, quod strangulat, evocet." Laudant nonnulli venam  
 " jugularem secare; quod inflammationem minuit, et præ-  
 " terquam levamen parat, turgescientiam in systemate capitis  
 " venoso adimendo, quod insequi solet, post sanguinis cir-  
 " culationem in pulmonibus impeditam; et ex hoc fortasse  
 " efficitur, ut nullum aeger sentiat dolorem, sana adhuc  
 " mente, quod in peripneumonia accidit nonnunquam, in  
 " qua, dum in maximo periculo versantur aegri, de nihilo  
 " tamen queruntur: Porro, hæc congestio venosa multum  
 " conducit ad spasmum excitandum, quoniam musculi la-  
 " ryngis multum præ caeteris talem conditionem suscipere  
 " prædisponuntur.

Sanguine qui sufficiat detracto: Alvus proxime solvenda  
 est, quod enixius tentare debemus, cum sarpinus adstrictior  
 esse videtur: Hoc semper absolvere possumus tutissime  
 clysmatibus: Nam pleraque medicamenta, alvum ciente,  
 infantes inquietant, et, ut vagiant, faciunt, quod haud  
 commodum est in morbi principio. Veruntamen, si illos  
 persuadere possumus laxantia propinare, facilius fortasse  
 hoc consequemur cremorem tartari in sero lactis solutum  
 et eduleatum adhibendo; et cum eodem consilio Clar. Ho-  
 mius magnesiæ in tabellis cum saccharo confectam præ-  
 scribit. Volunt aliqui ut purgantia externe corpori adhi-  
 beantur: Illa, si vero fortiora sint, systema nervosum sti-  
 mulabunt, æque ac cum ore assumantur. Præterea, re-  
 medium sic adhibitum anceps est tantum, quoniam ex vi ab-  
 sorbenti pendet, quæ vel fortior vel debilius sit; cum vero  
 purgantia in alvum per os, vel per anum accepta, vim  
 suam inferere in ipsum tubum intestinale queant. No-  
 perissime nihil efficacius in inflammationes internas do-  
 mando expertum fuit, quam vesicantium usus: Olim æ-  
 rius oppugnabatur, nunc acriem Pringellus, omni laude  
 cumplendus, vesicantium usum comprobavit: Quoniam  
 hircines affligi gutturi antea præcepimus, postquam san-  
 guinis copiaeducta fuit, vel hæc vel alia via, haud multa

post,

pon

pon

post, ut vesicatorium applicetur, solui, et ne stranguria induceretur ob cantharidum particulas, quae per morsus hirudinum facillime in corpus intrare possint, et vel ne, vesicante sumoto, ibi maneat, carbasi, gauze, portionem praestabit inter cutem et vesicatorium ponere. Post vasorum exinanitionem, vesicatorium forsitan optimum est remedium quo uti possumus, siue morbus sit spasmodicus, siue inflammatorius; et nihil ex observatu melius tuetur et infantes conservat sanos a morbo, vesicante. Aliqui adhuc, perillam inflammationem, emetica laudibus extulerunt: Clar. Humius vero autumat, se nunquam illa vidisse proficua; e contrario, suspicatur potius nocere, mucifecretionem in pulmonibus incitando, alisque illam expellendo, "which is (says he) the very circumstance that, if possible, we ought to guard against;" Sed si secretio etiam mucifecretur emeticis, attamen in principio morbi, cum tantum periculi aegro ex membranae ortu collatur, emetica adhibere utile sit, quo impediamus ne oriatur; nam si emetica ad membranam expellendam proficiant, certe etiam proderunt ad expromendam materiem ex qua conficitur membrana; aliter fieri non potest, quin plus minus expromptus erit ob inspirationem solito grandiore inter nausendum, et vehementiorem expirationem quae inter vomendum contingit. Theoriae vero obstitit experientia et emetica utilia esse, confirmat, quamvis, dum quae geruntur in vomitione si consideremus, aliter esse videretur, quum in quoque molimine vel tussendi, vel vomendi, vel stendi, partes quas occupat morbus agere, impelluntur; hoc autem vanae terrae disensit experientia. Supra notavimus cynanchen stridulam maxime grassari in orientalibus locis *Perthysire*, vel in illo terrae tractu *Carise of Gemrie* vocato; et hic ea est praxis, ut in primo morbi insultu emetica adhibeantur, et quodocunque morbus nocte gravius derepente adoriatur, et quoque ante sanguinem missum, vel alvi subductionem, et tuto optimoque cum successu; pauci enim infantes morbo interficiuntur, quibus tempellere adhibita fuerunt emetica. Curationem huius morbi vomitu confirmat Tournesart (g), cum lequatur de morbo in Oriente, cui nomen dedit *Pestis Infantum*; est enim, ut ille dixisset, apud imum gutturis carbunculus; Cum adoriatur, quamprimum adhibendum est emeticum, et etiam repetendum. Qualisqualis sit operandi modus, ex optima tamen auctoritate certius factus sum, hanc curationem felicem, nec periculosam, esse. Cognoscimus

VOL. III.

F f

emetica

(g) Vid. Tournesart's Voyage into the Levant, Vol. I. p. 121.

emetica, ante intermittens paroxysmum data, accessum illius arcere, et vehementis percussis vomitione finire insul-tus; Medicamentum, quo fere utuntur loci supra memora-ti incolae, est ipecacuanha ingrata; et inde vix illam de-glutient infantes; quare tartarum emeticum antepungere volui; qui, cum sapore et odore ferme carzat, facilius ad-hibetur. Porro, vel postquam vomitio pleno rivo excitata fuisset, operae pretium foret, hoc remedio in dosibus so-lum nauseam moventibus uti, quia via tanquam diaphore-ticum ageret; ad quod consilium sudoriferis stimulantibus, ut calefacientibus, antefereendus est. Et jam obser-vatum dignum est, posse magnum commodum ex sudore sic allato provenire; quandoquidem frigus secretionem muci magnopere augeat, quia morbum gravinrem reddat. Ex-muller (c), dum de asthma infantum, quod nonnulli cy-nanches stridulae assimilavere, vomitum laudat, quo pro-vocato, infantes liberantur. Ad eandem intentionem, qua tartarum emeticum aegro praebere volui, absolvendam, alia lenia sudorifera, ut vinum emeticum, in parvis dosibus, salia neutra adhibere possumus.

Praeter haec remedia ad febrem debellandam apta, et, si fieri possit, ut membranae ortus praeserventur, pediluvio uti liceat, una cum tepidis diluentibus, ut victu tenui, praesertim ex panada, decoctis avenae, hordei, &c. Quod ad victum pertineat, Meadius, dum loquitur de curatione strangulationis faucium, qui morbes haud multum ab-similis a nostro videtur, haec dicit: "Neque etiam inutilis est abstinentia, moderatio nimirum in cibo et potu." Fo-menta pariter ad fauces externas ad moveri possunt, prout occasio praebetur. Celsus spongiis in oleum calidum de-missas laudat: "Ad movere (ait ille) spongias oportet, quae melius in calidum oleum, quam in calidam aquam, subinde demittuntur." Sed cum tale applicetur, caven-dum est, ne caloris gradus sit nimis magnus: Oleum fur-tasse, cum caloris tenacius sit, aqua hanc ob causam non-nunquam anteferre debemus; nam haud necesse erit tam saepe, cum oleum adhibeatur, fomenta renovare, quam cum aqua.

Vapor ex aqua calida cum aceto commista exhalans uti-lis est, cum eo uti possumus.

Post quoddam tempus supervenit suppuratio; et tunc evacuantia, sicut venaesectio, purgatio, &c. repudienda sunt, et emetica forsitan jam optima reperientur: expecto-rantia.

## II. Suffo-

(c) Dissert. X. De Valetudinario Infant. tom. 2. p. 122.



## II. SUFFOCATIONEM præcavere.

Sæpius in discrimine esse potest aeger, ne juguletur, vel ob spasmodicam laryngis affectionem, vel ob membranae prægrande incrementum. Cum suffocatio ob spasmum imminet, tum ex antispasmodicis auxilium petere fas sit; cum paroxysmus talis inopinato ingruat, et nec dolor, nec febris, nec alia morbi symptomata prævivere, ad hoc consilium, moschum magnis in dolibus extulit Dr. Millar; "which," secundum illius sententiam, "proved anodyne and diaphoretic; the spasms were allayed; a gentle moisture was universally diffused over the whole body," &c.

Post hæc tamen de moschi impotentia queritur; ecce verba sua: "The disease was sometimes so violent at the first attack, and the transition to the second stage so rapid, that it required a medicine which should operate more immediately and powerfully than musk had usually done. For this purpose *asafetida* was prescribed; and with so good effect, that, in my latter practice, it has in a great measure superseded the use of musk. An ounce of this gum has sometimes been taken by a child of eighteen months in the space of forty-eight hours, and almost as much at the same time injected in clysters; allowance being made for the residue of the gum which is lost in making the solution. The following is the form in which the *asafetida* was commonly prescribed:

R. *Gummi asafetida*, ℥ii.

*Spiritus Mindereri*, ℥i.

*Aq. pulegii*, ℥iii. F. S. S. A.

"A table-spoonful of this mixture was given every half hour. If the child was very young or delicate, a smaller quantity was ordered; but if strong, and of more years, two spoonfuls, or even a larger quantity, was given; but this large dose was not persisted in if it occasioned much vomiting or purging, and was always diminished when the most urgent symptoms were removed."

Ne ingenium hujusce remedii usui ejus scrupulos injiceret, dixit porro: "However nauseous it may seem to be, children seldom refuse it; and, even when they have some aversion to it, if they are obliged to take it, they soon acquire a taste for it, and not only use it without reluctance, but with pleasure. But, in order to guard against every accident, at the same time that it was prescribed internally, an *asafetida* clyster was ordered to be injected

every eight hours, till the paroxysms became more moderate.<sup>(1)</sup>

Sed, cum vir ille cynanchen stridulam omnino quasi generis nervosi affectionem ducat, et cum tam cito decurrat morbus, viz nobis saltem patet, quare non statim ad opium confugiebat, quæ maxime confidunt medici, summa cognitione præditi, in spasms damandis; et nos etiam, ne creduli atque improvidi haberemur, dubitare oportet, an affecta Dr Millar relata, vere gigneret asafœtida: Ad-didit quim, insuper, in alio loco, (i) "To prevent a return of the paroxysms, a blister was put between the shoulders; emollient fomentations were directed for the stomach and belly; anodyne liniments were rubbed on these parts, and applied externally in the fauces and throat." Porro, fortasse venæsectionem rejicit Dr Millar, antequam omnes suas vires expertus fuit; ne verbum enim dixit unquam de topico usu hujus remedi. Omnium opprobriorum, quibus venæsectionem momuric, ingratis, consilietur tamen sanguinem missum esse, ut symptomata gravissima compescerentur; et quodammodo (2) huic intentioni respondebat. Quod si morbus omnino nervosus fuisset, pro symptomatum alleviatione, pejora extemplo fieri probabile est, et si venæsectio iterata esset, optima fortasse protulisset effecta.

Praeter venæsectionem, antispasmodica, fomenta, &c. quum atrociter saeviat paroxysmus huius temporis puncto, quid valeant emetica tentandum est. De illorum bono successu jam diximus.

Si peristeret paroxysmus cum violentia, et strangulationis periculo, ex coarctatione glottidis, vel magnitudine membranæ tracheam obturantis exoriente, bronchotomia proposita fuit; et confici posse feliciter verisimile videtur, cum respirationem resciceret. Quod si membranula per vulnus inflictum tracheæ extrahere conaremur, nisi sit parva atque ab omni cohaesione cum partibus vicinis libera, adeo ut cito extrahi potuisset; verendum est, ne, dum perficiatur operatio, quo tempore trachea et superne et inferne obstrueretur, fortasse penitus interpelleretur respiratio: Porro, parentes talem reformidant operationem, et nisi ex fruentia res cederent, famæ et medicorum et chirurgorum temeritatis notam inurerent. In ipsissimo morbi insultu præstare potuit bronchotomia, cum omnia alia experta fuissent incassum, et paroxysmus infanti mortem minitatur; per vulnus enim tubo introducto, respiratio

per-

(1) Vid. Observations on the Asthma, p. 39. (2) Ib. p. 40.

perageretur, et rivulum æris avertendo a larynge, ut paroxysmus minus ad recurrendum idoneus esset, efficeret, omni ab inspiratione ortum ducenti irritatione sublata; nec ducendum esset parvi, sanguinis ex parte profluvium, quibus evenire potuit ut membrana haud fieret; temere tamen hoc usurpandum est neutiquam.

Cum paroxysmi iterum iterumque recidivi facti fuerint, laryngis contractio spasmodica facile in consuetudinem transire potest; longe enim lateque dominatur in corpore humano consuetudo, adeo ut motus semel excitati, levissima data causa, citissime recrudescent, quamvis illorum principium amoveatur; quapropter, postquam evanuerunt phlogosis symptomata, et ex hoc fonte paroxysmi oriri videntur, cum summo commodo cortex Peruvianus adhiberi potest, qui non modo recursui obstat, verum etiam systemati nervoso robur affert; unde haud tam facile morbi principiis afficitur: Cum vero infantes nimis tenera sint ætate sæpissime, quo minus ore illum sumere queant, per clysmata adhibendus est, hoc prospectu simul, ut fluidi parva sit vis. Vel balneum frigidum parare possumus ex forti corticis decocto; vel ægro induatur subucula, inter cujus plicas consuitur pulvis corticis.



DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

PERSPIRATIONE INSENSIBILI:

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academiae Edinburgensis Praefecti;

NEC NON

Amplicius SENATUS ACADEMICI Consensu,

Et Scholasticæ FACULTATIS MEDICÆ Decretis;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINÆ HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JACOBUS HAMILTON, BRITANNUS,

Ad diem 12 Julii, hora locoque solitis.

1771.

---

J A C O B O H A Y

DE HAYTOWN,

Armigero,

M. D. et Col. Reg. med. Edin. Socio,

Avunculo suo plurimum colendo,

Observantiae et pietatis ergo,

Hanc Dissertationem

D. D. C. Q.

JACOBUS HAMILTON.

## PERSPIRATIONE INSENSIBILI.

**O**ECONOMIAE animalis ea est constitutio, uti per longum temporis spatium facta tecta possit conservari, si modo in aequabili ac moderata vivendi ratione velimus persistere. Quae res omnes, quotcumque leges systematicis probe callent, easque secum reputant, magna admiratione merito afficit; cum enim elementa, e quibus conficiuntur corpora nostra, admodum sua sponte sint in putrescentiam prava atque proclivia, in eamque celerrime rapiuntur, ipsa vi motuum qui in systemate peraguntur; inde fit, ut cito tam sanitati tuendae, quam vitae sustinendae, non solum inepta evadunt, sed, si e corpore tempestive eliminantur, hisce finibus e diametro contraria sunt et adversa. Hujus vero proclivitatis effectibus, diris aliocum, immo mortiferis, idque celerrime futuris propulsandis, plurimum profunt cibus ille potusque, quos appetitibus naturalibus, fame nempe et siti, impellentibus, indices ingerimus. Alimentum hoc, in ventriculum receptum, ibique subactum, chyli formam induit, et in sanguinis massam, per ductum thoracicum inductum, in succum proprium animale elaboratur. Succus ille animalium genus omne nutrit alitque; peracto demum salubri hoc officio, mox putrescere et corrumpi incipit, et e systemate excernitur, succo interea recente, in locum ejeti, indefinenter succedente.

Etiamsi mihi persuasum sit, singulos hujus processus gradus indagatione sedula perquam esse dignos; attamen, cum fieri nequiret, quin, si hanc viam intrare aggrederer, in molem nimiam hocce tentamen excreveret, et onus subirem, cui ferendo me minime fore parem, sat scio atque perspicio: Idecirco antecedentes gradus omnes transiliam; et ad ultimum describendum modumque quibus, juxta eundem, exoneratur systema indigitandos, progrediar.

Tria sunt jam bene nota corporis organa excretoria, pori, scilicet cutis, renes, et alvus. Argumenti, quod tam late patet, partem unicam solummodo tractare audeo; excretionem nempe illam quae fit per cutis poros, quae.

quæque Perspiratio Insensibilis vulgo appellatur. Felix si per me non steterit, quin iudicibus meis doctissimis, haud proles indignus videar, cui deferantur summi quos jam ambio honores!

Perspirationem insensibilem, per quamplurima retro adhuc secula, medicorum aciem minime elugisse constat. Hippocrates certe, qui pater medicinae atque conditor iure habitus est, talem fieri, seu transigi, e corporibus animantium excretionem, optime callebat; pronunciare enim non dubitavit, "totum corpus exhalare (a)." Aesclepiadem quoque, eosque qui eum secuti sunt, quibus a systematis quod amplectebantur simplicitate, methodorum nomen inditum, perspirationis haec nequaquam latebat, cum laxitatem pororum, vel contra eorundem strictioram, quasi medicinae fundamenta posuerint. Sanctorius vero, qui supra centum abhinc annos in Italia floruit, doctrinam de hac perspiratione, sedulitate magna et ex profecto, coluit, ut ejus opus adhuc extans, cui titulus *Medicina statica*, luculenter testatur; quamplurimi aphorismi statici ibidem recensentur, quos ex experimentis suis deducere auctori visum est. Ab eo Sanctorianae Perspirationis nomen traxit. Hujus exemplo et felici successu, nonnulli, qui inter medicos recentiores clarum sibi nomen pepererunt, excitati, perspirationi insensibili penitus indagandae et explicandae sedulo incumbere, et haud pauca, quae Sanctorium ipsam non perspexisse credibile est, ejus repertis addidere. Horum ego vestigiis atque experimentis insistens, nonnulla de perspiratione insensibili proferre fatagam; et in proposito exsequendo hujusmodi ordinem ac methodum sequi statuo.

1mo, Perspirationem definire.

2do, Ejusdem documenta vel indicia monstrare.

3tio, Fontes unde proveniat indigitare.

4to, Materiei perspirabilis dotes quantum potero eruere.

5to, Perspirationis quantitatem ad calculum revocare, et ea statuere quibus vel augeatur, vel minuitur.

6to, Usus ejusdem praecipuos in oeconomia animali exhibere.

7mo, Si universam de hac re doctrinam tradere aggrederer, hisce physiologicis conspectum perspirationis pathologicum oporteret subungere.

De-

(a) Epid. lib. 6. Sect. 5.



## DEFINITIO.

PERSPIRATIO insensibilis apto defini potest, Vapor tenuis, subtilis, e tota corporis superficie diffusus, et e plerisque ejusdem causantibus exhalans.

## PERSPIRATIONIS DOCUMENTA.

DATI hujusmodi perspirationem, aut in animalium corporibus peragi, facillimum oculis esset per multa in hunc finem adducta, huc recentia experimenta ostendere. Quam autem superveniens docum. magorum eorum acervum cungeret, et ne a constantia hanc partem insensibilis solutam et quasi spiritam praeferam, unum vel alterius referre sufficit. Perspirabilem materiem insensibiliter emanantem colligere vique sensibus obviare facere, timon olei oblium et corpori circumdato, olim docuit Pechenius (b). Illud Boerhaave vasi vitreo cui inferitur brachium, guttulas adhærere perhibet (c). Et etiam Haller testatur se vidisse in cuniculis febricitantibus densam nebulam e tota nudi corporis superficie exhalantem (d). Porro, cum corpus ita collocatur, ut Solis radios, qui minus in mare dealbatum impingant, intercipiat, undulam in muro ascendentem conspiciere est (e). His demum adjungi optime meretur experimentum quod Sanctorianum appellatur, quo patet, corpus quotidie ad solitum pondus redire, sicut excretionas sensibiles ingestorum pondere minime assurgant; hanc perspirationem insensibilem non solum revera fieri concludimus, sed et insuper materiei quantitatem quae hoc genere evacuationis effluxit vel excreta fuit, juxta defectum ponderis aucti, post cibum assumptum, colligimus et aestimamus. Nec opus est pluribus; quomodo excernatur haec materia jam dispendendam est.

## PERSPIRATIONIS FONTES.

QUANTUM quo materiei perspirabilis excernitur est, tota, cujus structura intima, ob nimiam ejusdem subtilitatem, vel maxime perspicua inter anatomicos, diu latuit; quapropter minime mirum est, si in diversas admodum sententias de perspirationis fontibus abierint. Cuius, cujus eadem est quae membranarum fabrica, e filis diver-

VOL. III.

G g

Imode

(b) De morb. princ. p. 115.

(c) Practic. Acad. vol. 1. p. 277.

(d) Prim. Lin. Phys. 1788. 224.

(e) Winslow's Anatomy, vol. 4. sect. 7. p. 294.

simode intertextis constat. Rete Malpighianum seu mucosum cuti proxime adjacet; huic vero superinducta est epidermis. Cutis superficies rugosa est; tubercula enim, papillae dictae, in unoquoque sero ejusdem puncto conspiciuntur; in lingua tamen, et in digitarum apicibus, in penis denique glande, evidentiores quam alibi, apparent. Glandulas quoque sebaceas, internam cutis partem occupantes, reperimus; quorum ductus excretorii, cutem perforantes, in ejusdem superficie hiant, materiemque ei oblinendam et defendendam aptam transmittunt. Cl. Malpighius (f), et Steno (g), alique qui hos sequuntur, per hasce glandulas perspirationem ac sudorem externi contendunt. Haec sententia, per breve tempus invaluit; anatores vero, scientia accuratius excolta atque tradita, labefactari coepit, et tandem abjecta est. Curta etenim magis est hac usque experimentorum supellex, quam ut aut possit concludi, tales glandulas in quacunque cutis parte, absque ulla exceptione reperiri. Cl. Ruyschius, cujus in anatome excolenda labores, quousque florebit medicina, in pretis erant, per totam cutim sparsas se eas invenire potuisse negat (h). Qui hanc sententiam amplexi sunt, specie quidam papillarum decepti, glandulas sebaceas temere nimis et re non satis explorata, ad unam cutem transulisse videntur. Cum sudor itaque et perspiratio e qualibet cutis parte erumpant, per has glandulas externi nequaquam possunt. Alii itaque perspirationis fontes omnino sunt quaerendi.

Arteriae subcutaneae per telam cellulosam repentes, trunculos unilique in cutem mittunt. Hi trunculi, in ramos innumeros divisi, cuti sanguinem suppeditant. Quo propius ad cuticulam accedunt, eo minores fiunt; tandemque, rulum sanguinem tenuitate ipsa excludentes, oscula apertis ubique in superficie hiant (i). Hanc esse veram cutis structuram, injectis vasorum cadaverum extra omne dubium collocat. Ruyschius, qui primus hanc artem injiciendi vasa cadaverum exercuit, eadem replendo, invenit quod ad extremam usque cutim pertingant. Cel. quoque Kaau, aquam calidam per arteriam axillarem insertam, forma tularia e toto brachio erumpentem vidit (k). Hae quoque injectiones, vias quibus excernitur materies

(f) De Extern. Tact. Organ. p. 18. 20.

(g) Epist. ad Boerh. cent. 3. N<sup>o</sup> 61.

(h) Thesi. 20. N<sup>o</sup> 120. Epistol. ad Boerh. p. 53. 54.

(i) Kaau de Persp. Dict. Hyppoc. N<sup>o</sup> 48.

(k) Kaau, N<sup>o</sup> 53. 54.

materies perspirabilis liquida demonstrant; per vasa, follicles, continua decurrit, nulla interposita glandulari structura.

Eadem vasa, dum agunt causas auctae perspirationis, odorem effundere videntur (1). Cum sudor eadem qua materies perspirabilis fruatur origine, parum inter se discrepant; nisi quod sudor sebo oleoque cutaneis, quorum secretio liliem canis augeatur, permixtus sit.

Materies illa, quae per perspirationem insensibilem emittitur, non solum e qualibet parte superficiei corporis dimanat, sed pleraque insuper corporis cava vaporem eandem magnopere referentem effundunt. Quocunque pergit cuticula, cute quasi abscissa, hanc excretionem obtinere vulgo creditum est (2), e. g. in visceribus, urethra, vagina, &c. Quae omnia vaporis exhalatione humectantur atque madescere nequaquam inficiamus eundem esse. An vero vapor ille ejusdem prorsus generis sit censendus cum materie perspirata, multum dubito. Materies perspirabilis, quasi sentiens se ex mora damnum systemati illaturam, protinus aufugit. Exsudatum vero illa quae in tubo intestinali, &c. peragitur, utili admodum immo necessario proposito inservire videtur; et, ne nimia quantitate sit nova, a rasis lymphaticis resorbetur, atque sanguini de novo admiscetur. Nequaquam itaque cum cum materie perspirabili confundenda censeo.

Aer externus perspirationis materiem per cutim excretam recipit atque dispergit. Haec analogia, quatenus sint illa cava e quibus profluit vapor, perspirabili materiei haud dissimilis, satis manifesto indicat; ea scilicet sunt quae liberum praebent aeri externo tam introitum quam exitum. Tales sunt bronchiorum, asperae arteriae, nasi fauciumque cavitates. Aer in respiratione per has ingrediens, ac de novo ex eisdem regressiens, exhalationem aquosam secum trahit; quae, ut plurimum, impercepta evanescit in aura. Cum vero aer, praecipue inter gelandum, sit frigidus, vel nimia humiditate abundat, adeo ut aquae dissipatione minus saveat, densum vaporem per os ejectum quilibet cernere potest. Eundem vaporem praecipitari, aciei que oculorum perceptibilem reddi, cum ori vel naribus inter respirandum speculum lucidum admoveatur, quis ignorat? Huc sedulo perpenis, nulla dubitandi causa restat de exhalatione quae fit per pulmones, fauces, &c. quin ad perspirationem insensibilem rejicienda sit. Es-

(1) Boer. Praelec. Acad. Tom. III. p. 376

(2) Kautz, N° 12.



circulo enim est, et eodem modo facta, quo ipsa perspiratio. Ob hanc causam recensita, nocet; tempellive itaque in sanis corporibus e syllemate eicitur.

#### MATERIE PERISPIRABILIS DOTES.

SANGUIS succus animalium generalis dicitur, unde omnia alia fluita feceruntur. Statim ab ejusdem missione, homogeneus esse videtur, quam vero per paucillum temporis immixtus permanferit, præsertim si interea in locum modice calido fuerit servatus, heterogeneam suam naturam ostendit. In tres partes, globulos rubros, lympham coagulabilem, et serositatem, secedit. Cum nil aliud in sanguinis massa reperiatur, hypothesis illa qua fluida quæ feceruntur in sanguine præexistisse statuitur, ne percolatione sola ad secretionem opus esse, necessario torquet. Aliquatenus tamen retineri meretur, cum ad perspirationis executionem elucidandam applicatur. Serositas enim pars sanguinis est fluidissima; magna copia aquæ abundat; saltem ammoniaci generis solutum continet. Propter ejus fluiditatem, vasorum minimorum foramina percurrere potest, dum globulis rubris, et lymphæ coagulabili, utpote spissioribus, transitus denegatur. Hinc corpus animalis haud inepte dicitur cribrum vesestre, quod tenuiora transire sinat, viscidiora retinet.

Ex sanguinis serositatē igitur præcipue derivatur materia perspirabilis, quæ, globulos rubros et lympham coagulabilem deferens, per arctissima vasa transierit, et, ad cutem derivata sub forma tenuissimi vaporis, perspirationem effluit. A priori igitur licet concludere, materiem quæ perspiratione excernitur, constare, magis saltem ex parte, ex aqua quæ sale impregnata est, quod etiam experientia comprobatur.

Apud perspirationē inesse, nemo inficiatur, qui remittitur vaporem qui a corpore, uti jam dictum est, effluit, aqueæ formam induens.

Saltem quædam sunt. ChrySTALLIZATIONES quæ adhaerent vestimentis vivaciorum aliorumque, quibus inter laborandum præ aliis calore protuli oboriuntur sudores, materiem perspirabilem sale esse impregnatam, satis demonstrant. Ex his vero, conjectandi sit hujus salis indoles, minime certiora sciri tenet. Ad genus autem ammoniacum referendum esse concludimus, quia nullus alius sal copulatusque generis in fluidis nostris adhuc repertus est.

#### Particular

(a) Kunkel philosoph. chym. p. 208. Tachenius quoque perspirat, & solum liquorem, opo vaporumque ante exspirat, collegisse.

*Particular quædam* fetiditas perspirationi inesse vulgo perhibent. Canes, quibus odoratus acutissimus est, unius de grege ceteri veligia præmentes cum sequuntur, ex cæteris omnibus neglectis, hunc solum cursu perunt. Mira quaque sagacitate, dominos suos cum mille aliis permixtos, peculiari odore, qui ex eorum corporibus exhalat, perlocuti, dignoscunt, et raro falluntur. Hinc omnes fere concludunt, volatile quiddam ac odoriferum materiei perspiratæ inesse, quod canes perferant, et accurate distinguunt. Et res ita se fortasse habet: Sed annon suspicari licet, hujus odoris specifici causam potius esse quaerendam in materie illa sebacea quam inter perspirandum quæque elucerni supra monuimus? Perspirabilis materies admodum est volatilis: Oler itaque simul cum vapore per aëra dispersus cito evanescit, et sensum acutissimam perceptionem effugit. Materies vero sebacea, quam etiam olere viximus, utpote magis fixa, odorem relinquit diutius mansurum; quemque propterea canes diu perferunt, postquam animalia quæ foetantur aufugerant.

*Materiem electricam* perspirationis quoque partem esse Ill. Hallerus (c) perhibet, quam et evidentius in nonnullis lucere dicit. Omnia, quantum novi, experimenta, in hunc usque diem, ad electricitatem elucidandam instituta, in hunc scopum collimant, ut nempe pateat materiem electricam per totum hunc orbem terrarum dispergi, et quiddam ejusdem æquilibrii inter omnia corpora nobis ingula obtrudere. Nil dubitandum est igitur, quin et materies perspirabilis suam ejusdem portionem habeat. Cum vero materiam electricam in nonnullis volentius lucere dicatur, quiddam implicari valetur, quod doctrinæ electricitatis, quæ innumera experimentis suffulcitur, procul est incongruum. Omnia enim corpora, quod ad electricitatem attinet, in duas classes reduci queunt: electrica nempe per se, et non electrica, appellata. Electrica per se et sua, quæ, calore et frictione excitata, atmosphæram electricam circum se colligunt atque retinent. Non electrica vero, quæ et conductores appellantur, sunt ea, quæ, frictione seu quocumque demum modo calefacta, nec materiam electricam amittunt, nec colligunt aliunde. Et, si ad electrico excitato, materies electrica ita communicetur, nisi sit insulata, sic enim loquuntur, eam non retinent, transmittunt enim electrici circumpositis, quo æquilibrium, nisi supponitur, letvetur. Corpora nostra, licet cum aliis quæ humiditate abundant, non electrica sunt; electrica

electricæ phaenomena igitur per se exhibere non possunt. Etsi tamen materiem electricam quovis modo in corpore accumulata esse; lucida tamen nequaquam appareret, sed impertecta ad corpora circumjacentia manaret. Juxta doctrinam igitur hanc improbabilis profusè videtur materiem electricam sub lucida forma e corpore cum perspiratione effluere.

Facta et experimenta, fidelissimi veritatis testes atque iudices, huic conclusioni obviare videntur. Manuum siccarum frictione lucem coeruleam excitatam fuisse (p), pilos electrico igne ex frictu luxisse, et denique indusia quaedam e corpore detracta, electrica phaenomena ostendisse, legimus (q). Ex his quidem discimus cuticulam, pilos et indusia hæc electrica per se esse; nequaquam vero materiem quæ perspiratione emanat electricæ igne luxisse. Quæ inique electrica materie lucidam perspirationem fieri nec theoria nec experimenta probent, minime admitendum est rem se ita habere.

*Alimentorum quoque salures, armatum præcipue, sicut alii, cepe, &c. in materie perspirabili dissoluti (r) percipiuntur.*

*An ær mephiticus perspirabili materiei insit, quaerere licet. Septicus præcelsus, qui semper in systemate nostro obtinet, ærem mephiticum evolvit.—Ær iste vel resurbeat, vel e systemate ejiciatur, necesse est. Eum per pulmonalem exhalationem transire, experimenta multa quæ in promptu habemus demonstrant. Vir, eximie in re chemica eruditus, Dr Black, cum calcem vivam aqua solutam aëri qui respirationi interserviet (subjecisset, eandem ære mephitico cito saturatam atque extemplo præcipitatam, auditoribus suis inspicientibus, ostendit (s).—Cum per aliquod tempus ærem seclusum a reliquo atmosphaeræ aëre spiramus, anima deficiente, desinere cogimur; eadem verò aëris quantitas diutius respirationi interserviet, si alkali causticum simul inclusum habeat; hoc enim ærem mephiticum, quo ær vitalis respirationi ineptus redditur, absorbet (t). Cum materiei perspirabili admodum similis sit pulmonalis exhalatio, ejus analogia ærem mephiticum per cutis poros quoque transire evincit; licet, propter materiei perspirabilis subtilitatem, sensus nostros adhuc lateat.*

PUR-

(p) Wilson on Electricity, p. 213.

(q) Vol. Symmer's papers, Philos. Trans. Vol. LI, p. 8.

(r) Waller Prim. Lin. Phys. parag. 236.

(s) Fraasch. Chem.

(t) Hales's Statics, Vol. I, p. 260.



## PERSPIRATIONIS QUANTITAS

OMNES fere qui perspirationi explicandae operam navarunt, quantitatem ejusdem ad calculum redigere sunt conati; et, quod mirum videri forte poterit, quam diversissimas deduxerunt conclusiones.—Sanctorius in Italia degens, summæ excretionum quæ fiunt e corporibus viris, quinque ex octavis partibus ad perspirationem de qua loquimur esse referendam, invenit (w). Cl. Keil quoque, cujus experimenta in Britannia instituta sunt, quotidianam perspirationem ad uncias triginta tres reducit (x).

Cel. Hoffman, qui aliquot de perspiratione fecit experimenta, hæc habet: “Deinde et hoc observatu dignum, quantitatem urinæ, in nostris præsertim regionibus, reliquorum quæ perspiratione, alvo, aliisque excretionibus evacuantur, quantitatem et pondus excedere (y).”

Attamen, inter tanta discrimina, lites forsan componi poterant, illibata omnium scriptorum veracitate. Calor enim externus perspirationis vim magnopere auget, et proinde majorem materiei perspirabilis copiam expellit; quo calidior igitur est regio, eo major fiet perspiratio. Hinc satis perspicuum est, plus multo externi oportere perspiratione in Italia, quam in hac Insula vel in Germania; prior etenim Sole benigniore, quam posterior, fruatur.

Inter eos quoque qui in eadem regione vivunt alii minus, alii plus perspirant. Præter calorem igitur, alia sunt quæ perspirationis quantitatem alliciunt: Cujusmodi sunt, sexus, ætas, temperamentum. Ætatis differentie cutis conditiones præsertim diversas efficiunt: In junioribus per vasa multa ad cutem magna humorum vis derivatur; hinc perspiratio sit admodum copiosa. In senectute vero, vasa quasi obsterantur, cutis, uti tactu quilibet sentiet, ardescit: Hinc contra perspiratio valde impeditur. Quam autem ætate æquales sub eodem Sole degentes impari materiei copiam perspirando exhalant, ratio differentie petenda est ex utroque sexu et temperamento, quibus variantibus, variantur etiam et cutis fabrica et sanguinis circuitus celeritas.

Perspirationis quantitas, prout eam sexus, ætas, vel temperamentum moderantur, admodum variabilis, et ponderatione sola disjundenda est. Eam vero parum refert cognoscere, dummodo ejus status relativus, auctam vel minutam perspirationem respicientes, nobis innutrescant.

Causæ

(w) Aph. Sect. I. N° 6.

(x) Medicin. Stat. Epistm.

(y) Tom. I. p. 372.

Causae occasionales auctae vel imminutae perspirationis quotidie occurrunt; harum adlioni omnes obnoxii victimis; multas evitandi vel profligandi vias non raro monstrant; eas itaque probe intelligere plurimum interest.

In illis perscrutandis quae perspirationem vel augent vel cohibent, ad cutem, ad humorum quantitatem, ad eorum denique motum, attendere debemus; nam, his variantibus, copiosior fit vel minuitur perspiratio.

Causae quidem auctae vel imminutae perspirationis, ad eas quibus relaxatur cutis vel contra constringitur, ad eas etiam quae humorum quantitatem adaugent vel minuunt, loci, referti solent. Haec vero distributio nequaquam sequenda est; multa enim quae perspirationem sive augent sive minuunt admodum complexi effectus suos producant, adeo ut ad unum aliquod referti non debeant. Idcirco, juxta ordinem sequentem, uti censeo, multo commodius cauerunda sunt.

#### QUAE PERSPIRATIONEM AUGENT.

*Calor externus.*—Perspirationem, copia solito majorem, immo ad sudorem usque, fluere, urgente calore, propria experientia unumquemque docet. Caloris actio in solida simplicia cutim relaxat, poros patentiores, et proinde ad materiem perspirabilem emittendam aptiores, reddit. Calori porro cum diu subiectum fuerit corpus, fluida expanduntur, et plethora, uti loquitur Cl. Graub. ad volumen inducitur (=), quo eisdem prorsus effectus, quae fluidorum ipsam augmen, producit. Pletthora enim solida praeter modum distendit; vasis itaque valde contractis, fluida quacunque datur porta eunt, et per poros cutis, praecodem calore magnopere dilatatos, emittuntur. Quocunque demum modo agat calor, nulla alia causa assignari potest, cujus major est vis in perspiratione acceleranda; et, si adhibet aliquis ejusdem gradus, reliquae omnes causas parum ad eam promovendam valere inveniemur. Inter reliquas itaque recensendas, datum esse caloris gradum supponitur.

*Frictiones cuti applicatae.*—Ad rem non vi muscolari possunt, praecipue versus extremitates. Harum itaque contractiones ad perspirationem promovendam multum faciunt. Quodcumque vasa extrema flaccida, adhaec ut oscillationes et sic frequentiores sunt, humorum fluxum accelerant. Frictiones actionem vasorum in cute patentium elevat, ruborem enim et calorem signant; perspirationem itaque

itaque augent, quod ex effectu eorum in morbis cogniti patet (a). Sanctiorum huic frictionum effectui contradicentem invenio; ejus vero sententiae fides vix habenda est; cum experimenta, quibus innixus eam amplexus et professus est, non promerit (b). Et quoque Keil, euis perscrutanti nec perspirationem inhibere nec promoveri, dicit (c). Ea die vero in quo frictiones sibi applicandas curavit, uti ipse agnoscit, equitando admodum ante erat defessus; et vix dubitandum est, quin perspirationem haud parum imminutam sensisset, si nullae ummo frictiones fuissent adhibitaе, cum defatigatio sola, uti postea monstrabitur, perspirationem imminuat.

*Balneum frigidum.*—Calor potentissimus est systematis nostri stimulus. Frigus contra sedativum est adeo efficax, ut vitam ipsam interdum supprimat. Ubi gradu vero mediocri, et per breve solummodo tempus, applicatur, systematis reactio id excipit. Immersio in aquam frigidam subito totum systema commovet, cordis ac arteriarum actionem intensiorem efficit, cutim vero quam aqua immediate attingit praecipue afficit; hic calor per cutim diffusus percipitur, determinatio fluidorum in eandem facta est, et perspiratio augetur. Effectus hi immersionem certius sequuntur, cum exercitio antecedente, quod nec sudor nec lassitudo subsequuntur, corpus fuerit calefactum.

*Corporis exercitium.*—Sanguinis circuitus e cordis et arteriarum actione pendet; cui adiutrix accedit musculorum contractio. Sed omnibus bene notum est, sanguinem citius curriculum suum consicere, et velociore motu per vasa deferri, dum exercitatione corpus agitur. Eodem exercitio augetur corporis calor; unde facile intelligere est, quomodo exercitium perspirationem copiosam, saepe usque ad sudorem etiam, producat, sicut omnibus experiri proclive est.

Hac in parte notatu perquam dignum est, quae fiat ut, perspiratione corporis exercitio valde aucta, et sudore copioso exinde fluente, reliquae aliae secretiones non solum non augeri, sed quodammodo quasi obstrui ac cessare, videantur. Mira quidem est haec et sagax naturae provisio; nam si aliter sese res haberet, corpus cito vacuum et inane relinqueretur. Haec observatio aliam quae majoris est momenti suggerit. Omnes qui secretionis arcana detegere tentarunt, nimiam ad generalem sanguinis motum,

h h

et

(a) De Gorter comment. in Hall. aph. 297.

(b) Aph. sect. 9. 42.

(c) Aph. sect. 200, 201, August 12.



et minus quam par erat ad organum ipsum secretorium et systematis nervosi affectiones, attendisse videntur (d).

*Anima pathemata activa.*—Vasa quae materiem perspirabilem exhalant, ipsarum arteriarum extremitates sunt, quae, quum vi motrice et quadam sensibilitate fruuntur, systematis nervosi affectionibus obnoxiae sunt; idque et pudor et timor manifeste indicant. Quum pudore affici-mur, rubor faciei suffusus suam esse extremorum vascu-  
rum actionem testatur. Timore vero oborto, pallor vul-  
tum occupat, formicatio per eam sentitur, quae et ali-  
quando tam valida est, ut pili erigantur. Pathemata ac-  
tiva contrariam huic effectum edere, et extremorum vascu-  
rum actionem citare, ex vi qua praedita sunt perspirationis  
augendae, suspicari licet: “Nihil (inquit Sanctorius) ma-  
gis liberam perspirationem reddit quam animi consolati-  
o (e).”

*Medicamenta diaphoretica.*—Id omne quod perspiratio-  
nem excitat, diaphoreticum dici potest: Medici vero per  
diaphoretica vulgo intelligunt ea quae per os ingesta per-  
spirationem copiosioram efficiunt. Horum quumplurima  
stimulantia sunt; cordis et arteriarum actionem excitant,  
et forsitan usque ad cutem penetrantia ipsa vasorum extre-  
ma stimulant.

Alia vero, quae ex effectibus inter diaphoretica jure re-  
censentur, indolem habent contrariam; vim enim sedati-  
vam edunt: Hujusmodi sunt plerique sales neutri.

Ad secretionem quamlibet augendam minime semper est  
necesse ut stimulus organo immediate applicetur. Fluxum  
enim salivae augeri, quum alimentorum grati saporis re-  
miniscimur, ut et lacrymarum effusionem, quum oculi  
clarae luci expositi sunt, quotidiana experientia demon-  
strat. Illic diaphoreticorum plerorumque effectus deduci  
possunt. Sympathia quaedam, quocunque modo capite-  
tur, inter ventriculum et vasa extrema obtinet (f). Sto-  
machus enim perspirationis statu afficitur, cujus quantitas  
vicissim, prout stomachus se habet, haud leviter augeri vel  
minui videtur. Tonus enim fibrarum ventriculi vasa ex-  
tremis communicatur, eaque proinde vel magis vel minus  
apta ad perspirabilem materiem emittendam reddit. Hae  
forsan diaphoreticarum stimulantium effectus referendi  
sunt; utique vero hanc res se habeat, ex hoc principio  
effectuum sedantium ratio deducenda est. Relaxationem  
enim, quam stomacho, et proinde toti systemati, et cuius  
vasis

(d) Cullen. Praelect. in Med. sect. II.

(e) Cullen. Praelect. in Inst. Med.

(f) Aphorism. sect. vii. 25.

Vasæ speciatim, afferunt, cordis et arteriarum reactio (sequi videtur: Hinc relaxatis vasæ extremis, et sanguinis motu incitato, diaphoresis certe quidem ac mitis promovetur. Eadem ratione emeticorum parvulis subhibitorum effectus explicandi sunt; quibus diaphoretica potentiora Materia Medica via præbet.

Huic explicationi lux affusetur ex effectu opii cum emetico uniti, et in pulvere Doveriano. Opiarum enim certiorum reddit relaxationem extremorum vasorum; dum forsitan reactioni validiori locum præbet, ex hinc perspirationem quam maxime augeat.

*Copia sanguinis augetur.*—Quoniam e sanguinis massa oritur quodcumque perspiratione exhalamus, materiei perspiratae quantitas, rationem quandam habet ad massæ illius molem.

Ex assumptis vel retentis augebitur sanguinis copia. Ingestio enim solito largior, si digerendo stomachi vires sufficiunt, vasæ replet, et proinde perspirationem augeat. Exempla augete perspirationis ab excretionibus nimis diu remoratis frequentiora sunt; alvum contractam, vel urinam parcam, largam perspirationem efficere sæpenumero experientia docet.

*Aër Siccus.*—De vi hujus causæ in perspiratione augendo consentientes habemus præcipuos auctores qui hoc argumentum tractarunt (g). Aër aquam dissolvit atque solutam suspendit (h). Materiem perspirabilem quoque dissolvere videtur, quæ proinde oculorum aciem effugit. Talem esse aëris effectum ex observatione certiores facti sumus; quoniam ejusmodi aëris status, qui solutionem impediunt perspirationem sensibilem reddunt; pulmonalis exhalatio, dum in aëre frigido quasi præcipitatur, densi vaporis speciem præ se fert. Ita quoque perspiratio cutanea vitium non semper laet: Cel. Haller enim, eam se vidisse, asserti, in locis ubi densior erat aër (i). Siccitas itaque aëris, ex actione ejus in aqua solvenda, plurimum in perspiratione promovenda valere potest. Porro aër siccus tonica vi pollet, et extremorum vasorum actionem elicit. Quæ via nimis cum vi solventi conjuncta in perspiratione excitanda aëre efficacem rendere potest. Cl. noster Home, qui summa cum laude doctrinam de Materia Medica in hac Academia tradidit, exercitando in aëre

H h 2

frigido

(g) Home's Med. & Phys. p. 245. B. Robertson on Food and Discharges, p. 68. Sancti. Aph. § 2. 6.

(h) Edin. Physical and Literary Essays, Vol. III. p. 87.

(i) Haller. Poen. Lin. Phys. par. 421.

frigido perspirationem valde auctam adnotavit (h). Serupulus vero adhuc restat, an perspiratio revera aëris siccitate augeatur; de quo plura infra dicenda sunt.

*Electricitas* — Inter alias quam plurimas electricitatis proprietates, quarum investigatione philosophia saeculo qui vivimus locupletata est, ejus res in perspiratione promovenda eminet. Cel. Abbas Nollet, qui ingeniose admodum plurima in electricitatis doctrina investiganda experimenta fecit, aquam gustatim ex tubo insulato decidentem electricitate adeo accelerari, ut plenum floeret cursu perspexerit (i). Hoc experimentum ad vegetabilia et animalia transtulit, quorum perspirationem auctam invenit. Dein in corpore humano caute admodum quaedam experimenta fecit, et electricitate corpori admuta perspirationem auctam persensit (m).

Electricitas, dum perspirationem auget, nec in cutem, nec in fluida, sed in ipsam materiem perspirabilem, agere videtur. Corpora enim, quibus Noller electricitatem admovit, insulata fuerunt. Materies itaque electrica in his accumulata, atque avolare adiens, nullum praeter perspirabilem materiem conductorem nata, eandem accelerat, quae citius aequilibrium restituitur.

NOLLET, qui et sibi met ipsi electricitatem applicuit, nihil ex eo nisi inanitionem quandam et elusionem persensit. Tutam igitur hanc esse perspirationem promovendi methodum, licet concludere; et foris non inutilem fore, repetita et accurata experimenta monstrabunt.

#### QUAE PERSPIRATIONEM MINUUNT.

Ex haecenus dictis, de causis perspirationem augentibus, facile percipi potest, quatenus sint eas, quibus seu aliquatenus seu penitus supprimitur; quum vero priores sint, ut plurimum, posterioribus e diametro oppositae, absque incommodo emitti possint. Sed, quum de una aut altera nonnulla occurrant quae adnotari mereantur, ea quam brevissime percurram.

*Frigori externo* itaque inter causas obstruentes, ni fallor, praecipuus locus est tribuendus. Calor magnopere augendus ac promovendus perspirationi inservit. Nemo itaque discrieri jure poterit quin hoc manifeste sequatur, frigus eidem remorandae plurimum valere. Minime tamen necesse est, ad hanc effectum producendum, ut frigus universae superficiei corporis applicetur: Saepissime enim

(h) *Motens Facti*, p. 246.

(i) *Mém. de l'Académie Royale pour 1732*, Vol. II, p. 231.

(m) *Idem*, p. 248.



enim experimur, spasmoda totam ejusdem superficiem pervadere, cum per exigua solummodo illius pars frigori exponitur. Hoc pendet a sympathia illa peculiari, qua se mutuo afficiunt diversae cutis partes, et quam certo scimus obtinere ex operatione aliarum causarum quibus afficitur perspiratio; quaeque diligenter adnotanda est, ut eorum effectus explicari possent.

*Exercitatio corporis ad lassitudinem usque protrahenda.*—

Debililas, ex quacunque deum causa oriatur, ad vim perspiratricem refringendam plurimum confert (n). Cum enim retundat cordis et arteriarum actionem, a qua praecipue circulatio pendet, totius systematis tonum proinde enervat; hinc fluida motu nimis tardo et languesciente propelluntur, secretio in genere plus debito remoratur, et speciatim perspiratio ob ejus solitae determinationis erga superficiem impetum cohibitum. Si tales sint in genere debilitatis effectus, multo magis exoriantur oportet ex ista ejus specie quae corpus invadit et affligit statim post nimiam exercitationem; ea enim procedente, ob auctam perspirationis vim, quae violento exercitio excitari solet, permagnum sit fluidorum dispendium, quod vicissim, ut experientia monstrat, causa est imminutae perspirationis.

*Excretiones aliae auctae.*—Status systematis nostri, utpote e solidis ac fluidis compositi, maxime salutaris, cum illos ratione solidarum ac fluidarum partium inter se necessario connectitur. Utrarumvis quantitas, sive major sit sive minor quam oportet, ad morbus gignendos aequaliter spectat.

Iustum itaque conservandum est medium, ut diversae fabrice animatae functiones rite perficiantur. Multa sunt huc spectantia, admiratione summa digna, quae ipsam naturam invenisse et ordinasse cuiusvis ostendenti patebit.—In his aequilibrium quod cernere est inter diversas excretiones nequaquam infimum locum occupat. Hinc, quotiescunque unuscujusvis sit incrementum, alterius alicujus contra sit diminutio.

Frigor externum perspirationem cohibens saepe diarrhoeam inducit; et a quacunque causa oriatur hic morbus, cum per aliquod tempus incubuerit, semper exinde perspirationis imminutio subsequitur. Cujus indicium est haud spernendum, quod saepe abigitur diarrhoea, cum augetur quantitas perspirationis; fluidorum quippe curriculum in hoc casu divergitur, et alia his aperiantur parvae e corpore exeant ostia. Hoc saltem certissimum est, augmentum

augmentum perspirationis multum conferre ad hunc morbum eliminandum.

HISTORIA etiam diabetis aliud præbet argumentum hujus inter secretiones nexus; cum enim grassante hoc morbo, permagna fluidi copia per urinam evacuetur, non solum refrenatur perspiratio, sed hinc porro necessario augeatur quantitas humoris qui ex aëre in corpus per absorptionem derivatur, quo suppleatur quodammodo ingens illud dispendium fluidi quod in hoc morbo fit per renes.

HUC pertinet etiam Sanctorii aphorismus: "Sudor semper est a causa violenta, et ut talis, sicut statica ex-  
" perimenta docent, impedit coëtorum perspirabilem oc-  
" cultam excretionem (c)." Hæc enim verba juxta principium quod assumptum fuit intelligenda, sudorem scilicet ex-  
" vacuasse systema, sicut diarrhoea vel diabetes, et perspirationem exinde retardari, usque dum solita fluidorum quantitas restituatur.

*Aër humidus.* Omnia quibus innitimur experimenta, ut eorum ope perspirationis quantitatem judicemus, omnesque nostræ conclusiones inde deductæ, corporis ponderationem respiciunt, et ex ea pendent. Cognito enim tam alimentorum pondere ex una parte, quam excretionum sensibilem ex altera; cum prius haud parum polleat semper exsuperet, differentia quantitatem materiæ, quæ insensibili perspiratione per cutis poros abicit, exhibere est censenda. Ponatur, e.g. alimentorum quæ injicimus pondus ad 5 uncias assurgere, et excretionum quæ per faeces alvi et urinam fiunt ad 3; sequetur pondus materiæ, quæ seceratur perspiratione de qua agitur, fore 2; quia alimentum ex una parte, et excretionem ejusdemque generis ex altera, æquilibrium inter se mutuo conservant; et corporis ipsius pondus parum aut nil de die in diem immutatur per breve saltem temporis spatium. Hoc modo ratiocinabatur Sanctorius: Sed absorptio humoris quæ fit ex aëre eam laxavit. Hæc a recentioribus observata est; et vix fieri potest, quin aliqua ambiguitas, tam in genere quod ad causas perspirationem afficientes attinet, quam speciatim quod ad actionem ipsius aëris in perspiratione promovenda vel refrenanda, hinc oriatur. Perspiratione enim in eodem statu permanente, incrementum ponderis quod fit in aëre humido ad auctam absorptionem referri potest, quam in illiusmodi casu locum obtinere haud cunctanter statuendum. Hæc porro observatio causam suspi-  
candi

tandi praebet, decrementum illud ponderis, cui deprehenditur obnoxium esse in sicco aëris statu corpus, unice referri debere ad abstractionem humoris aërei, ubi perspirationis quantitas eadem prorsus manet. Ut certius de hisce judicemus, pluribus quam quae haecenus facta sunt,isque accuratioribus experimentis opus est, ad quantitatem humoris ex aere per absorptionem injecti aestimandam, et ad ea penitus intelligenda quibus absorptio vel provocari vel reprimi solet.

*Peculiari aliqui stomachi status.* Nexum intimum inter stomachum et vasa extrema obtinere, et quaedam exinde perspirationem augere, supra notatum est. Alia e contrario eam minuant, quorum vis ab eodem nexu pendet.

Rigorem quandam in cute, et acutiorem frigoris perceptionem, saepissime optime valentes post cibum captum experiuntur: haec manifesta sunt indicia, extrema vasorum spasmate affici, et perspirationem esse imminutam. "Tempus minoris perspirationis est, quando stomachus est plenus et praecipue varietate edulorum (p)." Per multos alios Sanctorii aphorismos, e tertia sectione huc facientes, facile possum adducere. Constat itaque conditione stomachi inter cibum concoquendum perspirationem esse remorantam.

Hinc ex parte ratio reddi potest distinctionis quae usurpatur inter alimenta quae facile vel difficulter perspiratione evacuantur. Quilibet propria sua experientia certior potest fieri, cibum illum, qui non facile reddit vi concoctrici, majorem cuti rigorem inducere. Cl. Robertson adnotat, hortorum proventus, olera scilicet et legumina, et caetera istiusmodi, quae in genere difficilia sunt concoctu, perspirationem minuire (q). Sanctorius porro dicit, "Ubi est difficultas coctiois, ibi tarditas perspirationis (r)." Huiusmodi itaque alimenta quae difficile digeruntur non adeo ad perspirandum esse proclivia censere licet.

Alia perspirationis ex stomachi affectibus imminutae exempla adduci possunt, speciatim insana ex morbis illis quibus, dum perspirationem morantur, simul stomachum afficiunt. Annon contagionis et miasmatum vis sedativa totum ventriculi deprimit, et proinde spasmat, quae febribus praecorundum, extremis valis inducit? Nunne hoc probat emeticorum in febribus diluvientis usus?

PER.

(p) Sanctori. aph. sect. III. 72.

(q) On food and digestion, p. 62.

(r) Aph. sect. III. 29.



PERSPIRATIONIS U<sup>TI</sup>QUE.

**COGNITA** et perspecta quantitate materiei quae perspiratione exit, ut et ejusdem qualitate, usus ejus in economia animali facile discerni atque explicari possint; horum praecipuos paucis attingam.

**1<sup>ma</sup>.** Itaque perspirationis ope nimia fluidi exuberantia cohibetur, quo fit ut aequilibrium debitum inter fluida et solida conservetur.

**2<sup>da</sup>.** Quum omne quod per os ingeritur, non pariter nutritioni et incremento corporis inserviat; quodcumque ad illos fines seu parum seu non omnino est accommodatum, quodque aliis excretionibus non egerit, perspirationis auxilio exhalat: Hac etiam adjuvante, quaecumque aut vi circulationis, aut corporis calore, in putredinem verti proclivis sunt, et proinde noxia fieri solent, abiguntur: Hinc systema exoneratur; sales etenim, et alia jam memorata quae materiei perspirabili inesse ostendimus, simul cum eadem per poros exeunt.

**3<sup>ta</sup>.** Credibile admodum est, perspirationis haud parvam esse efficaciam in nervosis papillis humectandis et emolliendis, quo fit ut externi cuilibet corporis contactum penitus sentiant, et sensum ejusdem magis exquisitum ad sensorium commune deferant.

**4<sup>ta</sup>.** Quaeritur, An perspiratione corpus refrigeretur?

Docti, omnibus fere saeculis, diligenter indagare conati sunt caloris animalis originem; cui demonstrandae diversae inventae ac propagatae sunt hypotheses; sed hucusque frustra cessere omnes hujusmodi conatus — Et fatentur quicumque eruditione et sagacitate praecipue pollent, difficillius problema neutiquam exstare in tota physiologia.

Sed, utcumque haec res se habeat, corpus non solum calorem generat, sed etiam proprietatem prorsus diversam habet, calorem nempe externum ei admotum retingendi. Calor humani corporis in statu sano liquorem in thermometro Fahrenheitiano ad gradum fere 93° hñt; quem gradum parum aut nil mutatam inter magnas et crebras externi caloris vicissitudines, quibus corpus est obnoxium, constanter admodum conservat. Hujus phaenomeni explicatio vulgo allata et recepta haec est; vim caloris generatricem, qualisunque demum sit, eo plus immitti, quo intensior sit calor externus. Et quidem concedatur rem se ita habere, multa tamen litteris a doctis consignata habemus, et memoriae saeculorum insequentium tradita exempla, quibus constat, corpus, licet calori externo multo

intensiore, quam est internus ille quo fruatur, fuerit expositum, non tamen propterea posterioris momentum adaugeri (r). Cel. Franklin, cujus memoria posteris cara erit, quamdiu per immensum coeli expansum fulgura coruscantia micabunt, et tonitru tremendum nubila glomerantia dividet, exemplum illustre hujus rei profert. Die quodam, cum aëra insolitus calor et vix ferendus invaserat, adnotavit, liquorem thermometri, in umbra suspensi, ad gradum 100 ascendisse: Atamen, Quid inde secutum est? An calor corporis consueque etiam auctus est? Nequaquam. Dicit enim verbis disertis, corpus suum nunquam ad mensuram aëris externi, vel aliorum corporum eadem immerforum, incaluisse; et, quaecumque attingebat, tepida ei esse visa, quasi ad ignem fuissent calefacta (t).

Hoc et alia hujusmodi exempla prorsus sunt inexplicabilia juxta hypothesein supra memoratam: vim nempe caloris genetricem minui, cum augetur calor externus. Ponatur enim eam penitus aboleri; nisi alia quaedam causa interveniat, quae corpori animato propria est, nulla ratio assignari poterit, quapropter non, sicut alia circumstantia corpora, calorem, quippe qui praeditus est vi semet quoquoeversum diffundendi, recipiat.

Caloris absorptionem, vel frigoris generationem, fluidorum evaporationem in genere comitari, ex innumeris indicis constat; praesertim ex his experimentis quae a Cl. Callen in lucem edita sunt (u). Ex hoc principio potissimum mihi petenda videtur mirae illius proprietatis solutio, quae corporibus nostris inest; calorem externum nempe reslinguenti. Calor etenim externus, quum corporis superficiei applicatur, magnopere materiei perspirabilis fluxum auget; cujus evaporatione obviam itur effectibus aucti caloris, systemati generali incommodum aliquin insigne illaturi. Huic hypothesei decus addidit summi philosophi Celest. Franklin, idem consentis, suffragium (x.) Et, quamvis nonnulla ei suffulciendae haud ineptia adduci

VOL. III.

I i

possent,

(r) Dr Robertson, qui nuper chemiae in Academia Glasgoveni docuit, mercurium in thermometro, operam debentibus in vapouris quidam ubi calor supra humani corporis gradum ascendebat, applicato, ad gradum 97. vel 98. subsidere invenit.

Dr Chalmers in Carolina deperi, tempore aestivo cum mercurio supra gradum 100. esset, corpus sui thermometrum applicuit, et mercurium ad gradum 92. vel 96. protinus decidere observavit.

(t) Letters and papers on philosophical subjects, p. 166.

(u) Physical and literary essays, Vol. II. Art. VII.

(x) Letters and papers on philosophical subjects, p. 166.

possent, satius tamen duco eam tanti viri auctoritati nimiam relinquere.

Haecenus dictis subiungi nunc oporteret perspirationis conspectus pathologicus: Quum autem fieri nequeat, quin, si id aggrederer, in nimiam molem hocce tentamen excreveret, hic gradus sistendus est; quum semel, quantum verbis assequi potuero, intimos grati animi sensus protulerim erga Praeceptores meos doctissimos humanissimos Facultatis Medicae, ut et erga Professores reliquarum artium et scientiarum quae ad medicinae studium quocunque modo viam fiernunt: Vobis enim, Viri celeberrimi, si quid unquam in hac arte salutifera exercenda efficere valuero, id omne, jure merito, referendum et jam praesentio, et lubens in posterum semper agnoscam.



DISSERTATIO INAUGURALIS,

DE

CYSTIRRHŒA:

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

In Auditorio Recitandi admodum Viri,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academice Edinburgense Præfidi;

HEC MOX

AMPHIBI VENATUR ACADHEMICI Censura,

Et Universitatis FACULTATIS MEDICÆ Decretis,

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JOANNES PARNHAM, MARYLANDIENSIS,

Societat. Phys. Med. S. H. necnon Societat. Med. et Med. Phys.  
Edinens. Socius.

Ad diem 12 Septembris, hora locoque solita.

---

*Quam sit pulchra liberis crastula cœni arbor. HORAT. Epist.*

---

1772.

---

PHILIPPO BRISCOE, AMIGERO, MARYLANDIENSIS,  
Societo meo optimo, a quo, Patre clarissimo, dum nondum fere  
pueriles annos attigeram, amisso, amicitiam et curam quam maxi-  
me paternam semper expertus fui;

HEC MOX,

JACOBO BUCHANAN DE CATER, AMIGERO, SOCIUS.

Cui a me plura debentur;

DEMIQUE,

THOMÆ HAMILTON,

In Academia Glasguensi Anatomiae ac Botanices Professore, viro  
in rebus Medicis ac Chirurgicis præclaro, Præceptori in illis ar-  
tibus meo primario, et cuius erga me hospitium et amicitiam non  
potest quis meminere,

*Et tunc utiq; vi pte sui Indigne parva videtur*

Dissertationem hanc,

Parvulum animi grati testimonium,

Dicam volui

AUCTOR.

## DE CYSTIRRHOEA.

## DEFINITIO.

**STILANGURIA**; urina reddita albidâ vel lactis feri instar; ex eadem, post remoram aliquam, in matula materie mucosæ et non friabilis depositio.

## SYMPTOMATUM ORDO.

**SYMPTOMATA** ordine sequente instare solent. Mictio adest, vel mingendi cupiditas frequens; urina cum difficultate ac rivulo parvo redditur; interim ad vesicæ collum resistentia quædam percipitur; ex quo urinae fluentis obstructio oritur, dolore, calore, quasi ferventi per urethrae cursum tendentibus, stipata: Haec autem urinae reddendæ cupiditas ita frequens, ut decimo quaque horæ minuto sæpius occurrat; aliquando autem per semihoram, sed rarius horam ultra unam alteramve, urinam aeger retinere potest. Morbi initio, loti redditi ruberrimus et nonnunquam sanguinolentus color est; postea vero albidus vel lactis feri instar evadit; tum, post remoram in matula aliquam, materiam viscidam, mucosam, aluminis ovi similem, deponit. Haec autem, præ magna ejus visciditate ac tenacitate, in fila aliquando ad ulnæ dimidium vel amplius extensa deduci potest; nonnunquam materies deposita formam induit quasi laniatam; tunc plerumque quantitas ejus parva est; aliis tamen casibus, tam magna, ut urinae dimidium excretæ ferè superet; hæc autem, secundum quod tempus urina in vesica retenta fuerit, variabilis videtur; eandem etiam propter remoram foetidus iste ac putridus, quo natus impingit, odor comparatur: Symptomata narrata, utpote quæ morbum constituunt, aliis plerumque adventitiis stipantur; quorum tenebrosus maxime frequens, cum dejectionibus nonnunquam numerosis, occurrat. Haec inter examina, ab intestino recto materies, isti ex vesica similis, mucosa sæpe excrenitur. Dolores interitum, colicorum instar, cum inflatione aliisque viarum primarum affectuum symptomatibus, exoriuntur.

Symptomata alia nonnulla nonnunquam obtrinent; hæc autem, secundum morbos quibus hic noster alios conjungatur, variabilia; ergoque sub hoc capite minime recensenda sunt.

## OBSERVATIONES NOBILIORES QUINTAE.

MORBUS, noster a Domino Licentius exarbitri velicose nomine descriptus invenitur; ille autem de eo quasi morbo inaudito, omnibusque auctoribus, Hoffmannus excepit, alto silentio submerso vendidit. Hoffmannus de eodem, quasi velicose affectione raro, loquitur. Cuius autem medicus Budula, vel hujus artis libris versato, affectionem neque tam manducantem, neque tam raram esse, quam sibi ipsi hi auctores sinxerunt, non potest quin figeat. In alia præterea hujus dissertationis parte, hunc morbum Siennerto etiam notum fuisse, et Boneto autem sæpius designatum, Hoffmannusque ipsum nobis casus tres quatuorve opposuisse, ostendimus. Aliquibus forsitan, symptomata supra narrata, nisi morborum aliorum comite, sese non præbere, allegatum sit. Fatendum enim equidem est, itriguriam urinamque mucosam, morborum nephriticorum vel urinarum velicæ calculosorum, plerumque esse symptomata; sed, ex observationibus postea adducendis, symptomata illa non solum morbis aliis pendere, sed etiam, nullo alio existente morbo, ex velicæ ipsa idiopathice affecta oriri, nec non mucæ secretionem auctam, maximam nostram attentionem mereri, quandoquidem, eo diminuta, symptomata alia levare soleant, patet; hinc morbum non solum symptomaticum, sed etiam nonnunquam idiopathicum, liquet. Si autem idiopathicus sit, proxime disquirendum est, quoniam ei in systematibus nosologicis tribuatur vel tribuendus sit locus.

A systemate itaque Sauvagesiano, ut ordine primo, incipiendum est; illic sub classe ix. et genere xxviii. morbum, Pyuriæ sub nomine definitum, invenimus; in ista autem definitione, mistio puris, vel purulenta, cum mucosa confunditur, etiam si Sauvagesius postea ipse cauteatur mucum inter et pus distinctionem manifestam esse;—Linnaeus nomine barbaro *Ghr* utitur. Definitio ejus præterea nimis curta, nec symptomata suis diagnostica præbentur. Vogel hunc morbum nomine omnino improprio, Chylariæ, scil. designasse videtur; in ejus autem definitione symptoma morbi primum, stranguria nempe, deest. Cullenus, Nosologicorum ordine postremus, celeberrimus vero, de hoc morbo, in systemate suo, ne unum quidem fecit verbum; quare hoc oriretur silentium, rationes adducere non nostri hoc est; tantum, summa cum deferentia, systemata nosologica, adhuc tradita, omnia, forsitan ex ipsius rei natura, difficultatibus ac defectibus nonnullis laborare,



lurare, nobis ulservare liceat. Nullum vero esse in quo difficultates minores et defecta pauciora, quam Culleniano, inveniantur; eodemque tempore, non possumus non mirari, ad quot pauca genera nosologiarum aliorum sarraginem reduxerit. Hujus autem systematis rebus in aliis praestantibus culvis lectori non patet quin luceat; nobis ergo, si sub systemate tam conciso, eleganti, ac usui, morbum neglectum collocare conantes, errores nonnullos commiserimus, condonandum erit. Cullenus suas morborum classes divisionibus duabus generalibus distinguit, quarum prima tres classes priores continet; ea autem complectitur morbos systema in genere afficientes. Secunda vero, quartam ac postremam classem amplectens, morbus corporis partem tantum affligentes, sine ulla systematis generalis affectione, perstringit. Quæstio igitur, Sub qua harum divisionum collocandus sit morbus de quo agimus, imprimis oriretur.

Ex dissectionibus, cystirrhoeam inter et catarrhum communem, quoad glandularum mucusarum affectionum statum, similitudinis quoddam obtinere constat; hinc morbus amplexus ad classem ordinemque eundem, ac igitur ad Culleni Profluvia, primo ex intuitu referre suaderemur. Catarrhus vero, et sub profluviorum ordine genera alia complexa, pulsu frequenti et systematis affecti symptomatibus aliis stipantur. Ex observatis autem, cystirrhoeam pyrexiam nullam vel alia systematis generalis affecti symptomata fere semper comitari patet; hinc et similitudinem quam maximam propter, hunc inter morbum et gonorrhoeam, quoad et statum partium affectarum, et materiem excretam, non inter morbos generales, sed locales inter, recensendum esse, et etiam sub eadem classe, ad ordinem Culleni tertium, *Apocynetes* scil. referendum, ducere fert animus.

## CAUSÆ.

PARTI prægressa, morbum in duas species, symptomaticeum scil. et idiopathicum, sese dividere observatum fuit. Ad causas autem rite ac ordine investigandas, forsitan harum etiam specierum, secundum quibus oriuntur causas, ulterius in varietates distinctio non inutilis foret; hoc ad propositum, in tabula sequens.

## TABULA.

## I. Cystirrhoea symptomatica.

Sub qua comprehenduntur varietates sequentes.

## 1. Cystir-

1. Cystirrhoea calculosa.
  - a. Ex calculo in vesica ipsa.
  - b. Ex calculo in rene, pelvi ejus, vel uretere.
2. Cystirrhoea arthritica.
3. Cystirrhoea sympathica vel ex aliis partibus affectis.
4. Cystirrhoea syphilitica.
  - b. ——— ex intestinis recto affecto.
  - c. ——— ex vagina in feminis affecta.

## II. Cystirrhoea idiopathica.

1. Ex acerbis assumptis.
2. Ex acrimonia in urina indurata.
3. Ex urinae retentione nimia.

Hocce causarum conspectu dato generali, de singulis in ordine quaedam amplius proferre, necnon medicorum celeberrimorum scriptis observatisque deducta, quibus causarum hujusce morbi talium existentia probari potest, testimonio exhibere restat.

1. CYSTIRRHŌEA CALCULOSA. Calculum in vesicae mucis excretionis auctae saepius esse causam, medicis fere omnibus non ignotum esse potest. Ad rem stabilendam, in observationibus Boneti, Lieutaud, et Morgagni, exempla multa inveniunda sunt, alia in Nosocomio Regio Edinensi nos saepius vidimus. Singula vero quibus in vesica lapidis existentia dignosci potest nonnunquam maxime dubia sunt; quanquam enim praesentia ejus cathetere plerumque detegi potest, tamen, si cathetere immisso non invenire potuerat, calculum nullum adesse, minime denuncandum sit; quoniam exempla non desunt, ubi eo semel, bis, terve introducto, nullus perciperetur; attamen, post pericula repetita, vel manu magis perita instrumentum gubernante, lapis tentamina priora minore cum arte petacta illudens, sensibus tandem patetfactus fuerat. Praeterea, etiam si post tentamina maxima cum arte saepius instituta, lapidis perceptio nulla inveniretur, nullum tamen, exinde solum, adesse, nequaquam inferendum est; nonnunquam enim lapidem, vesicae lateri adhaerentem, tunicam sibi formasse evenire potest, (Vid. Lieutaud, Anat. Med. Obs. 1333. ad 1352.); quapropter, ex catheteris lapidem contra collisione, sonum ullum, vel vibrationes qualvis praesentiam ejus indicantes, percipi impossibile foret: In hisce igitur casibus, praeter ex catheteris usu signa, diagnostica alia, ex aegri temperamento et symptomatum observatione deprompta, adhibenda sunt. Ita, si temperamenti istius cujusdam ad calculi formationem praedisponentis aeger sit,

fit, si lapidem per urethram olim egeriverit, si urina ejus unquam sabulosa apparuerit, vel si doloribus nephriticis calculi per ureterem in vesicam descensum designantibus vexatus fuerit, tunc in vesica lapidem morbi causam esse verisimile erit. Ex calculo autem in rene, pelvi, vel uretere, hanc vesicae affectionem oriri, dissectionibus multis patet. Morgagnus ad hanc rem elucidandam exempla nobis plurima tradidit: in uno (Epist. XLII. 4.) quidem, medici consulti morbi sedem in vesica fuisse non dubitarunt, sed "mortui dissectio nihil quidquam mali in vesica, " magnos autem ramulosque calculos in renibus, ostendit:" Alium similem ex Harderi observationibus narrat, ubi corpore dissecto dicit, "In vesica nihil praeter " naturale observare licuisse; in rene autem altero, non " modo inclusas carunculis papularibus arenulas copiosas, sed praeterea ante ureteris ostium fuisse calculum " oblongum, acuminatum, siliis duritie, &c." (Morg. Ep. XLII. 5.) Multa alia hujusmodi, ex Boneti anatomia practica, (Lib. III. Sect. xx. Obs. xiii. Sect. xxviii. Obs. xvi.) exempla petenda essent. Ex symptomatibus, quando in rene, pelvi, vel uretere sit lapis, plerumque pronunciare difficile foret; nec magni forsitan esset momenti: Majoris autem utilitatis erit, hoc inter casus et in vesica ipsa lapidem distinguere. Haec verò dissimilia nonnulla etiam ambigua stipatur; quoniam ex doloris situ nil praecerto judicare possumus; necnon symptomata plerumque similia sunt. Si autem, post catheteris usum saepius repetitum, nullus in vesica perferatur lapis, nec regit de dolore, in illius regione, gravatio queratur, et si vomituritio eodem tempore occurrat, ex Sydenhami auctoritate lapidis sedem in rene, pelvi, vel uretere esse, suspicandum sit.

3. CYSTIRHOEA ARTHRITICA. — Juxta Doctorem Cleeck, aliorumque observata, filamenta mucosa in urinis arthriticum saepius inveniri liquet; hinc mucum ex vesica secretionem adauctam, arthritidem, majore minoreve gradu, non raro comitari duxerimus. Exempla vero magis ad rem pertinentia sunt, ubi paroxysmi arthritici alternare, ac ideo, aliquo modo, de morbo illi pendere cystirhoea videtur. Dux tales casus ex Vieussenio Sauvagesius nobis transcripsit; illis ambobus, paroxysmis arthriticis subvenientibus, mucum excretio supprimebatur, (Sauvage de Pyur. arthrit.) Multos alios tales sese vidisse dicit noster celeberrimus Praeceptor Cullenus (Praelect. Clin. ann. 1770-1.) Tres autem casus memorat; primus, in virgine nobili



nobili obediens, observatu dignior erat, secundus ac tertius viis multis occurrerant: In duobus posterioribus, mucoſae urinae excretionem paroxysmis cum arthriticis non ſolum alternariſſis, ſed etiam aliquando cauſis paroxysmi arthritici occaſionalibus, arthritidia accedendi ſolito praecedentibus, ſymptomatibus praegreſſis, excitatam eſſe obſervatum fuit. Cyſtitidis arthriticae exiſtentiam probare hoc ſufficit. Cognoscitur autem ex aegri temperamento, ſive genere, et ſymptomatum levatione, paroxysmo arthritico ſubſequenti.

3. CYSTITIS RHŒA SYMPATHICA. Sub hac caſus omnes ex partium veſicae vicinarum magiſque diſtitarum affectione mucoſa urinae includendos cenſemus. Inter partes corporis noſtri diverſas ſympathiam quandam intereſſe, nemo hodie dubitet, quanquam quiſque ſere theoria diverſa rem explicare tentet. De theoria autem in hoc loco diſquirere minime ad noſtra pertinet; ſed potius ad varietatum huius recenſitarum cauſas ſtabiliendas, teſtimonia proferre nunc noſtri eſt.

a. *Cyſtitidis ſyphiliticae.* Hanc ſub titulo Pyuriae viſcidae Sauvageſio deſcriptam habemus. Eos qui olim gonorrhoeam paſſi fuerint aggreditur. Muci ex glandulis urethrae excretionem auſtam (Anglice *Gleet*) temporis per multum poſt gonorrhoeae violentiam extinctam nonnunquam remanere bene noſcitur; glandulis vero ad veſicae collum ſitis hancce affectionem transferri, ex eoque cyſtitidis ſymptomata omnia evenire, non tantum probabile reſtat. Talem enim ſeſe ſaepe viſiſſe caſum teſtatur Calaneo (Praxi. chap. 1774.) Talem Profeſſoris noſtri digniſſimi Hope, in Noſocomio Edinenſi, ſub manibus ipſe viſiſſe meminit. In hiſce plerumque caſibus, ſtranguria paroxyſmarum febrilium, intermittentium iſtat, cum ſudore et mucis excretionem copioſa perfectiorum, formam nonnunquam induit. Haec febricula, gonorrhoea praegreſſa, et lapidis abſentia modis antea diſſis cognita, varietas haec dignoſci poſſet.

b. *Cyſtitidis ex inteſtini recti affectu vel haemorrhoidaliſis.* Ad communicationem vel ſympathiam veſicae inter et rectum ſtabiliendam quam plurima adduci poſſunt. Exempli ad rem pertinentia duo reſert Hoſſmannus (Vid. Conſult. et Reſponſ. Med. cent. ii. et iii. § 3. caſ. 84. 93.) In primo, niger fluxu haemorrhoidali olim laborans, haemorrhoidibus ceſſantibus, urinam, colore ſanguineo imbutam, maximo cum dolore excretam, et paroxysmis, redentem mittere ſolebat. Hi autem paroxyſmi, aliquot poſt dies, fluxu haemorrhoidali iterum ſubveniente, termina-

minabantur. In altero, generosus, fluxus haemorrhoidalis etiam aliquoties, hac cessante, missione non sanguinea, modo vero multa viscida, aliisque cystiterhoeae symptomatibus stipata, corripiebatur. In hisce igitur casibus, quia vesicae affectio ex haemorrhoidum suppressione ortum suum traheret non dubitandum est; quomodo autem fluxus sanguineus, ut in casu posteriori, in mucosum mutaretur, non difficile forsitan explicandum esset: Nobis vero in recto ipso, ubi fluxus haemorrhoidalis saepe formam mucosam induit, idem aliquando evenisse, satis nunc erit observasse. Haecce varietas ex causa plerumque dignosci potest: sed praeterea, in ea missiones cruentas, postea in mucofas conversas, morbi principio nonnunquam occurrere, observandum sit; ex hoc, si aeger plethoricus ac temperamenti ad haemorrhoides praedisponentis sit, etiam si antea sanguis nondum exsillaverit, morbum ex eo fonte provenire suspiciendum est. Talis casus in Nosocomio, Praeceptorum vul. Culleniano obvenit (anno 1770-L): Quidam, Petrus Whitehead, aetate 34, vir indigens ac labori assuetus, in quo quare syphilinidem praegressam suspicamur causa nulla fuerat, subito ac sine symptomatibus nephriticis antecedentibus ullis, stranguria sanguinisque ex vesica profusione corripiebatur; his symptomatibus per annos duos perseverantibus, tandem vero, sanguinis fluxu cessante, materiem mucofam et viscidam mingebat. Casum hunc, quanquam haemorrhoidibus aeger nunquam laboraverat, ad fontem nullum alium praeter haemorrhoidalem referendum judicabatur.

c. *Cystiterhoea ex vagina affecto.* Ex partium vicinis, vaginae affectiones vesicae saepius communicatas fore conjiceretur; nihilominus cystiterhoeam, ex hac causa originem ducentem, tam raro invenimus, ut historiam hujusmodi unam tantum, sed bene stabilitam, et rem quam lucidissime probantem, nobis a Cullenio traditam habemus. "Mulier, vidua, felicitates conjugiales iterum expertura, maritum juvenem robustum sibi assumptum. Consummatio nunc vero magis quam ei virgini venerat difficilis erat, nec nisi dolore quam maximo perficiebatur; hinc pudendorum cum molestia ac dolore inflammatio oriebatur; coitus, juvenis mariti saepe ex ardore inflaturus, effectus huiusmodi semper sequebantur; tandem autem hoc modo mense peracto, chirurgus arcessitur; remedia emollientia sine ullo symptomatum levamine adhibebantur; stranguria necnon urinae ardore supervenientibus, amici ejus, casum saepe venereum esse, suspicantur, ergoque, nesciente

ente chirurgo, mercurius ei exhibetur, eoque salivatio copiosa excitatur; nullum vero exinde auxilium recipiebatur. Quarto circiter vel quinto a nuptiis mense, urina perferuantibus sedimentum copiosum mucosum deponere videbatur, symptomatibus strangurialis remanentibus." Hic non dubitandum, quin ex vagina affecta symptomata cystirrhœalia ortum suum traherent; constictio quædam in vagina forsan præternaturalis ausam inflammationi in ea exortu præbuerit.

**H. CYSTIRRHŒA IDIOPATHICA.** Hucce titulo omnes cystirrhœa casus, non aliorum morborum symptomatice, causisque in vesicam ipsam primario agentibus orientes, designare volumus; tales vero existerre casus etiam, si dicimus, ex Sennerti scriptis pateret. Ille enim ex Cardani commentariis refert, \* Manachum quendam tantum pueri tunc lentæ in marala simul concretæ, ut ovi anseris magnitudinem superarit, sibi ostendisse, et tamen nunquam calculo laborasse. (Sennert. pract. lib. 3. pars 8. sect. 1. cap. 3.) Deinde ex Hüllerio scribit, \* Quendam minuisse multa similia liquidis margaritis, admodum pellucida, alia crassiora, mediocriter cocto albumini ovi similia. Multa alia similia ex Boneti observationibus deducerentur (Vid. Bonet. anat. pract. lib. 3. sect. 18. obs. 15. 17. 22.) Nunc autem, cystirrhœam ex causis in tabula designatis orti, probare nobis incumbit.

1. *Ex acris assumptis.* Acris nonnulla, salina præsertim, assumpta, in vias urinarias suos effectus peculiari modo ostendunt; pergaudere bene notescit; inter illa vero nulla hæc vi magis quam cantharides pulent; hinc non solum ex earum usu interno, sed etiam applicatione externa stranguriæ orientes sæpius observantur. Hæc (scil. stranguriæ) autem transitoriaæ plecunque ac fugaces, nec mucosum viscidum sunt (stipatae); in aliis vero exemplis effectus pertinaciores ac diuturnes evenire possunt: Tales casus etiam mucæ excretionis aucta stipatos sese sæpe vidisse, refert Cullenus. Alii etiam acris metiore ex systematis vel vesicæ irritabilitate stranguriam gignere possunt; ita venæ ac irritatio et mingendi cupiditas frequens ex ricini etiam oleo vel vini paululo assumpto urini nunquam solent. (Cullen. præcl. clin. 1772.)

2. *Ex acrimonia in urina indulta.* Acrimoniam urinae ex acris assumptis orti non denegandum; de urina vero, non ex aliquo in corpore introducto, sed causa admodum diversa, acris nunquam reddita, hic loqueremur; ita labor nimis, fluidorum partes tenuiores et aquosiores



diffundendo, salinas per vias urinarias transiunt, mucus dissoluitur, ac spiritus acrimonie magis prestantes, reddit. Hinc, post exercitia vehementiora ac diuturna, urina multo ruberrima et cum stranguria nonnumquam excrevitur: Ex hoc fonte in equis ex veterinariorum observationibus strangurias saepius oriri poteret. Bonetus praeterea casum ex Thoma Bartholino refert; ubi, ex pestilenti nimia de tempore eodem ad solem expositione diuturna, primo sanguinis mictione juvenis nobilis ager corripiebatur; deinde haemorrhagia, qua extinctus fuerat: In defuncti vero corpore nihil vitii praeter mucum in vesica et intestinis apparebat. Exemplum ad eandem rem, hinc praeterita, in Nassenmulo Edinensi lecto obrulit. Alexander McDonald, vir aet. 37, labori affectus, quinque ab illo tempore circiter annis, stranguria, mictione mucosa, aliisque cystitermone symptomatibus, laborabat; lapidem nunquam excreverat, nunquam arenulis urina sequebat, neque post catheteris usum saepius instillatum calculus unquam percipiebatur: Quamvis autem ejus labori nimis succedebant; neque, vel tribueretur, aliam sciebat causam.

3. *Ex urinae retentione nimia.* Ex hoc fonte mala ortum suum multa trahere, exemplis quam plurimis statueretur: Inflammatione vesicae enim, urina in solenni mictu ultra constrictiorem detenta, exorta, supremam sibi ossem cel. Tycho de Brahe traxisse dicitur (Bonet. de urinae supp. obs. 10. 7.) Ex tali vero causa cystitermone etiam oriri ab Hoffmanno probatur (cent. 4. et 3. cas. 82.) Quomodo retentio haec nimia suae edat effectus politica explicandum erit.

#### DE CAUSARUM ACTIONE.

PARTIS praegressa, ex auctoribus, ad causarum allegatarum existentiam vincendam, exempla tantum adduximus; nihil autem, vel nihilo proximum, de earum actione diximus; neque, more solito, in praedisponentes et occasionales vel excitantes divisionem fecimus. Nunc igitur quaedam de illis differere nobis incumbit et, 1. *De calculorum actione.* Vias urinarias, irritabilitate indutas, urinam etiam statu naturali aciem esse, unguibus hodie conceditur; hinc partes sensibiles ab acrimonia defendendi uriebatur necessitas. Huic vero proposito, tunicam ureterum et vesicae, sed praecipue ad caulum ejus, internam, glandulis ad mucum secretandam instructam, invenimus. Haec autem glandulae liquorem suum, quo magis iritantur, copiosiorum effundunt. Hoc modo calculum in vesica plerumque agit,

agere, (irritatione scil. glandularum circa collum ejus.) Sed quo modo lapis tunicatus, ut nunquam accidit, irritationem ad vesicæ collum induceret, quaestio non tam facilis; duobus vero modis solvenda sit: 1<sup>us</sup>, Lapidem, antequam tunicam sibi formaverit, aliquo pro tempore, hæc in vesicæ sese pervolvit suspicaremur; hinc glandulas etiam ad collum sitas ejus contactu irritari: Ex hac vero irritatione sensilitas partium aucta nrissetur; exinde autem urinae acrimonia, non antea præceptibile, pro causa irritante ac excitante ageret. 2<sup>us</sup>, Etiam si a principio tunicatus ac fixus fuerit lapis, eisdem nihilominus effectus e-  
dere poterit; hoc vero, ex irritatione a loco ubi lapis hæret, per vesicæ tunicas nulla ejus communicata, explicandum: Eodem quoque modo, renis, pelvis ejus, vel ureteris calculos, actiones suas ad vesicæ collum extendere, suspicandum. Quomodo autem hæc communicationes per membranas continuas fiant, et ubi, ex membranarum terminatione, anulus quasi tendinosus sit, ut ad vesicæ collum suæ effectus præcipue ederent, est quaestio tam obfcura ac theoricis tam subtilibus involuta, ut, hoc loco, silentio præterire melius duximus. Nunc, de *arthritidis*, ut caussæ, actione, proxime disquisitionum. Arthritis in nulla corporis unica tantum parte sedes coercetur; sed partem unam, nunc alteram obsidet. Hinc ventriculus necnon viscera abdominalia omnia ejus afflicta obnoxia sunt; renes quoque non immunes; hic enim paroxysmos, nephriticis quam simillimos, nonnunquam excitare solet. Ex antea autem dicta renes inter et vesicæ collum communicatione, morbum etiam ad vesicam transferri facile concepiatur; partium corporis externarum arthritide obsecrarum sensilitatem magnopere augeri, ab omnibus hunc morbum expertis concluduntur; hanc etiam sensilitatem auctam partibus internis affectis, ac igitur in vesicæ, obtinere probabile videtur: Hincque urina pro causa excitante (ut prius dictum) hocce in casu erit. 3<sup>io</sup>, De *causarum sympathicarum actione* nihil pene prorsus proferendum habemus. Sympathia inter partes diversas, duobus fontibus, connectioni scil. inter nervos cuidam, vel illi ex vasis sanguiferis orienti, forsitan tribuenda est; ex hisce ambobus varietatum hocce sub capite recensitarum actio aliquo modo pendet.

2. De *Causarum Idiosyncratarum Actione*. — Uvarum primarum, acrium scil. assumptarum, et urinae acrimoniae inductæ, ex antea de calculis dictis, actio facit lucide patebit; quomodo vero urinae retentio nimia  
suos

suos effectus edat, explicatione forsitan egeat. Nimia retentionis actio duobus modis explicari potest; imprimis, urinae vesicam venis absorbentibus perfusi, hisque ex cavitatibus ejus urinae partem absorberi haud absurdum videtur; hinc vero, partibus urinae magis aquosis primo absorptis, partes resistere minus aqua dilatae, ideoque acriores sunt; vel, 2do, distensione, retentione nimis orta, vesicae collo constrictionem induci; ex hac autem constrictione glandulas mucosas ibi sitas irritari atque emulgeri concipere possumus.

Glandulas enim mucosas vesicales, sed praesertim ad ejus collum, sedem nostro morbo praehere, ex dissectionibus multis patet. Hae vero glandulae tumidae ac in vesicam nonnunquam pendentes inveniuntur, (Morgagni. epist. xlii. 12. 13.); vesicae autem tunicae carnosae ac tam crassae, ut ejus cavitatem fere totam compleant, (Bon. lib. III. sec. xxviii. obs. xix. xi. Licetaud de ves. scir.) Dissectionibus vero solis causam morbi proximam assignare, objectionibus nonnullis exponitur: Quae enim post mortem apparent, morbi tantum esse effectus dici possunt: Ad rem haec pertinent; quamquam enim vesicae tunicae crassae ac glandulae tumidae post mortem inveniuntur, non quare harum partium huius status, ut morbum constitueret, haberetur, exinde sequitur. Ex dissectionibus vero, ex hisce glandulis affectis morbum oriri, liquet. Ergo, si modum quo afficiuntur designare possumus, causam efficientem habebimus. Hoc tantum causarum diversarum investigatione faciendum sit; ex ista vero eas omnes vel tunicae glandulosae sensilitate vel urinae acrimonia augendis agere; si autem urinae acrimonia adaugeatur, partium ejus irritationi subiectarum sensilitatem etiam adaugebit; hincque igitur causas omnes sensilitatem ad augendam tendere pateret. Ex hacce itaque glandularum sensilitate adaucta sanctorum symptomatum explicatio veniret: Ex eodem quidem fonte symptomata stranguriosa oriri facile liquebit; ex ea etiam, urina pro causa semper excitante agente, mucii secretio adaucta explicanda fore. Sed quomodo mucii magna ista visciditas exoriretur, non primo intuitu apparet; si vero, glandulis irritationem perpetuam applicari, istaque organorum secretioni ad aptum assidua irritatione, stimulum aliquam, vel potius partium laxitatem morbosam, non posse quin subveniat, perpendatur; quare, morbo progrediente, mucii visciditas fere semper adangeretur, etiam patebit. Ex eadem sensilitate adaucta, nec non irritatione perpetuo adhibita, vesicae tunicarum crassitudo, cavitatis ejus diminutio, atque glandularum tumiditas, oriri viden-

tur;

tur;

tur;



Mori haec vero glandularum tumiditas, necnon tunicarum crassities adhaerens, quoniam ut morbi tantum effectus habendas sit, tamen impetum vasorum mucum secretentium pulvis adaugendo curationem arceant; hocque conspecto, in morbi stadio profectione, ut causae praecipue morbi provatorum habereantur.

### DIAGNOSIS.

Mucum quos inter et nostum diagnostica nonnulla struere necesse est, *Gonorrhoea*, *Pyuria*, ac *Leucorrhoea* tantum. Ex gonorrhoea dignoscitur, ex hoc, quod in illa, muci ex urethra, stillicidio plerumque perpetuo, manatio sit; in cystitrinoea vero, non nisi cum urina mingitur.

2do, *Pyuria*. Hoc genere Sauvageus (ut antea dictum) et muci et puris mictionem includit; sed etiam ex Sauvageo ipso distinctionem interesse apparet; haec vero distinctio trahitur, imprimis, ex materialium urina cum excretarum consistentia. Pus enim friabile nec structura tenaci praeditum; mucus autem tam tenax ac viscosus, ut matulae fundo inversae quam tenacissime nonnunquam adhaereat, et in filamenta longissima diduci possit. Pus coloris grisei, mucus vero albidus ac pellucidus, invenitur. Praeterea, puris excretio rarissime, si unquam, nisi post partes erosas vel vasa rupta obtinet; hinc febris hectica stipatur. Muci vero excretio sine erosione ulla vel febre continere plerumque videtur; ex hoc autem discrimen aliud inter morbos exoritur.

3tio, *Leucorrhoea*. Hoc in morbo symptomata stranguiosa nonnunquam inveniuntur. Diagnosin facile vero sumenda sit, ex eo quod in isto materice mucosa ex vagina constanter emanat; urina autem non turbida, neque sedimentum album deponit.

### PROGNOSIS.

Quo rite de morbi eventu felici seu fatali dijudicetur, tum causas, ejusdemque duratorem, nec non symptomatum indolem, accuratius omnino perpendendas esse adparebit. Ita si ad vesicae calculum, ortum quasi exinde accipiens, morbus referri possit, et nihil sit causae quare supurationem, (quae crebrius huic malo finem imponere solet), imminere suspicaremur, ut ad curationem perfectam attingatur, quam plurimum lithotomia pollicetur: Si vero per longum temporis morbus inveteraverit, et signa statum purulentum denotantia jam jam sese manifesta reddiderint, dum aegrotus praecorporis habitu ad operationem suffi-

sustinendam parum valere, tunc prognosim infauissimam apprehenda sit. Denique malum, calculis in ureteribus, pelvis, seu vesibus exortum, eventum ut plurimum infelicem denunciat; quippe quod, si eorundem angustia, earum indeo immutetur, non sanabit, vel saltem ne per vires in vesicam transirent prohibeat, qua exinde per operationem chirurgicam, ut casu priore, extraheretur, nullus modus restat. Quod ad cystitideam, originem suam ex cystitide redeuntem, spectat; nunquam, ad sanationem ex toto aduendum esse, forsitan sperare liceat; quandoquidem arthritis cu isto non omnino latet. Cystitideam sympathicam, si tempore idoneo nostrae tantum accipimus, nos penes sit mitigare, vel penitus fortasse fugare. Quod idem neque ad idiotheticam pertinet, cujus casus, si ad morbi primam insultum cognosceretur, obviata ire haud difficile foret; at tamen, in amittente casu, curatio perfecta vis nunquam efficienda est. Rarius enim morbus adiuuatur, donec vesica densitate permulta adhaeretur, ac glandulae mucosae tumefactae sunt. Quapropter, etiam symptomatibus urgentibus quodammodo obuiam ramus, et viuis aegrotis magis placidam reddere conemur; plerumque tamen morbus, urinae suppressione, nullis remediis, nulla arte devincenda, seu vesicae exulceratione, quae scenam infelicem sato prorsus inevitabili claudit, tandem finitur.

#### METHODUS MEDENDI.

Haece forsitan, causas secundum quibus oriretur morbus, sese mutata haberet. Quoniam vero haud rarius, ut supra memoravimus, morbus symptomaticus sit, vel ex aliis viris rectius deduci possit, curationem perfectam ex hisce amovendis crebrius pendere, liquido patet; modos vero diversos quibus hoc perficeretur perscrutari, ultra huiusmodi dissertationis terminos non divagari cogerit. Quapropter, melius fortasse erit, ut animum ad indicationes tales quae, si non ab illis morbus ex toto fugatur, at tamen, omni ferme casu, ad symptomata subleuanda vias ostendant, praecipue advertamus: Hae itaque in duas sequentes forsitan resolvantur.

I. Sensibilitati partium affectarum nimis adhaerentiae obuiam ire. Quod item perficitur, uno, irritantia vitando:  
1. Opiatorum usu: 2. Remediis vulgo lithontripticis dictis: 4. Cicuta.

II. Acrimoniam in urina praeternaturalem fugare diluentibus atque demulcentibus

Ex eis quæ antea de causarum diversarum actione protulimus, hæc indicationes omnino necessarias esse, satis constabit; de modis itaque quibus perficiantur nunc in ordine differendum.

1. *Irritantia vitanda.*—Ex antea dictis, muci excretionem quovis irritante pro tempore non solum augeri, sed etiam partes jamjam nimia sensibilitate gaudentes ista irritatione magis ac magis sensibiles reddi, constat: Ergo ab irritantibus quibuscunque ex toto abstinendum esse parebit. Hinc exercitium nimium vitandum. Quod ad regimen spectat, quam maxime præcipue sit cavendum. Cibus animale, quam fieri potest, in neglecto relinquere oportet; vel forsitan ægrotus carnibus albidis, vel iis in statum putridum nimis facile divergentibus, tantum uteretur; carne salibus condita omnino evitata. Diaeta, siquidem ægri constitutioni non noceret, ex vegetabilibus refrigerantibus constare deberet; ab liquoribus, quippe qui viribus ad vias urinarias irritandas perpolleant, spirituosus abhorere oportet: Alvos, si adstricta sit, clysmatibus laxantibus, seu purgantibus lenioribus, elæx. lenitivo scil. seu mannae pauxillo, modice aperta servetur: Hæc enim cathartica salinis hæc in casu magnopere præluceant; quia illa (salin. scil.) ad vias urinarias stimulandas magis impertuna inveniuntur.

2. *Opiatorum usu.* Opii, quo ut irritationi obviam eatur, vel nimia parvam sensibilitas pro tempore sugetur, virtutes adeo omnibus sunt bene notatae, ut nihil nunc forsitan de iis enunciare necessarium sit. Exinde haud tantum ob dolorem, quo patiens, acutissimum, tentatur, sed etiam ad stillicidium, quod, materiam mucosam abluendo, partes ut facilius urinae acrimonia afficiantur reddit, compescendum sæpius non frustra usurpantur. Haud injuria fortasse diceretur, opiata, frequentius exhibita, ad diarrhœam in quamlibet phlogisticam, forsitan tunc temporis vesicae cervici insectam, adaugendam vergere. In nonnullis itaque casibus ne exhibeatur, cavendum sit. Quando autem symptomata violentius sæviunt, ad remedia temeraria illico confugere nonnunquam forsitan necessarium; et bonos opiatorum effectus, utpote qui ad dolorem mitigandum, et irritationem urinae crebriorem occurrentiam, valent, eorundem malis quam longissime prælocere adparet. Professor ill. Cullenus, morbum opio, et nullo alio remedio, sæpius sublevari posse, (Clim. Lect. 1770—1,) observat; et ulterius ait, euidam viro nobili apud Londinum a medicis consultis dictum fuisse, sese frustra mor-



bum mitiorem reddere conaturos, si Turca fieret, et opio penitus solo victitaret. Opium porro, in hac morbo, doloribus colicis, necnon dejectionibus alvi crebris, quæ nonnunquam sese exhibent, obviam eundo, utilissimum erit; si vero alvus constipata fuerit, opii usum haud parvum incommodi consequeretur. Quare, tali casu, eodem tempore quo opio utamur, catharticum aliquod lenius etiam præscribere, vel remedium viribus sedativis acque ac laxativis præditum adhibere, haud alienum foret. Talibus autem virtutibus gaudere jactatur *lyscyamus*. Hujusce extractum laudibus quam maximis cumulatam fuit; minime vero in hisce regionibus artis medicinalis exercitatio, an satis juste collaudetur, clarius probatum reddet; adsunt attamen experimenta, quæ talibus perfrui virtutibus evincant. Cullenus ait, quendam virum generosum, qui juxta ejus mandata idem assumpsit, plus ex illo quam ex alio medicamento commodi accepisse. Ex hisce itaque usis experimenta, quo ejusdem vires rite cognoscerentur, facere induceremur.

3. *Remedia lithentriptica.* Sub hoc capite aquam calcis, alkali causticum, necnon uram uræ, præcipue comprehendimus. Etiam si vero nomen lithentripticorum adhibuerimus, tamen medicamentorum id genus vi calculum in vesica solvendi gaudere longe nobis censere absit; causæ autem hujusce nostræ sententiæ in neglecto relictis, lectorem ad dissertationem inauguralem Doctaris Baderley, De tophis et calculis in viis urinariis, Edinburgi anno pestremo editam, referemus. Tametsi vero potentia calculum ullo modo solvendi talia medicamenta perfrui haud patet; quandoquidem tamen commodi multum secum sæpius adferant, quomodo hi effectus nascantur exponere, operæ fortasse præsum erit. Hæc autem investigatione, imprimis, an hæc medicamenta quamlibet inter se communem virtutem possideant, considerare necesse erit. Aquam calcis, alkali causticum, ut uram uræ, quasi plurimi nunc habito, retulimus; multa tamen vero alia terrea ac vegetabilia suppetias adferre observata fuerunt; (Sennert de cal. human. et Hoff, pass.) Omnia autem terrea hæc atque alcalina vi acida absorbendi fruuntur: Vegetabilia adstringentia sunt; (uram vero uræ vi adstrictoria pollere ex hoc patebit, quod in regionibus nonnullis ad coria dependa usurpatur). Omnia vero adstringentia acida vi absorbendi etiam pollere, ex eorundem in atramento parando usu videatur; in quo casu, juxta Cullenum, vires suas, ferrum ab acido præcipitando præcipue

vipue exerceant; Exinde hæc remedia omnia acida in genere absorbendo utilissima evadere probabile saltem evadit. Uti vero aciditatem absorbentia in primas vias, ubi liquidum istud sese exhibet, tantum peragere queant. Necessarium itaque erit dicere quomodo istiusmodi absorptio primas vias aspicere possit, quæ ejusdem effectus ad vesicam propagari queant. Pro comperto habemus, aciditatem in omnibus morbis qui cum alimentarii canalis tono immixtum, ut in hypocondriaci ac hysterici, slipantur, primas vias ut plurimum assilgere. Eadem aciditas mala calculosa quoque comitatur. In hisce exemplis, etiam si aciditas originem, ad primum, ex fibrarum intestinorum solidarum conditione traheret; pro certo tamen cognitum est, quod symptomata, aliquando post morbi initium occurrentia, vel ad idem sustinendum valeant, vel pro causis excitantibus postea adfint. Hoc præsertim ad primarum viarum aciditatem referri potest; hinc medicamenta, ad aciditatem imminuendam vergentia, atoniæ quam ista aciditas provocare possit nonnullis in modo occurrere queant; hæc in modo absorbentia directius in primas vias agere nobis in animo censere est. Hinc vero, ex usu corticis Peruviani, bene stabilitur, quod remedia, primas vias tantum vel primario afficientia, suos effectus, ad alias systematis partes morbidas, propagare possint. Eodem modo forsitan effectus ex absorbentibus suborti, ad vesicam propagati, iterum tonum partium et glandularum mucosarum (utpote qui ex longa morbi duratione e necessario contractus fuerit) præcipue restituendo, munere suo fungantur. Uti hæc medicamenta in morbis calculosis, ita etiam in vesicæ vitis nequaquam calculis oriundis, utilitatem nonnunquam istis modis adferant. An unum interea alteri antecellit, haud penes nos est dijudicare; quoniam utrumque suis fautoribus æque pergaudet. Aquæ calcis et alkali usurpandi methodus hæc in silentio prætereatur; quandoquidem quamplurimi viri celeb. de eadem ubi verba fusius fecerunt. Sin autem, quomodo causæ alkali optime paretur exhibeaturque, cognoscere velis, thesin Doctoris Badesley, antea citatam, consule. Uva ursæ bis terve indies in pulvere adhibeatur, a parvis tantum dosibus, quales patientis ventriculus facilius ferat, ad primum, incipiendum sit. Hæc autem doses sensim atque sensim adaugeantur; sin, uti alia adstringentia, ad dejectiones alvi crebriores excitandas aptior sit, haud abs te esset, cum unaquaque dosi, laudani liquidi pauxillum, a quo tales effectus compellerentur, commiscere. Quoniam autem hu-

jussu remediū vix tarde ut plurimum sese ostendere videntur, necessarium erit ut ejusdem usus longius protraheretur, si quidlibet commodi expectandum foret.

4. *Cicuta*. De ejus, in hocce morbo, utilitate vix quidlibet ex experientia constat; nec fautoribus suis, qui tam audaciter atque magnopere eandem collaudaverunt, facile credendum sit. Nonnullis vero in morbis, ut in scirrho, de ejus utilitate testimonia minime dubitanda habemus. Quomodo vero in hisce casibus suos edat effectus, minime liquido patet. Antea observatum fuit, sensibilitatem glandularum juxta vesicæ collum, in stadio morbi proveciori, tunicarum ejus densitate adhaerere suffulciri, quæ etiam conditio scirrhositati glandularum per similes sit. In hocce morbi statu, ex analogia, cicutam modo communi exhibere vellemus; nec dubium nobis restaret, quin ejusdem periculum faceremus, si alia remedia spem nostram fefellerant.

II. Acrimoniam in urina præternaturalem fugare. Hinc indicationi, ut antea dictum, subserviunt *diluentia* et *demulcentia*.

Sub *diluentium* titulo, omnes liquores mitiores atque aquosos quotquot pro potu ordinario usurpentur, comprehendimus. *Demulcentia* in genere quoddam mucilaginosi cum potu conjunctam, ad acrimoniam obtundendam, denotant. Sed eidem capiti hæc remedia adscribenda censemus; propterea quod eorum actio nobis quasi omnino similis, necnon effectus, tantum ex eo quod partes fluidorum aquosas adsurgent, uriri videntur. Ex fluidis vero sic adauctis, partes eorum salinae latius sese diffundent; unde, ut minus acriter viis urinariis percipiantur, evenire possit. Quapropter hoc in modo remedia talia haud tantum utilia fore, ubi urina acrimonia præter naturam abundaverit, verum etiam æque valere, si, urinae acritate tantum naturali prædita, partium sensibilitas augetur, in liquido adperchit. Uti antea liquores spirituosos vitandos esse demonstravimus, ita, ad hanc indicationem perfectius complendam, æger liquores mitiores, ut aquam simplicem cum lacte permixtam, vel lactis serum, quotidie pro potu communi bibat. Si autem urinae crudeliter laeviret, liquoris quantitas adaugenda esset; et, ut consuetudini eamum assentiri videremur, quoddam forsitan mucilaginosi, ut g. Arah. vel seminum lini, ei addendum esset. Potus frigidi quam calidi potius inhauriantur; liquores enim tepidi, copia magna inhausti, systematis robur frangere tendunt; unde, ut ab them. usu immodico ægrotus abstineat, necesse erit.



## OBSERVATIONES MISCELLANEE INAUGURALES,

## DE VINO PRAECIPUE:

QUAE, ANNUENTE SUMMO VUMINE,

Ex Auctoritate Reverendissimi Edinburgi Vini,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academiarum Edinburgicarum Praefecti;

HIC NUN

Amplius FERACUS ACADEMICI Cuiuslibet,

Et Universae FACULTATIS MEDICAE Decretis;

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

OGLETHORP WAINMAN, BRITANNUS,

Soc. Med. Physic. Med. et Chirurg. Edinens. Sod.

Ad diem 12 Septembris, hora hincque solitis.

Murem, quidam, sanam, necnon sterilitatem  
Virgula, et praeconio laetitia aliorum.  
Hic, quidam, O Locus! Tui hic omnia plena  
Mentibus: Tibi pampinea gaudia vinorum.  
Hic, aeger: Spumas plenis vindemia laetis.  
Hic, quidam, O Locus! Tui: natalisque munda  
Tingit ovum meritis: Scepilis crata colubina.

VIRGO.

Simplicitati quam maxime in praefectissimis remediis in seculi medici, nec  
alio nolem tot numerum, sed concinnam brevitate, non pompam, sed  
efficaciam, addere. Unde ex immensa Materie Medicae sylva non qua-  
vis promissae cingere, sed probatissimum solum distinctus habendus.  
Simplicium generis est Natura, hanc semper, sibi que oculis.

GAURUS de Formis Medicamentorum.

1772.

Vina eximio,

GULIELMO WAINMAN de CLAREHEAD prope SKIPTON,  
in comitatu Eboracensi, ARMIGERO;

ALEXANDRO MONRO, M.D.

Medicinae et Anatomiae in Academia Edinensi Praefectori;

HIC NUN

HIERONYMO DAVIDI GAUBIO, Medicinae et Chemiae in  
Academia Batava, quae Leidae est, Praefectori;

Ob urbanitatem maximam, et amicitiam verissimam, quibus me sem-  
per decoraverunt, animo grata nunquam non colendis, haec du-  
dorum primitias, ea qua par est reverentia, dicatas volui.

OGLETHORP WAINMAN.

OBSERVATIONES MISCELLANEA,  
DE VINO PRAECIPUE.

**I**NFELICES u, quos dura necessitas literatos illiteratos, volentes volentes, scribere cogit! Eheu! revera sic mihi res est. Leges hujus almae ac florentissimae Academiae ab omnibus, qui summos in medicina honores ambiunt, scientiae medicae specimen postulant.

His legibus obtemperare, hoc officio fungi, animus, vota, praesto astant. Mihi tamen vehementer dolet, quod aureum illud Horatianum praecipuum exequi non licet: Me non pene esse fumere materiam nostris aequam viribus, nec versare diu, quid ferre recusent, quid valeant humeri.

*Durum. Sed levius fit patientia  
Quicquid corrigere est nefas.*

Inter varios medicinae ramos, nullus incertior, nullus difficilior, nullus obscurior, nullus utilior, quam qui agendi modum ulumque medicamentorum tractat.

Haec artis Hippocraticae pars est, quae omni aetate, omni regioni, curae fuit; adhuc tamen, quod dicere piget, rudis incultaque jacet. Plurimi medicorum curatus hujus observationis iustitiam fati tellantur.

Nihilominus de hac re non desperandum; sed quo magis imperfecta et tenebrosa est, eo magis conandum, ut illuminemus. Nobis enim persuasissimum est, quod multae res medicae, nobis nunc prorsus incognitae, labor atque in aprium proferent. Quasdam observationes miscellaneas de Vino praecipue, ejus naturae, in corpus humanum effectibus, commodisque inde profluentibus, pro nostrae dissertationis argumentis, offerre mihi placet. Chemici liquoribus omnibus, spirituosos ex fermentatione factis, vini nomen in genere tribuunt. At nobis est in animo potissimum, immo etiam omnino, de vinis uvarum differere, quibus vini nomen praecipue applicatur. Nam ex substantiis omnibus, quae fermentationem spirituosam suscipiunt, nulla in tam bonum vinum, quam uvarum succus, converti queat. Uva fructus est fermentabilis, dulcis, delicatus, magna sacchari quantitate abundans. Immatura acerba; matura, moderate sumpta, fructus est innocuus. Species uvarum sunt variae; variis quibus inest color, varius gustus. Una eademque uva, secundum clima, et in sole expositionem, gustu et odore valde differt. Vini virtutes, res antiquae laudis, nullum latuerunt aevum; vix ullam latere gentem. Quanti in medicina, quanti in

diacta

diæta præsertim, valeat vinum, plus minus omnis narrat ætas.

Vires ejus in medicina multum nuper invaluerunt, ac magis magisque indices sunt manifestæ ac insignes. Hoc mihi, ut vinum hujusce centaminis præcipuum argumentum faciam, persuasit. Observationes cæteræ, quas sparsim addidi, perpauci exceptis, vini operationem ulterius illustrandi, ejusque usum corroborandi causa dantur.

In proposito exsequendo hujusmodi ordinem sequi mihi maxime aridet: Loqui nempe,

### I. DE NATURA VINI.

1. Vinorum partes in genere constituentes ab analysi chemica detectas tractare.
2. Vina in usu maxime, eorumque partium constituentium proportionem.
3. Vinorum electionem.
4. In corpus humanum effectus.

### II. DE USU VINI IN MEDICINA.

1. In morbis præcavendis.
2. In morbis curandis. Cautelas, et quodcumque de administratione observatu dignum videtur, suo proprio loco dabimus.
4. Vinum cum aliis medicamentis comparare, quæ ad eadem propozita respondenda adhibeantur.

### I. DE NATURA VINI.

1. *Partes vini constituentes.* Vina omnia, auctore Neumanno, ex aqua, spiritu inflammabili, materie salina, sive acido sui generis ab aceto æque ac acidis vegetabilibus nativis differente, sale crassiore, tartaro dicto, substantia gummosa seu mucilaginosa, unctuosa, et resinosa constant (y); quibus ærem fixum addo.

Hæc principia in diversis vinis diversa sunt proportione, secundum quam illorum qualitates sensiles mutantur, et operationi in systema animale adhibetur modus. Obiter hic quoque observare liceat, omnia vina ex *musto*, *vino picro*, et *aceto*, plus minus constare: viz enim possibile est, vel fructus ita maturari, vel fermentationem ita administrari, quin horum cujusque portio apparebit. Vinorum virtutes, pro illorum quoque diversa proportione, variant (z).

2.

(y) Newman. chem. per Lewis, pag. 246.

(z) Call. mat. medic.



2. *Vina in usu maxime, &c.* Nonnulli hæc in alba et rubra, in dulcia et austera, dividunt. Sed hæc methodus fallacissima est, quandoquidem vinorum colores frequenter sunt factitii, gustusque haud raro adulteratus.

De illis igitur secundum regiones in quibus producuntur loqui malim.

Germania vinum producit *Rhenanum* et *Mosellanicum*. Illud multum tartari et spiritus; hoc minus tartari sed plus principii unctuosi, continet.

Hungaria vinum Tokavense facit, vinum profecto suave, spiritu, una cum unctuosa, resinosa, et tartarosa, materie abundans.

Canariæ vina multo spiritus, materie gummosæ et tartarosæ, prædita sunt.

Madeira vina, spiritus eandem circiter quantitatem, plus unctuosæ et resinosæ materie, minus mucilaginosæ et tartarosæ, habentia.

Hispania Malagense, et *Sherry*, *Malmsey*, Angliæ dicta, spiritu, materia resinosa, unctuosa, gummosa, et tartarosa, sunt.

Portugallia vinum rubrum (*Red Port*) magna copia suppeditat, cui inest multum aquæ; reliqua principii parva tantum quantitate.

Gallia in omni fere provincia vina abunde præbet. Inter optima sunt Burgundica et Champagnensia. Hæc sunt fortissima, non dulcissima, spiritum rectificato plena, sed vix ullam unctuosam, resinosa, gummosam, tartarosamve materiam continentia. In optimorum numero Burdigalense (*Claret*) enumerari cæte meretur.

Omnia hæc vina colore, gustu, et potentia, a se invicem multum differunt, quod ipsarum uvarum differentia partim debetur, præsertim autem diversæ fermentationis administrationi, et his rebus quæ ante et post invocationem adduntur.

3. *Vinum electis.* Vina purissima, et spiritu mixta maxime immunda, procul dubio sunt optima. Burdigalense igitur et Rheconum Hispanicis et Portugallicis anteferenda sunt; quippe quod hæc absque alcoholicis additionibus ad nos vehi nequeunt, et inter vina quibus utimur inflammantia maxime, exhilarantia minime, sunt. Cum subito opus sit stimulo, Burgundicum, Champagnum, Madeirense, Canarense propria cautione præbeantur. Vinorum ætate, statusque fermentationis, magna habenda est ratio. Ad acetum propius appropinquare non debent, si pura et semifermentata bibantur, statim suscitant, diarrhoeam

thocam inducunt. Quinetiam a noxiis substantiis, si fieri possit, acquirenda sunt. Rheni vero quoties et quam facile in hac re decipiuntur. Mercatorum vina variis modis adulterant, qui quidem modi sæpe sunt immenſi; ſed nunquam ad artiſicia periculoliora confugiunt, quæ millibus exitum tolerant. Vina acida lithargyro abſque præparationibus ſaturatius edulcorant, et cum vinis dulcibus mercurium ſublimatum ipſamque arſenicum, ſi ſides auctoribus danda, commiſcerunt.

« Les chaux de plomb ayant la propriété de former avec l'acide du vinaigre un ſel d'une ſaveur ſuétée aſſez agréable, qui n'altère en rien la couleur du vin, et qui d'ailleurs a la propriété d'arrêter la fermentation et la putrefaction, ſeront très propres à remédier à l'aigreur du vin, ſi le plomb et tout ce qui en provient, n'étoient pas des drogues pernicieufes qui occasionnent inmanquablement les coliques les plus terribles, et la mort même, à ceux qui ont le malheur d'en prendre intérieurement. Il n'est pas étonnant qu'aucun marchand de vin, connoiſſant tout le mal que peuvent faire de ſemblables drogues, ſoit capable des les employer, par l'appas du gain; mais s'il y en avoit de tels, on ne pourroit les traiter autrement que comme des empoifonneurs publics (a). »

4. *Vini in corpus humanum effectus.* Aliquis in chemica ſcientia minime verſatus non poteſt non convinci, quanta fides corporum in ſe invicem operantur ex analyſis mera chemica conſpectu, principiorumque a priori conponendum, habenda eſt.

Investigationes noſtræ et concluſiones ab experientia præcipue in hac re determinantes ſunt. Ex qualitatibus ergo ſibi ſe genere ſenſibus obviis, et ex effectibus quos in ſyſtema humanum eſſe obſervatur, principia generalia ſequentia, in quæ modum ſui operandi adhibemus, dare lubet.

m. Vinum ex effectibus, diu immoderate datum, humanum ventriculum directe ſtimulare videtur. Ab hinc animus mira in modum afficit, deſunctione ac coram abigit, per totum corpus vim nerveam ſuget; unde mentis pax et tranquillitas, unde ſplendor et imaginationis vis, unde omnia alacritate facultatis exercitium.

« In vinis omnibus, æl. Van Swieten, quem ſatis nuper uſſide docuimus, pulchre notavit: Mirus ille inſt. et naturæ humanæ præſtiſſimus ſtimulus, omnia excitans, omnia calefaciens, dum modica copia ab homine non ab-

modum affecto famantur, oritur promptitudo omnium sensuum, sensus in omnibus membris agilitas, incredibilis lætitia; dum meditationibus exhaustus philosophus pauculum vini orbet, mox inde reficitur, et redit menti pacata illa serenitas, et novus quasi vigor (b). Verum enim vero, cum in majori lauratur quantitate quam vis nervosa ferre potest, vel si in eadem gradatim continuatur dosi, inebriantes et varenticos effectus exserit. Ubi vinum indulgetur, tunc, ut omnibus notum est, animum ad lætitiā effusam, ad cantandum, saltandum, et poulatim insanientiam, quodam modo pravehit. Cerebri functiones perturbantur; vis judicii et rationis imminuta: Hinc gestus stulti sermonesque fere ridiculi sunt. Si ulterius labatur, tum vero, viribus sensim deficientibus, potator se ipsam sustentare nequit. Sermo deficit, oculorum acies hebet, aliquando quasi in nube apparet, aliquando etiam ante oculos duplicia movere videntur. Caeteri sensus prope extinguuntur, et natura fere devicta est, donec tandem in somnum ebrius dilabatur, vel lethargicus fiat. Vertigo, magna stomachi aegrotatio, et vomitua, sæpiissime hæc signa præcedunt.

*b.* Vinum plus minus vi tónica et astringente gaudet. Anne pro tartari quantitate unde qualitates ejus corroborantes deducere succunt?

*c.* Secretiones, urinalem præcipue et cuticularem, promovere. Attamen observandum est, vinis omnibus hæc secretiones promovendi potestatem pariter non inesse; sed alia plus alius, alii non omnino, et alia contrariam habere effectum. Sic noster dicit ingeniosus Lewis: "Quod vina omnia dulcia libere per renes non transeunt, sed constitutionem plus calefaciunt, quam æqua alterius quantitas, eadem licet spiritus proportionem polleat, cum vina manifeste acida, ut Rhebanum, per renes transeant, alvumque leniter solvant (c)." "Vina Mosellana et Rhebana, ut sibi vult Hollmannus, illud corpori præstant beneficium, ut largiote etiam manu sumpta alvum sollicitent, et transpirationem moveant (d)."

*d.* Vinum corpus nutrit. Miror equidem, medicos, dum vinum cum alimentis sumptum diluere, moderate stimulare, secretiones promovere, considerant, qualitatem ejus nutritivam omnino negligere. Hæc tamen, quatenus mustum continet, certe gaudet. Eodem tempore, fateor, nonnulla vina hæc virtutem paavo solum gradu possidere, vel

(b) Cullen, vol. II. p. 37.

(c) Lew, mat. med. p. 195.

(d) Hoffm. tom. I. p. 112.



vel cibus quasi nutrire, appetitum promouendo, et organa digestiva corroborando.

Hinc de vini generalibus effectibus prædictis; nunc pauca restant dicenda de

## II. USU VINI IN MEDICINA.

A. *In morbis præcauendis.* Observationes nostrae de hac re ad morbos contagiosos pertinent, ad febres præcipue stricte dictas, et pestem. Ufus vini, in morbis præcauendis, ab effectibus præcipue quos in secretiones et animum habet, deducendus est.

*Quoad secretiones.* Huic insistere superuacaneum foret; siquidem apud omnes consentitur, nihil melius certiusve nos a morbis defendere, quam liber secretionum fluxus, et per corpus æquabilis circulatio.

*Quoad animum.* De hoc jamjam fusius dixi Causarum vero febrium contagiosarum et pestis remotarum cognitio ulterius monstrabit, quantum vinum, in morbis hæc præcauendis, animo agendo valeat. Hujusmodi sunt contagium, miasma, frigus, ebrietas, eibus quantitate deficientes, aut qualitate peccantes; vigilie protractæ; immodica venæ, mentis, vel corporis, exercitatio. Hæc sunt præsertim causæ horum morborum remotæ. Inter has quoque pathemata suppressoria, ut timor, terror, tristitia, &c. enumeranda sunt.

Nihil etenim evidentius est, quam, miasmate vel contagio simul concurrente, hæc pathemata febres et pestem excitare posse. Ad hoc probandum, frequentissime observamus, dum morbi febiles epidemice grassantur, eos, qui timore opprimuntur, potissimum affici: Et cognatos homines febre nervosa laborantis, vel qui ejus causa maxime sunt anxii, promptissime captari. Diemerbroeckius viri histariam narrat, qui diu in oppido, in quo saeviebat pestis, incolumis visit, donec tandem amici intimi funus, per plateas procedens, ejus conspectui fortuito sese obtulit. Hæc illum illico misit in modo affectus; et ipso illo tempore pestis illum prehendit.

Unum est præ cæteris, clamat Hoffmannus, quod humana corpora maxime ad pestis et aliorum morborum contagium recipiendum disposuit; idque est *timor*, quia corpora admodum reddit imbecillia, vires depauperat, et motus excretorios minuit. Immo etiam *timor* et *terror* plus in peste necant, quam ipsam miasma (2)."

Adeo hæc prævaluit opinio, ut Rivinus, medicinae o-

(2) Hoffm. tom. i. p. 302. tom. ii. p. 95.

him apud Leipsiam insignis professor, affirmaverit tales timoris per totum pestis Leipsicæ decursum effectus esse, quod nullum pestis invalit, quem non antea timor corripuerat. Rivinus præterea, cum plurimus aliis, dicit, Actual, quod nos contagium vocamus, nihil aliud quam melius operationem esse.

Hinc, in excellentissimo illo de pathologia libro, hanc proponendi quaestionem Gaubius occasionem præbuit (f). "An vis phantasiæ, an metus contagiorum mater?" Ea hujus sagacis prudens responsum? "Violentus animi motus ad virus generandum, acuendum, conferre posse, indubium est. At, si vel soli etiam mediculosi tantum inhererent, ipsi tamen sensibus constare, singularem in veri contagii materiam intervenire, qua sine reliqua vix quidquam possint." Ego ipse in illius sententiam manibus pedibusque discessurus sum. Hinc videmus, quam obsoletæ veteris doctrinæ sit, misinatum et contagii effectus prævertendi gratia, causas fugere delibitantes, quæ corpus illorum aeterni exponunt. Animas quietas hilarisque servandas, quippe quod homines indole lacta animoque audaci contagio minime obnoxii inveniantur. Timoris et anxietatis vis exitiosa depellenda. Hic vini usus proprietatem, et commodum inde oritura, videre possumus.

Quod vasorum ultimorum actionem excitat, novum systemati vigorem inspirat, qui quiescentem vigor nostræ sanæ causarum remotionem effectus prævertit. Vinum, ut supra diximus, hanc mirabilem possidet virtutem, quod omnem metum et tristitiam ex animo expellit, hominesque animosus, cordatos, hilaresque reddit. Antiqui Baccum cordis præsidem, eam ob rem, pronuntiaverunt.

Horum effectuum testimonium perhibet nam modo experientia, sed et plurima in Sacro Textu satis nota loca id tellantur. Hinc igitur dico, probabile esse, vinum effectus felicissimos in morbis depellendis producere posse. Sed, in hoc aevo, probabilitates nunquam sufficiunt; iuris rem probatam esse oportet: et, in id, ad medicamentum optimorum auctoritatem provoco, quæ auctoritas, in opinionibus licet parvi referat, in factis plurimi aestimanda est. Quamvis modi, secundum quos vinum agere diximus, quo pacto morbos propulset, parum explicant, quamvis vini theoria non prorsus lateat; nobis tamen sat est, si experientia ejus evinceat usum. Nam non semper medicum necessarium est anxius inquirere, quo modo quidquid fiat, sed quid sit. Experientia revera monstrat, eas qui vino

mo-

moderate utuntur contagium certius fugere, quam plebem, vel eos qui plus ex aquosis vivunt. Res præcipue sic se habet, cum febris nervosa epidemicè præstatur. Cl. Gulehrissius hanc singularem habet observationem, nullum, tempore quo hæc frequentissima fuit febris, qui vini potator erat, ea correptum. Hæc sunt verba:

"It was the poorer sort, and those a degree above them, who were subject to this fever. I knew but few instances of it amongst those who lived well; and of wine-drinkers, I do not remember that there was one seized (g)."

Dom. Colden, historiam febris nervosæ quæ epidemicè et lethalis in America fuesat anno 1746 narrans, ait: "It was observable, that, though many people were seized with this distemper, no one Madeira-drinker had it (h)." Nostra observatio aliquatenus idem confirmat; nam ex plurimis febre nervosa correptis, quæ in hac urbe nuper sævisbat, et immaturos studiorum inglorum socios immiti metebat sæcæ, vix ac ne vix quidem unus, qui vinum bibere solebat, quantum ego scio, affectus est: "Observo illos, inquit Vimoni, minime ad pestem dispositos, qui paucissimis caribus, *vinisque* maxime utuntur (i)." Hoffmannus etiam hæc habet verba: "Inter præsidia quæ ad dæclinandas febres petechiales valent, ego quidem præstabilius novi nullum convenienti et moderato vini usu. Ego sane, longiori experientia edoctus, id pro certo affirmare possum, grassantibus populariter morbis, ab æris constitutione humida, eos, qui exquisitam victus rationem tuerunt, et quotidie moderate bono vino usi, incommodi sensisse nihil (k)."

Gregorius, præfatus celeberrimus, vir revera generosus, factum hoc periculosum in prælectionibus suis refert, scilicet, quod, cum ipse studium medicinæ apud Leidam prosequeretur, febris intermittens epidemicè vagata, et ex 25 studiosis Britannicis, unus tantum aquam potabat, reliqui libras vini binas a prandio indies biberunt. Febris intermittens aquæ potatorem solum inaccessit.

Jam vero cogitet quisque prudens et corlatus, numne inter potentissima ab his morbis præservativa vinum enumerari mereatur. Tandem observandum venit, domi sacrum hoc modo laudibus effero, moderare tantum adhibendum. Minime enim mea est mens, ut ebrietatem, quæ

(g) Med. Ess. vol. iv. p. 281.

(h) Lond. Med. Obs. and Inq. vol. i. p. 226.

(i) Philof. Trans. abridg. vol. vi. ch. ii. § 21.

(k) Haff. tum. ii. p. 27.



quæ potius minuit vitum, nec non ingenii et corporis destruit vires, collaudare velim; sed, & contrario, eam velle diffundere. Græcorum illud *νότος* est. *Ne quid simile*, apud me multum valet. Ille enim longe errant, qui sese a contagio ingentes vini aliorumque liquorum fermentatorum quantitates consumendo conservare putant. Si in perpetuo ebrietatis statu manere illis esset penes, tunc contagium, fateor, vitare posse.

Nemo tamen committet ut semper ebrius sit. Ebrietatem alienissimus status sequitur, evidentium causarum noxas invidens. Debilitas, fidelis crapulae pedissequa, ad contagium recipiendum nullo in modo corpus disponit. Quis tam Bacchi lautor inepte est, ut hoc non fateatur? Quamvis igitur moderatus vini usus contra contagium magna sit amplexatus, quamvis novam quasi vitam corpori ipsique animo dare queat; verum enim vero, ut generosa et optima remedia, abusu et non debita dosi ac tempore adhibita, nocentissima sunt; ita etiam vinum summam perniciem corpori inducere aptum est; idemque haud secus quam aliud medicamen cautione et medici consilio eget.

Vinum equidem, ut observat Ramazini, si moderate potetur, magnas præstat utilitates ad corporis vires confirmandas: Sed eodem nihil perniciosius, si modus abest; naturam enim ignis habet, quo nihil est utilius, et eodem nihil nocentius (l). Item quod monet Plinius: "Nec viribus corporis aliud, si modus adest, utilius; nec aliud perniciosius vino, si modus abest (m)." Horatius ipse quoque usum vini moderatum commendat; sed intemperantiam minime laudat:

*Sicvis omnia non dura Deus prope sinit: neque  
Moresceat aliter diffugiunt felicitudines.  
Quis possit vino gravem militiam aut pauperiem crepare?  
Quis non te potius, Bacche pater, teque, decens Vanus?  
At, ne quis molici transiliat munera Liberi,  
Centauræa monitionum Lapithæ rixæ super mero  
Debellata; movet Sithonius non levis Evius;  
Cum fas atque infas exigui sine libidinum  
Discernunt avelli. Non ego te, candide Bassareus,  
Invitum quatiâ, nec parili ebriâ frendibus  
Sub divum rapiam (n).*

Sic denique canit noster Poeta:

*Wine whets the wit, improves its native force,  
And gives a pleasant flavour to discourse:*

*By*

(l) Bernard Ramazini, c. A. §. 24.

(n) Od. xviii. lib. 4.

(m) Plin. l. 14. c. 7.

*By making all our spirits debonair,  
Throws off the lees, the sediment of care.  
But highest verdials all their virtue lose,  
By a too frequent and too bold an use.*

POSTERET.

B. *Ufus vini nonnullis in morbis curandis.* Postquam hactenus præservatorium vini effectum perlustravimus; sequitur jam ut disquiramus, in quibus morbis proficuum illud sit. Hic a re non omnino erit alienum dicere, unde usum vini in morbis medendis deducere; quispiam tamen forsitan dicat, non multum referre, quando ex ante dictis satis intelligi potest.

Ne lectoris puret tautologiæ verisimili nimis obtundam, pauca verba sufficiant. Deducendus ergo,

I. *Ex effectibus quæ in ventriculi contenta exerit.*

Cum ventriculi contenta ad putrefactionem tendant, cum bilis in majore quam par est quantitate, vel in statu nimis acri illic funditur, vinum vi sua anilæptica potenter corrigat, citiusque eliminari faciat, suumque inde pendentes extinguat.

II. *Ex virtute in stomacho simulanti.*

a. *Prout in nervos sensatandi agit.* Stomachi actionem excitat, vinumque suam omni sere corporis parti, propter mirificam illam connectionem, quem ventriculus cum reliquo habet systemate, impertitur. Hinc hilaritatem fortitudinem, et corporis robur, præbet.

b. *Prout circulationis statum mutat.* Systematis vasculosi actionem auget, sanguinis circuitum per totum corpus pleniorē, æquabiliorem, reddit. Secretiones et excretiones promovet; materiem putrescentem evacuat; spasmus ex superficie removel; nullique a circuitu languidiore oritur occurrat.

III. *Ex effectibus quæ in fluidorum massam circulantium edit.*

PUTREFACTIONI sanguinis antevenit. Nonnulli etiam putant jamjam putridum ad statum sanum reducere posse; sed vix credam. Fluida diluit, et cum cordis tum articularum actionem suscitât; inde quoque secretiones et excretiones provehit.

FEBRES.

Uti v. vini usus in typho frequentissime indicatur, et utilissimus

lissimus evadit, illum præcipue tractabimus. Typhi character, sicut in Synopli nosologiae methodicae Culleniana datur, sic habetur: "Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; sensus functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae." Quod ad Typhi historiam, ad Tentamen medicum inaugurale D. Barrett, De febre nervosa, nuper Lugduni Batavorum editum, refero, quo historia plena et accurata videnda est. Mihi tamen liceat observare, quod opinio prævaluit typhum novum esse morbum, et in Anglia primum exortum; sed, si nos valde fallat animus, jam pridem, nomine tantum diverso, notus fuit. Aliquis Fracastorium (c) cum Huxhamo compareret, et characterem typhi æque ac temporibus hisce hodiernis exactum inveniret. Fracastorium inter nervosas, putridas, febresque petechiales, distinctionem non fecisse, haud inficias ibo; sed separari posse demonstrat. Nonnulli medici multum temporis insumpserunt, ad probandum hunc morbum Sydenhamum latuisse; et synocham, vel in summum synocham, se tantum cognovisse. At *febris nova*, secundum ipsius Sydenhami descriptionem, typhus præcise fuisse videtur. Sydenhamus summis cuius est viribus ostendere, inflammationis generis non esse, et sanguine missiones, aliorum more epidemicorum, non pati. Willsius febrem, quæ Oxoniae ann. 1661 epidemica fuit, tractans, typhum accurate describit. Unde apparet hunc morbum sub ipsissima, qua nunc conspicitur, forma, olim fuisse natum. Immo etiam maxima est probabilitas, una cum medicina novum esse. Febris catarrhalis maligna petechizans Junkeri (p), Housmanni (q), Elleri (r), nostri typhi descriptionem præbent. Typhus estrensis Boerhaavii (s) ab eodem, gradu tantum, differt.

Febris carectum et nosocomiorum Pringelli (t) et Van Swietenii (u), febris nautica pestilentialis et putrida contagiosa Huxhami (x), febris contagiosa Lindii (y), omnes ejusdem sunt generis, et a simplici typho frequentis et malignitate tantum discrepant. Adnotandum est, febrium phenomena maxime variata, et diversae esse nulla. Symptomata præsertim typhi cum synochæ sunt conjuncta. Quæ combinatio in hac regione omnium maxime est frequens.

(c) De morb. contagios. lib. II. c. 6.

(p) De cogn. et cur. morb. § 14.

(q) Diseases of the army, p. 294.

(r) Maladies des armées, p. 136.

(s) On fevers and infectious, p. 540.

(t) p. 72.

(u) lib. 75.

(x) Comitat. p. 202.

(y) De acc. ad ann. 1742 et 1747.



quens. Febris, viz. inflammatoriam imprimis indeit formam, et, cum per aliquot dies persistit, nervosa fit. Observationes igitur nostrae de vini usu, extremo synochi Radio, typho, synonymis supra dictis,isque omnibus in Synopsi Culleniana enumeratis, aptantur.

De his satis superque: Ad rem nunc propius.

Auctores omnes fere recentiores vinum in his febribus proprium esse consentiunt. Hanc generalem assertionem comprobare pauca sufficient exempla. A Pringelio incipiam, qui haec habet verba: "For a grateful and efficacious cordial, there was nothing comparable to wine; indeed, so great is the virtue of it, that I have seen many recover by its free use from the lowest condition (a)." Cantilenam eadem canit Hoffmannus: "In febribus malignis vino Rhenano nil datur excellentius, in his morbis restaurare vires, spiritus erigere, circulum sanguinis liberum reddere, transpirationem movere, expedit, et in eo versatur vinctis alexipharmacorum virtus: Quod autem vinum haec omnia praestet nolumus pluribus auctoritatibus, quibus practicozum libri sunt pleni, confirmare: sed confugimus ad solam experientiam, qua nobis constat, plures ex malignis evasisse solus vini moderato usu (a)." Hic, quod dicit Hushamus, addam: "In these fevers (b), I cannot but recommend a generous red wine, as a most noble, natural, and subastringent cordial; and perhaps art can hardly supply a better."

Si aliorum auctoritate haec confirmare necesse esset, peti possent facta ex variis medicorum scriptis. Quomodo vinum agit, ex praedictis et symptomatum natura satis patere speramus. Per totum typhi cursum, et versus finem synochi, ingens adest imbecillitas, ingens vis nervorum diminutio, cui vini stimulus obstat.

Imbecillitatis praecipua haec sunt signa: Languor, lassitudo, motus voluntarius diminutus, vultus moellus, pallidus, tarda oculorum motio, pulsus parvus, debilis, frequens, inaequalis, appetitus prostratus, animi dejectio, desperatio magna, lingua manusque tremulantes, vertigo, frequens animi deliquium, subsultus tendinum, oculorum aliarumque partium spasmodicae contractiones, convulsionum cerebræ, sensuum internorum perturbatio, delirium constans, absentia somni, coma, larditas, oblitio, tintinnus aurium, visus saltus, absentia sibiimet praesentia fingens, partium extremarum frigus, respiratio debilis, fre-

VOL. III.

N n

quens,

(a) Diseases of the army, p. 314.

(a) Tam. v. p. 277.

(b) Putrid malignant fevers, p. 223.

quens, atra, molesta, sapor copiosus, frigidus, iniquus, loquela submissa, turbata, nullitans: Quo vehementiora hæc symptomata, eo magis virtutum defectum denotant.

Medici contraindicationes nonnunquam esse existimant, quando revera nullae sunt: e. gr. quum in his febribus delirium apparet, cum calore aliquantum aucto, et pulsu frequenti, vinum ipsi valde improprium videtur. Ideoque licet aegrotus sit admodum debilis, et vis vitae labascet, ab ejus usu multi abstinere. At hic ad experientiam, optimam semper testem, appellandum est, Experientia docet delirium typhi fugare vinum. Hoc delirium, ut ego puto, a delirio quod in synocha accidit, plerumque plurimum distat. Pulsus synochæ validus, vibrans, hic obest; et quo insensibilior aeger, eo depressior et contradictor pulsus. Illud ex aucto sanguinis in vasis cerebri impetu: hoc ex debilitatis statu, sive energiae nervosae diminutione, pendere videtur: Non phreniticum est, non *ferax*, quod magna cum inquietudine, vehementia, sermone rapido, iracundia insueta, facile excitata, se manifestat. Delirium, de quo loquar, *mitis* nomen sibi vindicat; quum, abique animi perturbatione, iracundia, et furore, ingruit, et sermonem placidum, lenem, non cohaerentem, magna animi corporisque agitatione raro praesente, pro comiti sibi addeiscit.

Hanc observare distinctionem maximè est certe momenti. Si hoc igitur delirium ex vi nervosa diminuta, sive cerebri *collapsu*, ut in schola Culleniana vocatur, inaequali sanguinis distributione stipato, ortum trahit, vinum sanguinis circulationem aequabilioram reddens, ad illud removendum, *a priori*, aptissimum esse pollicetur: Sed sive melius, sive pejus, nostra de hujus delirii natura fundetur opinio, pro facta assumo, vinum id removez posse. Ad virorum clarissimorum Culleni, Gregorii, Gilchristii, Pringelii testimonium provo-  
co.

Quando dico vinum virtute refrigerante gaudere, et circulationem auctam, et calorem, qui aliquando in his morbis adsit, minuire, primo aspectu me rationi non consentaneum loqui credas. At, si horum originem conjectura consequamur, nostrum remedium ad hæc proposita respondenda egregie accommodatum arbitramur. Aucta pulsus frequentia a putrida primas vias stimulante colluvie, vel ex spasmu in superficiem irritatione, forte oriatur. Sequens signa, quando adsunt, affectionis spasmodicae existentiam probare tendunt, scilicet, nasi auriumque ex-

temarum

trematum frigus (c), urina pallida, pallor, et exsiccatio ulcerum, frigoris calorisque alterna successio (d), linguae siccitas (e).

Caloris sensus ad putredinem ineptam referatur. Vinum æquabilem per vasa extrema sanguinis distributionem promovens, spasmodum inde sopiens, et vim suam antisepticam exerens, hæc utraque symptomata superare valet. Pringle in hanc ivit sententiam: "By medicines of a cordial nature, and especially wine, I will venture to affirm, that I have frequently seen every symptom change for the better; the head became clearer, the skin cooler, thirst less; and, indeed, this is not to be wondered at, when we consider how probable it is, that the putrefaction, gaining ground by the sinking of the *vis vitæ*, occasions that acrimonious heat in this disease (f)." Unde effectus vini soporificus adeo in his morbis aliquando conspicuus? Anne abhinc provenit, quod topicam irritationem removel, et systemati æquilibrium reddit? Somni profecto causæ tales sunt, quales vinum inducere videtur, impressionum nempe absentiam, cupidinum gratificationes, relaxationem (g), &c.

Sitim, quæ in his febribus nunquam occurrat, sedare observatur vinum. Sitis aliquando ex spasmodica excretoriorum constrictione, quæ fauces humectare debent, provenit. Natura etiam sitim, sensilitate integra manente, systematis calori annexit. Sitis porro ab aliis fontibus notata dignis nascitur. Omne scilicet acrimoniæ genus, in systemate prævalens, sitim excitat. Causam hujus finalem, ut eadem diluatur, esse, liquido patet. Quippe quod dilutio omnem acrimoniam minus reddit noxiam, et expeditiorem ejusdem ex corpore evacuationem producit. Hinc sagax ille, nunquam satis admirandus, nunquam a me satis diligendus, Cælius hæc habet verba: "Sitis, quam indicandæ potus necessitati præferit natura, in morbis solito plus urget, quoties aut tractus superior primarum viarum illius sensationis sedes, aut cum hoc etiam corpus reliquum, humectatione indiget, quæ vel deficiens humor suppleatur, vel spissus diluatur, vel acrior temperetur (h)." Nullus fortasse acrimoniæ status majus systemati minuitur periculum vel dilutionem plus requirit, quam quivis putrefactionis gradus: Sitis ergo urgens febriem putridarum sit comes.

N n 2

Natura

(c) Huxham on fevers, 79. (d) *Homii principia medicinarum*, p. 12.

(e) Huxham, 18.

(f) Pringle's appendix, p. 123.

(g) Vide Cullen's institutions of medicine, part i. p. 96.

(h) Institutions pathologiæ, § 791.



Natura = putrefactionis in corpus humanum introductione anxie caveri. Cum materia paulo solito putidiores introducere, vel in systemate sunt genitae, sitis angetur illius. Antea hac materiae primae spississimum infestant. Propterea quod hic stagnant fluida, et ad putrefactionem quam maxime festinant. Harum utramque causam agnoscat sitis, vinum ad eam extinguendam videretur idoneum, si glandulas salivales mucosae stimulando, humectando, si in primis viis putredini obviam eundo.

Sudores quoque immodici, quando in his morbis occurrant, mitigantur vino. Ad hoc probandum, exempla minime desunt. Unum in praesentia a Cel. Hushamo citare sufficiat: "In profuse sweats, I have very frequently given a little generous red wine with the greatest advantage; it presently moderating the sweats, supporting the patient, and keeping up also the *miliary papulae*, if they happen likewise to attend (1)."

Proprii vini qualitatum combinatio, alacritatem animoque serenitatem importat, desperationem dimovet, anxiam lethi timorem fugit, qui quidem timor typho laborantis carnalit spiritus, et meditationes nigri et periculi imminenti melancholico prospectu gravat obducitque. Hanc, inquam, effectum, prae aliis stimulantibus, aliisve cordiacis, vinum possidet.

Ab omnibus praegressis concludere visum est, vinum manu liberum praebendum, quando pulsus sit parvus, debilis, sensorii functiones turbatae, viresque multum imminutae: Nec ab eo abstinendum, quamlibet delirium, modo sit generis mitis, pulsus frequens, et calor paululum auctus adsit, siquidem alia inflammationis signa defuerint. Eatenus est cum confidentia et audacia prodire, si non datur ultra. Difficilius revera anaspitque casus occurrant, quae praesens in vini exhibitione magnopere perturbant. De his tanta cum audacia nequaquam sum locuturus: sed, quod mihi videatur probabile, debite et diffidenter offeram.

Multi sese praesent casus quorum circumstantiae non satis apparent conspicuae et determinatae, i. e. ubi diarrhoea phlogisticam abesse habet pro certa certa licet. In his casibus, a vino prorsus abstinere iuvemus, usquequodum debilitatis signa sese clarius manifestent, ut vulgo accidit in aëta, vertigine in aëta, synochi febribunda et typho: et etiam cum haec pervenerit periodus, praecipue si lucis, et sunt intolerantia, capitis dolor, jactatio, et oculorum sit rubedo,

(1) Herb. on the slow nervous fever, p. 80.

res in ambigua hæret; quippe quæ phrenitidis suspitionem dant, et nil nisi æquum est fieri, cadaverum dissectionem, his signis prægressis, cerebrum inflammatum, immo etiam suppuratum, detexisse: E contra vero bene monet Vogelius, quod idem mea observatio iterum iterumque docuit, phrenitidis symptomata admodum esse ambigua, et sæpe illa absque inflammatione topica apparere. Si vero, eodem tempore quæ hæc occurrant symptomata, vires corporis multum sint labefactatae, incertum est quatenus vino aliisque id genus remediis stimulantibus uti non licebit.

In hoc rerum stato, ab his circumstantiis determinandum est,

a. *Agri consuetudine.* Si vinum quotidie bibere, præcipue si ad ebrietatis gradum usque consueverit aeger, tunc verissimum est, vinum remedium tutum et commodissimum futurum (A).

b. *Morbi duratione.* Si morbus jam aliquatenus provehatur, inflammatoriam diathesin repelli probabilem conjecturam facere liceat.

c. *Appetitu et fastidio.* Pauci, paucissimi sunt, in hoc ævo luxurioso, qui vinum non gustaverunt, nec ejus effectus plus minus callent. Maxime vel abstemii et sobrii his febribus laborantes vinum frequentissime appetunt. Sic Pringellius: "When the fever is protracted, with a low and slow pulse, the sick have a particular craving for something cordial; and nothing is so acceptable and cordial as wine (I)."

Ad veritatem hujus corroborandam quæque fere dies exemplum profert. Idem auctor hanc singularem habet observationem: "I have seen in cases of this kind, strange instances of the power of instinct; for, when wine was to do good, the sick swallowed it greedily and asked for more; when it was to hurt them, or raise the delirium, they either showed an indifference or aversion to it (I)." Et idem aliorum non latuit. Notus mihi quidam amatissimus, studiorum socius, febre quidam correptus fuit. Symptomata rem in ancipiti relinquebant, an cerebri inflammatio adesset necne. Medici, vinum administrabant, semper tamen inveni aegrum. Ille enim id ab ipso fere morbi initio abhorruit. Medici, fastidium ejus sive flocci pendentes, sive negligentes, vinum adhibere pergebant. Morbo indices

cref-

(A) Vide medical essays, Edinb. vol. v. art. 46.

(I) Diseases of the army, p. 295.

(æ) Diseases of the army, p. 28. third edit.

crescente, miserandus aeger tandem vitam cum morte commutavit; post mortem dissectum cerebrum inflammatum ostendebat. At, eheu! sero sapiebant Phryges:

*Quis desiderio sit pudor aut molus  
Tam chari capitis? Præcipue lugubres  
Cantus, Melpomene, cui liquidam pater  
Vocem cum cithara dedit.  
Ergo Quintilium perpetuus sopor  
Uiget? Cui pudor, et justitiæ soror,  
Incerrupta fides, nudaque veritas,  
Quandæ ullum invenient parem?  
Adulter ille bonis flebilis aridit.*

Ægri igitur desiderium et fastidium nobis aliquatenus imperare oportet; et, ubicunque aegroti appetitus vinum postulat, confidentius indulgetur; ubi vero nec sponte rogat, nec objectum assumere vult, sapiens medicus et cautius et remissius administrabit. Miror equidem, hæc a medicis minus caveri, minus etiam almoneri. De ægrotantium desiderio dicendi pauca hanc occasionem amplector, se procul dubio nostra attentione strictissimaque observantia digna. In omnibus morbis, febrilibus præcipue, quum aeger aliquid vehementer exoptat, moderatam ejusdem indulgentiam malum sequens raro vidi, etiam si non modo quantitas verum etiam qualitas sæpe minime idonea visa est. Æger contra delectatus est; inquietudo, ab animo assensu orienas, oblata, quæ emulstantem attentionem cum animo tum corpori nocivam sustentaverat.

Hoc modo, cum per multos dies noctesque aegrotus somnum oculis non viderit, sopor acquisitus est, per membra quietem irrigans, animi curas ex pectore solvens, salubrisque artus persudit toto proruptus corpore sudor. Hæc patrem Hippocratem non latuerunt; ipse enim in variis locis docet ægræ gratificandum. Ideoque quoties desiderium cunque ægrotantem urget, plus minus indulgere haud periculosissimum existimarem. Pro tristè molestaque sensatione haberem, quæ vitari debet; vide modo, ut petiti tam proprius fiat delectus quam res finit. Non video cur medici adeo frequenter oculos divertunt, cur naturæ sapientis mandatis surdam præbent aurem, quandoquidem quotidiana medicorum observatio commota inde emergentia monstrat confirmatque. Quot nobis sunt exempla hominum ex morbis periculosissimis ad sanitatem redactorum, post suis quam appetitibus furtim, vel permittente medico, indulserint?

Gaubius his verbis pulchre monet: "Nec menti huma-



uae sua defunt conamina, quibus periclitantem sanitatem tuatur. Etenim molesta perceptio minantis mali, aut olim tolerati memoria, non modo impellit eam ad quaerendum praesidium, siue id evitatio causae cognitae dederit, seu usus auxilii experimento, ratione aut conjectura inventi. Sed sunt etiam animus, formidine periculi inquietus, concipit impetum, motusque in systemate suarum functionum concitat, qui, licet ex instinctu potius, quam ex consilio, profluere videantur, certissimum tamen tutamina aut levamenti adferendi scopum atque efficacitatem manifeste declarant. Huiusmodi sane sunt praecipue, quae praeter rationem toties sese effecerunt, determinata resam noxiarum salidia, aut medicatarum appetentiae, quibus obsequendo imminentes morbi saepissime avertuntur, refractarii etiam sanantur (a)."

Commodorum, ex abnormium gratificatione appetituum praeter spem et suspicionem profluentium, rationem, quae sufficiat, reddere, memet imparem agnosco.

Talia recensita his resigno *quis juvat aëreas tentasse domos, animoque retundum percurrisse polum*, et cum Sydenhamo dicam, quamvis enim, si mentem serio applicuerimus, quid de facto agat natura, et quibus in operatione sua utatur organis, deprehendere valeamus; *modus* tamen quo illa operatur, mortales, aut ego fallor, semper latebit. Ut ad rem redeamus. An vinum sit proprium necne, judicandum est, denique.

d. *Ab Effectu.* Si ventriculus non pestorbet, si aegrum refocillet, si calorem non augeat, si avida hauriat, et plus petat, si pulsum non modo non frequentiore, sed tardiore et plenius, reddat, si languorem removeat, si anxietatem sedet, si delirium mitiget, si somnum conciliet; tunc pro tuto et aptissimo remedio est habendum, tunc libera manu exhibendum.

Distinctionem ferax inter et mite delirium semper fieri debere: vinum in hoc admittendum, in illo rejiciendum, uno fere animo consensum esse, haud inficior; eodem tamen tempore, haec res magna ambiguitate, magno tenebris, involvitur. Cum vultus erat ferus, cum voce citata, delirio, et subsultu, a vino, phrenitis susceptione commotus, Pringellus abstinuit. Cullenus tamen, medicus hujus saeculi ingeniosissimus, casus se vidisse observat, quibus aderat vultus ille ferus, inflatus, vox citata, cum peculiari oculorum rabesine, magna tranquillitate abeuntes, medicamentorum inflammantium, viniopique usum admittentes,

rentes, illisque manifeste curatos. Cum in harum pro-  
vectis febrium stadiis delirium, quod hactenus fuit mite,  
nunc phrenitici formam induit, cum aeger saeva cephalal-  
gia, magna simi et lucis intolerantia, pervigiliis, impetu-  
osa anxietate, lectique impatentia, vexatur, cum canora  
rapidaque loquitur voce, cum adstantes negligit, cum fi-  
cile provocatur, cum vultum rubore suffusum, oculosque  
rubros habet; tunc vix centesimus medicus asserere dubi-  
tabit, inflammationem invasisse cerebrum. Sed haec om-  
nia qualla enumeravi symptomata, absque inflammatione  
accidere, edocti frequenti experientia, Culleni observa-  
tione simul etiam annuente, affirmare audeamus. Ex na-  
tura illorum fugaci, ex cessatione antiphlogistis sine reme-  
diis, ex usu remedium stimulantium ad illa removenda  
tuto, ex salutari eventu, ex dissectionibus, denique, hoc  
concludimus et exploratum habemus.

Boni, in his ambiguis casibus, vini effectus perplurimis  
medicis sese manifestarunt. "Magna vinum quantitate  
sumptum, auctore Whitakero, omnem vehementiam se-  
dat; nam qualitate narcotica colligit sensus, somnum con-  
cillat, deliria, et acutissimos dolores capitis, imminuit (d)." *Gilchristus* addit: "This I can confirm from my own ex-  
perience, having given wine in high ravings, headach,  
tossing, and watching, and where the eyes were much in-  
flamed, with wonderful success; the sick having been  
composed by it, and sleep procured, when opiates failed  
me, or I durst not give them (p)."

Abhinc omnibus constat, nonnunquam difficillimum esse  
bina ante memorata deliria a se invicem sejungere, et pro-  
certo scire, anam adfit cerebri inflammatio.

An ulla sunt alia irritationum genera, quae cerebrum vex-  
are, omniaque haec inflammatoris symptomata, nulla ta-  
men illie inflammatione praesente, producere possint? Dies  
doceat. Nullus interim dubio locus superest, quin magna  
debilitas, signis supra dictis stipata, nulla in cerebro in-  
flammatione cadavera accurate insipientibus manifestata,  
mortales frequenter e medio sustulit.

Quam lubrica, versatilis, et ulene sine plena, sunt prin-  
cipia quae vini exhibitioni his dubiis in casibus praesunt?  
Quid, verbo, hanc inter ambiguitatem est agendum, ubi  
maxima phrenitidis datur suspicio, nulla veri probatio?  
*Scyllam* equidem inter et *Charybdim* versamur. Veneratio,  
qua viros supra memoratos prosequor, ne vini usum, qui  
suis in manibus tam utilis fuit, omnino damnum, me  
pro-

(d) *Traetat. de ura.*

(p) *Med. Ess. vol. v. p. 161.*

prohiberet. Ingens, contra, periculum ejus administrationem concomitans, ne temere et liberius utar, abilleret. Ideoque, in hoc rerum statu, iter medio facere, optimum tutissimumque judicamus, et vinum primo parce, caute, dilute, præbere. Eodem tempore, primarum dosium effectus sedulo observare, pulsusque statum examinare, continuo fere medicum oportet. Sed religiose observet, ut Celsus olim monuit, non, prout ut venit, apprehendere manu brachium: Sed primum residere hilari vultu, percontarique, quemadmodum se habeat, et, si quis ejus metus est, cum probabili sermone lenire; tum deinde ejus carpo manum admoveat. Quas venas autem conspectus medici movet, quam facile mille res turbant? Hæc, et hæc sola, ejus proprietas stabilienda est.

Quæcumque sint vini incommoda, hæc nobis præbet solatium, hoc sexum plerumque fert commodum, quod, quando sit incongruum, perturbatiorem extemporaneam excitat, quæ ab eo abstinere mature suadet.

*Tempus vinum administrandi.* Medici inter se nunc plurimum disputant, quo morbi stadio vinum administrandum. Ad hanc quæestionem litare potius determinandam, Riverius aliique multum laboris impenderunt. Paucæ hæc occasione loci citare haud alienum puto. A Riverio incipiam: "Circæ potum hoc adnotandum, vini usum in hæc febres (scil. pestilenti) aliquando esse proficuum, ut puta insignis cardiacum, et malignæ qualitate maxime adversum. Hæc a nobis observata sunt infinitis experimentis, ac præsertim in febre quæ Mompelii prævaluit 1623 post urbis obsidionem, quæ tantæ malignitatis participes fuit, ut tertia ad minus aegrotantium pars de medio sublata fuisset, et a vera peste solo bubone distincta fuerit; cum non solum exanthemata rubra, livida, et nigra, sed etiam carbunculi et parutiles, frequenter apparerent. His enim aegrotantibus, quibus pulsus erat parum frequens, et pulsui sanorum fere similis, lingua humida et nulla sitis, vinum exhibimus felici successu, illius continuationem indicabat levamen inde emergens. His vero, quibus febris erat intensior, cum sitis, lingue siccitate, scabritie aut nigredine, vinum prorsus interdicebamus. Advertendum tamen est, primis morbi diebus, vinum nunquam esse exhibendum, ne materię crudæ nimium exagitentur; sed tantum circa statum, cum malignitatis signa sese magis exferere incipiunt (y)." Malignitas, secundum Hufmannum, dignoscitur ex motuum et virium defectu, nec non



valde depresso sanguinis spiritualiscentia, ex tardo circulo ejusdem, quæ coniecta dispositionem quandam cruoris ad putredinem designant (c). In petechiis postremis diebus facta crisi debito modo potum, vires dejectas erigendo, et cuticularem secretionem secundando, omnia fere alia auxilia superate aasserunt. Hæc Riverii Hoffmannique observationes recentium plurimorum praxi quam maxime consonant. Ambo vero in hac una re falli videntur; si pulsus, scilicet, sit tardus, vinum omnino prohibent, vel saltem cumidine et circumspectissime exhibent, si hujus *tardum circum*, et illius *pulsus parum frequentem*, ita interpretari liceat. At experientia docet, quod proportionatè ad depressam sanguinis spiritualiscentiam pulsus tardior haud evadat, ut hi clarissimi viri sibi persuaserunt, a contrario, insuetam frequentiam, motumve potius tremulum, sibi metes plerumque vindicat. Et quando suscitatur vino, tardior sit.

Quoad linguae statum, de quo Riverius mentionem facit, ne nimium credas. Praxis etenim quotidiana, dum lingua sit sicca et scabra, vini usum evincit. Zacutus Lusitanus refert, se, in febre maligna, praesenti sibi intensa, cum linguae siccatate et nigredine, aegro jam desperato, vinum exhibuisse felicissimo successu (2). Pringelius idem etiam asseruavit (3). Et ego non video cur potius aliquis credat, Aselepiadi quam Herophylo, cur huic potius quam Aselepiadi.

Cum Riverius, Hoffmanno,isque recentioribus, vini usum, usque dum declinet morbus, prohibentibus, consentire nequeat. Quippe crisis respicere, nimis religiosum. Et *materie crudæ* exagitationem timere, inane, ridiculum, nobis videretur. Variæ circumstantiæ, multo hoc ante tempus, nulla ad crisis rationem habita, vini usum indicant. Potest, primo die primum vinum dandum esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto aut quinto; potest post uram avellianam, potest post duas, potest post plures. Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale aetatem, quæ ætas, quid tempus anni. Minimeque, in rebus multum inter se differentibus, perpetuum esse præceptum temporis potest. Hanc generalem regulam dare vellem. Cum febris contagiosa sit manifestæ, ex vi sedativa in systemate prævalenti pendentes; cum deiciatur animus, cum langueat pulsus, cum pauci aut nulli adsint diarrheticæ phlogisticæ signa; quarto vel quinto die

(c) Tom. v. p. 111. ib. tom. II. p. 27.

(2) Lib. I. obs. 93.

(3) Difficultes of the army, p. 260. 3d edit.

die efflato, vel ab ipso initio morbi, vinum præbendum. Docemur autem, vinum, morbo non longe profecto, frustra dari: Et quare? Propterea quod morbus, ut aiunt, decursat nequit, et suam cursum corrat necessum est; idemque, si vinum primis morbi periodis exhibeamus, ad effectum stadium, maxime tunc urgente necessitate, inopiam ejus sentiemus; et pro hoc stadio non id servasse poenitebit, ubi nempe utilissimum sese præbere pollicetur. Hujus ratiocinationis vim me non videre, ingenue confiteor. Omnibus liquet, quod, quo diutius perseveraverit morbus, eo debilior fiet aeger, crescet putriditas; et, si fallor, quo magis hæc putriditas et debilitas valent, eo majore aegratus periculo versabitur. Si res sic se habent, vires sustentare, putridæ propensioni obviam ire, ullo morbi tempore, quo vis pollet febrilis, vini moderato usu, nequaquam mihi absurdum videtur. Nec a nostra sententia longe discedit Celsus, dicens: "Si propter infirmitatem necessitas urget, satius est, consistere jam incremento febris, aliquid offerre, quam incrementum; satius, instante, quam incipiente." Cum eo tamen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit suscipiendus (\*). Ipse Pringellius, per longum *febris carcerum* decursum, propter virtutem ejus antisepticam, et ut vires vitæ sustineat, vinum exhibebat (†). Obijciat forsitan aliquis, quod, si per totum morbum vinum aegrotanti tribuamus, ante statum ab eo abhorrescet. Hoc possibile est; sed raro eventurum puto. Si coealat, ut aeger overfetur, mutetur vini genus, mutetur forma. Adeo ut, in summum, symptomatum natura, non minus, immo vero magis, quam morbi duratio, vini exhibitionem moderari debet.

*Quantitas.* Pringellius binas circiter libras vini libanani mitribus in die dedit. Gregorius multa majorem quantitatem sæpe præbet. Post 4 autem vel 5 diem, in genere, binas libras quoque per diem aegrum habere sinit. Vini remedium esse ex quo præcipue typhi modica pendet, illum iterum iterumque observantem audivi. Incredibiles vini quantitates optimo cum fructu in hac urbe humilissimis typho laborantibus sæpe sæpius administratas vidi.

Hic tamen corporis habitum et consuetudinem respiciendum est; e. gr. si febricitans naturaliter sit habitudine languida, si vinum potare consueverit, majorem portionem exhibere licebit. Quod illi dosi est immodica, in aliis effectum manifestum producere vix sufficiet. Ab effectibus, quos quaedam vini portio in sanum protulit, quan-

O c z

titatem

(\*) Lib. III. c. 5.

(†) Pag. 385.

titatem nunc male se habenti necessariam limitare non datur; Quippe quod, in ingenti illa debilitate, qua aegri hac febris plerumque afficiunt, quantitatem, ea duplo majorem, quam quæ sanum procul dubio inebriasset, frequentissime habere potest. Nulla igitur, quod ad quantitatem, exacta norma adhibenda est, nisi quam accurata effectuum observatio doceat. In hac re Pringelius optime monet: "Perhaps there is no rule of more importance, than to give a strict charge to the attendants of the sick, never to let the patient, when low, remain longer than two or three hours without taking something cordial; as I have seen men once in a promising condition sunk past recovery, by being suffered to pass a whole night without any support about the time of the crisis (3)."

Vinum, parvis dosibus frequenterque repetitis, modo obdormitutum non veras, exhibere, præ omnibus cavendum est. Noluit tamen (si Gaubii verbis uti liceat) quis existimet, probare me trepidantem ac sæpe ridiculam illorum solertiam, qui aut naturæ ~~omnes~~ nimium freti, aut de facultatibus remedium, plus quam in his est, sperantes, aut denique, ne quid turpius dicam, indicationi, quam suo modo enstituerunt, dissidentes, minutis adeo dosibus curationes aggrediuntur, ut abstinencia potius extenuare, quam data opera jugulare velle morbum, videantur; certe nescitis, agantne an ludant in re seria, vincere an vincere malint. Laudo ac veneror medicum circumspectum, et parum suo loco ac tempore cunctatorem, et sapientem naturæ ministrum, qui temerario ausu nunquam præcipitetur, nec sarragine remedium graver, multo minus violentia opprimat; Attamen condarum quoque ac intrepidum, consilii prudenter capti certum, et qui agendi opportunitates gnave rapiat, cumque agendum est, idoneum modo cunctum adhibeat, nec dubiae stillicidii diuturni assidui committat, quod virtute majore tutius citiusque impetrare possit.

*Forma.* Hac aegri desiderio, ventriculi statu, et debilitatis gradu, maxime opere iudicando. Periculum a vini stimulo profluens id lymphatum dare fuisse practicum quo nihil salius, nihil primis remediis commodius reperitur.

Plurimi id aqua calida diluunt; sed bonne hæc ventriculum relaxabit, et inde symptomata exaggerabit? Ita puto, Utarumque ergo vinum proprium et necessarium est, nec non deus, vel, si diluendum est, aqua frigida fiat. Vinum



nūm enim aqua frigida mīxum, multo magis cardiaci officio fungitur, multo magis refocillat, quā vinum calidis diluam; formis igitur, *negar* et *posset*, apud Anglos in usu, ostendendum. Quin etiā, aqua illa frigida ventriculum vi sua tonica roborat, versus corporis peripheriam fluida leniter determinat, sitim sedat, quāobrem ipse pater Hippocrates, in febribus etiam acutis, talem vini et aquae mixturam præscribere haud veretur. Ego ulterius adiciam, quod, quāviscūque vinum admittatur, aquam frigidam eodem tempore plerumque dare liceat. *Plerumque* dico, propterea quod in febre, quae nuper epidemice hanc infestavit urbem, sese obtulit exceptio. Multis erant symptomata inflammatoris, plus minus catarrhi et anginae, quae vini usum, aquae vero frigidae nequaquam, admittiebant. Hoc tamen in febribus aestivis autumnalibusque rarius evenit. Cum casus, tum consilium, plurima illius efficaciae exempla in apertum protulerunt. Nobis clare patet, potum frigidum in omnibus pure nervosis febribus, illisque quas manifeste comitatur putrida diathesis, utile et necessarium futurum. O! utinam medicos praëjudicium popolare tantum contemnere posse, audere, quantum potum frigidum liberius dare, in omnium provecto febrium statu admittentes, ubi diathesis phlogistica vel penitus abiit vel maxime diminuitur, praecipue cum topica nec ad pulmones, nec cerebrum, sed determinatio fiat! Vinum, verò, egelidum est adhibendum, et quantitas, prout exigunt symptomata, augenda.

Denique, in his febribus, necessaria sunt primarum viarum emundatio, quies, securitas, silentium, stragularum et induriorum frequens mutatio, quae quidem mutatio, caute facta, in modio ipso sudore, licet aliter male sentiat vulgus, satis est tuta: Neque alienum est apertis aliquantum fenestris parum aërem admittere. Haec sunt observationes, quas habui de febribus proficere, pauciores sano quam rei dignitas postulat.

Nunc ad Phlegmasias progrediendum est.

#### CYNANCHE MALIGNA.

Hocce morbus ex fatali sua natura nostram attentionem quam plurimum meretur. Annos licet 150 ante Boerhaavium exstiterit; magnus ille tamen et sagax vir, quod miror, nihil de eo memorat. Nunc per 40 annos in Europa notus fuit; verumtamen non adhuc satis bene intelligitur, nec distinguitur. Nuper enim *cynanche tonsillaris*, nōne sine magna parentum anxietate, et infantum nocu-

mento

mento, cum *maligna confusa*, et simili modo tractata est. Et inter medicos nunc agitur hæc, utrum cynanche maligna et cynanche stridula revera differant; nonnulli equidem permiscuerunt. Hoc, me iudice, satis superque evincit, quam maxime exoptandæ sint accuratæ morborum definitiones: Hoc plane indicat absolutam studii nosologici necessitatem, sine quo morbi a se invicem vix unquam satis distingui possunt. Quid remediorum referat cognitio, nisi morbos distinguere valeamus? Merito dolemus, post tot tantosque doctorum hominum labores, nondum adeo discussas esse, quibus hæc res immersa hæret, tenebras, ut plena luce resurgat.

Ferenda quidem ista discordia foret, si remedium non admitteret: At vero, cum id invenire non difficillimum sit, et multa suadeant, ut adhibeatur, quæ tandem ratio est, cur inveteratus error diutius foveatur? Quocirca signa, ad quæ medici hunc morbum a cynanche tonsillari distinguendi causa confugiunt, breviter summatimque percurram. Horum,

1. Est *Tumor*. In cynanche tonsillari tumorem majorem esse dicunt; rem ut plurimum sic se habere non denegandum; sed cynanche maligna cum tumore æque magno sæpe occurrit.

2. *Color*. Tonsillari rubor splendentior est proprius; malignæ obscurior, lividior, nigrior: Sed hoc certum signum non est; quoniam cynanchen tonsillarem color lividus frequenter comitatur.

3. *Crustæ*. (b) Hæc nota, crustarum scilicet in faucibus præsentia, maxime diagnostica existimatur. Ad hanc unicam notam, stricta nimis et servilis adhæsiō, ut tonsillarem pro maligna medici amplexi sint, fecit. Ex hac, inquam, ipsissima circumstantia tota hujus rei confusio pendet. Antequam medici animos ad cynanchen malignam adverterent, quoties crustæ in cynanche tonsillari occurrerant, profus ignorabant. Post hoc vero, vix ac ne vix quisdem decimus quisque cynanchen tonsillarem contemnit, qui crustis omnino immunis invenitur. Nihil frequentius datur quam maculae albae aphthosae in tonsillarum superficie circumscriptae. Hæc me non movent: At sæpènumero cineritis nigriorisve coloris serpentesque dantur; quo tempore medici plerique omnes malignæ ei nomen indere haud dubitarent. At ego tunc etiam admittere nolo cynanches malignæ nomen mereri, vel eadem remedia requirere,

(b) Observ. vocem Crustæ non doctitate respicere, quoniam quondam duritiem exprimit; vox anglica *Scurg* melius adhibeatur.

quirere, nisi alia magis characteristicæ adfuerint symptomata, quæ, ut diagnosi accuratius fiat, advocanda sint: E. gr. cum morbus sporadicus est, omni contagii suspitione remota, et præcipue si a manifesta febris applicatione ortum ducat, et adalium adariatur, pro tonsillari habere, crassas haud nauci faciens. Si adhuc manserit ambiguitas, aliud signum a vitæ tempore deducendum est. Suspicio fere semper de infantibus incidit. Sed ex absentia symptomatis maxime characteristici potissimum penderem, ex natura, nempe, febris, quæ in cynanche maligna nunquam non putrida est, *typhodes*, multo vomitu, magna anxietate, et in principio purgatione stipata. Magna virium prostratio, quæ tonsillarem non cumitur, cito apparet; et non longo post tempore exanthemata, eruptio scarlatina, miliaris, vel petechiæ, animadvertuntur. His signis cynanche maligna ad amissim distinguitur. Cum hæc symptomata desunt, mera crustarum præsentia negligenda est; quoniam absque cæteris signis nos semper in errores duceret.

Morbi cogniti medela cardiaca et regimine antiseptico prorsus consistat. Acida vegetabilia sola nequaquam bene respondent, quippe quæ lipothymiam et diarrhoeam inducere observantur. Eadem, cum magna vini quantitate data, valde utilia evadunt. Cardiaca, in hac, præ omnibus aliis morbis putridis, absolute videntur necessaria. Liber vini et corticis Peruviani usus præcipua sunt remedia. Hic, si id modo infantes caperent, plus commodi ferret, quam unquam adhuc tulit. Illud lubentius sumunt; immo etiam sæpiissime accidit, ut infantes hoc morbo correpti vinum magnopere exoptent. Infusio in vino menthae vomitum, quæ in hoc morbo occurrit, auctore Gregorio, frequenter sopit. Vinum, mea quidem sententia, *confessione cardiaca*, et omnibus id genus remediis, palmam præripit: Quæ corpus stimulant, nimisque calefaciunt, et eodem tempore antiseptica, et permanente, vera, cardiaca, vi vini carent.

#### ARTHRITIS;

MEDICORUM opprobrium, morbus mille hypothesebus oneratus, quibus quæque dies novam addit. Res nulla est, de qua tantopere, non solum indocti sed etiam docti, dissentiant. Quorum opiniones, cum tam variae sint, tanque inter se dissidentes, alteram fieri præfecto potest, ut earum nulla, alteram certe non potest, ut plus una vera sit.



De his differere non est hujus loci. Rogatus olim, quid et quale sit causa vera proxima arthritidis? Auctore *Symonde* mihi solebam, cum de Dei natura quævisset *Tyrannus* *Alber.* hac idem deliberandi causa illi unum diem postulavit. Cum idem ex eo postridie quæreret, balneum petivit. Cum sepius duplicaret numerum dierum, admittensque *Uirum* requireret, coacta faceret? Quia, quanto, inquit, diutius considero, tanto mihi res videtur abtenuior. Culloni vero sagacitas hujus rei tenebras, argumentorum factorumque agmine tam bene collectitum, tanque nitido dispositorium, ut nihil supra, jam tandem scilicet disculsi.

Et certe præstat, in morborum causis indagandis, progredi quonque per fœcula observata et cognita hæcenus corporis humani fabricam liceat, et in reliquis ignorantiam fateri, quam fœdis hypothefibus, quantumlibet etiam ingeniosus, ludere. Dulendum sane quilibet fingendi licentiam quemvis in sanctissima arte sibi impune arrogare; nec quodam pueris, aut ipsa religioni non esse, incerta pro certis recitare.

Multum fuit dictum quatenus vinum in hoc morbo admittendum, vel abstinendum; utrum iura ab eo abstinencia assuetis noceat, utrumve, ut multi asseruerunt, ab arthritide omnino liberet. Sic *Hoffmannus*: "Plures hiliarie notissimæ sunt, eorum, qui vel in carcerem conjecti, vel ad pauperatatem redacti, cum a vino abstinuerint, ab arthritide et podagra liberati sunt (c)." An abhinc colligendum est, solam ex vino abstinenciam arthritidem fugasse? Nequaquam. Nonne arbitrari æquum ad pauperatatem redactos a diæta plena abstinuisse, et sese etiam labori dedisse?

Ufus vini, prout maturiore vel provectiore ætate inceptus, et in diversis morbi circumstantiis, plus minus tutus est et necessarius. "Si æger, venerandus ille *Sydenhamus* clamat, vel a longo ac nimio usu liquorum inebriantium, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibis absque vino nequeat concoquere, non vacat certe periculo, eundem protinus ac de repente a vino depellere; qui quidem error haud paucis lethalis fuit (d)." Vinum citius quam plenum cibum arthriticis præbere volumus. Vini quantitas moderate stimulus vix nocere valebit. Totæ abstinencia perpaucis absolute necessaria est; illis minime, qui vinum moderate potare assueti fuerint. In

hisc

(c) Hoffm. *luc.* p. 343.

(d) Sydenh. de podagr. pag. 336.

hinc casibus, ubi in dubio hæret, an vinum proprium sit necne, multum ex vini natura pendeat. Vina aciescentia quam maxime fugienda sunt. Dum vinum Burdigalense æscit, bonæ Madeiræ sentiat hunc non habebit effectum. Quando animæ symptomata ventriculum premunt, vinum sive Burgundicum, sive Champagnense, sive Madeirense, sive Canariense, in usum veniunt. "Languore et ventriculi debilitate urgente, nihil veri aque vetis respondet ac vinum Canariense; neque vel vinum Gallicum rubrum, vel theriacum Antismachi, nec ullum aliud ex castiacis mihi hastenas notis, potes habet vires (e)." In similibus etiam casibus vini usum multum laudavit Cossé (f).

"Ubi dolor acutum abest, et anomala symptomata, anxietates, tormina abdominis, vomitus, singultus, deliria, &c. apparent, illico effluaci medela succurrendum est; cum ingens periculum imminet, tunc adhibendum fragrans vinum; imprimis si vires languent in veteranis jam podagricis; omnium maxime, si largiori vini usu dudum affecti fuerint. Contigit, ut veteranus podagricus, strenuus potator, decumberet: Pedes viæ dolabant, sed aderant anxietas, nausea, levia ventris tormina, una cum debilitate. Medicus vini usum prohibuerat. Accessit aegrum amicus, hilaris olim conviva, cum quo sæpius Baccho litaverat, qui illi omnia remedia amoveri iussit, et horum loco propinavit binas vini libras Rhenani generosi; hoc effectu, ut post paucas horas acriter quidem dolerent pedes, sed reliqua mala symptomata omnia evanuerant. Unde, doloribus mane jam diminutis, accedentem medicum false derisit aeger, vinum podagræ specificum jactans (g)."

Hic de phlegmaticis præmissis, pauca de Exanthematibus nunc dicenda veniunt.

#### PESTIS.

Hic omnium morborum maxime fatalis, nec ævo, nec sæculi, nec moribus privatis, nec publicæ potestatis; calamitas sane est acerbissima, quæ genus humanum sub morbi specie affligit. Contagii filiam esse pro certo, et tanquam ab omnibus, quæ de ea traduntur, historiis, confirmatum habeo. Hoc contagium ex generali atmosphærae circumambientis conditione non pendere, nec longiusque diffundi, multa probant facta. Potenter agere tantum

VOL. III.

P p

vide-

(e) Sydenh. de podagr. p. 308.

(f) Traité pratique sur la goutte, p. 66, 67, 69.

(g) Vén. Scritt. vol. 10. p. 388.

videtur, quando ex corpore *pestiferis* oritur, vel postquam vestibus, &c. quae per aliquod tempus aegris prope iaceant, sem aliquamdiu adhaeserit. Homines penitus hoc persuadere, maximi esset momenti. Nam, si omnes, quorum res sunt, parvo intervallo sese praecluderent, mihi persuasum est, pestis cladem levissimam fore.

Contagium primo et potissimum in systema nervosum operari videtur. Vis ejus sedativa aliquando corpori exitium instanter affert. Hominum saltem exstant exempla, puerum horarum vel unius diei spatio morientium, in systema nervosum actionis signis solum observatis, nulla febre, nullis furunculis pestiferis, (*plague-boils*), eodem tempore productis. Hi vero casus sunt singulares, praesertim primo contagio introducto tantum occurrentes, et, ut ego puta, ex fomitibus longa retentione virulentissimis factis exarientes.

Contagium plerumque reactionem admittit; et febrem, 3 vel 4 dies in minimum durantem, producit. Haec febris est typhus, *typhus exquisitissimus*. Omnibus typhi, omnibus *febris carcerum* symptomatibus, stipatur. Ab illis neutiquam discrepat, nisi quod bubones et carbunculi his rarissime, in illa frequentissime, appareant. In peste desperatio est constans, vis separabilis, partim timori quem hic inspirat morbus, et partim debilitati quam inducit, tribuenda. Omnia debilitatis signa occurrunt. Capitis perturbatio, delirium typhomanicum, sensuum internorum statum imbecilem indicant. Hinc sanguiferi systematis aequilibrium mutationem patitur. Sanguis ad vasa extrema haud pellitur. Unde horum vasorum restrictio, unde frigoris sensatio, unde fluidorum insueta quantitate in partibus internis accumulatio, unde in visceribus jam amplificatis effusio, unde denique ipsius cordis praeter naturam dilatatio. Quinetiam pellem comitatur serinentum, ure, putridum, quod in massam circulatoriam suos exferit effectus: Ab hoc fonte bubones, carbunculi, petechiae, haemorrhagiae, et variae effusiones internae, profluunt.

Quod medendi rationem, magnam circumstantiarum varietatem, quibus hic stipatur morbus, remedium varietatem poscere, omnibus liquet. Practici vero has circumstantias, in quibus haec remedium varietas separatim applicari debet, nondum dijudicarunt; quapropter nullum adhuc propositum fuit remedium, de quo non disputarunt medici. De his nunc anxie disquirere non nostrum est. At solum est videndum, quatenus ad hunc morbum curandum



randum valeat vinum. Praecipuus ergo indicationes curatorias breviter enumerare haud absolum erit.

Hujusmodi sunt, 1. Ad corporis superficiem determinare, 2. In visceribus congestionem, 3. Generali debilitati, 4. Putredini, obviam ire. Si quis me quaerat, qui sit, ut materiam morbificam ejusdemque expulsionem neglexerim? Percontanti responderem, materiam morbificam ejusdemque expulsionem vix nostram mereri attentionem. Morbificae materiae doctrina ad magnos in medicina abusus, in hac aequa ac multis aliis morbis, viam laxavit.

Opinionem, pestis et febrilium morborum modelam ex materiae morbificae concoctione et expulsionem pendere, universaliter fere invaluisse video. Experientia tamen cum ea opinione non consentiens, a clarissimorum virorum sententia me discedere coegit. Si permisisset tempus, ei doctrinae impugnandae incubuissem. Sed quam parvi pretii operam meam deputarent medici! Non, mihi si linguae centum sint, oraque centum, ferrea vox, opinionum in medicorum animis adeo pertinaciter inhaerentium, et tam penitus insitum, eradicare fortasse valerem.

Haec doctrina nullius potest esse usus in februm curatione; et medicinam infamare, potius quam illustrare, tendit. Morbifica ista materies in peste, fateor, directe interimere potest: Hunc vero casum nostra praxis non attingit. Sed ubi reagere permittitur systema, nostra cura ad vires vitae suffulciendas semper dirigenda: Quibus bene suffultis, materies morbifica expelletur necessario. Natura enim, vi sua manente, sibi permessa, negotium suum suo tempore exsequitur; materiamque delicto ordine ac via tum fecerit, tum etiam expellit, ut nostra opē, nostris artificibus atque auxiliis, non indigeat, suis viribus optime instructa, suis opibus locuples, suo denique ingenio satis edocta.

Ex antea dictis clare apparebit, quam apprimē vinum plurimis hisce indicationibus respondendis intersit. Debilitati et putredini occurrere, simul et systematis tonum sustentare, omnium maxime cura nostra digna videntur. Haec in oculis practici semper habuerunt, variis cardiacis, alexipharmacorum nomine, utentes. Proprietatem acrimae et calida cardiaca stimulantia adhibendi multum dubito. Me iudice, illorum usus in hoc morbo rejici univēse debet. Vinum omnibus praestat, et omnium aliorum vice fungetur. Practicos ad vinum confugisse, verum est; sed quanta dissidentia! quanta cautione! quanta parsimonia! *Acida* in peste ubique laudata sunt. At in hoc, aeque ac in aliis putridis febribus, cautius adhibenda. Magna vis

nervosæ depressio, et summa animi dejectio, quæ pestem nunquam non comitantur, solummodo usum remedium dubium resistit. Et ego *acidæ* pro sedativa habeo. Ubi ubi igitur acida exhibentur, nonne eorum vim sedantem vino corrigere conueniret? *Certa et diuturna experientia confirmatum habemus, potum citri et vinum Rhenanum, si quis non deatre usus fuerit, omnibus alexipharmacis, et aliis quæ in auxilium pestis prompta sunt remediis, pulchram præterire, et ob hanc manifestam rationem, quia nihil potentius putredini et motui ejus intestino resistit, quam acidum et vinum Rhenanum (b)."* Verbo, ab acidis et libera vini usa maxima commoda expectanda sunt. Similitudo, quæ pesti cum typho est, et frustum, quem vinum typho fert, hæc mihi spem inspirant. Verantamen Tartaro Emerico, Cortice Peruviano, sua debetur laus. An aer frigidus et aqua frigida admittenda? Ita variolaram aliorumque morborum febrilium analogia suadet. Omnia de vini administratione, sub typhum dicta, hæc etiam ad amussim pertinent.

#### VARIOLA.

ERUPTIVA felix laborantem typhosa symptomata ægrum aliquando corripunt, ut animi dejectio, virum prostratio, vomitus, anxietas insignis, pulsus debilis, vultus pallidus. Hæc apud adulescentes frequentissima sunt, qui morbi timore tenentur. Nonne in his casibus vinum quoniam maxime proprium? Ita Huxhamus affirmat: *"In such low depressed cases, I have seen pretty large quantities of wine given with great advantage (i)."* Circa morbi statum, ut vocatur, tumor frequenter imaginato subsidit, nulla evacuationibus, quæ hoc producere valent, prægressis. Hac in causa vinum non modo cum emolumento adhibeatur, verum etiam, asserente Gregorio, procul necessarium evadit.

Non desunt exempla hominum in variola, typhi signis rapata, magnas vini quantitates cum pulcherrimo successu bibentium. Vir quidam lib. vi. vel lib. viii. vini indies bibebat: Quoties vinum intermissum fuit, pulsus lahebat, delirium cum longa malorum symptomatum serie invalit; vino autem repetito, omnia mala symptomata evanuerunt. Plurima gradu minora exempla idem confirmant: *"If, at the approach of the secondary fever, the pulse flags, the patient faints, the pustules and interstices grow pale, shrivelled, and sunk, or livid, the extremities coldish and clammy,*

(b) Placæ. *art. medicæ*, p. 46.

(i) Huxh. on the small-pox, p. 144.

clammy, in such circumstances, I have seen very large quantities of wine given with surprising success (l).” Quamprimum diathesis, horror, sigillatim insolitæ, salivationis præprospere (b. c. priusquam exanthemata in trunco corporis et artubus æque ac in facie perfectam maturationem asseruat sint) declinatoriæ suspitionem dederint, illico instantanter ad alexipharmaca confugiendum est, consentientibus viris eximis, Mortonio (h), Sydenhamio (m), et Boerhaaveo (n), qui vinum valde laudant. Per totum denique variolarum confluentium cursum, ubicunque serositas, purrida, symptomata apparent, ubicunque corticem Peruvianum dare liceat, vinum erit idoneum et utile. Cum æger corticem gurgitare recusat, longe optimum et dulcissimum succedaneum sese præbet vinum.

Ex his dictis aliquis fortasse putet, me variolarum inoculationem, et quæ sub illa oliminet tractationem, contempnui habere. Longe absit! Opinionem hanc a me amotam volo. Claudier medicinæ ullum commodum in me nolo. Illius utilitas, nisi animus me fallit, solidissimo nititur, fuitur, fundamento; convictione, scilicet, amplissimæ experientię. Commoda inde emergentia (saltem in hac nostra Britannia) illam, ab omni argumentatione, quæ obijci potest, tutam servant. Non miror equidem medicos, aliter bonæ famæ, ejus usum dubitare, objectiones proponere, et etiam in propositis suis tenaciter hæcere. Nam quis mortalium est quem præceps animus, quem etiam præjudicia non abripiant subinde; præterquam quod omnibus ex æquo satisfacere arduum, ne dicam, impossibile sit (o).” Quid tum illis agas, qui nec jus nec æquum sciunt?

Nunc tandem ad caput extremum perventum est, scilicet.

3. Vinum cum aliis medicamentis comparere, quæ ad eundem proposita respondenda adhibentur.

*Alcohol.* Si aliquis alcoholis puri tantum biberet, quantum vini potest, deleterius sentiret effectus. Alcohol corpus plus inflamat, diathesin phlogisticam viâ citius producit. Acidum, quo vinum gaudet, hanc facit differentiam. Si alcoholi addas acidum, hanc (ut expectandum foret) vini virtutes dabit. Constat igitur manifeste aliquid ex accurata mixtura pendere; quoniam liquor ille Anglicus punch, minus licet alcohole nocivus, vino tamen æque nequaquam tutus est.

*Opium.*

(l) Huxh. p. 138.

(h) P. 151.

(m) De variol. p. 186.

(n) Prax. medic. vol. 7. p. 219.

(o) De Haen, præfal. rat. medicad.



*Opium.* Nonnulli vinum opio non melius esse nobis persuadere vellent; sed ego nequæ, nec ullus mihi minus practicus, opium, eodem in modo, et cum iisdem effectibus, præbere queat. Opium non vero illa virtute cardiaca, qua dixi vinum pollere, pollet. Etiam hunc effectum in aliuos exferere posse concederem, infuetos tamen, si fallor, sæpe frustrabit. Vinum vero est cardiacum *raro fallens*. Quin et illius acidum utim febrilem sedat, purillam acrimoniæ, primas vias infestantem, corrigit. Opium, in nulla forma, prout ego novi, eodem præstat. Propter hoc ipsum acidum, ejusdemque accuratam mixturam, vinum opio minus inflammat, et in minores doses facilius dividitur, idcirco in debili casibus tutius adhibeatur. Vino denique inest gratum quiddam, et quod alii aliquid; quibus opium caret. "Ingrata, nauseosa, molesta, quantum fieri potest, vitentur, aut saltem parciorè quantitate cum aliis remixta abipondantur artificiose. Præstat nullum quam tale exhibere remedium a quo natura abhorreat: Cujus regulæ, præprimis in foeminis delicatioribus, infantibus, &c. ratio habenda (p)."

*Contrayerva* alexipharmaci nomine multum prævaluit; et adhuc in praxi aliquatenus valet. Stimulus illi inest, sed nequaquam potens. In multo majore pretio est, quam meretur. Utrum ulla signa sit laude, dicere nequeo; nec hos puto, a quibus fuit applicata, dicere posse. Quippe quæ, quantum ego observavi, in simplici suo statu rarissimè nunquam data. Verum alteri medicamento, cui ejus operationem attribuo, conjuncta fuit; pulveri nimirum absorbenti, ut in *lapide contrayervæ*, qui quarta rix amplius parte contrayervæ continet; quod restat, fere omnino est terra absorbens. Si hoc medicamentum sudorem unquam excitavit, absorbenti tectæ, potius quam contrayervæ, debetur laus. Ex modo et quantitate quibus administratur, nihil nisi *platys* esse concludere volo. Lege paginam 130 Pringelii, et judica.

*Serpentaria* frequentius præscribitur, et vi majore stimulantur pollet. sine dubio bonos effectus produxit: Sæpius tamen noxia fuit. Ad optimum, ejus usus est lubricus. Pringelius aliquando cum fructu adhibuit, aliquando calorem corporis nimis augmentem notavit, et dosin parvissimam minorem reddere coactus est. Quocirca, cum ejus effectus semper sint dubii, et ejus virtutes absque vitis ex vino semper parari possunt, nonne prorsus desecrere æquum est?

Græv.

*Croci.* Hunc sanctitate imbuunt consuetudo : sanctiorem reddidit coeca credulitas. Boni seracem esse multi putarunt. Multumque mali ei assignatum est. Quale exemplum medicorum fidei, servilis zelumdem imitationis, attentionis inopiae, oculorum defectus, ad medicamentorum effectus videndos? Nec exhilarans nec citius croci antidota nobis nota est. Alexander, ingeniosus ille medicus, ad scrupulum usque, ullo absque evidente effectu, sumpsit (q). Cum grana tria pro dosi exhibet medicus, risum tenetis? Sive ullum bonum, sive malum, ab illis exspectandum est, oportet ut doses sint multo largiores, quam quae admittit praesens medicorum praxis. Dosi medicarum inusitas, aegri majorum aversatio, immensumque pretium, ad croci exilium, ex materia medica exoptandum, me maxime sollicitant.

*Alkali volatile,* corpori humano stimulum, potentem, transitorium, dissolubilem, et inde tutum, praebet. Cum ad unam systematis partem applicatur, in reliquum corpus agit; et tamen, ex vi sua inflammatoria, in parte quam directe tangit, nihil mali metuendum est. Natura illius volatilis, fugax, diffusilis, in ventriculo neutralizabilis, tutum, efficax, et longe plerisque omnibus antefesendum curiacum, id quidem reddit. Nihilominus cum Pringelio dico, vino nequaquam antecedere. Post vinum, alkali volatile stimulantium optimum esse concedo. Quid multa? Ubi cardiacum stimulus, tutum, permanens, requiritur, vinum huiusmodi nobis adhuc notis palmam refert. Omnibus fere est gratum: Ventriculo, illud in genere facilius, quam alia medicamenta retinenti, arridet, allubescit, dum ingratiorum medicamentorum *farrago* rejicitur; vel, si sit retenta, plurima inutilia, frustranea, evadunt; multa precaria, incerta; alia manifeste nocent.

Tandem coronidis loco sint illa quae habet Tirellus: "Vina sustentant firmos, erigunt lapsos, cohibent cadentes: Vina edunt miracula; non extracta, non lapidea, non quintae essentiae, nomina fabulosa, non boli, non pilulae argenteae, aureae, aut gemmae, plebis deceptiones, incantamenta marisupii, vituperia sapientiae, medicinae opprobria. Vina autem calidi innati vera pabula sunt, certissimaque alimenta. Haec adeo celebranda elogiis vestris encomiastico cantu; haec, severiori disciplina in usum vitae percolendo, in arguantium commodum danata (r)."

Nihil nunc dicendum restat, nisi ut gratias agam huius collegii Professoribus Illustrissimis; plurimum Reverendo

Viro,

(q) Vid. exper. essays.

(r) In historia vini, p. 62.

viro, *Samueli Plumer*, A. M. et speculatissimo viro *Jonathan Colton*, ambobus de *Salina* in comitatu *Elizacensi*; *D. Hlegbrough* de *Richmond*, cui in arte melendi pauci praeerunt: Quam me iurata amicitiam cum illo conjunxisse, illius instructiones medicas et praecipue obstetricas exhaustisse! Societatibus rebus humanis, *Medica*, *Physica*, et *Chirurgica*, quarum socium me fecit dies felicissimus. Quantum ex supra dictis sociis, et hisce Societatibus, doceperim, quantum illidem debeam, verbis consequi non possum.

— *Nec me meminisse pigebit vocant,*

*Dum memur ipse mei, dum spiritus hui regit artus.*

Nec Patrem silentio praeteream, me vetat *Pietas*; cum nemo sit, cui plus debeam, aut placere malim, quem cariorum habeam, quem in medicina caeterisque acrolari praetulerim; qui adulatione minus eget, observantiam magis meretur. Pars ne vel minima mei tam corporis quam animi exstat, quae paterni illius amoris, summae diligentiae, insignes non ubique notas seruat. Quantum illi debeam, ut Patri optimo, ut Praeceptoris fidelissimo, ut Amico conjunctissimo, meo ex animo nunquam effugiet.

Si hoc opus Professoribus placeat, quorum absque incitamento, nec unquam suscepissem, nec forte susceptum absolvissem, et illis, quibus dedicatur, haud pudeat, satis est. Si simul et in alios boni quid inde redundaverit, exulto. Sin minus, laudabilis saltem cinatus conscientia pro salamine laborum est. Neque verique unus me duxit amor.



## Morbis Coeli Mutatione Medendis:

QUAE, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Augustae Ratisviciensi Academia Viri,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academiae Edinburgensis Praefecti;

SIC HON

Imprimis ELIVATVS ACADEMICI Confecti,

Et Nobilissimi FACULTATIS MEDICAE Decretis:

Pao GRADU DOCTORATUS,

SOMNIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

FRUITORUM EXAMINI SUBJECIT

JACOBUS GREGORY, BRITANNOC,

Ad diem 12 Septembris, infra locumque solitum. 1774.

Pessimum ergo est caelum quod egrum fecit, ultra ut sit illi quicquam parum,  
quod sanare possit illi, et hoc sum, filii mei, monito in

*Edipi de Te. Medici.*

Ad Edit. alteram, auct. et emendatam.

1776.

Viro edmo,

GULIELMO CULLEN,

ALEXANDRO MUNRO,

JOANNI HOPE,

JOSEPHO BLACK,

FRANCISCO HOME,

Artis Medicæ in Academia Edinburgensi Professores dignissimi,  
Praeceptoribus suis spectatissimis,

Quoniam aliis oculis et percipere, tum aliis amicis

Quia se dignati sunt, semper colendis, hoc opusculum,

Grati animi testimonium, sacrum voluit

AUCTOR,

## MORBUS COELI MUTATIONE MEDENDIS.

**M**ULTI morbi, quibus gens humana vexatur, in certis tantum regionibus grassantur, et in aliis nunquam, vel saltem raro, occurrunt: Et quum constet, coeli temperiem varias affectiones in corpore humano producere, plurimi istiusmodi morbi, aeris vitiiis aliisque coeli effectibus facile tribuuntur. Mira extat differentia, tam ad animum quam ad corpus, inter constitutiones incolarum diversarum regionum; et quaeque anni tempestas agmen sibi proprium morborum ducit. Satis itaque patet, dispositionem ad multos morbos ex statu coeli et aeris provenire; nec dubitandum est, quin morborum causas exstantes ubertim etiam suggerat. Experientia docet, varios morbos chronicos tempore hiemali grassantes, et nullis fere remediis cedentes, veniente aestate facile sanari. Et notum est, statum aeris tam diversum esse in diversis regionibus, et in eadem regione diversis anni tempestatibus, ut effectus quam maxime contrarios in corpus humanum producat. Ratio ergo suadet, multos morbos, ex coeli intemperie ortos, coeli mutatione praecavere et sanari debere. Nec aliter res se habet. Plurimi enim morbi, nullis aliis remediis domandi, tempestate vel coelo mutato sponte evanescunt, aut levantur: Et omnes medici, tam veteres quam recentiores, in hoc consentiunt, coeli mutationem multum esse auxilii in variis morbis, vix aliter medendis.

In hoc tentamine, proponere aliquid de morbis quibusdam ad nostrum coelum pertinentibus conamur, et de ratione istius coeli mutatione medendi: Sed prius opus erit, pauca dicere de modis quibus coelum nostrum corpori humano praecipue noceat.

Observationibus satis constat, regiones, coelo temperato, sereno, et aequali gaudentes, saluberrimas esse: Has autem, quae vel calidae, vel frigidae, vel humidae sunt, periculosiores; praecipue si subitis tempestatis mutationibus obnoxiae sunt. Ex regionibus enim, sicut ex anni tempestatibus, quod olim monuit Celsus, optimae aequales sunt, siue frigidae, siue calidae; pessimae autem quae variant maxime. In hac Insula, coelum, per quatuor vel quinque menses aestivas, temperatum, et plerumque serenum, becum, et aequale, denique ex omni parte benignum et salubre est: Per reliquam autem anni, frigidum, humidum, varium, ideoque multis morbis opportunitum.

Ex principis physiologiae notum est, debitum fluidorum motum et distributionem, per universum corpus, ad sanitatem prae omnibus necessarium esse. Quicquid igitur haec obstat, corpori humano merito inimicum habetur. Aer autem frigidus, praecipue si humidus sit, perspirationem, et sanguinis distributionem ad partes corporis externas, magnopere impedit. Frigus enim externum vasa et spiracula cutis constringit; nimia humiditas fibras musculares debilitat, et vires moventes, cordis, scilicet, et arteriarum actionem, minuit: Sanguis itaque ad partes corporis externas minus recte propellitur. Sed, quomodo-cunque sit, siue ex his, siue ex aliis causis, pro contempto habeo, perspirationem valde minui, tempore existente frigido et humido.

Maximum autem periculum instat a subitis tempestatis mutationibus, quales in hac Insula adeo frequenter, et fere quotidie, occurrunt. Hisce mutationibus, motus fluidorum quam maxime turbantur: Partibus enim externis, subito refrigeratis, et vasis extremis itaque constrictis, sanguis ad externas rite et libere fluens, ab iis pulsus statim ad internas, magna vi et copia ruit. Eodem modo, foraminibus cutis invisibilibus conclusis, perspiratio reprimitur: Et perspiratio omnium excretionum maxime est necessaria. Ex his causis, congestio sanguinis in internis, et inde saepe inflammationes et haemorrhagiae, nascuntur: Ex iisdem etiam causis, febrim aliorumque morborum ingens cohors saepe provenit. Nil itaque mirum est, coelum nostrum varios periculososque morbos producere, et homines etiam robustissimos malis gravibus afficere. Plerumque tamen, ubi habitus corporis sanus et robustus est, omne periculum, naturae beneficio, facile praecavetur, et vel nullus sit morbus, vel brevi tempore tollitur. Nemo medicus ignorat, Naturam ipsam, in multis casibus, optimum remedium urgentibus malis sponte adhibere, et facile praecavere vel tollere multos morbos vix aliter sanandos. Nec aliter res se habet in casu de quo nunc agitur. Quamprimum enim sanguinis motus externarum partium refrigeratione turbatur, actio cordis et arteriarum illico augetur, pulsus crebriores et validiores mutant, viribusque moventibus sic auctis, constrictio vasorum extremorum, quae naturalem sanguinis motum impediens, brevi tempore superatur, et prorsus tollitur, et debita fluidorum distributio, et pristinum circuitus aequilibrium, perfecte restituntur. At, ubi corporis habitus antea debilis fuit et imbecillus, et ad morbos aliquis proclivis, eandem coeli in-



temperiem sine damno ferre non potest: Nam vires naturae medicatrices, quae periculum avertere, et malum sanare solebant, illis deficiunt; aut fortasse aliqua pars corporis, antea morbida vel debilitata, impetum sustinere nequit, et ex eo perniciem immedicabilem patitur. Pari ratione, corpus humanum, modo sanum et robustum fuerit, omnibus coeli varietatibus, frigidissimis aequae ac temperatis aut fervidioribus, mirum in modum se accommodat, ita ut nihil plerumque exinde detrimenti capiat. Aër frigidus et humidus, qualis est in nostra Insula, perspirationi et aequali fluidorum distributioni minime fauet; naturae autem beneficia istud incommodum satis plerumque compensatur, et debita fluidorum distributio, quatenus ad sanitatem requiritur, satis promovetur. Homines igitur, sano et robusto corporis habitu praediti, parum vel nihil exinde patiuntur incommodi. In multis tamen casibus, temperamentum corporis validissimum nullum praebet tamen contra mala etiam patri coeli. Sunt fortasse, in constitutione quavis, tempora critica et periculosa; et procul dubio varietates adfunt a vitae genere, et variis fortune, aliisque causis non accurate indagatis, provenientes, quae homines aliquando robustissimos morbis coeli reddunt ubinoxios. Observandum autem est, coeli intemperiem, etiamsi procul dubio maxima vi in corpus humanum polleat, et multos gravesque morbos producere valeat; saepe tamen incusari, ubi parum in vicio est, et ubi vera origo mali alio prorsus ex fonte derivatur. Sub omnibus enim coelis, quantumcunque diversis aut gravibus, homines reperiuntur, et plerumque optima sanitate gaudentes. Et, nusquam terrarum orbis nascitur genus aliquod animantium sub coelo sic infesto; nec unquam observatum est, caetera animantia aliquid damni percipere ex effectibus coeli nativi, quantumvis gravis aut intemperati, licet intemperiei ejus quam maxime obijciantur. Vis itaque dubitandum est, homines omnes coeli varietates et intemperies, sine damno aut periculo tolerare posse, modo secundum naturae leges vitam degerent. Minime enim credendum est, gentis humanae Patrem et Custodem eunditionem adeo duram et iniquam hominibus imposuisse. Et profectus, homines vitam eundem et duram degentes, coeli intemperiem minime curantes, ejusque varietatibus quotidie sese exponentes, caeterorum instar animantium, sani et robusti erunt; neque coeli nativi intemperiem prius conqueruntur quam artes invenerint, et ad perfectionem perduxerint, quibus corpora ab omni coeli intemperie magna

ex

ex parte defendere queant. Homines igitur, coeli intemperiem sentire pariter ac evitare solent, raro aliqui inde patiuntur incommoda; qui vero magis coeli intemperiem percontantur et evitare student, eo magis effectibus ejus obnoxii redduntur. Una nimirum est via qua homines sese recti possint ab intemperie coeli praevigilare corpora scilicet ita indurando et indurando, ut periculi et incommoda quae evitare niqueant, tolerare valeant. Nil itaque mirum est, homines vires nullius assuetos, virtutibus elegantibus indulgentes, coeli intemperiei impatientes evadere. Si quidem, hac ob causa, homines ceteroquin sanissimi, et optima valetudine gaudentes, coeli intemperiem sine damno esse possunt tolerare, prout quantum exinde periculi metuentium sit illis, qui temperamenta minus valida a natura acceperunt, qui vitas genere inchoptatos, vel aliter insalubri, corpora variis morbis obnoxia reddiderunt, qui diversa valetudine, quocumque ex causa prodecente, fracti et exhausti sunt, vel ita denique, quibus anni ingravescentes, aut animi afflictus graves et distorti vires nunc naturales, tam animi quam corporis, sensum minuerant.

In huiusmodi itaque casibus, coelum novum petere oportet, ubi Jovis purus et serenus, asphyrs moliter spirantes, et mures et solene jucundiores, affectus mulceant, hilaritatem inducant, et vires naturae renorent. — Sed nunc ad alia argumenta transibimus, quae mutationem coeli in multis morbis prodelle foudent.

Angusta quidem est scientia humana: Ad causas rerum ceteras et necessarias rarissime penetrat. Neque arti nostrae tanta adhuc usque lux affulsit, quin natura multorum morborum, eorumque causae, tam proximae quam remotiores, vel prorsus latrant, vel saltem non plane deprehendantur. Quam ergo morbus in regione aliqua grassari observatur, sed sub alio coelo raro occurrat, satis verisimile est, malum ex coeli effectibus originem ducere; et spes nascitur, aegrum, si in regionem italo liberam abeat, beneficium exinde accepturum. Et, deficientibus aliis et certioribus rationandi fontibus, argumentum incertum quidem, minime tamen contemnendum, ex hoc principio ducendum putavi.

In pluribus vero morbis, ex cognita causa proxima, indicatio curativa oritur, perspirationem promovere, et debitam sanguinis distributionem ad corporis superficiem restituere, ita ut nimia ad partes internas determinatio praecaveatur, vel, si jam obtinuerit, quam primum avertatur.

Nullum

Nullum autem novi remedium, quo haec omnia, citius, certius, tutius, et jucundius, perfici possunt, quam coeli mutatione, trahere in regiones temperate calidas susceptu. Necum coelum omnibus aliis remediis longe in hoc praeferat, quod non per paucas tantum horas adhiberi possit, sed per plures menses, vel, si opus fuerit, per annos integros; et medici bene norunt, multos morbos, quos chronicos vocamus, adeo pertinaces et curatu difficiles esse, ut non nisi longo tempore debellari et sanari possint, etsi optima et efficacissima remedia quotidie adhibeantur. Nec ignorant, multa remedia, quae maxima vi in corpus humanum possunt, per longum tempus usurpari nequire. Quaedam, si diu adhibentur, corporis habitum laedunt, et novos morbos inducunt: Alia longo usu virtutes quas prius habebant fere prorsus amittunt, et nullo utiles effectus in corpus producant: Alia, etsi tuta et efficacia sint, si diu usurpantur, aegrotis ipsis adeo injucunda et ingrata evadunt, ut vix quisquam in eorum usu per debitum tempus persistere voluerit. Hoc autem remedium, non modo sine periculo, sed cum maximo beneficio, per longum tempus usurpari potest: Nullum damnum corpori infert, nec longo usu virtutes amittit, nec aegrotis injucundum sit; contra, varias ob causas, admodum jucundum est; nec corpus debilitat, sed plerumque maxime roborat. Denique, si ad morbum debellandum coeli mutatio sola non sufficiat, auxilium petendum est ab omnibus aliis remediis quae in patria profuissent. Omnia enim sub coelo feliciore reperiuntur, et saepe etiam efficaciores redduntur.

Sunt autem morbi quorum causae proximae vel incertae sunt, vel prorsus latent, etiamsi causae eorum remotae, tam praedisponentes quam occasionales, satis pateant. Et medicorum observationibus constat, multorum morborum causas remotas, excitantes acque ac praedisponentes, ex effectibus coeli nostri ariri. In regionibus frigidioribus, nimirum, dispositio ad morbos inflammationem habentes, quae plerumque diathesis phlogistica vocatur, praecipue quidem tempore hiemali aut verno, inter omnes fere incolae obtinet. Sed in regionibus calidioribus, sicut apud nos in tempore aestivo, haec dispositio multo rarior est. Summo jure itaque expectandum est, dispositionem istam, qualiscunque sit, coeli mutatione vel prorsus tolli, vel magno opere levari.—In regionibus frigidis quoque, praesertim in his quas coelum nubilum, humidum, et obscurum urget, vires omnes, tam animi quam corporis, languescunt et debilitantur: Corpus debile, languidum, et



torpidum evadit; animus autem segnis, hebes, tardus, et ad tristitiam magis quam ad hilaritatem proclivis. Hinc, ut polius locus erit ostendere, dispositio ad morbos quosdam nascitur. Omnibus autem notum est, rem longe aliter se habere in regionibus temperate calidis, siccis, et serenis, quorum incolae, plerumque saltem, magna corporis alacritate, et pari animi hilaritate, gaudent. Facile igitur credendum est, peregrinationem in tales regiones pravam istam dispositionem maxime corrigere et emendare, aut fortasse prorsus tollere. Alteram commoditatem, quae quidem summi est momenti, coeli mutatione pro certo consequimur: Multorum nempe morborum causas occasionales praecavisse. Omnibus notum est, multos gravesque morbos in hac insula grassantes a sulstis tempestatis mutationibus originem ducere. Periculum ex hoc fonte proveniens via aliter evitandum est, nisi peregrinatione in regiones temperatas, ubi tempestas etiam hiemalis subtilis istis varietatibus minime obnoxia est. Coeli itaque mutatione omnes causae quorundam morborum remotae, ex effectibus coeli nostri provenientes, evitantur vel minuuntur: Et nemo ignorat, quantum intersit, ad omnes fere morbos medendos, causas eorum remotas quam primum tollere. In multis casibus, quando causae remotae tolluntur, morbus, nullis adhibitis remediis, brevi tempore sanatur: Vires scilicet naturae medicatrices, omnibus impedimentis sublati, per se ad morbi curationem sufficiunt. In aliis quidem, corpus tantam perniciem a causis remotis accipit, ut licet hae tollantur, non nisi longo tempore, et idoneorum remediorum usu, ad pristinam sanitatem restituatur. At, etiam in his casibus, idem medendi consilium, ad causas remotas tollendas, locum habet; morbi enim sanatio neutiquam expectanda est, dum causae ejus manent, et perniciem, quam primo fecerunt, indices renovant et augent.

Denique, sunt remedia quae corpus humanum eodem fere modo quo coelum calidum afficiunt. Balneum scilicet tepidum, diaphoretica mitiora, praesertim diluentia, vestitus plenior et calidior, praecipue indusium laneum, frictiones, exercitatio crebra et modica, perspirationem excitant, et aequalem fluidorum distributionem promonent. Multum itaque hujus generis remedia in variis morbis proficiunt: Ut et calor modicus, qualis in hac insula tempore aestivo obtinet; et quum coelum moderate calidum eodem effectus habere observatur, in regiones tali coelo gaudentes suscipere peregrinationem, quam maxime rationi con-

consentaneum est. Hoc modo, ex analogia remediorum effectuum, mutationem coeli in multis morbis magnum polliceri auxilium, optime colligendum est.

Postrema, ex sedula observatione rerum in morbo aliquo latentium, satis colligi potest coeli mutationem utilem fore. Exempli gratia, aer frigidus, respiratione in pulmones receptus, pectore laborantibus tussim saepe movet. Haec vero morbum augeat. Arthritici quoque, ex eadem causa (sere scilicet frigida) haud parum saepe patiuntur incommodi. Aegri autem huiusmodi incommoda evitare nequeunt, nisi in alias regiones transeant; nam si in hac insula manent, aëri nocenti quotidie exponuntur. In his itaque et similibus casibus, experientia docet, aliquid esse in nostro coelo aëris inimicum; et, etiam si non causa sit morbi, optime tamen eandem colligendum est coeli mutationem auxilio fore, quia magnum incommodum, et periculum vix aliter evitabile, facile summooveret.

Ob has praecipue causas, ni fallor, coeli mutatio, itinere in regiones caelo temperate calido, secco, sereno, et aequali gaudentes, facta, multis morbis in hac insula grassantibus maxime prodesset. Observandum tamen est, quicquid beneficii aegroti ex ista peregrinatione percipiunt, non soli aëris coelique mutationi tribuendum esse; quippe aliud remedium, idque vix minus efficax, in multis saltem morbis, simul adhibetur: Nempe, modica per longum tempus exercitatio. Aegroti nostri, quum coelos mitiores petunt, iter longum saepe per plures septimanas perficere coguntur, et omnes medici norunt, hoc magnum quidem effectum, et saepe quam maxime salutare, in corpus humanum producere. Est, in hac dissertatione de coeli mutationis effectibus, non de virtutibus exercitationis proprie agendum; tamen minime a re alienum puto, de his etiam pauca dicere. Ad argumentum enim nostrum aliquo modo pertinet; et de exercitationis effectu semper cogitandum est, quandocumque coeli mutationem susdemus; quippe nimirum ambo ex necessitate simul junguntur, eodemque fere effectu, plerisque saltem in casibus, in corpus humanum edunt. Et ratio et experientia satis docent, modicam et diuturnam exercitationem, qualis est in longo itinere perspirationem et sudorem ad superficiem determinationem promovere. Et nihil dubito quin multi aegroti ex hoc solo exercitationis effectu magnum levamen perciperint: Ni fallor, multae morborum sanationes huic tribuendae sunt, quae vulgo aëris mutationi imputantur.

Quando coeli mutatio pro remedio tentanda est, quaesilio

ſio naſcitur. Utrum aegrotus per mare, an per terras, iſer  
facere debeat? Ex obſervationibus multorum medicorum,  
tam veterum quam recentiorum, ſatis patet, navigationem  
ipſam in pluribus morbis haud parum proſuere. Clarifi-  
mus Gilchriſt, paucis abhinc annis, pulcherrimam diſſe-  
rationem edidit de navigationis uſu medico, qua plane  
oſtendit, navigationem remedium eſſe, et quidem in plu-  
ribus morbis efficaciffimum. Multarum aegrotantium hi-  
ſtorias traſiſit, qui plane hoc remedio, quaſi ex ipſis Orci  
ſaucibus, abſtriciebantur. Variæ res, quæ in navigatione  
obſervant, procul dubio ad iſtum eſſectum conducunt: Et  
minime negarem, æris maſini humiditatem et æqualem  
temperiem, et vapores ſalinos, aliæque dotes, operi ſer-  
poſſe. Mea autem ſententia, quicquid boni ex navigatione  
percipitur, ipſi exercitatiōi præcipue imputandum eſt.  
Gilchriſtus pulcherrime oſtendit, exercitatiōem, et qui-  
dem ſatis validam, a navigatione oriri, præſertim ſi navis  
parva fuerit, et mare iurgidum. Oſtendit etiam, hanc  
exercitatiōem commoditates quaſdam ſibi proprias ha-  
bere, et, in quibuſdam caſibus, omnibus aliis exercitati-  
onibus longe præſtare. Sæpe quidem, præter exercita-  
tiōem, aliud remedium navigando obtinetur, nempe,  
æſtutudo iſta marina dicta, quæ nauſeam et vomitum  
ſæpe exaltat. Hæc magnos habet eſſectus, et in pluribus  
morbis uſiſſimos. Medicis jamdudum innotuit, nauſeam  
et vomitum apprime utiles eſſe ad perſpirationem excitan-  
dam, et debilitum fluidorum motum ad partes externas pro-  
movendum vel reſtituendum. Magnæ etiam vi pollent ad  
expectorationem promovendam, ſi pulmones colluvie ali-  
qua graventur. Huiuſmodi autem nauſea, non niſi ſola  
navigatione per longum tempus adhiberi poteſt; ſed hoc  
modo, per plures dies, vel per integras ſeptimanas, haud  
raro excitatur. Et experientia docet, nullum exinde peri-  
culum aut detrimentum oriri. Vix tamen credo, ſimilem  
nauſeam, ſive emeticorum quæ arte comparatur, per ali-  
quod tempus ſine damno, excitari poſſe; patet ſaltem me-  
dici experimentum fuaderent, et nulli aegroti tali conſilio  
obtemperarent, ſed a remedio adeo deteſtabili abhorrent.  
Poſtquam nauſea ceſſaverit, homines navigationem faci-  
entes plerumque optima ſanitate fruuntur; et maximam  
cibi appetentiam ſentiunt, eſi nullam ſere exercitatiōem  
habent, præter ipſum navis motum. Hiſc motus, ut recte  
notavit Gilchriſt, tanquam geſtationis ſpecies, exercitati-  
onis munere fungitur, et debilitum fluidorum motum pro-  
mover. Præterea, altera et vera exercitatiō navigando



perficitur: Nam, prout navis fluctuat et jactatur, consentaneus corporis motus requiritur, ut corpora positio et liberamen secretur: alius enim nemo movere, et vix stare vel sedere, potest. Ad hunc motum perficendum, omnium fore corporis muscularum exercitatio modica, crebra, et vix sensibilibus, requiritur, et haec exercitatio sine ulla intermissione perficitur; ita ut quandoconque aliquis navigationem facit, etiam si in lecto decumbat, vel dormiat, exercitatione vel gestatione saltem utitur. Quicquid igitur boni ab exercitatione aequali, moderata, et continua, in morbo aliquo percipitur, a navigatione, prae omnibus aliis exercitationibus, jure expectandum est. Nequaquam ignoro, huc remedium in pluribus casibus incassum tentatum esse: Novi autem in aliis optimos effectus ex eo perceptos fuisse. Et, si quis in animo fecerit perpendat, in quibus casibus plerumque adhibitum fuerit, neutiquam mirabitur non semper ad vota successisse. Vix unquam enim tentatum est, nisi in morbo admodum periculoso, et haud raro profus insanabili, phthisi scilicet pulmonali: Et saepe aegri, non nisi in extremis morbi statibus, navigationem susceperunt. Et omnibus medicis notum est, istum morbum, ubi diu permanferit, perniciosam fere immedicabilem pulmonibus intulisse.

Nemo ignorat, alias exercitationis species, equitationem nempe, vel gestationem in curru, quibus multi scriptores medici, et praecipue Sydenhamius, tantas laudes tribuere, esse interdum feliciter succedant, saepe frustra tentari. Magnam autem commoditatem, prae omnibus aliis exercitationibus, navigatio possidet; nimirum, quod in multis casibus usurpari potest, ubi omnes aliae, propter aegri debilitatem, prohibentur. Haec enim adeo levis mitisque est, ut plerumque ipso aegro vix sensibilibus sit; et ab aegrotis, quantumvis indolis, sine periculo tolerari potest. Nonnulla quidem exempla sunt, ubi aegri, jam morbo fracti, et adeo debiles ut sese movere nequirent, in navem portati, perfectu itinere, vires et sanitatem recuperaverunt. In his itaque casibus, ubi aegri nec equitationem, nec gestationem in curru, tolerare possunt, ideoque iter per terras facere nequeunt, procul dubio navigatio tentanda est. At, ubi aegri peregrinationem in regiones idoneas per terras suscipere possunt, dubitari potest, utrum navigatio ex proposito anteponenda sit. Si longa fuerit, multa incommoda ex ea nascuntur, praecipue pro ratione dietae: nonnulli enim aegri dietam ex lacte et frugibus consuetam requirunt, quae longa navigatione via obtineri potest, et hominibus,

minibus, vitae molliori affueris, incognita navigationis metum et fatidum inveniunt. Rē viā aulem affertis, cetera navigationis beneficia haec incommoda compensare. Nec negandum, iter per terras in cursum perfectum optimos effectus, et his ex navigatione provenientibus similes, habere. Homines igitur, quibus opes integre copiam iam, et vires sufficientes relictas, iucunditatem aliam persequi licet, iterque per terras facere. Aliis quibus res angustiae domi, aut corpus profus debilitatum, illam optionem prohibent, remedium non minus efficax navigatione porrigitur.

Denique, quaestio adhuc manet: Ubi coelum mutare convenit, quatenus loca maxime idonea sint? De cominodis aut incommodis variorum locorum nihil certi statuere audeo; quippe in his rebus equidam minime versatus sum. Coelum temperatum, serenum, firmum, in pluviae saltem exibus, et aequale, requiritur. Regionis Europae Australes, Hispania, Italiae major pars, et Galliae partes Meridionales, tali coelo gaudent, ut et Madeira, et Insulae Bermudae.—Postea locus erit pauca tradere, de usu quem medicus ex aëlo etiam feruissimum capere possit.

His rebus praefatis, nunc de quibusdam morbis ex coelo nostro provenientibus magis speciatim tractare licebit. De omnibus ex hoc fonte dimanantibus, nebulam in animis fuit disceptare. Sufficiat aliquid perpendere, de illis morbis in quibus coeli mutatio maxime prodest, et quorum periculum aut incommodum hoc auxilium praecipue potulant.

Morbi, qui casti nostri effectibus tribui possunt, variant secundum aetatem aegrotantium. In juventute, morbi pectus afficientes, quorum haemoptysis, et phthisis pulmonalis saepe ex ea proveniens, sunt principes, plerumque occurrunt. Aetate provectiore, hi morbi rarius observantur; et tunc succedunt varii morbi viscerum abdominalium, et praecipue ventriculi, et ex his saepe oriuntur, vel saltem cum his saepe iunguntur hypochondriaci et arthritici. Aetate ulterius ingravescente, et viribus omnibus iam deficientibus, aëli intemperies hominem debilitat, et senem fere confectum, opprimit, innumeris malis ex omni parte disructis, vitam aeternam reddit, et mortis gradum festinat. Hanc naturalem morbum ordinem in sequentibus observare statimur; et igitur a Phthisi Pulmonali, quae in adolescentia plerumque occurrat, incipere oportet.

## PHTHISIS PULMONALIS.

Nulla fere caeteris in hac Insula grassatur, Phtisis Pulmonalis magis attentionem meretur, five vastationem ejus spectamus, five illos qui facilius ejus obsequuntur. Si tabulae mortuorum Londinensibus sales habenda sit, quarte pars nostrorum phtisi perituri. Et haec generis humani strages immanis in juveniles praecipue cadit, saepe in summos, praecipue sequioris sexus, et in eos qui ingenui, et animi et corporis elegantia, praestant. Sed, si tanta luctuosa jactura ab uno solo morbo non credenda sit, ponamus tabulae Londinensis etiam in duplum crescere, magna adhuc et quidem aspersio hominum strages phtisi impotenda erit. Si aperire prorsum esset calculus instituire, nequaquam difficile foret ostendere, phtisim pulmonalem in Magna Britannia viginti et quinque millia hominum quotannis necare. Clarissimus Hydeohamius opinionem non longe ab hac alienam de hoc morbo proposuit: Nempe, quod phtisis pulmonalis dum aetates virum, quos morbi chronici jugulant, interficeret. Alio loco statuit, morbos chronicos tertiam fere hominum partem necare: His itaque proportionibus positis, patebit phtisim pulmonalem quadraginta millia hominum, et amplius, in hac Insula quotannis absumere. Sed nihil opus est de hujusmodi vastationibus disceptare. Pauci sunt quibus cognatis famularet, aut amici, hac peste abrepti, non sunt lugendi. Misera haec tabes, saeva, atrox, et insensibilis, teneros et amabiles depascens, caede et luctu patriam implet.

Nostrae Insulae phtisis pulmonalis morbus endemicus habetur; nec immerito: Quippe nulla fortasse regio in orbe terrarum est, qua tantam caedem facit. Omnes medici latentur, in plerisque saltem casibus, remedia etiam efficacissima huic morbo frustra addideri: Et, ubi phtisis inveteravit, plerumque desperatur. Etiam phtisim incipientem sinare, vel praecavere, opus precarium et difficile est. Nullum autem remedium in hoc morbo melius successit, quam anni mutatio, itinere in regiones calidiores tempore facto. Quicquid igitur in morbo adeo periculoso auxilium pollicetur, summa attentione dignum est. De ejus agendi modo, nunc est inquirendum; et ex observatione symptomatum, et causarum morbi, tam proximarum quam remotiorum, et ex analogia rerum juvenium, indagandum quomodo remedium illud proficiat.

Phtisis pulmonalis his signis plerumque dignoscitur:

Uti-



Universi corporis morie lento, constante febre hectica, sensu pondere, aut stricturae, aut dolores in pectore, ipsius induratio, tussis crebra et molestia, initio heca, postea cum spatio plerumque purulento. Signa quae phthisi incipientem denotant, variant secundum causas unde morbus nascitur, veluti peripneumoniam, catarrhum, haemoptylum, &c. Causa proxima hujus morbi satis incerta; Cuiusmodi scilicet hominum phthisi mortuorum fere semper videntur tubercula, ramices, ulcerationes in pulmonibus, quibus istud viscus interdum magna ex parte consumitur. Dico haec fere semper obtinere; vix enim illud audeo rem ita semper se habere; sunt enim medici, nec parvi nominis, qui strenue contendunt, nullum ulcus nec aliud malum visibile interitum reperiri posse in pulmonibus eorum qui spatum purulentum copiosissimum, caeteraque phthisicos signa habuerunt, et qui phthisi plane mortui sunt. Huiusmodi autem exempla rarissima esse, odores consentiunt, et veram phthisin ab ulcere, vel potius ab ulceribus, in pulmonibus oriri fatentur. Sectiones quidem cadaverum satis ostendunt, in plerisque casibus, non unicuique ulcus aut tuberculum morbum facere, sed plura quae continuata serie in inflammationem et suppurationem abeunt. Et, cognita itaque causa proxima morbi, indicatio curativa oritur, tubercula resolvere, vel, si jam in suppurationem abierunt, ulcerationes quas primum sanare. Hoc autem, naturae beneficio, non medici auxilio, perficiendum est. Et nihil video unde colligi possit, coeli mutationem ad hunc effectum utilem fore. Si corporis habitus caetera sanus est, ulcera, in quavis corporis parte, ab ipsa natura facile plerumque sanantur, et hanc sanationem medici quidem facile impedire possunt, vix autem promovere. Nulla enim remedia novi, quae salutiferi illi processui vi aliqua specifica faveant. Satis notum est, multa remedia quae hoc consilium adhibentur contrarium prioris effectum habere, et non modo non prodesse, sed saepe maxime nocere. Quae sunt balsama, tam nativa quam arte comparata; Et haec ideo hodie rarius usurpantur.

Sunt tamen ulcera quaedam prava, quae et medici et chirurgi auxilium requirunt; et multa ulcera non sponte sanabilia, idaneis remediis adhibitis, facile curantur. Faci ratione, in ulcere pravo et pertinaci, pulmones depascente, varia remedia tentanda sunt. De agendi modo remedium in ulceribus externis opem ferentium, ratio facile dari potest. In duas classes se sponte dividunt:—In externa

terna et localia, quae ulceri immediate adhibentur, idque solum afficiunt:—Et in interna, et generalia, quae in universum habitum agunt, et ulceri tantum profunt, quantum labem aliquam totum corpus infestantem summovent. Priora maximae saepe utilitatis sunt, ad statum aliquem ulceris curandum, quem experientia ostendit ejus sanationi obesse. Incisiones, exempli gratia, vel escharotica, ad carnem fungosam consumendam, vel partes callosas tollendas, vel novam et benignam suppurationem inducendam, quae ad ulceris sanationem plane requiruntur. Hujusmodi autem remedia phthisicis adhibendi facultas non est; et, etiamsi adhiberi possent, nulla novi signa quibus ulcerum status ita deprehenditur, ut hoc vel illud remedium requiri monstraretur.

Altera remediorum classis (generalium, scilicet, et internorum) haud minore vi pullet ad ulcera illa sananda, quae a labe aliqua generali proveniunt. Qualia sunt ulcera syphilitica, aut scorbutica, quorum sanatio a remediis mere localibus frustra plerumque expectaretur, nisi simul remedia interna, et generalia, ad morbos istos medendos idonea, sedulo adhiberentur. Pari ratione, igitur, in hoc morbo ab ulceribus aegre sanandis proveniente, remedia adhibenda sunt ad labem illam medendam, quaecumque sit, quae ulcerum sanationem impedit. Sed, ut hoc recte perficiatur, morbi causas remotas indagare oportet. Non multis opus erit verbis ostendere phthisin, a mera pulmonum lésione, vel etiam a suppuratione, plerumque saltem, non oriri, nisi prius labes aliqua in eis, vel in universo corpore, exstiterit. Qualis sit ista labes, postea indagandum erit. Notum autem est, hunc morbum plerumque post haemoptysin supervenire; ita ut, quodocumque juvenis sanguinem a pulmonibus excreverit, desperetur. Interdum etiam phthisis peripneumoniam vel pleuritidem male tractata, et in suppurationem terminata, insequitur. Nonnunquam etiam, licet rarius, a magna aliqua vi externa, pectori aut ipsis pulmonibus illata, phthisis oritur. Ex his igitur observationibus remere colligebatur, pulmonum lésionem quaecumque suppurationem pravam, et ulcus insanabile, idemque phthisin lethalem, producere. Rationem hujus perniciosi medici, a natura et fabrica pulmonum, eorumque nonnere, petebant. Observabant itaque, sanguinem per pulmones magna vi et copia fluere, et ipsos perpetuo motu, respirationis nempe, agitari, qui vulneris sanationem, partes ejus a se invicem detrahendo et irritando, impedire credebatur. Denique, aliam etiam rationem

ex analogia ulcerum externorum adducebint, quae aegro sanantur quando aëri exponuntur. Aër autem in omnes pulmonum partes recipitur; si quae igitur ulcera in his sunt, ex necessitate aëri perpetuo exponuntur. Haec autem omnia ad difficultatem solvendam neutiquam sufficiunt. Motus singularum partium pulmonum semper parvus est, et, nisi plena inspiratione, vix sensibilis: Haud itaque probabile videtur, hunc tantam perniciem ferre. Et nihil fore aëris admissioni tribuendum est; quippe, et si in pulmones recipitur, nequaquam his immediate applicatur: Pulmonum enim superficies interna mucō semper tegitur, qui vulnus quodvis ab aëre facile defendere potest. Notum etiam est, canes, multaque alia animalia, vulnera externa, lambendo, sanare; quippe nimirum saliva, et mucus cum ea commistas, vulnera ab aëre satis defendunt. Omnia itaque argumenta, quae ostendant laesionem pulmonum phthisin facere debere, pro nihilo habenda sunt: Et praeterea, experientia satis ostendit rem non ita se habere. Innumera enim exempla sunt, ubi, post manifestissimas pulmonum laesiones, imma et suppurationes, nulla phthisis insequabatur. Multi haemoptysin saepe passi sunt, nulla unquam phthisicos signo superveniente. Multi, post peripneumoniam male curatam, suppurationem magnam in pulmonibus habuerunt, quae, pure per sputum rejecto, brevi tempore sanabatur. Denique, exempla quotidie occurrunt, ubi pulmones a vi externa laeduntur aut vulnerantur; phthisis autem raro exinde nascitur. Si vulnus magnum est, subita morte omne phthisicos periculum satis praevenit: Si leve est, brevi tempore sanatur. Exemplum quidem singulare est, ubi vulnus in pulmonibus remedium fuit, potius quam causa phthisicos. Praefectus militaris, qui phthisi pulmonali laborare credebatur, praefectus vulneratus est, globulo plumbeo per pulmones transmissa. Hoc remedium, asperum quidem et periculosum, optime successit; et homo, per multos jam annos vixit, et adhuc vivit, ab omni phthisicos symptomatic liber. Ideoque, ut suppuratio pulmonis curetur, nullis remediis opus est, quae ulceris ipsius sanationem directe promonent, si quae sint tali virtute praedita: Et nihil in ulcere ejusmodi videmus coeli mutationis agens. Medici auxilium tantummodo requiritur, ut morbus iste, sive pulmones solos, sive universum habitum infestans, qui ulcus insanabile reddat, quam primum tollatur: Hoc sublato, ulcus facile sanabitur. Ulceris enim in pulmonibus, sicut in aliis corporis



partibus, sanatio, omnibus impedimentis sublatis, solo naturae beneficio perficitur.

Hæc omnia, ni fallor, plane demonstrant, meram pulmonum læsionem, vasisque in eis rapturam, alius insanabile et phthisin nequaquam inducere, nisi prius pulmones, vel universus corporis habitus, labe aliqua corrupti fuissent. Sed natura hujus labe tantum ex observatione morbi cognoscendum indaganda est. Experientia itaque docet, peritissimos maxime opportunos esse qui labem congenitam a parentibus acceperunt; qui, ætate pubertatis jam præterita, ætatem 25 nondum attigerunt; quorum habitus gracilis et debilis est, et thorax arcuus et angustus, et spina docti deformis, et humeri prominentes alarum instar; qui ceterum albam, et lævem, et colorem vultus eximium, qui linguam collum, vocem debilem, et sæpe ex levibus causis tussim, et temperamentum sanguinem-phlegmaticum, habent: Denique, quibus inest dispositio scrophulosa vel hæmorrhagica, et qui catarrhis admodum obnoxii sunt. Hæc signa debilem quidem universi corporis habitum monstrant: Pulmonum autem pravam fabricam præsertim notant. Præcipuæ tamen et frequentissimæ phthiseos causæ alitres, ni fallor, redigi possunt; scilicet, dispositionem scrophulosam, hæmorrhagiam, et cancrum: Ex quacunque horum morborum nascatur ostendere conabor, cæli mutacionem magnū auxillium polliceri.

Omnibus jam medicis sanotuit, a dispositione scrophulosa hanc perniciem frequentissime oriri. Peritissimus Mead, multis abhinc annis, istam sententiam proposuit, Sydenhamius quidem observationem satis memorabilem delinquit, quæ hanc suggerere videbatur; nempe, quod in nonnullis phthisicis equitatione sanatis, illo morbo cessante, tumores in glandulis colli, styumque quoniam maxime referentes, observabantur. Nullie autem nullæ de hac re apud medicos dubitatio esset: Observatumus satis comportum est, scrophulosos præ omnibus aliis phthisi obnoxiosos esse, et maximam partem phthisicorum hanc dispositionem plane habere. Sunt quidem medici, nec parvi nominis, qui, ex ventum aegrotis phthisi absumptis, nonaginta ad minimum scrophulosos esse, ponunt. Præterea, magna certe similitudo et analogia est inter tubercula et ulcera phthisica in pulmonibus, et tumores abscessusque scrophulosos in cæteris corporis partibus. Eandem speciem externam, et, si cultro inciduntur, internam habeat, eandemque ipsitatem et duritiem: Eodem modo, a parvi initio ad moximum corpus magnam paulatim crescant, et plerumque sine magno dolore

lore aut molestia; tarde et aegre suppurant, et nunquam in suppurationem benignam abeunt, sed ulcera foeda et vix sanabilia relinquunt. Eodem anni tempore, ambo se ostendunt, hiemali scilicet aut verno; accedente aestate, levantur, aut dissipantur; at, reversa hieme, ambo saepe redeunt. Denique, in festinationibus cadaverum eorum quos serophula plane occidit, tumores serophulosi in omnibus corporis partibus, et tubercula in pulmonibus ejusdem speciei, haud raro reperiuntur; quod mihi his rebus vidisse contigit. Ex his omnibus facis patet, phthisin pulmonalem a dispositione serophulosa saepe oriri, et verum morbum serophulosum esse. Quapropter, ubi phthisis in iis occurrit, qui vel ipsi manifeste serophulosi sunt, vel a parentibus serophulosis nati, huic causae plerumque tribuenda est.

Fortasse quis credere potest, haud multum ad morbi sanationem conduciturum, hanc causam manifestissimis signis statuisse. Quippe nullus fere morbus serophula obscurior est, aut sanatu difficilior, etiam ubi partes externas occupat, quibus remedia idonea directe applicari possunt. Lamentissime quidem fateor, omnia fere remedia huic morbo frustra plerumque adhiberi. Et ex effectibus remediorum nequaquam colligere possum coeli mutationem auxiliari fore. Nec ex causa ejus multum colligi potest; quippe iis nihil fere obscurius est.

De causa proxima variae sententiae sunt: Alii morbum lymphae spissitudini aliisque vitiis tribuunt; alii putant vitium non in lymphis, sed in ipsius vasis lymphaticis, haerere, quae, variis ob causas, debilia, laxa, et praeter naturam ampla, credunt. Alii morbum oriri censent a materia aliqua murtida, sive in corpore genita, sive a parentibus accepta, quae, processu nondum explicato, a sanis fluidis fecernitur, et in quasdam partes, praecipue glandulas lymphaticas, deponitur. De his variis sententiis non hic est opus verba facere; nam, sive verae sive falsae sint, nisi accuratius indagantur, nulla indicatio curativa ex iis oriri potest quae coeli mutationem requirit. Nec melius intelligantur causae hujus morbi remotiores; nam, apud medicos nondum constat, utram diæta tenuis, ex frugibus similibusque maxime confecta, quali pauperum, et praecipue rusticorum, liberi utuntur, an diæta laetior et plenior liberorum opulentiorum, huic morbo magis opportuna sit. Neque audeo statuere, serophulam oriri ex effectibus alicujus coeli; quippe per totum terrarum orbem vagatur, et in omnibus regionibus, sive frigidis, sive calidis, sive temperatis, et in omni aevo, cognita est. Sed,

licet hæc pestis adeo universa sit, maxime tamen, ni fallor, in regionibus frigidis humidis grassatur, et in temperatis et siccis rarius occurrit. Ex observationibus quorundam medicorum nostrorum, qui in Italiam iter fecerint, hic morbus multo rarius est in Italia, quam in Insula nostra. In Hispania etiam rarius est, et vir pericillimus, qui apud medicum per plures annos Gadibus exeruit, mihi de hac re perquirenti retulit, se perpaucos illic vidisse hoc morbum laborantes, nec ullos rachitide tentatos, quam plures meliori huic morbo admodum affinem arbitrantur. Novi autem alios medicos asserere scrophulam in Hispania sæpius esse frequentem. Ex his itaque nihil certe colligere liceo, donec res accuratius indagetur. Sunt autem qui strenuissime affirmant, hunc morbum frequentius esse in Hiberniis, quam in Magna Britannia; et in partibus hujus Insule occidentalibus, quam in orientalibus: Quod nulli alii causæ, quam earum partium majori humiditati impotari potest. Et quidem in hac insula, quatenus colligere possum, frequentius est in locis humidis quam in siccis. Satis igitur verisimile est, scrophulam levamen aliquod accipere a peregrinatione in regiones siccas et temperate calidas. Hæc fortasse expectatio admodum incerta videbitur; at, ni maxime fallor, ex historia morbi, et analogia rerum juvenum et lædentium, magnopere confirmatur.

Est scrophula rara in pulmones incumbat antequam æger decimum quintum ætatis annum pertigerit, plerumque tamen multo citius in aliis corporis partibus, præcipue in glandulis colli, reperitur. Interdum quidem, nec raro, nullum scrophulae signum observatur, donec tubercula in pulmonibus formentur, et phthisis incipiat, quæ procul dubio ex hoc fonte proveniebat, quatenus ægri laborem congenitum habebant, quippe ex parentibus scrophulosi orti. Ubi scrophula in externis corporis partibus se ostendit, plerumque sit intra annum quintum et duodecimum; interdum, sed raro, a teneris ævibus miseros hæc pestis comitatur. Interdum etiam, sed admodum raro, ætate prævectiore apparet. Quando morbus solito tempore occurrit, plerumque circa ætatem puberem naturæ beneficio sanatur, et sponte evanescit, nec unquam ægrum pulvis verat, nisi mala fortuna in pulmones ruat, et phthisin faciat. Quomodo hoc beneficium perficiatur, scire me ignorare. Magnæ in corpore humano mutationes ex tempore producuntur, quæ nondum accurate intelliguntur: Plures autem morbi solis istis mutationibus prorsus



prorsus sanantur. Hac itaque remedium vix intelligere, et nevisquam imitare possumus. Aliud autem remedium in hoc morbo efficacissimum, non quidem arte compertum, sed naturæ beneficio suppeditatum, coeli mutatione imitari concessum est. Omnibus notum est, tumores serophulosos externos non semper in eodem statu manere, sed nunc augeri, nunc minui, interdum evanescere, et rursus postea se ostendere. Hæ mutationes ex variis anni tempestatibus oriri videntur. Strumæ plerumque circa solstitium hiemale incipiunt; tempore verno augentur; accedente autem æstate, incrementum eorum sistitur; æstate et autumnus evanescunt, vel saltem valde minuantur; reversa hieme, renovantur. Sæpe etiam, nisi remora suppurant, et ultra foeda faciunt, nullis remediis cedunt, donec, æstate accedente, sponte sanantur. At tubercula in pulmonibus, quatenus ex variis signis cognoscere possumus, eisdem effectus ex anni tempestatibus percipere videntur. Ager enim, tempore hiemali aut verno, sæpe tussim levem, frequentem, molestam, et siccam, cum difficultate respirandi, conqueruntur. Ex his signis, præcipue in serophulosis, phthisis semper metuenda est. Haud raro tamen sua sponte remittunt tempore æstivi autumno autem vel hieme redeunt, et, vere appropinquante, aegro mortem afferunt.

Nonne itaque satis verisimile est, tempus brumale omnibus ulceribus, et tumoribus serophulosis, ubicunque sitis, valde nocere? Nec omnino absumile est, coeli hiemalis intemperiem istorum malorum causas quasdam remotas, tam excitantes, quam prædisponentes, suppeditare. Et, si hoc credimus, pari ratione censendum est, æstatem, vel coelum temperate calidum, causas illas remotas tollere vel præcavere, ita ut, omnibus impedimentis ad tumorum resolutionem et ulcerum sanationem sublati, vires naturæ medicatricæ morbum vincant. Morbus, in constitutione latens, plerumque in partes debiles cadit. Aer autem temperate calidus respirationi favet, et pulmones roborat. Quis ergo censere impedit, coelum temperate calidum hoc modo phthisi occurrere, vel alio modo celato causæ morbi proximæ moderari? Sed, quomodocunque pestifera oritur, siue hiems morbi causas remotas præbeat, siue tantum morbo jam esistenti noceat, satis constat, periculum nullo alio modo evitandum esse, quam hiemis intemperiem fugiendo, peregrinatione in regiones calidiores facta. Si aeger in idoneas regiones iter faciat, illique per tempus satis longum commoretur, perpetua æstate per annum in-

coelum, vel, si opus fuerit, per plures annos, gaudere possit. Hoc modo omnia nostrae longae hiemis incommoda praeventur; et quicquid boni ab aestate nostra perciperetur, aestate ita ad arbitrium protrahenda, non modo saluum praestari, sed maxime etiam augeri, expectandum est. Et quidem mihi nequaquam absurdum est expectare, si aestas per quatuor menses durans tanta vi pollet, ut ulcera serophulosa sanare, et tumores resolvere, et denique morbum per plures menses fugare possit, aestatem perpetuam non modo per longum tempus morbi reditum praevenire, sed etiam totum corporis habitum mutare, et dispositionem serophulosam radicibus extirpare, ita ut omne periculum phthiseos serophulosae postea supervenientis prorsus praecaveatur. Nec his argumentis obijciendum est, serophulam in regionibus calidis interdum reperiri. Notum enim est, coelum multo majorem effectum in peregrinos habere quam in nativos. Corporis constitutio, certo calori assueta, exinde nec multum fert incommodi nec incommodi. Si igitur calor morbi est remedium, major ejus conserto gradus adhibendus est; et forsitan nihil aliud ad serophulam Hispanicam medendam requiritur, quam in coelum adhuc fervidius peregrinatio.

Haec omnia magnopere confirmantur observatione effectuum quos experientia ostendit coeli mutationem habere in phthisi incipiente medenda, aut praevenienda. Multi nostrorum quatuordecim qui omnia signa habent tuberculi incipientis in pulmonibus, instante hieme, coelos mitiores petunt, ibique manent per hiemem unam vel alteram. Nonnulli a morbo prorsus liberantur, et in patriam sani et robusti redeunt, nec ulla postea phthiseos signa percipiunt. Alii autem, qui unam tantum hiemem peregre morati sunt, in patriam redeunt, sese credentes sanos et incolames: At, prima hieme, morbum pristinum corripiuntur, et brevi tempore pereunt. Cum igitur coeli mutatio tanta vi pollet in hoc morbo medendo, ut tubercula jam formata tollere et resolvere possit, a fortiori, eorum formationem praevenire debet. Et ita res se habere. Nam, in regionibus calidioribus, etsi serophula nonnunquam occurrat, phthisis pulmonalis raro observatur. Expectare ergo aequum est, serophulosos nostros, in tales regiones ante aetatem phthisicam transvectos, a phthisi immunos fore. Ex his omnibus satis manifestum mihi videtur, coeli mutationem optimos polliceri effectus, et ad sanandam et praeventandam phthisin pulmonalem ex serophula ortam. Aliebam vero adeo periculosum praecavere praestat, quam

jam

jam inchoatum aggredi.—Eruditiſſimus Mead ſimilem ſententiam de aëli mutationis uſu, in phthiſi ſerophuſoſa præcavenda, jam dudum ſtatuit, in elegantiffimis ſuis *Monitiis* et præceptis medicis. Verba ejus hæc referam: *‘Cœlum quoque mutare ſæpe in ſalutem cedit, imprimis ſi morbi (ſerophulæ ſcilicet) in pulmones ruſturi ſit metus; ita tamen ut regionem, nec calidam nimis, nec frigulam; nec tempeſtatibus mutationibus inſalubrem, petat aeger.’* Sub tanti nominis auctor ſententiam meam cum fiducia repono; nec pudet meas ſaltem conſeſiones hoc modo ſalvas reddidiſſe.

De beneficio, in phthiſi ſerophuſoſa, ab ipſa itineris exercitatione exſpectanda, nihil a priori ſtatuerè audeo. Exempla verò a Sydenhamio recensita oſtendunt, exercitationem in hoc morbo optimos effectus habere. Ideoque, in hoc, uti in pluribus aliis morbis, ab ipſa itineris exercitatione levamen et auxilium exſpectari poteſt.

Altera, et non infrequens cauſa phthiſeos, in hac ſaltem Inſula, eſt hæmoptiſis. Quomodo autem phthiſin producat, penitus explicare non ſuſcepiam; ſed, quom experientia docuit, phthiſin pulmonalem hæmoptiſin plerumque inſequi, nihil dubitavi, hanc cauſam eſſe phthiſeos, poſuiſſe. Quidam medici, ut ſupra notavimus, opinantur, meram vaſis ſanguinei rupturam, qualis in hæmoptiſi, plerumque ſaltem, ſit, ulcus inſanabile et phthiſin inducere; quippe, per vehementem ſanguinis in pulmonibus curſum, eorumque motum continuum in reſpiratione, et liberum aëris aditum, vulnus apertum ſervatur, et ſanatio ejus in perpetuum impeditur. Argumenta quibus hæc opinio reſellitur, non opus eſt repetere. Experientia ſatis evincit, phthiſin nec ex mera vaſis ſanguinei in pulmonibus ruptura, nec quidem ex ſola ſuppuratone, in plerisque ſaltem caſibus, provenire, ſi modo iſtud viſcus antea ſanum fuerit. Alii, aliam morbi cauſam, et quidem magis probabilem, propoſuere: Sanguinem nempe in pulmones, ex ruptis vaſis effuſum, non omnem tuſſi rejici, ſed aliquantum ejus in pulmone manere, ibique corrumpi, partesque vicinas irritare, et erodere, et tandem ulcus ſocium et inſanabile producere. Nihil dubium quin magna perniciæ pars ex hoc fonte proveniat: Attamen, ni fallor, iſtud maxime raro accidit, niſi prius pulmones labe aliqua infecti fuerint. Nam, in cæteris corporis partibus, modo habitus ſanus et robuſtus ſit, ſanguis in telam cellulolaſſam effuſus, ſine ullo damno aut periculo, brevi tempore abſorbetur. Vidi, poſt venæſectionem imperite factam, brachium



um a capite usque ad humerum livido colore suffusum. Nulla tamen suppuratio aut gangraena exinde orta est; sanguis ipso evanuit, ita ut, post viginti dies, nullum morbi vestigium relinqueretur. Saepe etiam in pulmonibus nulla ulcera post haemoptysin formantur; quoniam vix probabile est, omnem sanguinem in pulmones effusum cuncti excreari. Si igitur nulla talis perniciēs post haemoptysin oritur, verisimile est, sanguinem effusum, et non spuito rejectum, vas inhalantibus absorptum fuisse. Sed si, qualemcumque ob causam, hoc non perficitur, facile crederem, ulcus caeteraque mala oriri a sanguinis corruptione in cellularum pulmonum effusū. Praeterea, talis in pulmonibus suborta nullam crebram procul dubio excitaret, qua nihil magis ad phthisin faciendam conducit, ut postea locus erit exacerare.

Nonnulli sunt qui docent, haemoptysin nequaquam esse causam phthisicos, sed tantummodo causae ejus signum et effectum. Phthisin a tuberculis in pulmonibus oriri credunt, quae diu adfuerint antequam haemoptysin inciperet, et quae istum morbum, vel potius symptoma, induxerint, ille affirmant, vasa scilicet sanguinea sua mole ita comprimendo, ut sanguis in pulmones, vel per transudationem, vel ex ruptis vasculis effunderetur. Sectiones etiam cadaverum plane ostendunt, tubercula, sive scrophulosa, sive ex aliis causis orta, phthisens causam frequentissimam esse, aut saltem cum comitari; et observationibus constat, tubercula in pulmonibus, ex aliis causis, praeterquam dispositionem scrophulosam, oriri. Opifices quidam, ex artificiorum natura, pulveri admodum exposti; exempli gratia, qui farinae molenda, lapidibus caedendis, lino carminando, aliisque similibus, occupantur, tuberculis in pulmonibus, et phthisi pulmonali, maxime obnoxii sunt; nec hoc alii causas imputandum est, quam pulveri quem in pulmones quotidie hauriunt. Minime tamen credere possum, phthisin post haemoptysin non oriri, nisi prius tubercula in pulmonibus adfuerint. Saepe enim, in cadaverum sectionibus hoc morbo mortuorum, ingens ulcus reperitur, nulla autem tubercula; multi etiam aegri phthisi post haemoptysin insecuta absumuntur, qui, antequam haec invaserit, nulla unquam signa tuberculorum exhibuerant. Interdum quoque, post peripneumoniam male tractatam, et in supurationem terminatam, vera phthisis pulmonalis insequitur, etsi nulla antea tuberculorum signa adfuerint. Et interdum, licet rarius, phthisis nascitur a magna si externa pulmonibus illata.

Ex causis itaque haemoptyscos, tam proximis quam remotis, et a statu non modo pulmonum sed totius corporis, qui tam praecedat et comitatur, ratio petenda est, cui phthisis pulmonalis haemoptysin insequatur.

Medicorum observationibus satis constat, dispositionem ad haemoptysin saepe a parentibus accipi: hinc patet motum non a levi aliqua et fortuita causa originem ducere, sed a fabrica et constitutione speciali, sive pulmonum, sive universi corporis. Notum enim est, parentes saepe temperamentum, et conformationem specialem, in prolem transmittere: Et, in multis saltem casibus, a pectoris deformitate plane videmus, pravam pulmonum structuram obtinere. Utrunque talis structura obtinet, pulmones nequaquam ite distenduntur, et sanguinis motus in eis impeditur; hinc distributio abnormis et congestio, quae vasa sanguinea debilitat, et distendit, et rupturae obnoxia reddit. Multae causae excitantes, quae haemoptysin saepe faciunt, sanguinis congestionem in pulmonibus plane inducunt. Exempli gratia, exercitatio violenta, vel virus corporis ingens, veluti in cursu, vel in magnis ponderibus levandis, tussis vehemens, clamor, cantus, &c. Antequam etiam sanguis erumpit, manifestissima signa determinationis abnormis, et congestionis sanguinis in pulmonibus, ferre semper observantur: Scilicet, sensus ponderis, aut caloris, aut molestiae, aut doloris in pectore, et rubor genarum. Erumpente sanguine, haec omnia sponte, et plerumque brevi tempore, evanescunt; et saepe, sanguinis missione tempestive facta, haemorrhagis omnino praecavetur. Observatur etiam, signa constrictionis spasmodicae vasorum extremorum haemoptysin antecedere et comitari. Interdum a subita externarum partium refrigeratione, praecipue corpore prius calente, haemoptysis nascitur: Et omnibus medicis notum est, nihil magis ad hanc praecavendam vel sanandam conducere, quam debitam fluidarum determinationem ad corporis superficiem promovere vel restituere. Satis itaque patet, sanguinis determinationem abnormem et congestionem in pulmonibus haemoptysin producere; et ideo nunc est inquisendum, quomodo distributio ista abnormis nascatur, et cur sanguis majori copia in pulmones ruat.

Haemoptysin, experientia docet, iis praecipue occidere qui victu pleno uruntur, qui ex agiliore vitae genere in otiosum et sedentarium transierunt; maxime omnium tamen, is quibus aliae solitae excretiones, praesertim sanguinae, sive naturales, sive praeter naturam existentes, cessant:

Et

Et in hoc genere haemorrhagia narium, aut, in sexu fequiori, menses, sunt principes; quibus adungere oportet, sanguinis missionem solitam praetermissam, et interdum, sed rarius, haemorrhoides suppressas. Haemoptysis etiam tempore veris saepius contingere observatur, et plerumque tantum hominibus, intra annum aetatis decimum octavum, et trigessimum, vel trigessimum quintum, quo tempore status plethoricus variis signis adesse dignoscitur. Dubitare itaque non licet, quin haemoptysis omnibus aliis haemorrhagiis similis ex plethora proveniat; et ideo causae illius plethorae quae haemoptysin producit, nunc breviter tradendae sunt.

Aetate puerili, ubi corpus indies crescit, major adest homini sanguinis copia, quam ad corpus nutriendum, et sine incremento sustinendum, requiritur: ex hac quidem vera plethora est; attamen nequaquam morbida. Nam vasa facile cedunt et dilatantur, donec corpus debitam magnitudinem attigerit; sed, quum vasa validiora fiunt, et sanguini resistunt, tunc plethora sentitur, et haemorrhagiae et variis morbi ex ea oriuntur.

Ex observationibus et experimentis clarissimi Winttinghamii junioris constat, proportionem densitatis et roboris inter arterias et venas variam diversis hominum aetatibus obtinere. Aetate puerili, et etiam juvenili, venae arteriis multo majore vi et densitate pollent: Aetate proveciori, arteriae vicissim majorem vim adipiscuntur. Debitum aequilibrium circa trigessimum vel trigessimum quintum annum obtinere valetur. Hinc, si plethora in corpore adit antequam aeger trigessimum attigerit annum, in arteriis tantummodo, vel saltem praecipue, se ostendit; quippe venae, ubi majorem densitatem et robur, nimiae sanguinis copiae resistere queunt: Arteriae autem, ubi majorem laxitatem et debilitatem, nimiam sanguinis proportionem accipiunt, idemque distenduntur: Et inde provenit congestio, et a subita et violenta aliqua causa, quae sanguinis distributionem magnopere turbat, arteriarum ruptura, et haemorrhagia. Sed, post annum trigessimum quintum, haemorrhagiae plerumque ex venis, raro ex arteriis, fiunt.

Quandiu arteriae auctae sanguinis copiae et venarum vi, modo naturali et aequali, cedunt, omnesque corporis partes indies crescunt, nulla incommoda ex illa plethora naturali sentiri possunt. Quandocumque autem corporis incrementum cessat, et plethora morbida insequitur, haemorrhagiae ex illa corporis parte primo apparere debent, quae debitam suam magnitudinem primo pertingat. Hinc



in capite eo tempore, haemorrhagiae maxime expectandae sunt; quia caput, ut omnes medici, et pictores, et statuarii, fati horunt, ante alias partes debitam magnitudinem accipit. Et ita res se habet: Haemorrhagia enim huiusmodi ante alias occurrere repetitur; plerumque scilicet ab anno decimo quinto ad decimum octavum. At, ubi omnes corporis partes debitam magnitudinem acceperunt, ratio cessat, cur haemorrhagiae maxime in capite obtinerent. Tunc, venis adhuc arteriis maiorem vim habentibus, haemorrhagiae in his partibus imprimis accidere debent, in quibus sanguis maxima vi et copia fluit. Hoc ratio patet, cur illo tempore in pulmonibus evenirent: Tantum enim sanguinis per pulmones fluit, quod per totum reliquum corpus. Si igitur fluidorum distributio et circuitus aequilibrium, quaecumque ex causa, magnopere turbantur, patet omnia mala exinde oriunda in pulmonibus praecipue sentiri: Nam, licet illud viscus parvum sit, attamen vasa ejus sanguinea magna sanguinis copiam semper continent. Ideoque maiorem copiam, vel etiam maiorem sanguinis impetum, sine periculo ferre non possunt: Facile itaque rumpuntur; unde haemoptysis fit. Postea autem, quum systema arteriosum tantam vim acceperit ut venosum superet, id est, ubi homo trigessimum quintum annum praeteriit, haemorrhagiae non amplius ex pulmonibus, nec quidem ex arteriis, in aliqua parte, accidere debent. Et ita plethora, siqua in corpore adsit, in venis praecipue vel solummodo sentitur: Et hoc malum, et consequentiae ejus, frequentissimi obtinent in corporis partibus, quibus sanguinis motus in venis tardissimus est. Hinc, aetate proveciunt, ex venis haemorrhoidalibus sanguinis fluxus praecipue accidit; sanguis enim in his quam maxime retardatur: non enim directe ad cor redit, sed in venam portarum transit, et per jecur fluit. Praeterea, venae haemorrhoidales parvum auxilium a motu musculari habent, et valvulis omnino carent: Hinc magna saepe congestio in his, nec raro venarum tumores seu varices, et ruptura, et sanguinis effusio, insequuntur. Similes ob causas, sanguinis congestio et effusio in cerebro eadem aetate saepe accidunt, et paralytin, aut apoplexiam, (quam Hoffmannus Haemorrhagiam cerebri vocavit), faciunt.

Ex his omnibus, si fallor, pro certo colligere possumus, statum totius corporis plethoricum, et nimium sanguinis in pulmones determinationem et congestionem, causam esse haemoptysicos. Semper autem observandum est, nec haemoptysin, nec alias haemorrhagias, nec ulla alia in-

communi, a statu illa plethorico, qui cessante corporis incremento supervenit, nec a nimia venarum densitate, et arteriarum laxitate, oriri, modo corpus sanum et robustum fuerit, nisi validae quaedam causae excitantes simul concurrunt. Caetera enim animalia, et plerique homines, ab his incommudiis immunes sunt. At, ubi dispositio morbida in systemate jam obtinuit, praecipue pulmonum debilitas, sive a parentibus accepta, sive a prava pectoris structura nata, sive ex aliis causis magis obscuris proveniens, haemoptysis saepe nascitur. Et, etiamsi nulla prava structura in pulmonibus speciatim obtineat, si modo universi corporis habitus debilis sit, si status plethoricus superveniat, vel si subita aliqua et violenta causa externa sanguinis distributionem magnopere turbet, mala exinde oriunda in pulmonibus plerumque sentiuntur. Experientia facis ostendis ab haemoptysi, illiusmodi determinatione sanguinis et congectione in pulmonibus comitata, illud viscus tantam lahem accipere, ut ulcus insanabile et phthisis exinde oriatur, cum vulnus simplex illud puritatem nequaquam inducere valeret.

Neutiquam accurate explicare possum quales mutationes ex sanguinis congectione in pulmonibus nascantur, et cur, hoc statu pulmonum existente, ulcus aut vulnus insanabile foret. Intelligimus quidem, statum istum pulmonum a sano et naturali longe alienum esse; et si, ad vulnus aut ulcus sanandum, constitutio universi corporis vel partis ejus cuiusvis sana et robusta requiritur, haud mirum est, in hoc casu, ubi pulmones jam aliquatenus morbidi sunt, vulnus in his sanare difficillimum esse. Fortasse nimia sanguinis copia, et vasorum aliarumque partium solidarum debilitas, sanguinis effusi absorptionem, aut ulceris benignam suppurationem, impediunt. Quandocunque pathologia hujus visceris rectius intelligitur, hanc rem accuratius explicare facultas erit: Interca tamen, mea sententia, aequum est, phthisin haemoptysin insequentem, huic praeter naturam sanguinis in pulmones determinationi tribuere. Haec enim non modo phthisin incipientem monstrat, sed morbum per totum fere cursum, ad extrema usque stadia, committitur, et, nisi magis aut minus obtinet, morbus incrementum aut levamen accipit. Sic omnia remedia, quae ad phthisin praecavendam, vel levandam, vel sanandam, utilia esse censentur, copiam sanguinis minuire, impetum ejus temperare, congectionem tollere, et distributionem aequalem promovere, manifeste tendunt. Non verbis opus est ostendere quomodo hoc sententiam nostram

lram confirmet, et ex doctrina de haemorrhagiis in genere, et speciatim de haemoptysi, sponte fluat. Quis ignorat victum tenuem, ex lacte et frugibus maxime confectum, et venae sectiones repetitas, magno opere prodesse? Tempus activum, vestitus calidior, indusum laneum, exercitatio crebra et modica, equitatio, gestatio in curru, navigatio, tantum etiam proficiunt quantum congestionem sanguinis in pulmonibus minuunt, et determinationem ad alias partes, praesertim externas, promouent.

Antea satis diximus de effectu diversarum anni temperatum in phthisin serophulosam: Idem obtinet in phthisi ab haemoptysi proveniente. Nonnulli sunt qui tempore verno omnia signa sanguinis in pulmonibus congestionis, et phthiseos incipientis, quotannis habent, et abscessus in eis formatur, rumpitur, et pus excreatur. Accedente autem aestate, morbus sistitur, et sanitatis specie aegri fruuntur: Sed, redeunte hieme, morbus iterum atque iterum reuertitur. Hoc modo vita, interdum etiam per viginti annos et amplius, protrahitur.

Etsi aestas phthisici sit saluberrima, tamen hieme nequaquam periculosissima est. Omnium consensu, tempus vernum et autumnale multo magis eos infestat; quia his temporibus sanguinis distributio maxime turbatur, magnis scilicet et subtilis tempestatis mutationibus. Tempore activo, ob aeris calorem, perspiratio magna est, et distributio ad corporis superficiem rite promouetur; determinatio autem ad renes, et urinae quantitas, minuitur. Tempore vero hiemali, frigus externum perspirationem reprimi, et sanguinem a superficie pellit; sed tunc urinae copia multo major est. Itaque aequilibrium aliquod inter cutem et renes obtinet, quo excretionem per unum repressa, excretio per alterum augeatur. Hinc multa incommoda a calore activo, sed praesertim a frigore hiemali, oriunda, optime praecaventur. Vere tamen et autumno, illud aequilibrium quasi in dubio est; hinc si determinatio nimia ad pulmones vel aliquam aliam partem jam obtinuerit, his temporibus, praecipue ope causarum excitantium quas subitae tempestatis mutationes suggerunt, maxime augeri debet. Quando autem certa sanguinis determinatio obtinet, sive ad superficiem corporis, sive ad renes, determinatio abnormis ad pulmones minuitur; et ideo phthisici aestate et hieme, quando hae determinationes regulares et continuas sunt, minus incommodi ex morbo sentiunt. Casus quidem satis frequenter occurrit qui plane ostendit, quanti sit momenti, ad hunc morbum praecavendum, aut



sanandum, aut levandum, sanguinis determinationem a pulmonibus avertere. Omnibus medicis innotuit, mulieres, dum uterum gerunt, phthisi pulmonali raro perire. Immo, si mulier jam phthisi tabescens gravida fiat, morbi progressus plerumque sistitur, vel saltem maxime retardatur, donec mulier partum edat. Saepe tamen, brevi tempore post partum, interdum paucis septimanis, interdum paucis tantum diebus, phthisicae moriuntur. Haec omnia, si maxime fallor, variae sanguinis distributioni plerumque tribuenda sunt. Dum mulier uterum gerit, magna sanguinis copia ad uterum fluit, ad nutriendum et formandum foetum. Hinc sanguinis determinatio ad pulmones avertitur, congestio in eis minuitur vel tollitur, et omnia mala exinde provenientia magnopere levantur, vel proflus sanantur. Brevis autem tempore post partum, naturalis ista et salubris determinatio ad uterum cessat. Nil igitur mirum est, congestionem sanguinis in pulmonibus postea augeri, et morbum exinde natum ingravescere. A priori quidem crederemus, miserie istis mulieribus unicam adhuc spem superesse, quae naturae beneficio sponte porrigitur. Si, magna ista determinatione ad uterum subito cessante, nulla alia naturalis succedat, patet morbum in pulmonibus maxime augeri, et summum exinde periculum instare. Notum tamen est, brevi spatio, plerumque paucis tantum horis post partum, magnam determinationem naturaliter ad mammas fieri. Satis igitur aequum est expectare, hanc novam determinationem optimos habere effectus, modo secundum naturae ordinem promoveatur muliere, scilicet, infantem suum lactante. Congestionem enim in pulmonibus minuire vel proflus tollere debet, et vitam protrahere, donec naturae viribus morbus sanetur. Et revera, nonnulla exempla ex optima auctoritate accepi, et unum ipse vidi, ubi, hoc experimento facto, et nullis aliis adhibitis remediis, phthisis pulmonalis manifestissima proflus sanabatur. Et nihil dubito, quin hoc remedium multae phthisicae sanari possent, praesertim si nondum ad extrema morbi studia pervenissent. Experimentum autem raro tentatur, nam plerique vix credere possunt, mulierem, jam tabidam et fere moribundam, infantem, sine periculo et sibi et infanti, lactare posse. Experientia autem docet, tales mulieres, infantes non modo sine periculo aut damno, sed cum maximo beneficio, in utero gerere et nutrire: Infantes quoque, plerisque saltem in valuis, nequaquam debiles aut morbi sunt, nec ullum incommodum sentire valent a morbo quo matres laborant. Vix igitur credere possum,

possum, si matres infantes suos lactarent, illum exinde periculum, aut his aut illis, nasci et plane videri, quomodo optimos effectus haberet. Sed, etiam si periculi aliquid lactare videatur; praestas tamen, in morbo adeo periculoso, anops tentare remedium, quam negam certae morti relinquere.—Sed ad argumentum redeo.

Est hieme determinatio ad tenebras major sit quam aestate; tamen nequaquam constans est: Saepe enim turbatur subitis tempestatis mutationibus, quae hieme plerumque satis frequenter occurrunt. Sed, licet frigus hiemale constanterissimum esset, sanguinis distributio quoties turbaretur, nisi aer in conclavibus et aer externus ejusdem fere temperaturae essent. Quando aer externus frigidissimus est, aer in conclavibus saepe calorem aestivum aequat vel superat; hinc subitae et magnae sanguinis distributionis mutationes oriuntur. Ratio itaque manifesta est, cur aestas phthisicis hieme salubrior sit: Determinatio enim ad corporis superficiem, quae aestate obtinet, fere semper perpetua est; et, etiam si perspiratio nunc major nunc minor redditur, sanguinis determinatio, non nisi a subita et violenta causa, quae raro accidit, penitus mutatur.—Fortasse eadem ratio reddenda est, de effectibus letaceorum, aut fonticulorum, aut vesicantium, quae phthisicis haud raro opem ferunt.

Unica ergo restat via, qua congestionem sanguinis in pulmonibus semper amovere sperare possumus; nempe, determinatione ad corporis superficiem promovenda. Haec tamen, uti saepe jamjam observavimus, aëre temperate, aequaliter, et perpetue, calido melius et certius perficitur. Coelum autem nostrum per paucos tantum menses aërem hujusmodi praebet. Coelum itaque mitius phthisicis petendum est: Et experientia quondam hoc consilium satis confirmat; multi enim nostrorum hoc modo a morte, aliter inevitabili, quotannis eripiuntur. Huic remedio aliquatenus similes sunt vestitus calidior et exercitatio modica; et quicquid boni ex his percipitur, rara quidem sententia, sanguinis distributioni mutatae penitus tribuendum est. Quod ad vestitum attinet, paucissima observanda sunt. Satis notum est, indusium laneum, simplicissimum quidem remedium, in hoc morbo quam maxime prodesse; et certe nihil magis constat, quam id perspirationem, et sanguinis ad corporis superficiem determinationem, directe promovere. Indusium laneum, ubi perspiratio magna est, brevi tempore madere et frigescere sentitur; hinc perspiratio reprimitur: Indusium laneum autem sudorem aut humiditatem facile absorbet, et non nisi perspiratione enor-

mi humidum sit. Hinc cutis sicca et calida manet, et perspiratio magnopere promovetur.—Omnibus notum est, exercitationem similem habere effectum; facile igitur patet, quomodo congestionem in pulmonibus minuere vel tollere potest. Prima quidem facie, haud absurdum foret, periculum ab exercitatione metuere, ab aucto, scilicet, sanguinis impetu: Et, si exercitatio violenta esset, procul dubio maxime noceret; nam ambulatio, cursus, et similia exercitia vehementiora, respirandi difficultatem cæteraque symptomata statim augent. Experientia autem clarissime ostendit, modicam exercitationem, navigationem, gestationem in curru, et haud raro equitationem, sanguinis congestionem in pulmonibus, et omnia mala exinde nata, minuere vel tollere: Hoc plane tribuendum est auctæ sanguinis determinationi ad corporis superficiem. Clarissimus Cullenus, in prælectionibus suis, casum singularem memoravit qui hanc doctrinam satis confirmat. Vir qui hæmoptysi laborabat, dum domi manebat, et nulla exercitatione utebatur, pessime se habuit, et plures morbi reditus passus est. Ab equitatione tamen levamen semper percipiebat; et interdum, quando malum maxime urgebat, equum ascendebar, et per aliquod tempus equitabat, hoc effectu, ut a morbo, pro tempore saltem, liberaretur. Alia similia exempla a navigatione Gilchristus tradidit.

Sydenhamius autem, pro omnibus aliis mediis, hoc remedium maxime laudat; et non modo in morbo levi aut incipienti, sed etiam in ultimis phthiseos gradibus, ubi jam sudoribus nocturnis diarrhoea ista, colliquativa vocata, accesserit, quam plerumque mora brevi tempore excipit: *Quantumcumque* (inquit) *exitialis phthisis sit, hoc tamen sancte assero, quod neque mercurius in hoc venerit, neque cortex Peruvianus in intermittentibus, efficaciores extant, quam in phthisi curanda exercitium jam laudatum, (equitatio scilicet); modo aeger curet, ut lintamina lecti probe arefacta fuerint, atque etiam, ut satis longa itinera emetiatur. Atque hoc multiplici experientia, quæ vix me fefellit unquam, didici.* Et, licet equus veli phthisicis præcipue conferat; tamen et itinera curru facta mirandos sine effectus quandoque ediderunt. Recentiores medici tantas exercitationi laudes neucquam tribuerunt; attamen omnes consentiunt, eam magnum sæpe ferre auxilium.—Patet igitur, quantum boni, ab ipsa itineris exercitatione, aegroti phthisi ex hæmoptysi nata laborantes capere possint.

Tertia et quidem frequens phthiseos causa adhuc restat:  
Nempe



Nempe catarrhus. Omnibus notum est, post catarrhum longum phthisin pulmonalem haud raro inlequi: Saepe notum difficile est catarrhum dignoscere a vera phthisi ex tuberculis in pulmonibus incipiente: Praecipuum enim signum, tussis scilicet, in utroque obtinet; et nihil subit, quin plurimae phthises quae catarrhu vivuntur a tuberculis originem ducant. Satis autem patet, catarrhum verum phthisin haud raro inducere, etsi nulla tubercula antea fuissent in pulmonibus. Multa enim exempla sunt, ubi, post manifestissima signa catarrhi a communibus causis orti (aeris scilicet refrigerationis aliqua), vera et lethalis phthisis pulmonalis inlequitur sit; etsi nulla antea erant signa tuberculorum vel morbi alienius in pulmonibus, et ubi nulla suspitio erat dispositionem scrophulosam temperamento inesse. Interdum etiam, nec raro, post tussim convulsivam phthisis pulmonalis oritur.

Quam itaque de facto minime dubitandum est, de modo quo catarrhus longus phthisin inducat ratio reddenda est; et, si fallor, eadem, quam supra de haemoptysi jam proposuimus, phthisi a catarrho oriendae facile applicari potest. Si congestio sanguinis pulmones phthisi opportunos reddat, facile intelligimus, quomodo tussis crebra et vehemens illam perniciem excitarer: Patet enim huiusmodi tussim motum sanguinis in pulmonibus impedire, et magnam congestionem producere. Fortasse membrana mucosa (quae in catarrho praecipue afficitur) labem aliquam ex hoc morbo accipit, quae perniciem inducere potest. Sed qualis sit illa labes (si quae revera sit) explicare non suscipiam. Si pulmones igitur debiles aut morbiidi sunt, si prava est circa pectus structura, vel si aliqua labes in constitutione latet, nil mirum est catarrhum longum phthisin ex aetate producere, qua maxima sanguinis determinatio ad pulmones obtinet.

Quando phthisis a catarrho nascitur, omnia signa sanguinis congestionis in pulmonibus accedunt, et intertem haemoptysis fit. Morbi historia et progressus idem serè est, sive ex haemoptysi, sive a catarrho, oritur; eadem res juvant et laedunt, et medendi methodus eadem est. Minime igitur in hoc loco repetere opus est quae jam dicta sunt. Si congestio in pulmonibus morbi causa et fons est, sine dubio quamprimum tollenda est. Haec autem, remedia supra memoratis, et praecipue coeli mutatione, optime perficitur.

De his tribus frequentissimis phthisicos causis (vel potius duabus; nam haemoptysis et catarrhus pro una haberi possunt,

possunt), separatim tractavimus, quasi morbus ex una vel ex altera tantummodo oriretur. Satis autem patet, omnes istas causas in eodem aegroto interdum conjungi vel concurrere posse. Catarrhus haemoptysin saepe inducit: Porro etiam pulmones delinuat, et tuberculis serophulosis obnoxius reddit. Sanguis in haemoptysi effusus, et non absorptus, tubercula formare potest, quae, lapsu temporis, inflammationem et suppurationem inducere possunt. Et a tuberculis serophulosis, vaso sanguinea comprimantibus, sanguinis effusus, sive per transudationem, sive ex ruptis vasis nasci potest, et haemoptysin, et tussim crebram et molestanti facere. Quae de his speciatim et seorsum dicta sunt, omnibus junctis facile applicantur. Et ex omnibus factis et argumentis, plane, ni fallor, colligi potest, coeli mutationem in maximi momenti esse ad phthisin pulmonalem praecavendam, vel curandam.



De quibusdam morbis nunc est agendum qui aetate praevectiore occurrunt, et qui ex effectibus coeli nostri, aliqua saltem ex parte, oriuntur, et qui coeli mutatione sanari vel levari possunt. Hi praecipue in viscera abdominalia, et imprimis in ventriculum et intestina, incumbunt, eorumque functiones magnopere impediunt: Quapropter non modo in his sentiuntur, sed universam corpus afficiunt, et multos morbos graves, et quidem pertinacissimos, saepe faciunt. Sed hic tantum de duobus hujusmodi morbis agere locus erit: De Hypochondriasi, scilicet, et de Arthritide.

#### HYPOCHONDRIASIS.

HYPOCHONDRIASIS omnibus medicis satis nota est, quippe nullus fere morbus chronicus, in hac saltem regione, frequentius occurrat. Varia et quidem innumera symptomata, tam ad animum quam ad corpus spectantia, hunc morbum comitantur. Praecipua tamen sunt universi corporis lassitudo et torpor, animi hebetudo, metus et moestitia, turbatio simul ventriculi et intestinorum functionibus. Multiplex hac malum ex effectibus coeli nostri originem ducere videtur: nam in regionibus frigidis humidis frequentissimum est; in temperatis, et in calidis, raram vel prorsus ignotam: Et etiam observatur, hypochondria-

eos tempore aestivo longe melius se habere quam hiemali. Hinc verisimile est, morbum coeli mutatione levari vel sanari posse. Difficile quidem est, et fortasse prorsus impossibile, plenam et accuratam rationem reddere omnium symptomatum, quae in hoc morbo occurrunt. Multa enim in ipso genere nervoso situm habent, ejus natura nondum adeo accurate indagatur, ut morbi ejus intelligi queant. Multa etiam pendent a mira illa sympathia, quae inter varias corporis partes, et inter corpus et animum, obtinet. Haec autem densissimis tenebris obregitur. Hujusmodi itaque symptomata explicare non tentabo. Causas tantummodo morbi sensibiles, tam proximas quam remotiores, indagare conabor; et ex iis, et ex analogia rerum juvenantium et liedentium, ostendere, quomodo morbus coeli mutatione sanari, vel saltem mitior reddi, possit.

Vix dubitandum est, quin causa proxima hujus mali in tubo alimentario haereat; pleraque enim symptomata quibus hypochondriaci vexantur a turbatis ventriculi et intestinorum functionibus plane oriuntur. Quae sunt, anorexia, nausea, vomitus, ructus, rumination, cardialgia, gastrodynia, flatulentia, tormina, interdum diarrhoea, saepius alvi tarditas. Haec omnia debilitati, seu atoniae tubi alimentarii, procul dubio tribuenda sunt. Animi etiam affectiones, quae magnam partem mali faciunt, in plerisque saltem casibus, ab eadem debilitate ventriculi et intestinorum plane nascuntur: Licet interdum animi affectiones, ventriculi et intestinorum debilitatem, et veram hypochondriasin, inducere observentur.

Quaestio hic oritur, et quidem difficillima. Si certae animi affectiones a debilitate intestinorum proveniunt, quomodo sit, ut ista debilitas saepe occurrat, sine hujusmodi animi affectionibus? Multa enim exempla sunt, ubi aegri omnibus ventriculi et intestinorum morbis, qui in hypochondriasi occurrunt, miserrime vexantur, dum animus nullo modo afficitur. Hanc difficultatem fateor me non posse solvere: Dubito etiam an solvi possit, donec accuratius indagetur quomodo corpus et animus se invicem afficiant. Nequaquam recte intelligitur, quomodo ventriculi morbi animum afficiant; vix igitur expectandum est, rationem reddi posse, cur hoc in quibusdam tantum casibus abtineret. Fortasse dispositio aliqua, in genere nervoso, vel in ipso animo, requiritur, ut affectiones illae prodicerentur. Qualis autem haec dispositio sit, fateor me ignorare. Patet tamen, animi affectiones a morbo ventri-



culi et intestinum saepe pendere; plerumque enim, hoc salutato, animus ad pristinam sanitatem restituitur.

Diximus morbum, vel potius causam morborum in intestinis, debilitatem seu atoniam esse. Varia argumenta hanc opinionem confirmant: Ipsa symptomata supra recensita ventriculi et intestinorum debilitatem plane indicant; universi corporis debilitas morbum comitatur, et hanc raro eum producere videtur; plurimae causae quae universum corpus, et intestina ipsa speciatim, debilitant, morbum saepe inducunt; et quicquid vel intestina vel totum corpus solent, hypochondriacis auxilium est. Praeterea autem, ni fallor, aliud malum saepe in corpore obtinet, qui sub alimentarii atoniam et debilitatem, et hypochondriacum, auget, et fortasse etiam inducere potest, sanguinis nempe in abdomine motus tardus et congestio. Si libera et naturalis sanguinis distributio ad sanitatem et robur universi corporis, vel partis alicujus, sustinendam requiritur, facile credendum est, ab impedito sanguinis motu in abdomine, intestina tantam labem accipere, ut variis morbis obnoxia fierent. Vel, si intestina jam debilitata et moribunda sunt, et sanguinis distributio turbatur, verisimile est, perniciem in ea praecipue cadere. Denique, potest, quod, si sanguinis motus, ob defectum exercitationis, aut alias causas, languescat, et si universum corpus afficiatur; tamen mala exinde nata in abdomine praesertim sentiri debent; quippe in eo motus sanguinis renosi naturaliter tardissimus est, propter longum circuitum per jecur faciendum, antequam ad cor redeat.

Haec sententia, hypochondriacum a motu tardo et congestione sanguinis in abdomine provenire, vel saltem augeri, ratione minime incongrua est; et nunc est videndum, quam confirmationem accipiat ex observatione causarum morbi remotarum, et rerum quae hypochondriacis opem aut malum ferunt.

Variae causae quae hypochondriacum inducunt ventriculum et intestina directe et immediate ledere videntur. Aliae vero fluidorum motum primo impediunt, et hoc modo fore ut viscera abdominalia debilitent, et, secundum nostram sententiam, malum hypochondriacum faciant. Nonnullae quidem ambo illos effectus plane habent, Diximus, coelum frigidum humilum, quale in regionibus nostris septentrionalibus, praecipue quidem tempore brumali, obtinet, dispositionem ad hypochondriacum producere. Effectus autem manifestissimus talis coeli est, perspirationem reprimere, et fluidorum ad corporis superficiem distributionem

hūiorem impedit. Hinc itaque congestio in internis metuenda est. Minime tamen in animo est negare, coelum frigidum humidum in ventriculum, vel in genus nervosum, vel denique in ipsum animum, directe agere posse, etiam si fluidorum murum nequaquam turbaret. Natum est, aërem humidum fibras musculares universi corporis laxare et debilitare. Nil itaque mirum est, ventriculum et intestina eisdem effectus pati. Regionum frigido-humidarum insulae languidi et torpidi sunt, et ad moestitiam proclives; et illicites iactant hunc morbo opportuni: Nec absurdum est, hanc lugubrem dispositionem, tam animi quam corporis, impedire perspirationi tribuere. Docuit enim Sanctorius, in Aphorismis suis staticis, hilaritatem in mente nasci dum libertissima sit per corporis superficiem perspiratio; et, contra, gravitatis sensum in corpore, et moestitiam in animo, percipi a perspiratione impedita. Et omnes fere homines, quantumvis sani et robusti, et a malo hypochondriaco liberi, effectus satis manifestos, tam ad animum quam ad corpus, percipiunt a variis cœli constitutionibus. Quando temperatum, siccum, et serenum est, nova vis et alacritas animo accedit; animo autem major hilaritas. Contra vero, ubi coelum frigidum, humidum, nubilum, et obscurum urget, corpus fit debile et languidum, animus herbet et tristis. Hæc varietates fortasse tribuuntur cœli effectibus in genus nervosum; nec dubito quin magnos illiusmodi effectus habeat. Sed, ut fallor, magna ex parte tribuendæ sunt turbatae fluidorum distributio; nam, si hæc exercitationi idonea rite promoveatur, nulla plerumque animi moestitia aut corporis languor ab effectibus cœli frigidi humidi in genus nervosum nascitur.

Alia, et quidem frequentissima causa huius mali est vita otiosa et sedentaria: Plerique homines literis dediti, aut aliis negotiis occupati quæ diurnam et intentam animi applicationem requirunt, et nullam fere corporis exercitationem, hoc morbo, nunc magis nunc minus, vexantur. Hoc vitæ genus duplici modo nocere potest, et dispositionem ad hypochondriacum producere. In primo itaque loco, sanguinis motus exinde languescit, ob defectum exercitationis naturalis: Medicis enim satis innuit, muscularum actionem ad sanguinis circuitum rite promovendum requiri. Hinc etiam perspiratio et determinatio ad superficiem minuitur: unde pethora in corpore nascitur, et congestio in partibus internis: Et jamjam ostendimus, mala exinde provenientia hæc actare abdomen præcipue

afficere debere. Præterea, quum musculi, nisi rite exercentur, pristinam et naturalem vim brevi tempore amittunt, vires moventes in vita sedentaria ex necessitate languescunt, et tantum corpus imbecillum evadit; et hinc etiam fortasse ventriculus ac intestina, per sympathiam aut consensum, similem debilitatem vel atoniam percipiunt. Mea autem sententia, hypochondriasis a vita sedentaria oriunda impeditur fluidorum distributioni ad partes externas potius tribuenda est, quam muscularum debilitati et atoniae: etsi hæc atonia sine dubio malum augere potest. Nam, in regionibus calidioribus, ubi perspiratio et determinatio ad superficiem solo æris calore satis promoventur, hypochondriasis raro occurrit, etsi debilitas et atonia admodum illis frequentes sint, et incolæ haud multa utantur exercitatione.

Certi animi affectus, quos passiones deprimentes vocamus, præcipue moeror aut sollicitudo gravis et diuturna, hypochondriasin sæpe faciunt. Sed bene notum est, omnes animi affectus graves ventriculum aliquo modo afficere; et vice versa, animum variis ventriculi morbis turbari. Observatur etiam, animi tristitiam, et alios ejusmodi effectus, non tantum ventriculum et totum corpus miro modo debilitare, sed etiam perspirationem magnopere impedire. Quum itaque sanguinis motus languescit, et determinatus a superficie hoc modo divertitur, et ventriculus et intestina ex consensu eorum cum animo ab eadem causa debilitantur, nonne verisimile est, congestionem in visceribus abdominalibus ita debilitatis succedere, et hypochondriasi sequenti causam dare?

Multae quidem causae hunc morbum faciunt, ventriculum, et intestina, et universum corpus, debilitando, quae fluidorum distributionem nequaquam directe aut speciatim afficere videntur. Quales sunt evacuationes magnae, et præcipue lentae, profluvium mensium, fluxus albus, interdum venus immodica: Ex his universi corporis debilitas nascitur. Aliæ causae ventriculum et intestina præcipue debilitant: Quales sunt, nimis usus theæ, vel nicotianæ, vel opii, aliorumque narcoticorum, emetica vel cathartica fortiora sæpius repetita, diarrhoea, vel alvi restrictio diuturna.

Aliæ autem causae, quae hypochondriasin vel saltem dispositionem ad eam producant, plane videntur sanguinis motum tardum et congestionem in abdomine facere. Plethora, in multis casibus, ad hunc morbum producendum procul dubio haud parum confert. Homines enim, qui

victu



victu pleno et lautiori utuntur, et vitam otiosam et sedentariam degunt, ad hypochondriam maxime proclives sunt; et vix dubitandum est, quin in iis status plethoricus obtineat, et magnam partem morbi faciat; praesertim quum remedia quae talibus aegrotis opem ferant inspicuntur. Victus enim tenuior et parcius, vel ex frugibus confectus, exercitatio crebra et diuturna, et interdum sanguinis destructio, iis magnopere profunt; et haec omnia plethoram directe et plane minuunt vel tollunt. Antea explicavimus cur plethura, siqua in corpore obtinuerit, in abdomine praecipue se ostenderet. Hypochondriasis enim non nisi aetate proveciori occurrit: Aetate puerili prorsus ignota est; juvenili raro observatur; sed, post annum trigessimum vel trigessimum quintum, frequentissime reperitur.

Marbus etiam haud raro oritur a tumoribus istis in liene aut hepate, qui interdum post febres intermittentes male curatas observantur. Huiusmodi tumores liberum sanguinis motum in abdomine plane impediunt, ideoque congestionem producant.

Haud raro etiam oritur a dispositione haemorrhagica, ubi haemorrhagiae cessant. Observationibus constat, eos qui haemorrhagias passi sunt ad hunc morbum magnopere esse proclives. Praecipue tamen hypochondriaci opportuni sunt quibus fluxus haemorrhoidalis repressus est. Ex hoc fonte hypochondriasis saepe provenit. Et omnibus patet, istius fluxus suppressionem sanguinis congestionem in abdomine producere. Connexio inter hypochondriam et fluxum haemorrhoidalem maxime notanda est; eadem aetas, idem coelum, et anni tempus, idem vitae regimen, victus scilicet plenus et crassus, et vita otiosa et sedentaria, habitus plethoricus, dispositio haemorrhagica, et alii durities, utrumque pariter inducant. In eodem aegrotto haud raro occurrunt, et interdum eodem tempore; et saepe, fluxu haemorrhoidali suppresso, hypochondriasis nascitur; illo autem restitute, haec vicissim solvitur. Fluxus autem haemorrhoidalis procul dubio a congestionem sanguinis in abdomine oritur: Ex hoc itaque aliud argumentum provenit, hypochondriam, in multis saltem casibus, ab eodem fonte originem ducere.

Nihil scire colligendum est de hac re a sectionibus cadaverum; nam hypochondriasis, quanquam molesta et sanatu difficillima sit, et multos, per magnam vitae partem, miserrime infestet, vix unquam tamen lethalis est, nisi interdum ubi alios morbos, hydropem exempli gratia, vel alias cachexias, inducit. In quibusdam autem hypochondriacorum

driscentum cadaveribus, sanguinis congeffio in venis mae-  
femeficis plane obfervata eft.

Ex tota itaque argumento duæ præcipue caufas hypo-  
chondriacæ facere, recte colligiffe mihi perfuaderem, ven-  
triculi, nempe, et inteftinorum debilitatem feu anniam,  
et fanguinis in abdomine congeffionem. Ad morbi cura-  
tionem igitur, fecundum hanc doctrinam, præ omnibus  
neceffarium erit ventriculum et inteftina roborare, et fan-  
guinis congeffionem in abdomine tollere, ejuſque liberum  
motum et diftributionem promovere. Ad primum propo-  
ſitum varia remedia apta ſunt; et sæpe haud parum au-  
xilii percipitur a remediis tonicis, five per os ſumptis, five  
aliis applicatis. Cuiusmodi ſunt, cortex Peruvianus,  
chalybs, amara, balneum frigidum. His autem et ſimili-  
bus, morbus rari perfecte ſanatur, niſi ſimul adhibeantur  
remedia quæ alteri curandæ conſilii respondent, debilitatem  
nempe fluidorum motum et diftributionem reſtituere. Hoc  
autem ære calido et exercitatione, optime perficitur, præ-  
cipue equitatione, quæ niſi magis hypochondriaci laboran-  
tibus prædeſt. Laudes quas Sydenhamius equitationi do-  
dit, in phthiſi ſananda, melius fortaffe hypochondriaci ap-  
plicari poſſunt. Non ſolum debitam fluidorum diftribu-  
tionem efficit, fanguinis motum per vaſa minima extre-  
mitatum promovet, et riſibus moventibus et toti corpori  
alacritatem reddit, ſed ventriculo et cæteris abdominis in-  
teſtiniſ ſpeciatim favet. Nulla alia exercitationis ſpecies  
congeffionem præbet, quæ fanguinis in abdomine circui-  
tum æque promovet, et motum perſiſtenticum et vim in-  
teſtinorum ita augeri videatur. Hinc omnes excretiones  
fluidorum ad digeſtionem cibi utilium quam maxime pro-  
moventur, et nutrimentum rite et maturiſſime conſequitur.  
Inteſtiniſ hoc modo ſanis redditis, animus, per ſympathiam  
cum ventriculo peculiarem, ſolitam ſuam alacritatem et  
lacryſium recipit.

Hoc optimum remedium adhuc efficacius redditur,  
quando coeli mutatio cum eo conjungitur. Satis jamdu-  
dum diximus de effectibus coeli temperate calidi in debita  
fluidorum diftributione promovenda, quam maxime eſſe  
utilitatis etiam in hypochondriaci probare tentavimus.  
Quoniam autem hic morbus animum maxime afficit, et ex eo  
etiam sæpe originem docet, ſatis patet, coelum tempera-  
tum et jucundum, et quidem ipſam loci mutationem,  
ægrio utiliſſimam fore. Cælum patrio pulchrius, mores  
ſocietatis, et ſcænae novæ et amœnæ, mentem grate  
occupant, et imaginationem ſuaviſſime detinent. Quibus  
modis

modis, nam ubi morbus ab animo minime incipiebat, aegrum per sympathiam inter animum et viscera abdominalia magnam levamen sentire debet.

Sed loci mutatio et iter ipsum, præter beneficium ab exertatione per longum tempus continuata proveniens, alios magnos producit effectus. Connexio quædam inter distantiam et tempus, quæ ex numero rerum insignium in mentibus nostris pariter mensurantur, longum iter (ob numerum rerum novarum quæ peregrinantibus quotidie occurrunt) eundem fere effectum habere facit ad molestias nostras oblivioni tradendas; uti cursus amorum qui citius aut tardius, forsitan simul, mentis malis remedium adfert. Distantia etiam omnia ex oculis amover, quæ moerorem prætoritum in animum revocarent, aut fœdas quas morbus vel infirmitas velo lugubri umbraverant, imaginationi suggererent. Leves quoque illæ molestiæ, quæ ex rebus domesticis aliquando proveniunt, et hypochondriacos sæpe plus atque sollicitant, tunc longe remouentur.

Denique, ignaviam morbosam cui domi hypochondriacos indulget, inter peregrinos discutere necesse est. Torpor est tristitia animi magnæ sui morbi partes: quicquid igitur attentionem excitat utilissimum esse patet; et omnes mentis conatus, etiam si coacti et primo molesti, mentem occupare, et novæ idearum series inducere inferviant.

His morbis animus ad solitam hilaritatem paulatim redit, intestina sanitatem pristinam recuperant, et utrique vigorem proprium sibi invicem imperionantur.

#### DE ARTHRITIDE.

De arthritide jam pauca dicenda sunt, non quia tantum coeli effectibus hunc morbum tribuendum esse putavimus, nec quia sola coeli mutatione, nullo alio remedio adhibito, cum perfecta sanari expectandum est: Sed, propter multa argumenta, quæ liadent coelum nostrum frigidum, humilum, et variis, arthriticis hæc potum nocere, et, contrario, calidiores in sæpe magnopere prodesse. Omnes medici sentent, paucæ tantum remedia in hoc morbo revera utilia esse, nullum fere cum radictus exstipare, et pauca infirmorum ægrotantium cruciatus lenire. Ex illis etiam, quæ vel dolorum levamen vel morbi solutionem pullicentur, nonnulla ipsæ ægrotis adeo insuavida exadunt, ut brevi tempore rejiciantur. Pauci homines tanto animi constantia præditi sunt, ut per longum tempus in usum remedii admodum ingrati persisterere velint, præsertim



si non in ipsis saevis morbi paroxysmis adhibeatur; sed in morbi intervallis, ubi aegri haud raro nulla incommoda, aut dolores, aut aegritudinem, percipiunt. Exercitationem crebram et validam, et victum tenuem, omnes medici consentiunt, sola esse remedia unde arthritidis sanatio tuto petenda sit. Hujusmodi autem remedia aegroti quasi uno ore repudiant, nec vim consuetudinis ita vincere possunt ut morbi sanationem his conditionibus recipiant. Morbus etiam multis membrorum usus plane sustulit, et exercitationem reddidit impossibilem; et altis victus lautior, propter debilitatem vel alias causas, absolute requiritur. Remedium itaque jucundum, efficax, et tutum, in hoc morbo maxime desiderandum est; et coelum calidum his frui beneficiis spem maximam concepi. Sunt quidem nonnulla remedia, quae saevissimos podagrae dolores brevi tempore mitigant, et alia quae morbum ex universo corpore pellere videntur; sed saepe miseris aegris novos et graviore morbos, aut mortem ipsam, inducere observantur. Cujusmodi sunt, varia remedia partibus dolentibus applicata, praecipue repellentia, sive frigida, sive ex spiritu vini et similibus confecta; et medicamenta quaedam in ventriculum recepta, et imprimis aromatica et amara, qualia pulverem Ducis Porilandiae componunt. Quam itaque arthritis haud raro graviorum morborum quodammodo remedium est, non omnino sananda est, nisi mala quae a podagra repressa nasci solent simul praevenire possimus: Et hic etiam valde praestat coeli mutatio.

De arthritide plene et ex professo agere, minime in proposito est: Satis erit, ex observatione quarundam causarum remotiorum, et ex experientia juvantium et laedentium, coeli mutationis utilitatem monstrare. Ex causa morbi proxima nihil hujusmodi deducere possum; quippe ea nihil fere obscurius. Nonnullae quidem causae remotiores vix melius intelliguntur, et praecipue praedispositio strictius sic dicta, vel seminum morbi. Aliquid hujusmodi existere, satis novimus; pleraque enim causae remotae, tam praedisponentes quam occasionales, in quibusdam tantum hominibus, arthritidem produciunt, et in aliis, vel nullus morbus vel ab hoc prorsus diversus. Sed natura istius praedispositionis vel seminis quae a parentibus in prolem saepe transmittitur, adhuc prorsus latet. Ad alios igitur ratiocinandi fontes magis exploratos transimus. Ceterae causae praedisponentes praecipue sunt, aetas proveciua, habitus corporis plenior, crassior, et plethoricus, victus opiparus, vinolentia, venus praematura et immodica, et,

prae omnibus, vita otiosa et sedentaria. De causis occasionalibus, vel excitantibus, nequaquam opus est multa verba facere. Vix credo arthritidem ab aliqua causa subita unquam nasci, nisi valida dispositio in corpore antea obtinuerit; et, ubi ista dispositio est, morbus plerumque certis intervallis recurrit sine ulla causa manifeste excitante. Interdum quidem a vehementibus animi affectibus paroxysmus inducitur, (similibus autem haud raro pelliatur); interdum a vi externa, praecipue oculis illata, distorsione vel defatigatione; interdum a praetermissa exercitatione solita, vel ab evacuationibus solitis suppressis, et saepe ab erroribus in victu, ingluvie, crapula, et quicquid crediditatem et aciditatem in ventriculo producit. Notum etiam est, huiusmodi morbos in ventriculo paroxysmi arthritici fere semper praenuncios esse.

Sed magis ad rem attinet, causas excitantes, et fortasse quoque praedisponentes, saepe ex statu aëris provenire. Arthritis regularis, quae plerumque, quando incipit, semel in anno recurrit, primo Vere aegram aggreditur, plerumque, exeunte Januario, aut incunte Febuario, nunquam fere tempore aestivo, nisi a subita et violenta aliqua causa excitante. Ingravescente morbo, ubi aeger hinc paroxysmos quotannis patitur, alter Vere alter Autumno accedit: Æstate autem, aeger a morbo proflus, immunis est. Denique, in his casibus, ubi aeger miserrime cruciatur, et usum membrorum perdit, et per maiorem partem anni lectu figitur, tempore aestivo maximum levamen percipit. Saevissimi isti dolores, quos medicina vix attingere potuit, hoc naturae beneficio semper magnopere levantur, et plerumque per tres quatuorve menses omnino cessant. Pari itaque ratione, coeli mutatio magnam suaviem in hoc morbo pollicetur.

Procul dubio aër frigidus arthriticis nocet; follicles enim tegunt partes a morbo praecipue insectatas, et exinde aliquid levaminis percipiunt. Nec aliud remedium artubus dolentibus praeter pannum laneum, aut simile quovis, optimi medici applicare permittunt. Constat etiam, subitam corporis refrigerationem, paroxysmum arthriticum haud raro inducere. Et saepe arthritici, a pedum refrigeratione aliqua, leves dolores podagricos sentiunt. Medicis, quaque bene novum est, sudorem vel perspirationem pedum solitum interceptum, paroxysmi arthritici saepe praenuntium esse. Paroxysmi etiam qui magnum paroxysmum faciunt, levi pedum et interdum totius corporis madore, plerumque solvantur. Hinc itaque verisimile

est, perspirationem suppressam aegrotis nocere, liberam autem prodesse. Vere, et Autumno, ubi tempestas variat maxime, morbus maxime flagrat, et in aestate, ut antea diximus, cessat. Ad evitandas igitur causas remotas, sive praedisponentes sive occasionales, ex aliis provenientes, coeli mutatio vehementer suadenda est. Nunc videamus quomodo coelum fortunatum caeteris causis remotis occurrere possit.

Morbi ventriculi paroxysmum arthriticum saepe semper praecedunt, et quidem plerisque arthriticis insistant, et magnam partem morbi faciunt. Sibi hypochondriaci notavimus hosce morbos in regionibus calidioribus minime grassari, et quidem apud nos rarius in aestate occurrere. Quibuscunque igitur causis tribuendum sit illud levamen ventriculi morborum quod ex aere benigno provenit, sive effectibus ejus directe in genus nervosum, sive effectibus in solidarum distributione promovenda, constat, coeli mutationem istis morbis magnopere prodesse, et, iis sanatis aut levatis, sequum est expectare arthriticis exinde maximum auxilium recipere.

Arthritis, ut supra notavimus, eos plerumque aggreditur qui vitae acumen praeterierunt, qui 30 vel 35 aetatis annum attigerunt; Aetate puerili sere prorsus ignota est, et juvenili admodum rara: Aetate provectiore autem perspiratio sensim minuitur; nam multa vasa minustiora, et foramina cutis, lapsu temporis coarctantur et coalescunt; et homines senescentes solitam et debitam exercitationem plerumque negligunt; quippe pristina animi et corporis alacritas tunc deficit, et ipsi sedentariis negotiis saepe occupantur. Talibus itaque hominibus perigrinatio in regiones calidas, ni fallor, optime succederet, et distributionem ad superficiem et excretionem per cutem restituerit, et ita fortasse huic malo levamen ferret.

Arthritis plerumque eos invadit qui epulis lautioribus indulserunt, et vino aliisque liquoribus spirituosius ultra modum dediti sunt. His igitur, prae omnibus aliis hominibus, crederemus liberrimam per cutem perspirationem necessariam esse; nam equilibrium certum inter ingesta et egesta ad sanitatem requiritur. Hoc autem plane turbatur, si quis victu lautiori utatur, et vitam otiosam et sedentariam degat. Experientia satis ostendit, varios morbos exinde nasci, et imprimis arthriticum. Homines qui victu modico et tenui utuntur, etsi vitam otiosam agant, arthritis raro invadit: Et illi qui valula et crebra utuntur exercitatione, praecipue qui duro et perpetuo labore victum quac-



quaerunt, etsi cibum crassum magna copia quotidie ingurgitant, immo, et liquoribus spiritibus indulgent, hoc morbo raro vexantur. Sunt etiam nonnulla exempla, ubi homines arthritidem haereditariam (quae omnium pessima, et sanata difficillima, habetur) per plures annos passi, ad insipiam redacti, et victum dura labore quaerere coacti, prorsus sanati fuerunt. Hujusmodi exempla clarissime ostendunt quantum intersit ad hunc morbum levandum, aut medendum, liberissimam fluidorum ad corporis superficiem determinationem promovere. Nequaquam ignoro, aliam de hac re et prorsus diversam rationem dari posse, et beneficium ab exercitatione acceptum effectibus ejus in partes solidas tribui. Procul dubio exercitatio non modo liberam fluidorum distributionem promovet, sed etiam musculorum et universi corporis habitus vim et robur conciliat, conservat, et auget: Et minime contendo, exercitationem hoc modo arthriticis non prodesse; praesertim morbo jam fractis et debilitatis.

Varia autem sunt argumenta ex morbi historia, et ex analogia jurantium, quae ostendunt beneficium ab exercitatione perceptum effectibus ejus, in debita fluidorum distributione promovenda, magna saltem ex parte tribuendum esse. Ex supra dictis, ni fallor, satis patebit, perspirationem impeditam arthriticis maxime nocere. Et variae res aegrotis opem ferunt quae vix aliter agere possunt, nisi perspiratione et debita ad superficiem distributione promovenda. Hujusmodi sunt vestitus plenior et validior, praecipue partium dolentium, unde omnes fere arthritici aliquid levaminis sentiunt: Et balneum tepidum, vel etiam calidum, et fricationes crebrae et validae, unde multi maximum auxilium perceperunt; et nonnulli, morbo admodum fracti, usum fere perditum membrorum recuperaverunt. Non opus est repetere quae jam dicta sunt de beneficio, in saevissimo hoc morbo, a calore aetliivo percepto. Ex his omnibus recte, ut mihi videtur, colligendum est, liberam perspirationem ad hunc morbum medendum imprimis requiri; et antea probavimus, coelum temperate calidum in eo praestare, quod aegrotis quam maxime fractis et debilitatis sine periculo aut detrimento, per quodlibet tempus, adhiberi potest. Coeli igitur mutationem arthriticis suaderem, ob has praecipue causas, ut omnia nocentia quae ab hieme nostrâ proveniunt evitentur, ut beneicia, quaecumque sint, quae tempus aestivum suggerit, continuentur, et ut perspiratio et debita fluidorum ad cor-

poris superficiem determinatio praeveniantur, vel, si repressae fuerint, ut restituantur.

Aliud tamen argumentum his adungere liceat, quod, etsi incertum et minime accuratum videatur, non tamen idcirco absurdum censeo. Antea observavimus, arthritidis seminum in constitutionibus quorundam inesse; sed, quam natura hujus semini adhuc latet, vix expectandum est remedium forte repertum in quo corrigi aut exstirpari possit. Cum enim in hoc morbo, (ut bene monuit Sydenhamus), causa ejus in habitum et novam quasi naturam transiverit, nemo sanus exstimeret leviculum aliquam et momentaneam alterationem, a quolibet sive remedii sive vietus genere superinductam, curationis scopum posse attingere; ut vero corporis habitus omnis alio traducendus est, atque humo integer deinceps, quasi nova incude, refingendus? Sed, si constitutio funditus, vel saltem magna ex parte, mutatur, haud improbabile est, istam qualemcumque dispositionem mutari vel corrigi. Notum est, certas mutationes quas corpus subit dispositionem istam in conspectum ducere: Nam puerili et juvenili aetate raro se ostendit, virili autem plerumque morbus invadit: Constitutio igitur certas mutationes ea aetate subit, quae huic dispositioni favent. Ex aliis itaque mutationibus sperandum est, dispositionem arthriticam tolli vel corrigi posse. Coeli autem mutatione corporis constitutio quam maxime mutatur: Et experientia satis ostendit peregrinationem in regiones calidas non modo tutam esse in hoc morbo, sed utilissimam et aegrotis ipsis jucundissimam.

Est casus satis memorabilis, et huic observationi appositus, quem clarissimus Van Swieten in Commentariis suis citavit, de homine qui trigesimo primo aetatis anno podagra miserrime laboraverat, et manuum pedumque usum totum omnem perdididerat: Hoc statu in Indias Orientales navigavit, ut insigni ibi munereungeretur. Post triennium in patriam rediit, solo aeris calore, absque ullo alio remedio, perfecte sanus a podagra liber vixit.

Similem casum illustrissimus Hallerus recensuit Domini de Poincy, qui jam senescens, et arthride miserrime vexatus, in Insulas calidas Americae iter fecit, ibique per plures annos vixit; hoc effectu, ut ab arthride aliisque senectutis malis liberaretur, et pristinam sanitatem recuperaret.

Alterum similem casum a medico peritissimo accepi, qui segrum saepe vidit dum peregre vivebat. Vir generosus podagra

dagraper plures annos laborabat, donec tandem morbus adeo ingravescebat, ut per majorem partem anni miserrime cruciaretur. Aeger multis remediis frustra usus erat: Per longum tempus sola diæta lactea vitam sustinuerat. Morbus tamen indies augebatur. In Italiam iter fecit, ibique brevi tempore proximum atrocissimum (sed brevem) passus est. Dehinc tamen a morbo liber vixit, et adhuc post plures annos vivit. Observandum est, hunc ægrum deus tantum annis in Italia commoratum esse, et, dum ibi maneret, victo, paulo quam antea lautius indulgere.

#### DE SENECTUTE JUVANDA.

REX neque inutilem, neque a proposito hujusce dissertationis alienam, me facturum credidi, si in hoc loco pauca proponerem de senectute juvanda, et vita humana ultra limites ordinarios producenda, ope cœli mutationis. Nonnulli medici, atque hæc parvi nomina, existimant, senectutem ipsam verum morbum esse, qui arte nostra levamen accipere potest. Alii quidem contendunt, senectutem statum naturalem et inevitabilem esse, et ideo nec morbidam nec arte humana meliendam. De hac quaestione, quippe inutili et inepta, minime nunc est in animo verba facere. Sive morbus, sive status naturalis sit, satis superque patet, senectutem multa incommoda secum ferre, corpus variis morbis opportunum reddere, vires omnes naturales, tam animi quam corporis, sensum minuire, et mortem ipsam citius vel serius inducere. Hic igitur status omnia præstare et auxilia quæ medicina præbeat quam maxime requirit. Medici enim est, non modo morbos sanare, sed sanitatem tueri, et vitam, quantum hominibus detur, conservare et protrahere. Medicina igitur admodum imperfecta foret, si nulla remedia huic proposito idonea suppeditaret. Præsertim quum nonnulli sunt male dicentes, qui strenue contendunt, artem nostram saluferam vitam humanam interdum breviorē reddere.

Nulla equidem remedia novi, quæ juventutem præteritam revocare possint: Minime tamen dubito, quin remedia adeo efficacia deprehendantur, ut senectutem instantem pellere possint, et vitam, sanitate et viribus parum imminutis, per aliquot annos ultra limites naturales producere. Virtus autem hujusmodi nequaquam assequenda



est a quolibet medicamento per breve spatium usurpato. Ad tantum effectum in corpore perficiendum, remedium requiritur non modo efficax, sed per longum tempus continuatum, et ad universam fere habitus conditionem penitus mutandam idoneum.

In pluribus casibus, ubi vitium aliquod totum corpus infestaverit, et græve periculum minuitur, universum habitum mutare sæpe optime succedit. Omnibus probe innuit, vitæ genus intemperatum, aut minus idoneum, longam valetudinem et senectutem præmaturam sæpe inducere. Ratio itaque suadet, et experientia satis ostendit, idoneum vitæ genus ista incommoda prævenire posse, et sanitatem tuam, et senectuti moram ferre, idcirco vitæ terminum producere. Quantum ad hunc effectum conducatur idoneus vitæ generis mutatio Cornaro luculenter testatur: Qui, cum annum ætatis quadragesimum præterierat, et constitutionem, ob vitæ genus minus temperatum, quodammodo fractam et debilitatam senserat, prius consuetudinibus valedixit, vitam sobriam et temperatam legit, vigoremque pristinum recuperavit, et corporis sanitate et animi viribus nihil imminatis, annos centum complèvit.

Antea diximus, cœli mutationem maximos effectus in corpus humanum edere: Et, si per tempus satis longum homo sub cœlo alieno degat, haud ab simile est, constitutionem ejus funditus mutari. Varia sunt argumenta quæ mihi suadent, mutationem a cœlo calido expectandam plerisque sensibus utilissimam fore. Nemo sanus existimabit, cœli mutationem, vel ullum aliud remedium, senectutem semper pellere, et vitam humanam in æternam, vel etiam per longam annorum seriem, protrahere posse. Beneficium adeo mirificum nequaquam pollicebor. Multi autem, qui vires desicientes et sanitatem fractam percipiunt, et mortem prementem sentiunt, remedium avidissime captabunt, quo vita per paucos tantum annos prolongetur, et vires languentes et fractæ aliquatenus reficiantur.

Consilium nostrum, aliquis obijcere potest, vitæ humanæ longinquitatem eandem fere esse per totum terrarum orbem; vel fortasse, si quæ differentia sit, in regionibus nostris æquilonibus majorem quam in servidioribus. Sed antea monuimus, cœlum calidum multo majores effectus in peregrinos edere, quam in homines qui sub eo semper vixerunt. Si quis remedia cuius optimo semper assuescat, quicquid boni a tempestivo ejus usu expectavisset plane perdit. Immo, facile crederem, intempestivum hujus reme-

medii

medii usum non modo non prodesse, sed in quibusdam casibus quam maxime nocere. Si quis nostrorum sanus et robustus, et aetate florens, coelos fervidiores peteret, ibique degeret, vitam non modo non protraheret, sed fortasse decurtaret, et senectutem praematuram sibi compararet.— Miserrima hujusmodi exempla quotidie spectamus. De hoc igitur remedio quod olim ille alius Celus optime monuit, sedulo observare oportet, cavere nempe ne in secunda valetudine adversae praesidia consumantur.

Hic igitur ostendere conabor, quales mutationes in senectute occurrant, quomodo cunctum nostrum senibus noceat, et qua ratione peregrinatio in regiones calidiores eis suavis sit. Neutiquam in animo est hic agere de omnibus malis speciatim, quibus aetas senilis, in regionibus hisce septentrionalibus, obnoxia est, et quae coeli mutatione praecaveri, vel levari, vel sanari possunt. De his tantummodo mutationibus et varietatibus pauca proponere statui, quae senectuti naturales sunt, et quae sanissimos et robustissimos, citius vel serius, invadunt, frangunt, mutant, et tandem occidunt.

Ingravescentibus annis, corpus humanum variae patitur mutationes, quae vires omnes et functiones naturales laedunt: idemque multa sensibus incommoda inferunt. Hae mutationes universum systema afficiunt, et ex omni parte labefactant, et debilitant: genus nervosum imprimis laedunt, sensus hebetant, vim et alacritatem, et animi et corporis minuunt, partes solidae rigidas et duras reddunt, et fluidorum motum et distributionem magnopere impediunt. Omnia haec mala se invicem plane augent: difficillimum tamen est eorum principium et fontem explorare, vel detegere quendam caeterorum causa sit. Si ab impedita fluidorum distributione incipiamus, quaestio oritur, cur haec corruat, si partes solidae et vires moventes, sanae, naturales, et integrae maneant? Vel, si a duritia et atonia partium solidarum, et praesertim arteriarum et muscularum, incipiamus, difficile erit rationem reddere, cur haec indurescant, et vires suas amitterent, si fluidorum distributio rite promoveretur, et vis nervosa non minuitur. Denique, si ab ipsa vi nervosa deficiente incipiamus, (unde procul dubio omnia alia mala sponte fluere), explicare oportet, cur haec deficeret, si sanguinis motus et ceterae machinae animalis functiones rite et mote solito perficiuntur. Cordis enim actio et vis nervosa se invicem alunt. Constatendum itaque est, corpus humanum circulum esse, cujus principium et finis adhuc latent, et for-

tasse diu latebunt. Res omnes quae ad vitam et sanitatem et incrementum corporis necessariae sunt nondum accurate intelliguntur, vix igitur expectandum est causam eorum defectus accurate intelligi posse. Multa tamen novimus quae ad vitam et incrementum necessaria sunt, et quae vim et sanitatem corporis alunt: Multa quoque novimus quae his omnibus inimici sunt, quae vires minuunt, sanitatem frangunt, corpus attenuant, et morti ipsi viam sternunt. Novimus porro haec omnia se invicem augere, et ideo indices in pejus ruer.

Omnes autem mutationes quae a senectute proveniunt sub tribus illis capitulis redigi possunt; sub vi nervosa imminuta, partibus solidis induratis, et libera fluidorum distributione impedita. Ad effecta itaque uniuscujusque nunc magis speciatim perpendenda progredimur. Prima plerumque signa, quae senectutem incipientem comitantur et denotant, a vi nervosa imminuta oriri videntur. Sensus omnes, tam externi quam interni, paulatim hebetiores sunt. Visus, auditus, olfactus, gustus, sensum deficient; hinc plerique senes cibos mites et dulces, quos antea apperebant, fastidiunt, et cibaria conditiore, salita, et aromatica concupiscunt. Hilaritas juvenilis senili gravitate paulatim cedit. Corporis etiam vis et agilitas sensum minuuntur; hinc plerique senes omnibus validioribus exercitationibus valedicunt, et negotia laboriosa pro vita tranquilla et otiosa habentissime commutant. Ingravescente ulterius aetate, vis musculorum indies magis magisque minuitur, donec tandem senis consueti omnem fere usum membrorum amittunt. Animi vires quoque paulatim deficient. Imaginatio reprimitur, et memoria vacillat. Primo quidem ideas recentiores facile dimittit; ceteri antiquas, quas olim acceperat, optime retinet. Postea tamen omnes ideas, tam antiquas quam recentes, e memoria profus delentur, et tunc iudicium funditus subvertitur. — Partes corporis solidae indurescunt: Tela cellulosa non modo durior ad scalpellum evadit, sed majorem vim adtractilem adipiscitur. Hinc cutis, quae in junioribus mollis, levis, et aequalis fuit, paulatim indurescit, et rugis notatur. Innumera foramina invisibilia coarctantur, et prorsus concluduntur; hinc perspiratio reprimitur, et cutis hecietatem peculiarem acquirit. Arteriae densiores in senibus, et rigidiore, et etiam arctiores fiunt, et multi minores paulatim clauduntur. Venae quoque majorem adipiscuntur densitatem et vim quam in juventute, sed neutiquam in eadem ratione ac arteriae. Hinc, ob majorem resistentiam,



tiam, et minorem impetum, (viribus nimirum moventibus jam imminutis), sanguinis motus tardior est; ideoque venae senum amplius nec raro artiosae sunt. Ob hanc causam etiam, et minorem cordis irritabilitatem, (a defectu vis nervosae), pulsus rardiores micant. Cerebrum ipsum, nervi, viscera omnia, indurescunt, ut et caro muscularis, cujus saepe magna pars in durissimum tendinem convertitur. Haec duritia plane oritur a defectu fluidorum, quae non, ut antea, per minutissima vasa jam coarctata vel conclusa fluunt. Eadem fortasse ratio magna ex parte reddenda est de debilitate musculorum, et totius corporis decremento, quae in senectute observantur. Nam corpora, quantumvis magna et obesa et robusta in prima senectute, in ultimo senio marcescunt, et prorsus debilitantur. Si vasa quae sanguinem ad partem aliquam ferre solebant coarctantur, vel clauduntur, ita ut nullum sanguinem, vel exiguum quantitatem, ferant, patet istam partem non amplius ut antea aliq. nil mirum igitur, si tabescat, et vires, quas prius habebat, amittat. Praeterea, multa vasa, et glandulae lacteae in mesenteria, in extrema senectute, evanescunt; et exinde etiam verisimile est, longe minorem nutrimenti copiam ex eodem cibo in sanguinem venire.— De impedito fluidorum motu et distributione minime dubitandum est. A defectu vis nervosae, a debilitate partium moventium, a majore resistentia arteriarum, et ab arctatione vel excascatione innumerorum vasorum minorum, et foraminum cutis, patet sanguinem non ut antea libere per totum corpus fluere: Et omnes fere excretiones minutae, et nonnullae suppressae, et secitiae et marcor, et durities corporis, factum praeter dubium demonstrant. Perspiratio in senibus admodum minuitur, et saepe fere aquosa est. Alvus etiam in his plerumque tarda repetitur. Hinc, secundum multos et celeberrimos auctores, aerimonia in fluidis nascitur, a retentione earum partium quae excerni et eliminari debent. Natura autem hujus aerimoniae, quatenus scio, nondum accurate indagatur: Minime tamen negarem, varios morbos in fluidis senum obtinere: Et, deficientibus caeteris naturae viribus, quae sanguinem viue comparare solebant, haud absumile est, eum effectum vel aliter morbidum fieri.—Senes morbo interdum obnoxii sunt a defectu sanguinis motus plane oriundo, necrosi vel gangraenae scilicet, quae plerumque pedes primo invadit, postea crura, et mortem tardam quidem, sed certam, inducit.

Ratio ergo patet, cur caelum nostrum frigidum, humi-

dum, et varium, senibus adeo sit inimicum. Genesi nervoso imprimis nocet, et vim et alacritatem, cum animi tum corporis, minuit: Hinc debita fluidorum distributio impeditur, et atonia et duritia partium solidarum augentur. Quinetiam aer frigidus et humidus (quod jamjam saepe monuimus) perspirationem, et liberam ad superficiem determinationem, directe et immediate impedit. Frigus quoque externum cutem ceterasque partes solidas duras et rigidas facit. Sed haec omnia in senibus naturaliter obtinent, et, ubicunque obtinuerint, (ut supra notavimus), se invicem augent.

Ex hac senectutis historia colligere liceat, tria, malis ejus ut occurratur, praecipue requiri: Scilicet, vim nervosam alere et sustinere, vel, si jam labefactatur, eam restaurare: Partium solidarum duritiam nimiam praeveneri vel tollere, et debitam sanguinis distributionem promoveri. Si haec omnia exacte et ad vota perfici possent, nihil dubito quin vigor pristinus et juvenus integra restituerentur. Sed, si pro parte solum perficiantur, robur et vim aliquo modo renovabunt, senectuti instanti moram afferent, et vitam fortasse per plures annos protrahent. Nulla autem remedia novi quae his propositis melius respondeant, quam coeli mutatio, itinere in regiones calidas facto.

Nec pro nihilo habendus est, remedium hocce tutum et jucundum omnibus senectutis malis simul et semel occurrere. Vidimus plane haec omnia se invicem augere: neuiquam tamen novimus quodnam sit causa ceterorum. Summi vero momenti est, ad morbum aliquem medendum, causae ejus remedium quam primum adhibere. Sed, si cuivis malorum quibus senes praemuntur remedium adhibeatur, equum est expectare universum corporis habitum beneficium exinde accepturum; viribusque naturae hoc modo aliquantulum refectis, cetera senectutis mala quodammodo levati debent.

Vix opus est dicere, quantum aer calidus profit, ad vim nervosam excitandam et alendam. Sanissimi et robustissimi, qui tali auxilio nil egent, novam alacritatem, tam animi quam corporis, exinde sentiunt: Debilibus vero et imbecillis, et adversa valetudine exhaustis, vires labefactatas restituit, et quasi vitam ipsam deficientem integrat. Viros musculorum reficit et conservat, sensus jam hebescentes acuit, sanguinis circuitum languidum et serè stagnantem instigat, pulsus (in senibus tardos) festinat, et debitum fluidorum motum et distributionem per totum corpus promovet;

inver; atque secretiones et excretiones omnes, jam minutas et fere suppressas, praecipue perspirationem, restituit. Hoc modo igitur sensibus magnopere prodesse debet.

Nec minore vi pollet ad praecavendam aut sanandam duritiem illam cutis et omnium partium solidarum, quas sensibus tanta mala offert. Frigus cutim et partes solidas constringit et indurat: Sed calor moderatus eas laxat et molles, testibus ipsius sensibus. Si senex igitur in regiones temperate calidas traiecit, sibi benignos cutem ejus durant, rugosam, siccam, et fere imperviam, mollem, levem, et penetrabilem, sensim resderet; innumera vasa minutiora jam coarctata, et fere conclusa, iterum patefaceret, et sanguini aliisque humoribus viam aperiret ad multas corporis partes, ob defectum fluidi vitalis, fere exsiccatae. Hinc omnes secretiones et excretiones naturales jam deficientes promoverentur, et vis et contractibilitas et molities, muscularis duris, tendineis, tremulis, imbecillis, et fere paralyticis, restituerentur. Nec dubitandum est, quin genus nervosum, ex hac renovatione, ceterarum corporis virium optimis percipiat effectus. Notum est, in aliis hominibus liberam fluidorum distributionem et perspirationem, majorem vim et alacritatem, et corpori et animo, conciliare: Nec in sensibus aliter obtinere debet. Et, genere nervoso hoc modo integro, universum corpus reficitur. Hinc, quamprimum durities partium solidarum, et praecipue cutis et arteriarum, quodammodo vincitur, vires corporis augentur, sanguinis reditus ad eam festinat, ut nimium resistant, pulsus crebriores micant, et sanguis per vasa minuta et extrema rectius propellitur; ideoque per vasa fere conclusa viam libi aperit, et partes duras, rigidas, et siccas, ut nunc, molles, flexibiles, et vividas reddit.

Vel, si a perspiratione et distributione ad superiorem promotis magis incipere placeat, atque patet, quomodo coeli mutatio sensibus juvaret. Labera enim perspirationis, quomodocunque excitata, cutem relaxat et humidat; hinc duritiem et siccitatem senilem minuit vel corrigit, et sanguinis distributionem ad externas faciliorem reddit. Vires itaque naturae auget, et deficientes reddit. Genus nervosum etiam quam maxime favei, et corpori alacritatem, et animo hilaritatem, conciliat. Tribus indicationibus curativis, quas proposuimus, optime respondet, et haec quaeque se invicem promovere. Ex his omnibus itaque, a prae colligendum est, coeli mutationem sensibus magnopere prodesse.



Doctrina quoque haud parum confirmatur, ex analogia multarum rerum quae senibus profunt, et quae indicationibus nostris plane referendae sunt. Vim nervosam alere et sustinere imprimis suavis: Usus autem vini liberalior ad hunc effectum tendit; et experientia satis ostendit vinum, quantumvis junioribus noceat, modice usurpatum, senibus non modo tutum esse, sed quam maxime utile; ita ut Lac Senum non immerito habeatur. Ad hanc rem confirmandam, magnorum nominum auctoritas vix requiritur. Si tali auxilio opus esset, inelysissimus Sangradus (cujus famam nemo est qui non audivit) esimium documentum suppeditaret. Postquam enim, per tutum fere vitae cursum, contra omnem patum generosum bellum atrox et inexorabile gesserat, ingravescens animo, praedio succubuit, et, dura necessitate coactus, ab inimico diu execrato gratiam et subsidium imploravit. Si quis Sangradi exemplum rejiceret, sagacissimo Le Sage celet, qui non minus in arte medica quam in hominibus versatus fuit. Ad alteram indicationem, perspirationem et fluidorum ad externas distributionem promovere, vestitus calidior plane requiritur. Et omnibus notum est, hunc senibus valde utilem esse, et eos inducio laneo sese oblectare. Fricationes quoque et modica exercitatio, praecipue gestatio, quae ad idem tendunt, senibus magnopere profunt: Ut et balneum tepidum vel calidum, unde plurimi senes maximum auxilium perceperunt.

Sed beneficia quae tempus aestivum senibus adfert, praec omnibus doctrinam roborant, et utilitatem a coelo calido expectandam optime ministrant. Accedente aestate, omnia mala quibus senes hieme vexabantur fere evanescent, et, senectute paulisper repulsa, scintilla pacis extincti ignis eos denum animare videtur. Sed reversa hieme mala prius iterum et etiam angustius premunt. Si tantum ignis beneficii ab agitate nostra percipitur coelum perpetua aestate gaudens auxilium multo stabilius pollicetur.

Denique, experientia satis ostendit, hanc spem senectutis aliquo modo medendae, et vitae ultra terminum naturalem producendae, nequaquam vanam aut fatilem esse. Multa enim exempla sunt, ubi homines jam senescentes, in regiones calidas profecti, novum vigorem acceperunt, et vitam fere delictentem protraxerunt. Nonnulli Europaei in India Occidentales iter facientes huc forsitan insperatum beneficium acceperunt. Fertur etiam, Hispanos et Lusitanos, haud raro, quando senectutem premientem sentiunt, in Brasiliam aut alias partes Americae Meridionale-

lis se transvehere, et ita vires deficientes rescicere, vitamque interdum per viginti annos et amplius protrahere. <sup>1</sup> Brasiliae salubritatis fama (inquit Piso, in historia sua naturalis et medica Brasiliae continentis) non paucus olim senes aliosque minus prospera attentes validudine, ex Hispania et Indis, aliisque distantis locis, exivit ad aërem et aquas hinc caelo datas, tanquam ad duo validissima praesidia vitae et valetudinis. Perquam maturae enim pubescunt incolae: Senescunt tarde, idque sine canitie aut calvitie. Quo fit, quod longe ultra centesimum aetatis annum, viridi senecta, non Americani tantum, sed et ipsi Europaei fruuntur, totumque adeo territorium <sup>2</sup> Macrobiū dici mereatur. Immo fertur, foecunditatem amissam in Insulis Americae calidis rediisse. Quod, si verum est, clarissime ostendit, quantum aër calidus valeat ad vires corporis rescicendas.

Quaestio adhuc manet, qua aetate peregrinatio in regiones calidas cum maximo beneficio instituat. Dubito, an ulla optata speciem designari possit; quippe peregrinationis usus non ab annis, sed a statu constitutionis, pendet, et alii citius alii serius senescunt. Auctores senectutem dividunt in erulam, sive viridem, et decrepitam: Illam ubi anno quadragesimo bono, vel a tempore quo homo canescit, et conspiciillis primo utitur, ad annum sexagesimum tertium, grandem climactericum scilicet, protrahunt; hanc ab eo termino ad extremam vitae horam. Pauca et levia tantum incommoda in priore percipiuntur; facile tamen observantur, et universam ruinam imminentem plane indicant. Omnes autem functiones, tam animi quam corporis, adhuc supertunt. Motus muscularis parum minuitur, facultas generandi, et cibi appetitus et digestio manent. In senectute vero decrepita, omnia cito in pejora ruunt. Animi vires omnes indices minuuntur, et demum prorsus abolentur, cunctaeque corporis functiones languescunt, et tandem siliuntur. Notum tamen est, haec mutationes nunc citius nunc serius accidere; nonnulli vires et functiones omnes, etiam generandi facultatem, ad centesimum fere annum retinent; nonnulli corporis formam, sensusque omnes externos et internos, ad septuagesimum vel octogesium annum integros conservant. Plerumque tamen omnes vires manifestissime labefaciuntur ante septuagesimum annum; ante quinquagesimum autem nulla fere mutatio sensibilis abinet: Vix itaque credo coeli mutationem ante quinquagesimum annum requiri; post cum vero, nihil dubito quin in plerisque casibus quam

maxime

maxime proficiat. Ni fallor, in hoc, sicut in aliis casibus, multo facilius erit mala praevenire quam sanare; ideoque haec peregrinatio cum maximo fructu institueretur intra annum aetatis quinquagesimum et sexagesimum quintum, plerumque fortasse circa sexagesimum, nunc citius nunc ferius, secundum hominum vires et constitutionem. Haec autem a variis circumstantiis pendent, veluti ab habitu congenito, et fortasse haereditario; nam longevitas in quibusdam familiis multo frequentior est quam in aliis; pendet etiam magna ex parte a vitae genere, et innumeris aliis causis externis.—Minime tamen dubito, quin peregrinatio in regiones calidas senibus jam decrepitis valde proficiat, et unicum fortasse remedium sit, quo vires eorum refici, et vita protrahi, possunt.

Postremo, inquirendum est, quoniam coeli hujc consilio optime respondeant, et quae regiones senibus petendae sint. Regio itaque patria calidior, aëre puro, sereno, et benigno gaudens, et in caeteris salubris, semper eligenda est: Senectute iterum premente, regionem adhuc calidiorē petere oportet; nec de senē omnino desperandum putat, donec coelos etiam fervidissimos expertus fuerit.—Si quis nostrorum jam senescens in Italiam aut Hispaniam iter faciat, ibique degat, nihil dubito quin optimus exinde percipiat effectus, et senectutem, vel saltem omnia senectutis mala, per aliquot annos pellat. Lapsu autem temporis, procul dubio cum iterum invadent; tunc, si coelum adhuc fervidius petat, eadem ratione novum vigorem exinde capiet, qua senex Hispanicus in Americam meridionalem transvectus ex ista mutatione auxilium percipit.

Hoc modo sperare licet, homines a coelo etiam fervidissimo salutem accipere posse, senectutis mala lenire, et vitam, cujus brevitate toties sunt cuncti, per viginti vel triginta forsitan annos producere.

\*\*\*

TERTIAMINI huic jam finem impositoro, nihil amplius mihi restat, quam ut almae hujus Academiae Professoribus meritis agam gratias. Ob insignem in arte propria peritiam, et in omni literarum genere scientiam, quantas sibi laudes collegerint, nemo non audit; ob benevolentiam morumque suavitatem, quantas, studiosa juvenutis jubentissime fatentur. Alia vero beneficia, aliaque gratias postulantis, in me contulerunt; quoniam Patre cito mor-



te abrepto, mihi adolescenti manum porrigerent, et consilio et amicitia semper adessent. Hujusmodi beneficia, praeterquam verbis rependendi, utinam facultas esset: Juvaret tamen, hoc modo, beneficiorum ab iis receptorum me non immemorem praestare.

A laboribus academicis discessuro, vitio fortasse mihi verteretur, Societatem Medicinæ Studioforum, (cui omnes, qui utilitatem ejus experti sumus, gratias haud parvas debemus), silentio praeterire: Haec quidem maximas sibi laudes vindicat, quod, in ea, utile dulci optime jungitur, et labor ipse voluptas fit. Per quadraginta jam annos studiosa juvenus ex illo fonte veram scientiam hausit: Quantum exinde delectationem, quantumque fructum, ipse percipiam, semper meminisse juvabit.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

PLUMBI VIRTUTIBUS MEDICIS:

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi Illustrissimi Viri,

GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academicæ Edinburgensis Praefecti:

REC. RUF.

Auspicio SYRACUS ACADEMICI Censuro,

Et Medicæ FACULTATIS MEDICÆ Doctori,

Pan GRADU DOCTORATUS,

SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

GULIELMUS GOTTLOB LILIE,

HOLSATO-GRÆNANUS,

Soc. Med. Edin. Soc.

Præd. Id. Junii, hora locoque solitis.

---

1775.

---

Viro Celeberrimo,

JOANNI CRISTOPHERO LUDOVICO SEIF, M.D.

Summa cum laude apud Hamburgensem

Præm. medicam emercenti,

Con sanguinitatis ac benevolentiae

Vinculis filii conjunctissimis,

Observantiae ergo,

Haec pagellas scribi esse voluit

AUCTOR.

## PLUMBI VIRTUTIBUS MEDICIS.

**O**MNE medicinae rationalis principium et incrementum duobus hisce potissimum, accurata nimirum observatione, legitimoque inde deducto ratiocinio, fundamentis innititur. In humani igitur ingenii honorem, aegrotantiumque emolumentum, ut praxin medicam feliciter exerceamus, quae intima morborum sit natura, quid morbus in corpore humano efficere valeat, et quae vera medicaminum salutarium vis sit, summo studio et opera indagandum. In hoc studium jam veteres, nec frustra quidem, incubuerunt; recentiores tamen iis palmam longe praeripuerunt. Magnorum enim in arte Hippocratica virorum ingenio, irrequietisque studiis et laboribus, debemus, quod multorum morborum, non solum naturam et causas melius distinctiusque compertas habemus; sed nostra quoque aetas eo praecipue inclauit, quod medici, inusili medicamentorum nimis compositorum sarragine relegata, imputatisque sesquipedalibus formulis, simplices imitantes naturae leges, simplicia exhibuerunt medicamenta, et experiendo observandoque, de illorum virtutibus propriis, agendique ratione, disputarunt; mortiferas immo venenorum vires sic fraenis coercuerunt, ut tuto possint in salutis praesidia commutari. Quorundam tamen medicamentorum patroni, ex nimio propriae quasi progeniei amore, miras quasdam et saepe universas ferre virtutes medicas in iis detexisse sibi persuaserunt, et laudibus extulerunt, quae vix fidem merentur. Ad hunc numerum plumbum, quin referri debeat, nullas dubito, cojus, quamquam toties confirmata sit virtus, in variis corporis nostri affectionibus debellandis; in aliis tamen, in quibus aequè commendantur, parvi momenti vires illius, vel penitus nullae esse, inveniuntur. Hunc igitur ad evitandum errorem nihil magis conferre contendimus, quam in naturam remodii intimam inquirentes, effectusque primarios in corpus humanum accurate observantes, ut legitimo ratiocinio, qui verus sit usus tandem concludamus. Nos ideo, jubente lege academica, ad scribendum compelli, de *plumbi virtutibus medicis* disputare nobiscum decrevimus. Nam tantae illius et salutiferae, et noxiae observatae sunt vires, ut tota res paulo accuratius examinari et illustrari summo jure mereatur. De plumbo igitur, ejusque calcibus, praeparatis



ratis salinis, vaporibusque, verba facientes, effectus illius in corpus humanum primo indicaturi; ex his deinde, et morborum, in quibus commendantur, natura, et accurata denique observationis norma, qui legitimus ejus sit usus medicus, vel externus vel internus, quantum in nobis situm erit, derivare conabimur.

Plumbum, in propria sua forma metallica concretum, vel interne exhibitum, vel externe corpori humano applicatum, nullos ferme effectus edit, nisi a mole vel gravitate deducendos. Impedit enim, ut postea videbimus, particularum nimis arcta inter se cohaesio; impedit quoque magnam, quae cum combinatae sunt, principii inflammabilis copiam. Quandocumque vero portio illius, per humores, imprimis acidos, in organis digestionis dissolvatur, et sic aëreosa evadat, ea ad praeparationes salinas, de quibus mox dicemus, haud dubie referenda est. Ea iisdem ferme causis communes quoque plumbi calces excludimus, quae, quamquam proprias ferme nullas virtutes possideant, in variis tamen emplastris, ad debitam his spissitudinem conciliandam, in auxilium vocantur. Dubito enim, an ulla vis refrigerans his possit adscribi. Olea, nimirum, et substantiae pinguedinosae omnes, menstrua quidem solventia quorundam metallorum habentur; tam perfectam tamen, ac sales, solutionem efficere nequeunt; et particulas praeterea metallicas sic tegunt et involvunt, ut non possint, quin vires illarum multum imminuantur. Exempla tamen memorantur, fide satis digna (a), in quibus sola cerussa, partibus excoctis infantum aspersa, convulsionibus eos affecerit, et lithargyrium, externe applicatum, morbum illum colicum induxerit, de quo paulo post dicendum erit.

Praecipuae vero plumbi, ob quas vel laudari, vel vituperari meretur, vires in praeparatis salinis concurrunt, quae, artis ope, ex hoc metallo conficiuntur. Omnes ferme sales acidi in plumbum agunt; pauci vero perfecte solvunt. Ab acido vitrioli corroditur; sed mox in massam insolubilem cum eo concrevit. Per acidum salis et aquam regiam, solutio fit turbida et imperfecta. Acidum quidem nitri optime plumbum dissolvit; sed propriam sic cum eo communicat acrimoniam, ut vis ullius, quantum novi, hanc solutionem in usum medicum vocare ausus fuerit. Ad hunc tamen usum, plumbi solutionem per acidum acetum praeter reliquis accommodari, omnes consentiunt. Eandem vero hanc solutionem varii auctores variis nominibus insignierunt,

(a) Dr Baker's papers on the poison of lead. London Medical Transactions, Vol. I, and II.

Signierunt, propriasque in ea virtutes quaesiverunt; cum necesse tamen lithargyrii, extractum Saturni, aqua Saturnina, sint simillima, nec, nisi in eo, a se invicem differant, quod vel majorem vel minorem salis illius metallici copiam in se contineant, qui, in crystallos redactus, *saccharum Saturni* audit. Hunc igitur saltem ejusque solutis-  
nem, ob majorem puritatem, et ob faciliorem dosim determinandi rationem, caeteris anteponendum esse, non est quod dubitemus.

Saccharum igitur Saturni, externo corpori admotum, fibram simplicem haud parum adstringit, corrugando, eam, qua se contrahi paritur, vim auget, sicque illius texturae robur addit. Qui unquam enim fibrae cuidam musculari admovent, vel gassu exploraverit, inter adstringentia saccharum Saturni referendum esse, haudquaquam ambiget. Longe tamen majorem in solida viva, sive fibram nerveam, illam nimirum vim exercet, quam sedantem appellare inter medicos convenit. Illius enim fibrae et sensum et motum, seu ipsam vitam, insigniter imminuit, impediendo, quaeunque deinceps ratione id fiat, quo minus tanta cum his partibus energia nervea possit communicari. Quod enim solutione sacchari applicata, acuta dolorum vis infringatur, calor partis imminuatur, sensusque refrigerationis percipiatur, quae quidem revera eveniunt, nullam hujus rei dubitationem relinquant. Sedans ejusmodi vis huic soli metallico tanta inest, ut, ex applicationibus, nimis frequenter repetitis, in peculiaribus quibusdam casibus, penitus sublato partium tono et vita, gangraena tandem superveniat.

Nosius plumbi usus internos jamdudum veteribus, Galeno, Vitruvio, &c. innotuit; qui tamen haud multum, ad effectus illius primarios considerandos, animos attenderunt. Morbum quoque peculiarem colicum passim observarunt; sed mirifice, sicuti multi quoque recentiores, in causa illius erudenda, ingenium exercere. Optime primus hunc morbum descripsit Franciscus Citois, in Gallia, apud Pictones, grassantem, qui dein colicae Pictonum nomen sibi acquisivit. Quae signa hujus morbi praecipua notabantur, fuerunt, pertinax alvi obstructio, violenti abdominis dolores, tandem in extremorum paralytin vel epilepsiam desinentes. Post multas disputationes agitatae, Ephe-  
meridum Germanicarum tandem auctores, tetri hujus morbi causam esse plumbum, repeterunt, quo vix austerius conservari, et dulcior reddi, consueverant, idque testimo-  
nio haud dubio confirmant. Eodem metallo impregna-  
tum

rum pomaceum, in variis Angliæ locis, præcipue apud Damnoniam, eundem sæpius movisse morbum, extra omnem dubitationem passit Cl. Baker. Similis colicus morbus, ab aqua, hanc admodum pura, in cysteris plumbeis longius ferreata, apud Batavos frequenter oriri notatus est. Et innumera a variis auctoribus memorantur exempla, ubi plumbum, vel fortuito assumptum, vel, imprudenti consilio, pro medicamento interno exhibitum, funestissima illa mala ubique excitaverit.

Quæ cum ita sint, nulla plane dubitatio relinquitur, quin usus plumbi internus dolores colicos, alvi obstructionem, spasmos, extremorum dolores, paralyin, corpori humano inducat, et id quidem, per vires suas adstringentes, præcipue vero sedantes, excitans. Adstringentia enim, quæ minus tanta fluidorum copia in intestinorum cavum effundi queat, impediunt; sedantia vero, fibræ vitales sensum et motum imminuendo, motus peristaltici languorem inducunt; mox vero, vires naturæ medicatrices, excitando, indirecto stimulantia evadunt; et sic, pro rata ratione, vel virium suarum, vel hominis, in quem agunt, irritabilitatis, vel motus convulsivos, vel contractionses spasmodicas, excitant. Plumbum vero ab aliis medicamentis sedantibus, quorum actio minus diuturna esse animadvertitur, eo nomine differt, quod, præcipue per frequentem applicationem, vires permanentes exerceat, quæ, nervis ipsis notivæ, his quasi impressæ manent. Nec difficile intellectu est, quomodo, per nervorum inter se sympathiam et nexum, hæc affectiones cum nervis aliarum quoque partium possint communicari, et hæc extremorum debilitates, tremores, dolores, paralytes, paralytes; præcipue, cum tantum, in genere, et pecuniatam intestina inter et extrema nexum et sympathiam intercedere videamus. Nec huic explicationi obstat, quod assumptæ particulae plumbæ primo cum terminibus diarrhoeam interdum excitaverint. Non mirum enim est, minorem hujus veneni copiam vires naturæ medicatrices inter solium, motus, ad potentias nocentes expellendas, accurate pares excitare permisisse; quæ tamen vires, viribus veneni, toties repetitis, succumbere tandem coactæ fuerint. Negari quidem de plumbi non potest, quod similiter de omnibus, quæ in nervos agunt, medicamentis verum est, quod multi satis magnam illius copiam impune ferant, et quidam ab eadem dosi, quæ alios misere exerceat observator, vix afficiantur. Hæc tamen exceptiones, vel ex vario irritabilitatis gradu, vel peculiari idiosyncrasia, explicandæ, regulæ generalis vim



vim minime infringunt. Omnes insuper auctores, qui internum plumbi usum variis in morbis lumen extulerunt laudibus, in eo consentiunt, præparata illius, ob vires refrigerantes, imprimis esse commendanda; et sic, quæ nos hic comprobare constiit sumus, eadem, aliis verbis, confirmarunt. Et accurata observatione Cl. White (b) nuperum invenit, actionem cordis, pulsusque frequentiam, per præparata saturnina evidenter imminui.

In venenorum naturam et vires inquirens, Cl. Sprongel (c) cani dedit sacch. Sat. ʒss et alio dein ʒi; secutus est vomitus, vehementibus cum conatibus, et totius corporis motibus convulsivis, et tremoribus; post paucas tamen horas, canis bene se habuit. Varii quoque auctores, qui de colica saturnina scripserunt, ægrotantes plurimos in principio morbi nausea, et irritis vomendi conatibus, vel ipso vomitu bilioso, laborasse memorant. Vomitus illam ex viribus plumbi sedantibus explicare nulli dubitamus; confirmant enim, quos varia emetica in corpus humanum edunt, effectus. Quæ nimirum virale ipsum principium immediate aggrediuntur, ea provisa natura, omnium virium suarum contentione, e corpore ejicere conatur. Nec multum tamen interest, si ex viribus sacch. Sat. adstringentibus hunc vomitum derivari malis; cum adstringentia, e. gr. alumen, majori dosi exhibita, nimis forte corrigando ventriculi fibras, haud raro vomitum excitaverint.

Solutio sacch. Sat. sanguini recentem e vena misso admixta, illum coagulari prohibet, perque longum tempus fluidum conservat. Cum vero multi medici eam taceant opinionem, quod omnia, quæ sanguinis concretionem impediunt, vim quoque possideant fluida jam coagulata resolvendi, et Cl. Goulard (d) tantopere viribus solventibus extracti sui saturnini confiderit; operæ prætium duxi, an revera hæc res ita se haberet, experimentis examinare. Frustula igitur coaguli sanguinis recentis in solutionem sacch. Sat. saturatam, et in aliam dilutiorem immersa, ibique tamdiu retinui, donec quidam foetor putredinis incipientis testimonia daret; ne minimum tamen dissolutionis signum inveniri. Nullam exinde, sanguinem tractum resolvendi, vim sacch. Sat. inesse, conclusi. Et raro quoque in tumöribus, præcipue recentioribus, fluida effusa revera coagulata

(b) Medical Commentaries, vol. iii. part. v.

(c) D. Sprongel experimenta circa varia scuta. Dissert. iniquur. Göttingæ 1757.

(d) Goulard traite sur les effets des préparations de plomb.

coagulata reperiuntur. Si igitur variis rebus externe applicatis, per mutatam solidorum actionem, fluida effusa reabsorpta fuerint, quam, quæso, medicamentis nostris virtutem resolventem tribuere possumus?

In canis venam jugularem Cl. Sprengel iniecit sacch. Sat. 3ii, et in alius venam 3i in aqua calida solutas. Vix veneno immisso, animalia hæc mortua conciderunt: nec ul-  
lum amplius vitæ signum dederunt. Bis postea repetivit experimentum, et in cane tandem juniore parvulo a sacch. Sat. 3iis eundem effectum vidit. In aliorum simul canum venas jugulares spiritum vini, et satis magnam laud. liq. copiam, iniecit: Animalia quidem valide inde perturbata; post aliquod tamen tempus, penitus restituta fuerunt. Experimenti hujus, quod ordinis gratia hic reposuimus, violentus et subitaneus eventus, ex actione sacch. Sat. in nervos sedante, certo certius debet explicari; quippe qui aliarum injectionum effectum longe vincat. Et subita mors, et summam nostri medicamenti vim, et maximam tonicæ vasorum internæ sensilitatem, æque demonstrat.

De virtutibus sacch. Sat. antisepticis, fufius hic differere opus non est, quæ cum omnibus salibus metallicis communes sint, sacch. Sat. quoque inesse, nemo dubitabit; easque haud exiguas esse, ipsi experimentis comperimus.

De vaporibus denique plumbi dicendum est, quorum vix alia vis, quam sedans, potest observari, quæ, vel influxum nervorum penitus tollendo, paralyfin, vel eundem multum innuendo, motus inordinatos spasmodicos inducant. Atotia enim, ut optime effatus est Cl. Hoffman, gignit spasmus. Subtiliores plumbi particulas facile volatiles fieri, jam ex odore patet, quæ, plumbis leviter tantum calefacto, nares nostras ferit. Horum vero vaporum subtilium, qui vel per inspirationem hauriuntur, vel a vasis absorbentibus recipiuntur, vel in nervos superficiei immediate agunt, vim, exempla operationum, qui in plumbo fundendo vel calcinando occupantur, tum etiam sigulorum satis superque evincunt. In eos enim, præcipue asthma, tremores, extremorum convulsionem, et colica tandem Saturnina, et paralyfis misere sæviunt; mala, a solis plumbi vaporibus, me iudice, derivanda. Ne vero quis hos, in iis, effectus a plumbo, casu fortuito per os assumpto, derivet, hic cum Cl. Baker observare sufficet, typographos sæpius a typis, nimis calefactis, tractatis, digitorum debilitate, et contractionibus, affectos fuisse. Duo insuper, quæ huc faciunt, exempla memorat Cl. Perci-  
val

val (e). Vir quidam, qui pedes laminas plumbeas, ante focum repositas, imponere solebat, levi crurum inde affectus est paralyti; canis vero illius, qui in eandem decumbere solebat, omnem penitus extremorum usum perdidit. Puer, antea sanissimus, quem laminas plumbeas, recenter fusas et adhuc calidas, pedibus nudis percurrere solebat, doloribus inde colicis, violentis extremorum convulsionibus, et unius lateris paralyti, curripiebatur. Hi certo effectus plumbi effluviis debent adscribi; nec ulla menstrui ejuslibet praevia in plumbum actio potest excogitari.

Quum igitur, ex accurata observatione, noxii hi, quos nunc memoravimus effectus plumbi, per os assumpti, vel vaporem illius, satis comperta habeantur; mirandum certe est, omnium auctorum et medicinarum praestitam execrationem consensu, praeparatorum e plumbo salinorum usum externum, ab omnibus his incommodis, immunem inveniri. Decantatum enim Cl. Boerhaave (f) testimonium, ubi, externam quoque aceti lithargyrii applicationem, corpori nocere enunciat, paucaeque, quae ad hanc confirmandam sententiam attulit, exempla Cl. Percival, generalis hujus propositionis vim minime tollunt. Calces plumbi, in minutissimum pulverem relictas, et sic per se applicatas, corpori nocere posse, non negarem; potius assentirem. Cum purio, ut rarius tamen evenire solet, acrimoniam quandam, ad eam determinatam, per applicationes Saturninas, in massam circumneutem repuleris, multas inde turbas excitari, quae ab effectibus tamen plumbi primariis toto coelo differunt, variorum quoque morborum semina inde nasci posse, aequè mirandum non est. Et ipse quoque affectiones cutaneae illuturneae, melle topicae, quaecunque demum ratione sulis curatae, ob partium consensum, consuetum suum stimulum ad intestina referre solent; et sic varia primarum viarum excitate mala, quae, prudenti tamen medicantis consilio, feliciter possunt averti; nec cum imminenti colicae Saturninae symptomatibus debent confundi. Quae tandem idiosyncrasiae in quibusdam corporibus vis sit, hoc loco, ut fufius explicetur, haud opus est. Exceptiones igitur, quae remanent, paucissimae, ex causis modo allatis non explicandae, ad hanc referendas esse contendimus.

His itaque dubiis remotis, ad propositionem nostram revertimur, tutum sacchari Saturni usum externum, quantumvis sit noxius internus, defendere minime dubitantes.

Ante-

(e) De Percival's observations on the poison of lead.

(f) Boerhaave Elementa Chemicæ, Vol. II. Proc. 172.



Antequam tamen ulterius hoc argumentum prosequamur, a proposito nostro haud alienum esse duximus, in causas singulares hujus phaenomeni paulo accuratius inquirere, quod primo intuitu contradictionem comprehendere videtur. Quae igitur illa sint, quae efficiunt, ut illud plumbi venenum maximam suam vim, nervis inimicam exercere valeat, primo indagabimus; quae vero illius vim sic compescunt, ut into possit exteriori corpori applicari, postea videbimus.

Ut plumbum in corpus humanum activum evadat, primo requiritur, ut principium inflammabile, sive phlogiston, ab illa separetur, et sic terra illius metallica, sive calx, remaneat. Id plumbum cum caeteris metallis commune habere videtur. Haec vero dum disputamus, illam tantum intelligimus principii inflammabilis partem, quae formam illi dat regulinam. Pars enim hujus principii elementaris his insuper inesse videtur, qua, per maximam ignis vim, expulsa, et naturam illorum intimam mutabis, omnemque agendi virtutem tolles. De antimonio saltem haec vera sunt, cujus calcem valdeperere emeticam, quo magis calcinaveris, eo inertior evadet. Hanc tamen calcem sic exultam et destructam invenies, ut addito ignis pabulo, per fusionem vix ac ne vix quidem in regulum metallicum reduci possit. Per solutionem in acido, plumbum magnas acquirere vires, inter omnes convenit; sic ut multi, illud, non nisi per acidum quoddam solutum, in corpus humanum agere posse existiment. Ex indubiis vero experimentis chemicis patet, in solutione metallorum per acida phlogiston separari, avolare, et sic vinculum quasi solvi, quod particulas metalli constituentes invicem junxerat. Calor nimirum, qui, dum fit solutio, nascitur, principii inflammabilis motum indicat, illudque revera avulsisse, vapores inflammabiles, saepius surgentes, demonstrat; demonstrat quoque calx inde praecipitata, omnia ferme principii inflammabilis experta. Ex his idcirco jam suspicio nascitur, solutionem metallorum per acida, pro parte saltem activam suam vim a phlogisto inde separata requirere. Haec tamen opinio ulterius confirmatur, si in mentem revocemus, calces plumbi, sic ut aliorum metallorum, quancunque denum modo in hunc statum redactae fuerint, simili agendi vi gaudere, si modo ea ratione applicatae fuerint, ut vim suam rite possint exercere. Exempli quaedam, quorum antea mentionem fecimus, nobis pro testimoniis sunt; et, si ego fallor, paulo accuratior observatio plura in posstrum suppeditabit. Noxios quoque

que effectus, qui ex lamina plumbica, fonticulo impolita, observari fuerunt, ad plumbi calcinationem, et particularem illius apertis vulncri applicationem, vel earundem absorptionem, referendas esse crederem. In exemplis saltem modo memoratis, ne suspensio quidem est, solutionis praeparatae per menstruum acidum. In plerisque nulla nisi divisio mechanica adhibita fuerat, cujus, quanta vis sit, mox dicetur. Tritura quoque, longius continuata, quae quorundam metallorum, praecipue mercurii, vim sentit, in speciem calcis ea redigit; in qua, si calor tantus excitari nequit, ut omne principium inflammabile avolet, sic tamen separatur ab eis, ut nisi per fusionem intus cum eis coniungi non possit, usque forma metallica restitui. Nec sic semper, nisi paulum materiae custodiam, quae phlogiston continet, addamus, pristinum pondus recuperabimus. Sic quondam saltem partem in calcem redactam fuisse patet. Ut enim mercurii iterum exemplo uti liceat, cujus forma quidem fluida agitationi mechanicae maxime favet, paucae hae particulae, quae per triturationem penitus in calcem redactae sunt, in pilulis mercurialibus cum melle paratis, vel in solutione Plenckiana, vel in frictione, ope unguentis mercurialis, in corpus insinuantur, sufficiunt ad illum effectum mercurii specificum excitandum, qui per minutissimam copiam calcis mercurialis potest excitari, ut ex effectibus sublimati corrosivi omnibus satis innotescit. Qui vero mercurium tempore triturationis acidum catholicum ex aëre attrahere, et sic ope huius menstrui pro parte dissolvi contendunt, hypothese saltem indulgent, cujus nulla possunt certa testimonia adduci, in contrarium vero nonnulla haud parvi momenti. Mercurius enim phiala vitrea inclusus, diuque sic agitatus, in calcem tandem accuratissimam abit, in cujus calcinatione acidum illud catholicum adjuvare certe nequit: Nec ex motu peculiari materiae electricae menstruum solvens derivare potest, cum vitrum non sit materiae electricae conductor. Quae hic de metallis in genere, et de mercurio speciatim, disputavimus, ad plumbum quoque applicari posse, non est quod dubitemus. Quos a vaporibus plumbi observamus effectus, ex hac quoque calcinatione pro parte explicandos esse opinamur. Phlogiston non aëre valde cum terra plumbi metallica vincula connectitur, et facile a superficie illius, aëri exposta, adjuvante praecipuis modico tantum caloris gradu, avolat, caloremque albam ibi relinquit. Ut pleraeque vero materiae volatiles consueverunt, sic phlogiston quoque quandam, et subtilissimam quidem, portionem hu-

ius terrae, alias fixae, secum in altum rapit, et inde percullarem illum odorem, quem in vaporibus plumbi percipimus, viresque corpori animali noxias, acquirit. Cuiusmodi haec plumbi subtilissima, hac ratione corpori humano applicata, substantiens violentissimoque effectus produceret existimo, nisi tam magna principii inflammabilis copia tecta et involuta esset, quod tantum ad vires metallorum enervandas valet. Cum enim venena metallica, ejusmodi substantiis obducta, quae multum phlogiston continent, multo mitiora evadere videamus; nonne patet conclusio, nec, iisdem penitus detractis, posse illorum vires acere? Haec de plumbo quoque vera esse, tutus unguenti Saturnini, et emplastrorum a cerussa, usus evincit. Quoque, quae praedita sunt ostra, virtus, tristia illa mala leniendi, quae plumbi venenum intestinis inferre solet. Ex his igitur omnibus, ut plumbum activas vires exeret, principii inflammabilis jacturam requiri concludimus.

Requiritur porro, ut particularum calcis Saturninae fiat minutissima divisio. Solutio plumbi per acidum, praeter principii inflammabilis abstractionem, et huic operationi omnium commodissime inservit. Minutam hanc in solutione fieri divisionem nemo negat; multi tamen metalla insigniter inde mutari contendunt. Per solutionem hanc chemicam, novas metalla induere vires, pristinas exuere, et in naturam quasi neutram, a pristina penitus diversam, perverti, et natum inde corpus neutrum solummodo in corpus humanum agere posse existimant. Nos vero gravissimis ex causis in aliam abire opinionem inducimur. Acida nimirum solventia, praeter ea, quae diximus, naturam metallorum intimam minime mutare persuasi sumus: Menstrua tamen haec chemica, in eo potissimum a mechanicis differre concedimus, quod longe subtiliorem, et in minutissimas quasi moleculas, divisionem efficere possint, quae nulla unquam attingere posset vis mechanica. Sales ipsi acerrimi, quando semel in massam solidam concreverunt, quanquam in subtilissimum pulverem redacti, vix in animale corpus agunt, nisi antea per menstruum aquosum particularum ulterior fiat separatio. Hic tamen saltem cum menstruo suo aquoso sic coivisse, ut progenies neutra inde prognata sit, nemo affirmabit. Si in spiritu vero vini solum dissolveris, mutatis ex mixtura quantumvis qualitibus sensibus obvis, naturam tamen illius mutatam fuisse haud cogitabis. Eadem vero de plumbo, caeterisque metallis similiter vera esse, vix dubium videri potest. Nam quocumque demum acido metallum dissolveris, illud semper tamen



tamen vires suas specificas retinebit, ut in plumbis, e. g. et mercurio videre est: Et eo majores exercebit vires, quo magis menstruum, quo usus fueris, aptum inveniat ad minutissimam divisionem perficiendam; minores, e contrariis, si contra feceris. Sic acidum quidem vitrioli in plumbum agit, phlogiston separat, valet, divisioni vero impar invenitur; massam igitur inertem insolubilem relinquit. In sublimato vero corrosivo, cum aptissimo menstruo maxima agendi via conjungitur. Sed qualitates tamen metallorum sensibus obviae, per has solutiones salinas vario modo mutantur. Concedo; acida nimium cum metallis solutis intime miscentur, et per mixturam qualitates suas proprias cum his communicant, nihilque praeter ea. Sic metalla ab acido nitri vim illam acquirunt igneam, ab acido salis summam acrimoniam, ab acido aëti mitiores dures, et nullis metallis propriis virtutibus, in genere, pro natura acidi solventis, vel aciora vel mitiora eradunt, et sic saepe cum specifica sua actione, magnam vim stimulantem acquirunt. De vaporum plumbi subtilissima divisione nemo dubitat; et de calcibus plumbi, antea demonstravimus, eas per comminutionem mechanicam, haud adjuvante solutione salina, activae fieri. Sequitur ergo, praeter calcinationem molecularum plumbi, minutissimam earum quoque separationem requiri, eandemque per acida quidem omnium aptissime, aliis tamen quoque modis quodammodo posse perpetrari.

Majorem quoque vel minorem plumbum vim exerceat, pro partis sensibilitate, cui applicatur. Minorem enim vim exerit in eam corporis externam, quae minori, quam interna sensibilitate gaudet; majorem vero, ut antea demonstravimus, in internas intestinorum tunicas. In iis tamen, qui per longum tempus continuis plumbi effluviis exponuntur, ut operarii in fodinis Saturninis, haec ipsa intestinorum sensibilitas gradatim immittitur, ut nec ab ipsis stimulis tam facile afficiantur. Si enim per purgantia iis alvum movere volueris, duplicem, immo triplicem, medicamentum cathartici dosim oportet, ut exhibeas. Per multa vero experimenta patuit, per unam materiam extraneam in vasa sanguifera introductam, et sic illorum tunicis internis applicatam, quae et maxima ipsae donatae sunt sensibilitate, et nunquam a prima sua origine ab ulla alia re, quam fluido in statu naturali blandissimo, sanguine nimirum alui conflueverunt, violentissime totum corpus affici. Omnium vero maxime momentaneum et subito lethalem effectum

produxisse saccharum Saturni, confirmant experimenta quæ, a Cl. Sprögel instituta, antea narravimus.

Plumbo admixtas particulas salinas, præter calcinationem et divisionem, nihil ad illius metalli vires adangendas conferre, antea demonstravimus. Sed ulterius quam maxime mihi probabile videtur, acida admixta, particulas plumbi tegendo et obvolvendo, vires illarum specificas potius imminuere: Maximam idcirco vim, plumbum, rite prius in calcem reductam, minutissimeque divisum, in corpus animale exercitaturum esse, si sic per se purum illi possit applicari. Si vero, plumbum, cum acido conjunctum, minores producere effectus, majores hinc eo comprobaverimus, confirmata statit nostra opinio. Nec defunt, quæ quam maxime verosimillimam hanc rem efficiunt. Plumbum per os assumptum, vel per vapores in corpus introductum, maximas exferere vires, modo demonstravimus: Vapores ab acido solvente immunes esse, evincere conati sumus; præparata vero salina, vel hoc forma in ventriculum ingesta, vel ab acido, sæpius ibidem habitante, in formam salinam commutata, in ipsum ventriculum haud violenter agunt; longe vero violentius in intestina, quando, quin acidum solvens jam ab his abstractum fuerit, vix possumus dubitare. In statu enim sano, per bilem, reliquosque digestionis humores, omne acidum sic destruitur vel enervatur, ut in tractu intestinorum vis illius signa inveniantur. Nihil vero impedit, quin idem de acido, plumbo adherente, affirmemus, illiusque magnam in intestina vim ex hoc quoque fonte derivemus. Nam effectus plumbi in ipsam ventriculum his solummodo analogi sunt, quæ ab sacch. Sat. externo corpori applicato observamus. Violentus quidem vomitus, et, ventriculi dolor, cujus Cl. Warren (g) mentionem fecit, non tam ab aliis observatus est auctoribus, et, an omnis ille morbus, quem sub nomine colicæ Pictonum descripsit, ad colicam Saturninam veram referendus sit, adhuc dubito. His igitur si addamus effectus, quos supra de ipsa plumbi calcis commemoravimus, subtilissimam plumbi calcem, ab omni materia aliena purissimam, omnium maxime corpus humanum afficere, non possumus quin concludamus.

Cum antea vero viderimus, quam subito lethatis fuerit injectio sacch. Sat. in venas animalium, quædam saltem oritur suspicio, plumbi venenum magis nociturum esse, si in vasa possit absorberi. Id in intestinis quodammodo locum habere videtur, et in corporis superficie, cui vapores,

vol

vel subtiles plumbi caelestes applicantur, in quibus nulla vis adstringens detegere potest, quae illud impedire possit absorptionem. — Quo plura vero ex his omnibus concurrant, vel quo majori gradu singula ex dictis obineant, eo majorem, ceteris paribus, plumbi actionem futuram esse, manifestum est. Quae tamen ultimas illas sit actio, quae illius vires, vel chemicae vel mechanicae maxime hic valeant, et qui tandem inter illas, limites poni debeant, nos penitus ignorare confitemur.

Fusius hucusque demonstratis his, quae plumbi vires vel augent, vel imminuunt, vix necesse erit, ut, quae usum ceterorum preparatorum plumbi salinorum tutum reddunt, multis hic exponamus. Omne argumentum ad tria praecipue, quae sequuntur, capita potest referri. Externa corporis superficies non tanta praedita est sensilitate et irritabilitate, ac interna; nec igitur tantopere ab us, quae immediate nervos afficiunt, potest laedi. Minutissimae porro plumbi particulae haud parae corpori applicantur; teguntur nimirum ab acido, eoque minutissimo, quod non parum ad venenum illud nervis inimicum invalvendum et mitigandum confert, vel olensa eidem usui interserviant. Si absorptioni tandem quaedam vis concedenda sit, satis patet, vin, quam plumbi praeparata ab acido sibi conjuncto derivant, adstringentem, contractis et occlusis, partium spiraculis cutaneis, omne timendum exinde periculum esse aversum.

Moderius de variis plumbi effectibus in corpus humanum lauti; tunc ad ejusdem usum medicum nosmet convertimus; primo, de usu illius externo dicturi; paucis dein subjungentes, quid de usu hujus metalli interno sentiamus. Cum vero plumbi ipsi metallo nullas, nisi mechanicas, antea concesserimus vires, nec alium quoque ab eo usum medicum expectabimus. Paucis igitur hic monere sufficit, laminas plumbi ad comprimenda ulcera fungosa, opercula plumbica in papillis mammarum excoriatis, caudiculasque plumbicas, in variis urethrae morbis, et haud sine fructu quidem, fuisse adhibitas. Sic multi quoque ad curandum intestinorum volvulum globulos plumbeos exhibuerunt; quae mihi tamen nec satis certa, nec tuto medicina videtur. Calces plumbi, ea saltem ratione, qua in emplastris, multa pinguedine testace, vulgo adhibentur, praeter aptam formam vix aliquid habere, quare ad usum medicum commendari possint, contendimus. Vapores denique plumbi subtiles, ab acrias, quibus imbuti sunt, vires necno unquam commendaverit. Maximas vero a plumbi pra-



praeparatis salinis virtutes medicas summo jure exspectamus, eaque, per acetum confecta, in inflammationibus, praecipuis topicis, vel phlegmonis, summam nuncupare medicamentorum nequaquam dubitamus. Quae tamen, ut melius pateant, ipsique ut omnium ferme auctorum consensum rationibus quoque salcire possimus, quid sit inflammatio topica, et quae tandem ex illius natura indicationes curativae derivandae sint, imprimis indagare decrevimus.

In omni inflammatione topica, jam actu vigente, ex quacunque demum causa nata, veram obstructionem adesse, inter auctores ferme convenit. Alia tamen praeterea occurrunt multa, nequaquam immediate ab obstructione pendentia. Non nimis imprudenter me dixisse existimo, si duplicem, immo contrariam ferme, diversis in vasis, conditionem simul locum habere statuerim. Nisi omnia enim me fallant, in vasis immediate affectis a nimia extensione, debilitatem, immo annuam, si sic loqui fas sit, ad fibram potius simplicem referendam; in vasis vero vicinis circumjacentibus, fibrae perverae visio, actionem, et tonum multum adauctum, constrictionesque spasmodicas, reperies. Sanguinis reliquorumque fluidorum in partem affectam accumulatio, vasorum exinde distensio, partimque effusiones, quatenus ex a vitata absorptione pendeat, prioris hujus status testimonia dant; nam pristinis si haec vasa viribus semet contrahendi gauderent, omnia atque fluida recepta propellerent, sicque circulationis conservarent aequilibrium: Partis vero dolor, calor, rubedo, interdumque pulsatio, posteriorem reliquorum vasorum statum indicant. Inflammationes tamen hac topicas quodammodo inter se differunt; et ad praxin multum utinet, ut qua ratione, quibusve ex causis natae sint, rite distinguamus. Id vero tribus potissimum modis fieri, ipsaque exinde in tres species commodè dividi posse, existimamus.

Primo loco ponimus violentiam externam. Per vulnus, contusionem, combustionem, luxationem, &c. inflammationem fieri, nemo ignorat. Hic vero immediate multa vasa, vel penitus destruantur, vel vi saltem mechanica multum debilitantur. Sic aliter fieri non potest, quin verum quaque laedantur, irritentur, majorque energiae nervae in partem affectam fiat determinatio. Oportet igitur, ut doloris percipiatur sensus, et vasa, quorum structura mechanica integra manserit, majori vi agant, immo spasmus afficiantur. Cum vasa vero antea debilitata nec huic impulsui resistere, nec fluida recepta eadem vi ulterius propellere possint, satis patet, unde in iisdem major fluidorum

tum congestio, obstructio, nimia extensio, vel effusiones, tumor exinde, universalis tensio, dolorisque incrementum.

Alteram inflammationis causam, violentiam internam dicimus, sive irregularitatem in aequilibrio circulationis, ubi subito major fluidorum circumstantium copia et impetus in partem aliquam determinantur. Haec vero iterum a causis, vel internis vel externis, originem ducere potest. Quae causae haec sint internae, saepissime ignoramus; una tamen ex externis satis manifesta est, stimulos puto et irritationes, quibus partialis quoque frigoris applicatio annumeranda est. In inflammatione, hac ratione nata, quaedam saepius adaucta vasorum actio propriam affectionem topicam antecedit; quae tamen, cum impetu fluidorum subito adaucto, diu subsistere nequit, quin multis vasis, praecipue extremis, vim inferat, eaque dissolvendo debilitet. Sic, vasorum data obstructione, nervorumque irritatione, caetera suo ordine mox procedunt, saepeque totum systema in consensum rapiunt.

Inflammatio denique topica oriri potest, ex vasorum, quodam in loco, habituali laxitate ac debilitate, quae multis ex causis variis in locis potest progigni. Sedantes ac debilitantes nimis frigoris vires, et pristinae inflammationis effectus, hic enumerare sufficit. Hic tamen, ut inflammatio fiat, requiritur, ut, ab alia quacunque demum causa, febris vasorum adaucta actio universalis excitata fuerit, sive pyrexia cum diathesi phlogistica. Sic intensior fluidorum impetus majore vi in ea vasa irruet, quae resistere nequeunt. Facile igitur in his nascetur obstructio, adjuvante diathesi phlogistica, constrictioneque tantius superficiiei spasmodica, ea, quae antea descripsimus, phaenomena omnia excitatura.

Ex modo memoratis, posterior species, saepeque secunda, hic ad nos non pertinent; quippe quae applicationibus externis non obtemperent, nec saepius illarum opem tuto possent removeri. In reliquis vero curandis, haec applicationes externae multum valent. Varia tamen varii medici hic in usum vocant auxilia; quae omnia tamen vel ad emollientia, vel adstringentia, possunt referri. Inflammationis jam proposita pathologia, indicationes curatorias duas evidenter indigitat: Ut vasis, nimirum, dissensibus ac debilitatis vis semet contrahendi roborque restitatur; ut vasorum simul vicinorum adaucta actio et spasmus, ab energiae nervae incremento oriunda, imminuatur. Absoluta, prima indicatio, obstructionem quoque ejusque

sequelas tales; secunda vero, dolori simul reliquisque incommodis medicabilis. Omnis vero, quae emollientibus vis inest, ex ea, quae pollent, solida simplicia relaxandi, virtute jure derivatur. Favendo igitur et relaxando sedant, vasorum tamen debilitatorum vitium non corrigunt, sed potius augent; lente tantum, nec certo tamen eventu, inflammationem resolvunt, ad suppurationem potius, immo putredinem, disponunt; habitalem semper in parte debilitatem ac laxitatem relinquant. His, tantisque haec praxis premitur incommodis, ut certiores et magis plerisque in casibus expeditam, jamdudum multi medici commendaverint. His vero assentiri ipsius rei momentum non jubet; qui tamen, in corporibus valde rigidis, inflammationeque jam in suppurationem tendente, maximo cum fructu emollientia adhiberi posse, concedere non recusamus.

Ratiocinio igitur et experientia ductus, emollientibus adstringentia longe anteponi merere contendimus, quae, si sedantem simul vim habeant, omne curationis punctum absolvunt. Fibras vasorum distentas, debilitatas, adstringunt, corroborant; inordinatam insimul energiam nerveam, vasorumque actionem et spasmos, imminuunt; ingratis symptomatum urgentium vim compescunt. Quam vero memoratas has virtutes omnes præparatis plumbi solinis inesse, antea comprobaverimus, quo jure illa hic commendari possint, facillime patescit. Illorum denique in phlegmone usus externus, et tutus, et salutaris innumeris experientiae et auctorum, quorum nomina recensere nimis longum foret, testimoniis confirmatur.

Verum tamen vero, his generalioribus plumbi encomiis præmissis, quae optima illud applicandi sit ratio, quibusque in casibus præ reliquis commendari possit, non abusu erit commemorare. Saccharum Saturni omnium optime adhiberi, antea diximus; ejus, si pro partis sensibilitate si usque ad zi vel amplius in aquae purae lib. i. dissolveris, solutionem habebis ad propositum nostrum satis aptam. Hanc solutionem, linteamenti exceptam, partibus affectis saepe applicabis, nec multum interesse videtur, an trigilam an calefactam applicaveris. Vel pulicula, ex hac solutione et mica panis confecta, pro re nata conveniet.

Ob urentem dolorem, maximumque caloris sensum, in combustis refrigerans haec applicatio fraternum summe est utilitatis, et quam cito omnia in melius veriantur, verum miraberis. Memorabile ejusmodi exemplum in triginta tribus negrotis, ab explosione quidam pulveris pyrii nescire



combustis et confusis, narrat Cl. Percival. Simili ratione laudari meretur solutio Saturnina dilutior, in oculi inflammatione, ipsaque immo ophthalmia. Tantae enim in economia animali utilitatis, tantaque sensibilitate, quod totum systema facillime in consensum rapere possit, praeclarum organum est oculus, ut nimis cito illud a tristibus inflammationis sequelis defendere vix possis. Nostro vero remedio, caeteris tamen haud neglectis salutis praehidisse, id feliciter obtinebis. Cum hic vero morbus, semel ortus, tanopere recurrere amet, illudque ab habituali vasorum oculi debilitate, a pristina inflammatione relicta, praecipuum pendere videatur, vis hujus solutionis adstringens, ad laxitatem hanc emendandam, morbiq; restitutum praecavendam, haud parum inservit. In gonorrhoea porro, tumores testiculorum inflammatorii valde dolentes, vel a sola nerva irritatione propagata, vel a compressis ductibus excrementibus nati, nullis applicationibus externis melius obtemperant, quam Saturninis, quae, simul adhibitis idoneis medicamentis internis, multum quoque valent ad violentiam in haec moribus reuerens inflammationem coercendam. Sic tumores quoque haemorrhoidales inflammati, absumma, quae erant intemmoda, citissimam curationem requirunt: Nec isdem, immo sanguinem jam fundentibus, medicamentum nostrum applicare dubitavimus. In principio enim hujus morbi, antequam in consuetudinem abierit, quidquid alii contra sentiant, tutum usum omnium eorum, quae morbidam hanc determinationem avertere et corrigere possint, defendere haud haesitamus.

Magis interta dulcius videtur usus aquae Saturninae, in ea inflammationis specie, quae erysipelas nomine venit. Quam notia in illa observata fuerint emollientia, nemo ignorat: Summis vero laudibus Saturnina extollit Cl. Goullard, et cum multis aliis Cl. Aikin (b), pro parte saltem ei assentitur. Alii vero, inter quos eminet Cl. Cullen (c), eadem condemnant, isque applicatis facilis gangraenam supervenire existimant. Sic, ab utraque parte, testimonis in contrariam sententiam allatis, si a priori concludere liceeret, in hoc morbo vix solutionem Saturninam commendavimus. Erysipelas enim videtur nunquam esse naturae serimoniam salinam e corpore eliminandi, quae in transitu suo poros cutaneos, vel jam effusa, vicinam cutem irritat, irrodit, et sic inflammationem cutaneam excitat. Nec, ut novissime constitit, ab amui contagio liber est hic

(b) Aikin's observations on the external use of lead.

(c) Dr Cullen's lectures on the Materia Medica.

morbus. Præ reliquis igitur convenire parias videntur pulveres sicci, farina, &c. qui acrem humorem exhalantem absorbent, et sic, quo minus ulterius morbus profectus, impediunt. Hoc tamen de re iudicium nostrum suspendere possumus, donec ulterior experientia certiora nos docuerit.

Quid de solutionis Saturninae usu in ulceribus apertis inveteratis sentiendum sit, æque magnis serme dubiis premitur. Ea quidem ulcera, quæ ex morbo cachectico primario originem suam ducunt, penitus hujus loci non sunt, reliqua vero diuturna et jam habituala facta, quandam quoque sæpe cachexiam inducunt, inde præter externa, interna quoque remedia requirunt. Inter externa vero remedia, de quibus hic loquimur, in his ulceribus, his tantum exceptis, quæ marginibus callosis cinguntur, emollientiaque requirunt, et ratiociniis, et auctorum testimoniis, propriisque experientia edocti, minime contemnenda esse Saturnina concludimus. In omnibus enim his ulceribus, præter callositatem vel laxitatem, acris illa sanies præcipue curationem impedire videtur, quæ continuo nervos vellicat, et ipsa in putredinem tam prona est. Solutio Saturnina saniem hanc acrem abstergit, putredinem corrigi, nervorumque sensibilitatem imminuit, et sic ulceris consolidationem non parum promovet. In marginibus ulcerum valde inflammatis, sacch. Sat. utilitas ex antea dictis jam patet; et in iisdem valde laxis vis illius adstringens sive tonica egregie convenit, præcipue si quidam illi stimulus addatur. Hæc enim laxitas præcipuus acris illius saniei fons est, quæ, quo minus laudabile pus formari possit, impedit. Ob viam tamen illam, quam medicamentum nostrum in nervos exercet, illius usus non per nimis longum tempus debet continuari.

Quædam tamen sunt inflammationes topicæ, in quibus sacch. Sat. haud æque debet laudari, sed evitari potius. Inflammatio cum febre synocha primaria has applicationes externas repudiat, quæ, ut exemplis utar, in rheumatismo et arthritide nec multum valent, nec tuto plerumque adhibentur. Post febres acutas inflammatio sæpe, critica dicta, nascitur, quæ soluta in abscessum tendit. Hoc quidem abscessus signa potius mortis jam soluti, quam naturæ valentius morbosicæ materiam cœnosciam eliminandi, habemus: Experientia tamen docuit, hos per blandam suppurationem omnium optime terminari. Omnia igitur quæ suppurationem hic impedire possint, sic et Saturnina, potius sunt evitanda. Quæcunque enim dixerit Cl. Goussart, vis persuadere nobis possumus, Saturnina, nisi in quo

quo antea posuimus sensu, suppurationem posse promovere. In cynanche quidem inflammatoria, sic ut in aphthis quoque ex morbi natura, gargarismata convenirent Saturnina; ab his tamen abstinendum est, ob summum periculum ne illarum portio deglutatur.

Ad inflammationis naturam proxime accedit haemorrhagia, et ea quidem praecipue species, quae activa dicitur. In his igitur, iidem tamen adhibitis cautelis, solutionem quoque Saturninam commendamus, quandocunque nimirum locus ipsius affectus commodè potest applicari. Vis insuper sacch. Sat. adstringens orificiorum sanguinem fundentium contractionem promoveat. Sic in epistaxi hanc solutionem a Cl. Vogel (4) commendatam legimus. In haemorrhagiis vero passivis, quae, vulnere recenti excepto, vel a solidorum laxitate, vel fluidorum dissolutione, pendunt, applicationes externae parum efficere valebunt; et, si his uti velis, melius e simpliciter adstringentium classe eas desumes.

Praeter ea, quae antea de ulceribus in genere diximus, pauca adhuc de cancro addenda habemus. Atrocissimi hujus morbi, qui summorum remedium usque adeo viribus illudit, curationem quidem cum Cl. Goulard a medicamento nostro minime expectamus; non sine causa tamen magnum symptomatum lenimen. Cum omnium medicorum consensu, in cancro occulti regimine, tota res eo cardine vertatur, ut illius inflammatio revertatur, vel jam incepta supprimatur, solutio certe Saturnina maximo jure hunc in finem potest commendari. In cancro vero aperto, omnibus aliis applicationibus, Saturnina anteponi meretur. Sanem enim putridam quodammodo corrigit, inflammationem mitigat, refrigerat, sacrosque, misere aegrotos excruciantes, dolores sedat, sicque omnem fest opem, quam desperata morbi natura admittit. A priori patet res, et quid ad auctoritatem attinet, ad Cl. Boerhaave et Heister testimonia sufficit, provocare. Quae de cancro hic disputavimus, quodammodo ad tumores quoque et ulcera fetophulosa, si fallor, possunt applicari.

Aceto lithargyrii, et inde infecto unguento Saturnino, quanta vis insit ad morbos sive eruptiones cutaneas curandas, cutique nitorem reddendam, cum omnibus satis innoscescat, non opus est ut multis hic commemorem. Caeterum ipsissimum praesens hoc remedium multis medicis timorem incussit, ne acrimoniam quandam in corpus retro-pellerent. Fusius hac de re agere, nec animus, nec hujus



operis limites permittant. In genere, hic notasse sufficit, longe rarius, ac multi quidem crediderint, in his morbis acrimoniam in fluidis circumcumbentibus esse pertinacissimam. Praecipue illas hic intelligo eruptiones, quas, in Nosologia sua methodica, inter morbos locales recensuit Cl. Collen. Sunt vero illae vitia solius cutis, ex obstructione, varii sorte generis, in poris cutaneis praeputa. Tutae, igitur, me iudice, ope sacch. Sat. possunt removeri. Ad crustas simul emollendas, praecipue convenit unguentum Saturninum. Quae de agendi ratione plumbi in inflammatione et ulceribus antea diximus, ad minora haec ulcuscula, exceptis excipiendis, possunt applicari. Experientia tamen docuit, eruptionibus hisce nimis subito remotis, varias febres insuper et pulmonum et primarum viarum turbas, quae multis per acrimoniae repulsae signis imposuerunt, quamquam facile alia ratione possint explicari. Stimulus enim in partibus exterioribus confectus, subito sublatus, ob peculiarem, cutem externam inter et ventriculum, intestina, pulmonesque nexum, facillime ad has partes, ut accurata observatio docet, deferretur. Eadem vero, experientia magistra, didicimus, stimulo artificiali subinde per purgantia intestinis applicato, omnium optime praeveneri et tolli haec incommoda.

Multas nihilo tamen minus eruptiones cutaneas, acrimoniam quandam sibi conjunctam habere, haud negavimus. Satis frequenter enim cachexia venerea, scorbutica, &c. eas propugnat, vel eadem, ex salibus ammoniacalibus sanguinis nimis accumulatis et ad cutem determinatis, nascuntur. Varia tamen haec acrimoniae genera, signis suis propriis notata, variam medelam requirunt, et internis praecipue remediis indigent. His rite administratis, externa vitia plerumque cum ipso morbo evanescent. Morbo vero primario jam extincto, si eruptiones cutaneae habituales pertinaciter remanerent, haud neglectis cautelis antea traditis, summum in nostro medicamento positum erit salutis praesidium.

In quibusdam leucorrhoeae speciebus, injectiones solutionis sacch. Sat. in vaginam et uterum a nonnullis laudantur. Quando exulcerationes, ibidem sitae, huic morbo originem dant, usum huius generis enematum non negarem; si vero vasorum laxitas in causa est, praeter medicamenta interna et universalia, injectiones potius simpliciter adstringentes commendarem.

Præparata quidem e plumbo a Cl. Goulard, in tumoribus quoque scirrhosis, luxationibus, anchylosibus, &c. sum-

summo opere laudantur: Quam parum vero in his efficere valeant, antea dicta, relique ipsa nos docuit. Nullam enim vim habent solventem in fluida coagulata congesta, nec, ut ille credidit, admodum sunt penetrabilia. Cæterum, si ea his ineffet vis, qua corporis intima penetrare possent, ab externa quoque applicatione eadem certis certius expectanda essent mala, quæ plumbi vapores, et præparata interna assumpta, produxisse novimus. Omnibus tamen his malis, si conjuncta sit inflammatio, vel eadem superveniat, præsentissimum a solutione Saturnina auxilium derivabitur.

Ad internum tandem sacch. Sat. usum pervenimus. Quicumque vero ea, quæ supra de plumbi effectibus in corpus humanum notavimus, in mentem revocare voluerit, nec plumbi usum internum in genere peius condemnandum; et, in casibus peculiaribus ac desperatis, vis ac ne vis quidem esse concedendum, hic statueret, minime mirabitur. Tanta enim, et subtilis, totiesque ab innumeris auctoribus confirmata illius vis venenata est, effectusque primarii tantopere nervis inimici sunt, ut nunc fusius hanc rem explicare, testimoniisque ulterius confirmare, haud opus sit. Minutissimas insuper doses, vel clanculum, vel consilio interno corpori applicatas, neque trisla sæpe movisse mala, vel lentum saltem evasisse venenum, commemorasse sufficiet. Non quidem ignoramus e plumbo præparata, a multis haud parvi nominis medicis, in hæmorrhagiis, diarrhoea, leucorrhoea, phthisi pulmonali, multisque aliis morbis, ob adstringentes et sedantes vires eximias, fuisse commendata: Nec eadem in his morbis insigniter interdum profuisse negabimus. Quare vero, quaeso, ad noxia, vel summe saltem periculosa remedia confugies, cum tot tantaque haud minus celebrata tibi sint artis præsidia, quæ tuto majorique cum fiducia in usum vocare possis?

Auctorum insuper de tuto plumbi usu interno testimonio, examine instituto, omnibus numeris absoluta haud invenies. Effectus enim plumbi, in parva præcipue dosi exhibiti, non statim sæpius apparent; post longum tamen tempus semet manifestaturi, vel iidem tantum non sunt, ut certis signis possint judicari. Systemati interim tamen nervoso nocent, vel morborum chronicorum semina fiunt. Lenta nimirum Italorum venena præcipuam suam vim plumbo debent. Si porro ob idiosyncrasiam, vel peculiare forte quoddam in exhibitione, aut præsentis corporis statu, quibusdam hominibus minime nocere plumbum videres, quare,

quæ, quælibet, conclusionis universalis vix erit? Sed, quod maximum est, multi auctores, tinctura illa antiphthastica dicta feliciter usi, totam exinde plumbi usum internum tacite propugnavunt; cum eadem tamen tinctura, quamvis pro parte ex sacch. Sat. consistatur, si per quoddam tempus steterit, rarissime ullam plumbi particulam continet. Acidum nitrosum vitrioli, quod vitriolo Martis inest, plumbum attrahit, et cum eo præcipitatur. Sic in fundo vasis sedimentum albam invenies, et in liquore plerumque nil ferre aliud quam feri solutionem habebis. Hanc rem ita sese habere, jam ex sapore percipies. In ipsa quoque illa tinctura, solutione hepatis sulphuris instillata, sæpius nulla plumbi signa detegere poteris.

In desperatis tamen quibusdam delirio febrili phrenitico, ac peripneumoniae casibus, miranda certe cum successu se facch. Sat. ad gr. iv. exhibuisse narrat Cl. Hundermannus (1). Cum vires fluctantes, quas cum sedantibus conjungit opium, non ab illius usu in phlegmatis interdiciant, maximam certe in istisdem spem a sacch. Sat. concipere liceret, si tuto illud in usum posset vocari. Sed ex antea dictis satis patet, quam periculosa sit hæc medicina. Si vero in summo horum morborum acumine, cæteris omnibus jam exhaustis ac irritis artis præidiis, in præsentissimo mortis periculo, solium potius, quam plane nullum remedium adhibere liceat; rebus ita se habentibus, sacch. Sat. propinare haud dissuaderem. Salutaris tamen hic effectus pluribus, quantum novi, nondum confirmatus est exemplis. Cavendum igitur est, ne, nisi in desperatis admodum casibus, hujus medicamenti periculum faciamus. Et summa insuper opera navanda est, ut postea exhibitis purgantibus oleis, quantum fieri possit, effectus noxios averiamus.

Sic ad finem perduxî ea, quæ hujusmodi operis limites de plumbi virtutibus medicis proponere permittebant. In rerum quidem causis indagandis, interdum ingenio indulgè; in regulis tamen practicis tradendis, nihil opinioni credidî. Nihil tamen minus, ab errore me haud alienam esse, multaque minas accurate dixisse, egomet ipse bene scio. Quæ vero sic deliqui, benevole lector, ea auctoris juventuti, nec satis adulto judicio, ignoscas, peto.

Nihil igitur superest, quam ut illi, quibus in arte mendi usus sum præceptoribus, eas, quas debet ac habeo, grates, persolvam. Earum vero primitiæ summo jure Cl. Rhades ac Meckel genio ac memoriae debentur, quos nimis

(1) Dissertatio de sacchari Saturni usu interno salutari; Acta naturæ curiosorum, vol. vii.



nimis cito dera fata amicum orbisque literati totis effu-  
perant. Ordine tunc Cl. Gleditsch Walter, Gashium  
commemorare jubet mens grata, jubet animi integritas.  
Quae denique, eaque maxima, Cl. hujus Academiae Pro-  
fessoribus debeo, haud tacere possum. Intus eos tamen,  
prae reliquis, Cl. Cullen, quem ferè nepotes nostris tempo-  
ribus invidemus, grati animi officia mihi persolvenda sunt.  
Si tanta enim doctrinae beneficia, ac benevolentiae munera,  
quae in me peregrinum ulro contulerit, publico testi-  
monio haud celebrarem, ingratus in patriam revivere,  
sensuque animi proprii dissimularem. Quam tandem sum-  
mam, totiusque repositam Cl. Hope in me adhibuerit be-  
nevolentiam, ut maximis gratiarum assensibus confitear,  
eorum, quibus fructus sum beneficiarum, mens haud im-  
memor postulat. Illam semper diem felicissimum ducam,  
qui primus florentem hanc Academiam salutari mihi de-  
dit, utpote in qua rarae humanitatis testimonio, artisque  
medicae summos fructus, tuces expertus fuicim, quorum  
nullquam mihi ex animo excidet grata memoria.

DISPUTATIO PHYSIOLOGICA, INAUGURALIS,  
Arterias omnes, et Venarum Partem,  
Irritabilitate praeditas esse:

QUAM, ANNUNTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendissimi omnium Vob.,

CULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

Academiae Edinburgensis Praefecti;

MACRUM

Academiae SENATUS ACADEMICI Consilium,

Et Honorificae FACULTATIS MEDICAE Decretis;

PRIUS GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

RICARDUS DENNISON, Anglo-Britannus.

Soc. Med. Soc. Hon.

Frid. Id. Junii, hora locoque solitis.

---

Syllabus disceptandi praebent, uti solent, Vires,  
Ner., velut ipsa triplex, et pericula faciles,  
Aut odium interitum juvenentur vestitus iniquum,  
Aut immundi aspectus ipso-maledictaque dicta.

---

Hon.

1775.

Viro eximio,

THOMAE YOUNG, M.D.

Obstetrici in Academia Edinburgensi Praefecti egregio;

Et

GULIELMO DONNE,

In ubi Nervici Chirurgi peritissimo;

RICARDUS DENNISON,

S. P. D.

Cum laudes medicas in hac illustri academia petitarum meritis sit,  
charitas, quae sit, jubente academia lege, scribendae sunt, alicujus  
viri in arte sua, vel aliter, nobilis, namque praefigere; ego quoque,  
consuetudini et usui receptis obsequens, cui, Egregii Viri, quibus meum  
primum in medicina laqueum dicerem, petitionem dedi. Quod feci,  
non ut vestram estimatorem laudando augerem, quippe quae con-  
sulam quibus innatisis sententia, et gravissimum iudicium testima-  
nibus sanctorum confirmata sit, sed ut maxime, quae in me conta-  
listis, beneficiorum, animam meam gratumque attestaret. Locus  
igitur oblatus inoffensus, ut vestrum atque, aliter, quapropter me,  
longum morbum perperam, amicus et medicus, mihi praeceptor, et quasi  
pater deinde fuit. Alteri, cuius praeceptis, omnia quae de arte obse-  
trata vici, debet, cuiusque in me antecessorum animam, in quo hoc  
venit, nunquam non expertus sum, tantae in me voluntatis, animi  
sensu, quae semper intus habui, sive saltem exprimam.

Vivite, Viri Egregii, vestrisque usui, vestris decori, arti salutiferae  
ornamenta, et hominibus praesidia ac saluti esse, pergite.

## DISPUTATIO PHYSIOLOGICA,

## INAUGURALIS.

Arterias omnes, et Venarum Partem,  
Irritabilitate praeditas esse:

Certe et vasorum, unde unde sit, actio, est in corpora humanum summi usus et magni momenti potestas; adeo ut, post sanguinis circuitum detectum, plerique eam omnium primam praecipuamque et alicuius corporum nostrorum efficiendi, habuerint. Eandem praecipuam quoque sanguinis toto corpore promovendi instrumentum esse, inter omnes fere convenit. Et, si mathematicorum eam metiendi rationes et experimenta feliciter essissent (a), sic, quid ipsa vel sanguinem ubique peritandum valeret, comperto, an ad idem aliae quoque potestates, et quid quaeque, auxilium conferrent, aestimari clare potuisset. Verum, quia aliter res se habet, et nondum veras curis viros, ac tantummodo relativas, quisquam deprehendit; idem quaestio, quae hujus opusculi argumentum futura est, scilicet, an aliae potestates sanguinis circuitum adjuvent, et an rubrum sanguinem ferentia vasa, ac prae reliquis arteriae, id faciant, alia via investiganda est. Qui cordis actionem solum hujus rei instrumentum esse negant, ii, aut vasorum elaterem aut irritabilitatem conjungere cum corde speram, contendunt. Et, quia, si cor deficit, horum alterutrum suppetias ire haud dubium est, primum, nequid elater possit, inquiram. Cumque cum nihil posse, paucis, ut spero, demonstravero; tum opusculi rationculam his capitulis sic exequi pergam; ut,

I. Cordis actionem, propter ei objecta multa remora-  
mina, ad sanguinem, ea qua novimus celeritate, ubique corporis peritandum, non sufficere;

II. Arterias universas contractilitate musculari, seu ir-  
ritabilitate, praeditas esse;

III. Eandem certis venarum portionibus non desse;

IV. Vasorum irritabilitatem, cum in sanitate, tum sive  
auctam, sive imminutam, sive alioquin abnormem, in mor-  
bis, momenti maxime habere, ostendam.

## VASORUM ELATEREM NUNIL VALERE.

An sanguinem promovendum, elasticitas nihil eo va-  
lere visenda est; quod nullum elasticum inanimatum lon-

VOL. III.

3 C

gius

(a) Vide Boerlii, Keil, et Hanc. Newton, et conflat inter se rationes  
et cum Hallesi experimentis.



gius resiliendi potestatem habet, quam quanta fuerit extendendi potestas. Ita funis quivis, unciae pondere ei appenso, in digiti sui longitudinem extensus sit, cum, ablato pondere, tantum uno digito brevior fore, constat.

Eandem rem cujusvis ligni elastici, ut virgae, flexio, simplici experimento, confirmat: quo ut in rectum statum resiliat virga, ita non in contrarium quoque recurvari, potest. Unde sequitur, vasorum distensionem, quam sanguis ea distendens dat, non hujus promovendi causam esse posse; propterea quod tantum motus a corde accepti in vasis distendendis amittitur, quantum inde pendens contractio reparat, navique impetus nihil additur (b). Hinc a corde derivata vis eadem ita in summam permanet, ut divulsatur, parique, corde agente, adhibeatur, pars, hoc quiescente, continetur (c). Quumque igitur vasa humorifera nostra, ut et reliqua firma simplicia, alia aliis causis, omnia in vita distenta reperiantur, eaque distensio, quam generico nomine tensionem dicas, tam fibrarum muscularium tono (d), licet hujus tota causa non sit, quam omnibus totius corporis actionibus, necessaria est; tamen, ad sanguinem suis vasis percitandum, per se nonnullam valet.

### C A P. I.

*Ad sanguinem toto vasorum orbe percitandum, cor, propter  
et objecta comminuta, non sufficere.*

An sanguinem universis vasis sine auxilio percitandum, cor non sufficere, complura hujus actionem testantia, manifeste declarant. Ea sunt (e), arteriarum, quo longius a corde recedunt, eo majora cava; earundem passim inflexiones, item anguli, quos cum truncis, unde oriuntur, rami describunt; tum anastomoses; dein sanguinis visciditas; postremo, partium arteriarum cingentium cum rigore pondus.

Quod ad arteriarum eo majorem, quo a corde longius recedunt, cavitatem amplitudinem attinet; multi iam metiri conati sunt, ut Cole medicus Anglicus, ut Keil, ut Senacius. Quarum mensurarum licet apud alios alia ratio sit, et exactam vix invenias; tamen id valet, ut omnium arteriarum cava, trunci magni cava, longe majora, fatearis. Quod si majora sunt, sanguinis plus quaque capiant necesse est. Sanguinis autem copia quadratis diametrorum respondebit. In quocumque vasa sic ampliora perfluentem, et  
copia

(b) Coll. Inst. CLIX. Inst.

(d) Coll. Inst. CI. CII.

(e) Mauro, praefect. anatom.

(f) Coll. GLXX.

copia pro partis mensura usque crescentem, cordis pulsas manifeste, et pro ratione, minor erit. Atque hic, ut ait Hallerus, "erit eadem retardatio sanguinis, quae est in aneurysmate."

Neque earundem arteriarum, si sola vi elastica praeditae sint, inflexiones, toto corpore crebrae, quae frictionis, mox memorandae, vim necessario adaugent, et, ut partes vicinae magis resistant, efficiunt, non quoque de cordis actione adimunt; sic enim "semper aliqua pars vis, nempe potestatis, impellentis absfuitur in impellenda parte pliae convexa et motantis figura vasis flexi (f)." Quod, posita fibrarum muscularium actione, aliter se habet; per quam fit, ut auctior inflexione dilatatio auctiorem quoque contractionem concitet.

Eodem quoque ramorum cum truncis anguli pertinent; quorum eodem fere modo effectus explicandus est. Similiterque resistitur in talis rigentibus eo magis humorum motus, quo maioribus angulis a truncis rami abscedunt: "Anguli," inquit Hallerus, "eo plus de velocitate trunci demunt, quo longius ab angulo nullo, nempe, a rectissimo ducto, recedunt."

Quin et, quoties inter se duo arteriae ramo intercurrente conjunguntur, quoniam aut hinc, aut illinc, interpositus ramus incipere, et sic modum huc, modo illuc, sanguinem dirigere potest; hoc quoque cordis actionem effectum in sanguine percitando, imminuet. Sic "contrarii sibi sanguinis torrentes partem sui motus in anastomusibus delent (g)."

Porro, cum sanguinis inter se particulae assidue circumstantur, illae perquam viscidus sit, adeo ut, quoties quiescere permittitur, sponte concreascit; ea visciditas non potest de velocitate a corde accepta non aliquid adimere, et frictionem adhaesionis, aliquam inevitabilem, augere.

Quod ad haec attinet: Isti omnia corpora quae inter sese moventur, inter se quoque, per particularum superficies, magis aut minus adhaerescunt; ita id duabus rationibus fit, nempe aut ea adhaesione, quae ante agitationem, mixturae aut solutionis initium fit; aut ea, quae inter se inimica corpora, et nunquam penitus coitura, summis tamen suis partibus contingentia, ut oleum aquae, adhaerescunt. Illa, adhaesionis attractio, haec seicatio, nominata, cum cura distinguenda sunt. Adhaesivis attractio quibusdam tantum corporibus obvenit, dum alia mutuo se contra repellunt. Adhaesivis

(f) Haller, prim. lib. CLXII.

(g) Haller loco citato.—Prim. lib.

frictio potest aut corporibus, quibus asperae, aut quibus leves, superficies sint, incidere. Asperitatem superficierum frictio vasū nostris, quorum latera interiora perpolita, et humore ex ipsis dimanante lubricata, sunt, minime, et sola hævum, unavenit. Sanguinem vasū intus haerere, et hoc ejus motum tardare, manifestum est, confirmatque, id quod in canalibus metallicis usu venit; quorum quoque majora, prae humoris intus perfluentis copia, cava sunt, eo hævus motus magis tardatur. Quoniam autem, quo minora per se cava canalium sunt, eo interior eorum superficies, prae humoris copia, major est, illic tardius profluit; ita in nostris vasū, quantum hinc sanguis, quamque magis, quo longius a corde receditur, tardetur, et quantum motus a corde accepti usque depereat, facile judicatum est. In extremis vero vasū, quorum adeo exigua et minuta cavula sunt, ut haec unamquamque sanguinis particulam contingere credantur, cordis potentiae jacturam magna sit necesse est.

Quod ad partium arteriarum circumdatarum cum rigore pondus attinet: Illustri philosophus et physiologus Hædlerus, "pondus," inquit, "incumbentis atmosphaerae, musculorum et carnum arteriis incumbentium, vis ejus contractilis, resistunt equidem cordi, cæterum velocitatem sanguinis non minuunt; tantumdem enim residunt in cordis diastole, quantum systoles tempore de ejus viribus dampnerunt." Atque, eandem hinc rem agi, ac ubi cordis in arterias elasticas distendendas actio impenditur, existimat. Sed non ita est. Ut enim, sub unaquaque eandem systole, arteriae in diastole, id est, distentae, tum partium earum disgentium, itque superincumbentium, pondus movent; ita haec partes minime tam elasticæ sunt, ut resistendo tantum sanguinis celeritati addant, quantum adprimendo dampnerint. Quod igitur in partibus perfecte elasticis solis fieri potest, id fieri in iis quae neutiquam perfecte elasticæ sunt, non est sperandum. Satis quidem aer elasticus est; sed partes reliquæ, de quibus hic agitur, in eodem loco non sunt habendæ. Ideoque hinc quoque sanguinis a corde accepti velocitati oritur obstaculum.

Ex his omnibus remotionis sanguinis causis satis constat, eum per arterias profluentem, quatenus a cordis actione hoc pender, multum retardari. Quia et aliter e corde, aut haud procul ab eo, aliter in extremis arteriis, sanguinem intare, oculis, præsertim vitro adjunctis, cerni etiam potest. Eodem pertinet experimentum chirurgicum; quo vulnerata arteria propius cor, difficilius, remotius ab eo, facilius, sanguinem effluentem sistere reperta est. Haec etiam



dem sanguinis remoramini, postquam licet conclusioni  
suae nemiquam faventibus, recipienda tamen videt Haller-  
us; (sacret enim, (b) "calculus ponere non facile esse,  
facile magnam rationem esse facile intelligi; et in vivo ani-  
mali in truncis sanguinem instar torrentis fluere; in mi-  
nimis plerumque lentius moveri incipere, deinde coagu-  
lari;" in CLXIII. sic rem, in suam partem deturam, di-  
judicat. "Certe tamen est, in animalium viventium  
incisionibus, sanguineos globulos, qui singuli moventur,  
non tantum de sua velocitate amississe, quantum calculi  
poscunt. Quare oportet, causas aliquas dari, quae de-  
structivam motus potentiam minuant. Et quidem cer-  
tum est, remorum lumina in minimis non tantum ad trun-  
cum rationem habere; frictionem levitas summa minu-  
it. Facilitas etiam, qua sanguis per rebas refluit, mo-  
tum ejus per arteriolas expedit, quae proxime cum ve-  
nis communicant. A pondere sanguinis, a nervorum  
vi, a laqueis, nihil valde sperari potest, quorum illud et  
resistere possit, et adjuvare; hi nihil quidquam in vi-  
vis animalibus virtutum habeant. Vis derivationis quae-  
cumque ea fuerit, et motus musculorum novam celerita-  
tem generare potest." Verum crescere, prout longius a  
corde receditur, remoramini, et sic motui turcis pro ra-  
tione reſisti, vel hoc apparet; quod omnium cordis actio-  
nem imminuentium causarum effectus in extremis vascu-  
lis primum apparent. Quin et ipse vir clarus Hallerus,  
"certum tamen esse, in animalium viventium incisioni-  
bus, sanguineos globulos, qui singuli moventur, non tan-  
tum de sua velocitate amississe, quantum calculi poscunt,"  
solito candore sacretur; et "oportere causas aliquas dari  
quae destructivam motus potentiam minuant (i)," idem  
addere cogitur. Quod videns, ut aliquam saltem causam  
inveniat, "remorum lumina in minimis non tantum ad  
truncum rationem habere; frictionem levitate summa  
minui, et facilitate, qua sanguis per rebas refluit, motum  
ejus per arteriolas expedit, quae proximae cum venis  
communicant," adfirmat. Sed haec rem non explicant,  
et laborantem magnum virum manifestis difficultatibus  
premi facile videas. Nam, quod ad primum, quo utitur,  
argumentum attinet, nempe, "minimorum vasorum cava  
ad trunci communis cavum minorem, quam vulgo credi-  
tum est, rationem habere;" solus fere, et, quantum video,  
sine experimento, sine proprio, sine alieno, et sine testi-  
monio, hoc asseruit. Et contra ejus sententiam fiat rei  
verae

(b) Hall. prim. lin. CLXIII.

(i) Hall. prim. lin. CLXIII.

verae species. Nonne enim, quo longius a corde arteriae recedunt, quo propius fines suos accedunt, numerosiores usque rami reperiuntur? Et, ut ante dictum est, nonne ipse, cava omnium extremarum arteriolarum simul sumpta, communis trunci cava, ampliora esse, sequitur? Quod, si extremas arterias cylindricas esse dicitur; tamen sic quoque ramorum omnia cava, quam trunci unum, majora sunt dicendum est. Cum autem "laetitia summa minus frictum" dicat, duo frictionis genera, adhaesionis et attractionis, esse obliis, id dicit. Quam illa adeo non levitate immittitur, ut hac ipsa quam maxime augeatur. Ita duas superficies, ut vitri aut marmoris, perpolitas, aqua saltem interposita, ut sine alio opere inter se cohaerescant officies, et ob nullam aliam causam, quam quod omnia utriusque superficiem puncta ab omnibus mutuo continguntur; cum attractionis frictio ab uno puncto pendeat, et in summa laetitate prohibeatur. Contra igitur hujus arteriarum cavarum laetitia, quae tanto major erit, quanto propius illarum fines adsunt, effectum, quemque pro ratione ampliata usque simul earundem superficies necessario adauget, nihil natura prorsum est, quod celeritati a corde traditae non sic obstiti ostendat.

Porro quo modo "facilitas, quae sanguis per venas refluit, motum ejus per arteriolas expedit, quae proximae cum venis communicant," minime concipio. Si, quo tempore cordis contractio sanguinis quiddam in arteriae principium coniecit, eo tantundem in venas transfret, nullus pulsus, nulla arteriae dilatatio foret, et magni viri argumentum aliquid ponderis haberet. Quod nullum habere pulsus ratio docet; quo sanguinis in venas transitui diastoles simul et systoles spatium requiri intelligitur. Unde, cum sanguinis in venas, uter facili, transitus diastolen arteriarum, id est, harum dilationem, non prohibeat, cum ad remora in minuenda nihil valere, et si difficilis est, contra augere, patet. Nihil quidem ad rem sanguinis pondus esse, illustri viro habens assensio; utpote quod, si alibi celeritatem, ut in arteriis ascendentibus, immittit; alibi, ut in descendantibus, adauget, et in rei summa nihil mutetur. Neque musculorum alio quaestione interest; quae, ut sanguinem quidem, sive in venis, sive in arteriis, ubi occurrat, percurrat, ita illius motus summam nihil afficit. Denique, "vis derivationis," adeo nuper physiologia et pathologia pervulgata, nisi in vasis inter se vicinis et pervia, rem non tangit. Vasa enim corporum nostrorum, dum vita superest, ultra diametron, quam vaqua aut mi-

mus plena haberent, humoribus distenta, has arte amplectuntur. Et, si pars humoris alicui vasi dempta est, quoniam brevi ei, quod restat, humoris vas sese per elaterem suum accommodat, usque acque arte ac ante amplectitur; ideo hinc in luminari neque retardari neque pericitari sanguinem universum sequitur.

Quibus omnibus inter se perpenis, cordis actionem ab initio ad fines arteriarum non eandem permanere, et alia, qua sanguinis in extremis vasculis celeritas explicetur, potestate opus esse, sciendum est.

## C A P. II.

*Arterias universas Contractilitate musculari, seu irritabilitate, praeditas esse.*

Cum igitur simplex arteriarum elasticitas ad sanguinem percitantium nihil conferat, nec cordis potentia per se ubique sufficiat; aliam potestatem illi muneris praestare, eamque, quoniam nulla alia in corporibus nostris motus causa nota est, muscularem esse, manifestum est. Et quoniam, ut supra dictum est, extra ipsa vasa muscularis actus motus sanguinei summam nihil adjuvat, alioque aliter admota, aequalem effectum inaequalis ipsa praestare non potest; ergo assuetam eam in ipsis vasibus, nempe arteriis, inesse, argumento claro sequitur. Cujus argumenti ea via est, quae ipsa haud levi causam sustinet. Verum ne argumento, quantumvis valido, et quilibet ipsis mathematicis saepe sufficiunt, neganti tamen insistam; quae arteriarum contractilitate musculari praedita esse res verae fidem faciunt, eas deinceps exponam.

Eae sunt in arteriarum fabrica, fibrarum muscularium, non nomen solum, sed species manifestae; deinde earundem arteriarum, experimentis comperita, irritabilitas; tum, debilitato corde, sanguis moveri perflans; porro hic, arteriarum assuetudo deleta, languide morans; denique, ejus in arteriis extremis motus velocior, quam ut ea, cordis tot impedimenti obiectae potentiae, velocitas tribui possit; pullerimo, alia temporibus et aliis in corporis partibus, cum eadem cordis actio est, sanguinis alia cum impetu velocitas (*b*). Ut a fibrarum muscularium in arteriis specie incipiam:

Est in arteriis fibrarum muscularium lamina, musculari celeritate, quam tunc in muscularibus anatomicis examinaverunt, et pro musculari plerique habuerunt. Sed

praeceps



praeter nomen et incertum rei iudicium, in arteriis fibras evidentes sunt, quales in canali intestinali cernuntur, exstentibus autem moventium muscularum fibras pallidiores quidem (1), sed quas musculares esse, peritissimis cuivis, praeter Hallerum, Anatomico, et persuasum est et persuadetur. Quod, si vix in primis illustris, Hallerus, illas fibras musculares esse negavit, quia ad eas pullos ire nervos observavit; numne in multis locis nervos esse multa testantur, quorum aliquae praesentia nequiquam conspicua est? Praeterque hoc, haec illius negatio minime contra res veras, et, praeceteris, non memorandis, Iaculentum praeceptoris nostri Monrois experimentum valere debet. Itaque aurae praecisae exiguum tubum infixit. Quod iure agendum, aliquibus temporis minutis exactis, sanguinis motus magna ex parte desierat. Quo facto, opili aequa soluti gutta una infusa, citis pariter maxime distillae commotae sunt. Quod non opili diluti tantillo, ad partes distantiores perlato, sed nervo stimolato, et per medium cerebrum ad longinquioris corporis motum transmittenti, tribuendum est. Quod autem harum fibrarum testatur, quam alibi muscularum, densiorem, eamque, "soliditate satis conspicua esse," Hallerus, et Nichol ad tendineam aut ligamentosam propius, quam muscularem, naturam accedere, contendunt; id non ita esse, hoc apparet, quod nusquam corporis tendineae aut ligamentosae fibrae sic, ut arteriarum ear, de quibus agitur, fibrae intestinalium circulares, disponuntur; id est, nusquam in circulum ita componuntur, ut, priusquam hunc compleverint, singulae ad latus detorqueantur, et circulum desiciant, solumque, "multae conjunctae videantur unum anulum exprimere (m);" contraque nusquam fibrae musculares non in tendineas compaetioresque desinunt (n). Et, cum adeo intestinalium fibras, quas nemo musculares esse negat, arteriosae referant; ita has quoque naturae muscularis participes esse, veri certe simile est. Eadem porro species fibrarum muscularis in pluribus conspicibilis est: Ubi, ut in vellis, quasi musculares fibras esse in confesso est, ita, in tunica arteriarum musculari, post absumptam, quae ubique us intertexti, et magnam earum molis partem conficere in sanitate solet, telam cellulosam, distinctiores fibrae clariioresque apparent.

Alterum, quo in arteriis contraxibilitatem muscularem inesse, anatomicis et physiologis placet, argumentum, ab

illa-

(1) Memoire prel. anatom.

(2) Ibid.

(m) Haller. prim. lib. XXX.

illarum irritabilitate tractum est. Hanc multi clari viri defenderunt, ut superioris sæculi, Pecquetus anatomicus, cui "sanguinis motum vasorum constrictione adjuvari" placuit (q); ut Glissonus, qui cordis, arteriarum, et venarum vim peristalticam memorat (p); item hujus sæculi, ut J. de Gorter, qui "vasa, arterias et venas exserere alternam constrictionem, ad humorum motum adjuvandum," contendit (q); ut Senacius, qui majorem arteriis, quam cordi, vim contractilem tribuit, et eas corda appellat (r); ut Feid. Winter (s); denique, omnes in Britannia anatomiae et physiologiae peritiores viri, ut Monro Professor noster egregius, ut duo Hunteri, et Cullenus, qui elegantissime omnium, eoque, quo omnia ornat, ingenio hoc argumentum, in suis Medicinae Institutionum praelectionibus, tractavit. Sed hanc arteriis denegat Hallerus; utpote in quibus, nullam stimulo quoquam mechanico irritabilitatem, et solis chemicis, quae, qualia acida mera sunt, quodvis corpus firmum corrugant, eoque anacepe irritabilitatis indicium dant, excitare ipse potuerit. Nec dubium quidem est, quin in hac re fallacia latere possit, motuique vitali id tribui, quod veneni, ut olei vitrioli, spiritusve nitri, opus est. Verum enim verum, si fallor, a stimulorum hujusmodi chemicorum opere, modo paulo peritior quis experimenta administret, eaque saepe iterata, et omni modo tentata, variet, lucis quoque aliquid argumenti nostro affulgere potest; irritabilitatemque inter et corrugationem, quam in qualibet corpore, live vivo live vitae expertae, quandoque stimulus chemicus dat, distinguere certe potest. Cor enim, in eodem firmo vivo, modo motum suscitatur, modo non eadem vis veneni? Et, cur eadem illud, aliquando saltem, non inanius eodem, afficit? Certe stimuli, qui idem est, diversus effectus esse nequit. Qui, ut a vitali magis potestate, multum saepe variante, pendet; ita multum variet, et modo major, modo minor esse, modo nullus videatur, necesse est. Reque vera, post id tempus, quo Hallerus experimenta sua instituit, arteriarum fibrarum utroque stimulatorum genere, licet difficiliter, licet saepe obscurius, et ita, ut non in experimentorum prosperorum ipsius auctoritatis potestate semper esset, eadem renovare; tamen, ut ipsius verbis utar, "adeo clare, adeo

VOL. III.

3 D

allucide,

(q) Dissert. anatom. p. 133. et dissert. de circuitu.

(p) In libro de ventriculi et intest. cap. 17. N° 5. p. 238. et cap. 8.

(q) Exercit. med. de motu vitali.

(r) De Chœur. tom. II. l. 3. ch. 4. p. 109. et ch. 7. p. 209.

(s) Apud Van Dœverum, in observ. acad. cap. 18. p. 257.

dilucide, ut nullum dubium de irritabilitatis effectu restaret," constrictae quidem fuerunt (t). Quod pensum Qualterus Verschuir, plurimis experimentis institutis, elaboravit. Quorum experimentorum hic eventus fuit, ut, si nonnulla parum ad sententiam cesserint, plurimis tamen felicior successus non defuerit. Et, si eorum auctor, qui paulo post acceptam in sua academia artis nostrae lauream, nos invisit, coram nostris Professoribus experimenta illustrata non neque feliciter absolvit; id neque mirandum est, neque viro ingenioso pariter et probò fides deroganda. Sunt enim haec, ut illustri Boyle dicto utar, eorum experimentorum in numero, quae contingentia seu fugacia, eoque fallacia, dicat. Praeterque nostram auctoris notitiam, rem veram tuerentur experimentorum testes, viri clari doctique G. Van Doeveren, Camper, alique anatomici et physiologi Batavi praeclari. Quod, si haec de musculari arteriarum potestate experimenta longe quidem saepius spem nostram fallunt, quam ad sententiam succedunt; non ideo arteriis illa potestas deneganda est; siquidem affirmantes res verae, vel una aut altera, plus ponderis habent, quam millia negantia. Et in hac re eo mihi minus dubitationis datur, quod in partibus, ut vesica, ut ureteribus, quarum vis muscularis certa et explorata est, saepe satis gravium stimulorum nullus, alias admodum levium, sensus est. Verum, ut, quod ponderis haec de arteriarum contractilitate habeat, cognoscatur; ea, quae aut alii, aut Verschuir, aut nos ipsi instituimus ademus.

#### EXPERIMENTA.

PACQUETUS, postquam vasorum "contractionem, in spontaneam et violentam," distinxerat, "hanc," inquit, "excitat humoris acrioris asperitas, punctio, et continui qualibet ex causa saluti (u)." Glissonus, qui primus hanc, de qua agitur, fibrarum muscularium actionem, irritabilitatem (x), nuncupavit, cum motum intestinorum peristalticum, "a fibris naturali vi motiva pollentibus," pendere dixisset; ita a consimili fibrarum contractione, similem cordi, arteriis et venis vim tribuit (y). De Gortee

"arterias

(t) Vid. Verschuir dissertat. "De arteriarum et venarum vi irritabili, ejusque in vasis exercitio, et inde oriunda sanguinis directione abnormi." § 27, et confer cum ejusdem experimento 7.

(u) Loco ante relat.

(x) Quid contractio muscularis, seu irritabilitas sit, vide Cull. lib. LXXXIII. et sequent.

(y) Loco apud Versch. supra relat.



"arterias gaudere omnibus requisitis ad muscularem motum, et talem re vera ipsas multum exercere, ex inaequali quadam in parte circulatione et pulsu," disserit. Idque experimento confirmat, quo "arteria aperta alterne digitum immissum premere, simili modo ac: cur murone spissus abscisso," deprehensa est. Porro, "in irritata," inquit, "parte calor major et humorum motus per stimulos excitatur." Denique, varia phenomena, ex hac vasorum vi explicabilia, ostendit. Senaculus irritabilitatem dat, a nervis derivatam. Quam in iis vim inesse, "motu et contractione venae cavae, quae, quiescentibus reliquis partibus, in ipso tronco et ejus ramis facile excitatur, et, quod arteriae irritatae se contrahunt et palpitant, eandemque in vivo et sano corpore, ubi, ob frequentiores earum contractiones, humorum in iis motum varia irritamenta excitant, ostendant," confirmare ille conatur. Quorum virorum siue experimenta siue observata, si minus accurata aut recentia minus, et non satis elaborata iterataque, dicam; vide an haec fide majore digna sint!

Zimmermannus, magni Halleri discipulus, eoque minus in hac re praepjudicii suspicandus, e tribus super arteriis experimentis quae instituit, in duobus oleo vitrioli manifestas arteriae contractiones, et egregius Lorry spiritu nitri, antea quam venae cavae, paulo manifestiorem actionem (=), deprehenderunt. Quae etiam experimenta si, quia hic acidorum merorum corrosivus, non potestatis vitalis affectio, suspici potest, leviori fide digna videantur: quamquam, quo modo inter hos duo, mechanicum veneni et vitalem partis musculosae effectum, distinguendum sit, mox exponetur; en alia tibi, quam hac, qualis qualis sit, suspicione certe carent.

"Inter reliquas corporis humani partes, et arterias post mortem animalis se contraxisse, licet nec corrosivum quoddam, nec feram irritatae fuissent, immo ostendisse adhuc hanc vim, dum de corpore separatae jam essent et varias in partes dissectae," testatur De Housset (a). Eodemque pertinere videtur experimentum celebrati olim viri Wallaci, qui in "anate dissecto aliquoties vidit, sanguinem in pectoris vas, cunctis arteria, repulsum fuisse ad

3 D 2

cor,

(=) Recueil period. d'observ. de med. par M. Van Dermonde, tom. vi. pag. 7. et comment. de rebus in scientia nat. et med. gestis, vol. vii. p. 1. p. 438. 439.

(a) Mem. sur les part. sensib. et irritab. tom. ii. observ. 21. pag. 204. Consule et Verfic. disput. inaug. de hoc. et ante haec experiment.

cor, qui sanguis regressus per aliam arteriam perpelletur (b). Podtrem, ope effluvi electrici vii docti L. Bilker et J. Van Den Bos, neco manifestam aortae contractionem, item M. Van Graen, ut vix dubium esset de propria ipsi facultate contractili, deroverunt.

Nunc quid experimenta Verschuriana aigumento lucem affundant, videndum est. Verschur viginti et duobus experimenta in canibus, vario successu, instituit. Quorum de quinque, nempe, ix. xii. xx. xx. xxi. ipsius veros audi-  
 "Nulla," inquit, "manifesta irritabilitatis et contractionis signa, licet variis stimulis arterias irritarem, derogere potui: Laceris video, mea hac in re cum iis Ill. Halleri convenire." Deinde alia sex sunt, nempe, ii. iii. iv. v. xi. xix. de quibus irritabilitas "non adeo," inquit, "manifesta fuit, ut dubius haererem, num quidem ille effectus principio irritabili tribui deberet, an potius alii eandem causae; neque haec mihi satisfecerunt, ut absque serapula calculum adfirmanti sententiae adicere auderem; cum tamen saepius idem, omni adhibita cautela, viderem, cum luculentiora iis irritabilitatis indicia observarem, majorem vim prostanti arteriarum irritabilitatem adquisiverunt (c)."  
 E. dimidio igitur horum experimentorum numerum, nempe undecim, quinque nullam irritabilitatem, sex aliquam, sed levissimam, ostenderunt. Quibus levior haec contractio excitata est, stimuli mechanici, id est, ferrum, fere erant, nempe in omnibus praeter decimum, ubi quis prior stimulus fuerit non dictum est, posterior oleum vitrioli erat, et tertium, ubi post ferrum aëria chemica adhibita memorantur, solum ferrum admotum est. Eoque, quod obijci alioquin poterat, nempe aëria chemica, praecipue quae rodendi vim possident, rodendo, non principium irritabile excitando, egisse, iis experimentis obijci non pnest. Verum enimvero, quod ad haec quoque attinet, ut ante dictum est, irritabilitatem inter et corrugationem, seu erosionem, non tam distincte disticille est. Etenim vis rodens, quoniam in solida nostra etiam viva, sed in simplicia seu inanimata, agit; ideo, si unquam, semper agere debet; quippe cui ad agendum nihil, praeter idoneam ipsius vim, opus sit, visque vitalis neque impedit, neque expediat, ejus effectum. Ob quam causam, si in aliis experimentis contractionem arteriarum, in aliis non, eadem veneni, sive viutolicum, sive nitrosam acidum, fuerit, vis excitavi, effectus ejus non rodenti noxae, id est, operi mechanico,

(334)

(b) In epistol. de motu chyli, pag. 793.

(c) Vide Dissertat. supra rel. § 27. pag. 10.

(nam et chemica corpora funditus mechanice agunt, et, a mechanis quae nominantur, solum hoc, quod haec ignoro, illa noco, opere agunt, distinguuntur), sed vitali, nempe irritabilitati, jure tribuitur. Et sic quidem non de his solis, sed et supra relatis, experimentis, et de omnibus similibus, ubi sub iisdem aut similibus rebus acria contractionem arteriarum efficiunt, judicandum; eaque omnis, in quibus contractio, siue major, siue minor, excitata est, pro arteriarum irritabilitatis argumento haud invalido habenda, negantiaque rei difficultati, aut naturae fugaciae, tribuenda. Postremo, cum adhibiti stimuli, siue chemici siue mechanici, ad eundem effectum conspiraverint, et eundem arteriarum motum excitaverint; ita utrique eodem etiam modo egisse, et ab utrisque praestitus motus muscularis, fuisse, existimanda sunt. Estque, me iudice, hoc ipsum irritabilitatis arterialis per se prope satis indicium. Certe cum aliis argumentis, post experimentorum rationem expositam pependendis, et jam ante diuincatis, conjunctum, fidem satis firmat. Verum, quid, ex hujus viri experimentis quae restant, lucis porro affulgeat, videamus.

Ea sunt undecim, nempe, i. v. vii. viii. ix. xiii. xix. xvi. xvii. xviii. xxii. In omnibus his, contractiones haud paulo manifestiores, quam in sex proxime relatis, erat. Quod vero ad octo eorum attinet, ipsius aucti verba. "Experitus sum ad irritationem, ope stimuli ferrei, in arteriis contractiones, quas non solum ego, sed et amici et socii mecum viderunt." Et paulo post, "Leviter radendo et comprimendo, ope scalpelli et tenaculor, arterias contrahi vidi, non una, sed iteratis vicibus; manifestissime semel, dum attentus eram ad mutationem ex irritatione in arteria ortam, observavi hanc partem esse contractiorem ac antea fuerat; momento cum hunc effectum inspexeram, en? arteria eodem illo loco longe arctius ac adhuc fuerat (quasi nunc demum penitus percipiens stimuli molestiam), ante oculos sese constrinxit, adeo clare, adeo dispicere, ut nulum dubium de irritabilitatis effectu restaret." His dictis ille experimentum vii. respiciebat. Quae sequuntur v. xiii. xiv. xv. xviii. experimenta spectant: "Saepe quoque arteriis aliquot locis se contrahere observabatur, ita ut, si hae constrictiones non multum distarent, sed sibi vicinae essent, tum diameter, eleganti phaenomeno, inaequalis adpareret, hinc inde quasi ligamine contracta; intermedia loca vero viderentur paulo turgidiora, et facile esset hos nodos et inaequalitates digitorum tactu sentire." Deque



viii. xvii. xviii. "Nonnunquam," inquit, "disparebant, animali adhuc vivo, hæc in arteria phaenomena, aliquando, sed difficiliter novae contractiones rursus excitabantur; brevi tamen post mortem semper, quantum observavi, cessabant (*d*). Confirmant hæc quasi maxime, illos effectus non debere deduci ex mechanica quavis læsione, sed oriri ex principio vitali." Et experimentum xiv. respiciens, "Attendi," inquit, "et longiore tractu arteriam se contraxisse, ut diameter ad insignem distantiam magis contracta esset, quam erat supra et infra eum locum." Adque xii. alludens, sese ait, "singularem motum, pulsus celeriores et fortiores, penitus distinctum a reliquis, ut arteria instar vermis fere reperet, seseque agigaret, viro certe spectaculo vidisse, quod omnino demonstrat propriam arteriarum agendi vim (*e*)."<sup>2</sup> Postremo, experimentum viii. stimulo aucto, ait, propter magnam irritabilitatem, spasmum speciem (*f*) exhibet, ut ex illius verbis facile colliges, "Longe saepius arteriae irritatae mihi exhibuerunt contractiones violentas et peristantes, quae alterna vice non remittebant." Oriri illud statuo ex irritabilitatis gradu nimium incremente, et auctum stimulum absque violenta contractione non ferente; idem saepissime mihi contigit in intestinis, quae irritata semper fere spasmodice se contraxerunt, quod et de vesica verum est. Semel hanc rem oculis comprobatam vidi, quando una cum amico, viro doctissimo Frid. Kutsch, contemplatus sum in aperto abdomine vivi canis, summa certe admiratione, arteriae cuiusdam singularem ejusmodi motum et pulsus, qui a reliquarum arteriarum motu statim ad levem oculi conspectum peculiari sua actione diversus, conspiceretur; leniter dein tantummodo ope scalpelli illam irritavi; exin, quod mirum, motus ille, qui systole et diastole peragebatur, disparuit; arteria enim duobus in locis mediocri longitudine ex applicato stimulo se constringebat in violentam contractionem, absque remissione, eo loci, ut externo adspectu adparet, magna ex parte cavum suum deleverat, locus inter spasmos medius mirum in modum dilatatus conspiciebatur; solito enim diametro duplo quidem ad oculi conspectum amplior erat; post mortem, hæc omnia evanescerant, eratque arteriae aequalis diameter, et debita capacitas. Hoc experimentum evidentissime evincit arteriarum vim irritabilem (*g*).

Ex

(*d*) Cull. Inst. XCVI.

(*e*) Hæc convulso esse videtur. Vide Cull. Inst. CXII.

(*f*) Cull. Inst. CXI.

(*g*) Vid. Dissert. Verich. § 28.

Ex his experimentis, eo plenius relatis, quod auctoris opus paucorum hic in manibus est, arterias vi musculari, sive irritabilitate, praeditas esse, apparet. Nam non solum contractiones leves et modice magis, cum relaxatione, ut in sanitate, alternantes, sed inordinatae, et hinc spasmodicae, illinc convulsivae, nec in una arteriae parte notabiliore, sed, ut auctor ait, "per totum ipsius decursum, ut tota arteria et plures simul rami, ob spasmodicam contractionem, praeter modum angustiores essent." Quae contractiones non a cordis contractionibus pendere, hoc apparet, quod in omnibus simul arteriis idem non incidit; in experimentis enim, de quibus modo relatum est, cum "unius arteriae pulsus erat quandoque parvus, diameter contracta, alia arteria pulsu satis libero, imo celeri, ac forti, agitabatur." Et, post aliquod tempus, saepe cessabant haec symptomata; arteriae, modo contractae, diameter augebatur, pulsus erat liberior et fortior, egregie observabilis (b).

Eodem etiam experimenta Halleri pertinent (i). Quin et recisae arteriae ea contractio, qua prae fluxum sanguinis sensum minurum, tandem omnino sistit, neque arteriae retractioni, neque thrombo tribuenda, quanta contractilitas arteriis insit, haud ambigue ostendit (k).

Aliorum experimentis jam expositis, ad unum aut alterum, quae ipse, praesentibus amicis, instituit, deinceps transire secundum est.

#### EXPERIMENTUM I.

Hae hyeme catuli femellae, quatuor dies natae, incisae tegumentis, arteriam posterioris femoris cruralem, in digiti et dimidii lati longitudinem, denudavi, et a vena et nervis comitibus separatam, modo acus acie punxi, modo cultro rasi. Quam similemque in altero ureterem irritationem nulla contractio, aut irritabilitatis ullum signum secutum est.

#### EXPER.

(b) Vid. Diff. sup. rel. § 29.

(i) "Nullus pulsus in arteriis bujus animalis," Capolla erat, "adparuit, et ejusmodi fere plerumque animalia fuerunt; in quorum pulsum inquirivi. Et, non rarum est, in vivo animali foetio, pulsum nullum adparere, neque videri arterias dilatari; tamen frequentes huius observationes sunt, ubique dilatationem et oculis et tangenti digito fuisse manifestam," &c. Vid. Op. minor. exper. 20. p. 72.

(k) Vid. exper. 9. Verich. et Morgagn. De inf. et causis mort. per anatum. indagat. opus. 19. 21. 24. pag. 18.

## EXPER. II.

PAUCIS post diebus, canē magnū adultū, incisā tegumentis femoris posterioris, arteriam cruralem duos in longitudinem digitos nudatam, pariter a vena nervoque comitibus sejunxi. Tum, tunica externa seu cellulosa excisa, muscularem, cujus fibrae separatim fascibus transcurrentes facile oculis cernebantur, patefactam, ut ante acus acie, cultro, tenaculaeque pressu, nunc pungere, nunc radere, nunc vellere institui. Quod aliquoties factum, prius nulla contractio secuta est, nusquam arteriae diameter imminuta; sed brevi mora, inflammatione jam arteriae tunicae accensa, unaquaque irritatio pulsus crebriores, his undante motu interpositis, excitavit.

## EXPER. III.

EADEM, in alterius femoris arteria, experimenta licitata, eandem prorsus eventum habuerunt. Similiterque adjecto inflammatae vasis tunicae salis communis soluti paululo, arteria, deleta rubore, quam pro natura candidior et aliquanto contractiore diametro, apparuit. Et aliquanto post sale spongia cum cura absterfo, acus et cultri, ut ante, irritatio inflammationem, comitante arteriae motu oscillatorio, reduxit. Quam inflammationem spiritus corn. cerv. gutta sustulit, candoremque, sed paulo minorem, quam a sale creatum, restituit.

## EXPER. IV.

EJUSDEM canis carotide externa scalpello nudata, tantumque, quanta in sanguine detrahendo plaga esse solet, incisa; sanguinis inde rivus pennam corniceam crassitudine primum aequabat; paulatimque deinde, procedente profluvio, magis magisque attenuatus, tandem filum, quo in faciendo mulieres, aut vestium sutures, utuntur, reicerens, novissime vix effluere potis erat.

Haec pericula mihi facienti aderant Ricardus Byam, juvenis mihi multos annos conjunctissimus, ingenio, animi virtute, vique amicitiae, singularis, et Joannes Innes, operum anatomicorum in hac academia Administrator, et corporis humani partium, cum magno studiosorum fructu, Demonstrator.

Praeter rationes, quare hujusmodi experimenta toties experientia frustra habent (1), nostrorum primū eo etiam scilicet



sollellisse videtur, quod vivantes, sustinet recentius nata, irritabilia minus erat. Idque eo verisimilius est, quod neque ureter, de cujus irritabili natura nemo dubitat, illum irritabilitatis signum edidit. Altera duo experimenta proxima haec paulo prospectiora fuerunt; utpote sub quibus manifeste inflammatio, et aeternae solio major actio, et in tertis minimorum vasculorum ex chemico stimulo contractio, apparuerunt. In novissimo sanguinis affluentis rivus, magis, utque, arcu sanguinis non immutato, pro ratione arteriae contractionis attenuatus, clarum erat contractilitatis arteriosae indicium. Eodemque hoc haud obscure pertinet Hewsonii de ulno, quem, paulatim sanguine crebriuseducto, et summo pabulo, extinxit, minorem usque et minorem rivum dans, experimentum. Eandemque rem illustris Praeceptor noster Monro, incisus variarum animalium carotidibus, saepius observavit.

Quod autem experimenta, ut dictum est, parum ad sententiam saepe procedunt; id eo fit, quod, cum, a corde accepto motui arteriarum motus respondens, ab eo magna ex parte dirigatur; ita ad ejus rei, consuetudinisque, effectum superandum, insolita stimuli magnitudine opus est; neque infra id, quod actioni spasmodicae excitandae est, instrumenti quicquam sufficit. Quod in experimentis relatis facile cernitur. Idemque non solum de arteriis, sed et de ipso corde, verum est; cujus actio, neque ipso, neque parte vago, mediocriter irritatis, saepe, ac sola spasmus parlente stimuli vi, excitatur.

Arguit quoque actionem arteriarum, sanguinis, corde multum debilitato, motus tamen sustentatus. Ita cor in ossam naturam versum, aut exulceratione gangraenave consumptum, et sanguinem tamen diu fluere perstitisse, accepimus (m). Verum in hoc argumento aliqua fallacia latet; siquidem totum cor sic affectum unquam, ut nulla ejus pars agere posset, non est verisimile. Visque hujus rei huc redit, ut, si, ex hujusmodi ulla causa cordis actione imminuta, sanguis solus impetu perficere tamen perisset, in ea re multum arteriarum motui tribuendum, latearis. Quantum autem hoc, quantum arteriae ad eum motum sustentandum conferant, dici non potest. Sed conferre etiam in hoc casu cor, ejusque ad mortis usque articulum necessariam actionem esse, hoc indicium est, quod sine arteriae, quam sanguis e ventriculo projectus facit, distentione, illam ad propriam actionem stimulantem, arteriarum

contractionis initium nullum, ideoque nec progressus, esse potest.

Cumque porro, arteriarum actione deserta, languidius sanguis circumfluere dictus sit, ejus quoque argumenti vim perpendamus. Hujus rei exemplorum penuria est. Maximeque ad rem ea sunt, ubi arteriae pars aliqua ex toto, non plerumque partim tantum pars afficitur, in ea motatum est; aut ubi inter duas arteriae alicujus partes pervium usum tubus vitreus dat. Ubi igitur horum utramvis sit, si ultra partem osscam, ultrave tubum vitreum sanguinis motus procedit, id cordis, si minus, arteriarum integritatem potentiam, denotat; et, aut pro argumento nostro, aut contra id, facit. Ex tubi vitrei effectui nihil adhuc lucis, propter experimentorum defectum, affulsit. Magisque quaestionem tangit id, quod in ossae arteriae partis ex toto natura exploratum est. Quantum igitur in parte arteriae ultra osscam a corde remotiore sanguis tardetur, tantum ad hunc pereitandum arteriae integrae valere magis, et jure quidem, credendae sunt. Sed hanc rem spectantia experimenta pauciora adhuc et incertiore eventu sunt, quam ut certi et explorati quicquam inde deduci, aut argumentum nostrum inde confirmari, possit. Neque de hac, ut et de nonnullis aliis musculari arterialis indicis, dici tantum potest, solum verisimilitudinis pondus ab eo exoriri. Quod, si in extremi artus alicujus, ut cruris, ut brachii, paralyti, sanguis in arteriis solita impetu perfluit, id notionem nostram neque refellit, neque roborat; solumque paralyseos causam in musculis voluntati parentibus, id est, quorum vigor a potestate animali pendet, sedere, malique innunes fibras arteriarum musculares esse, qui casus frequentissimus est, ostendit. Verum, quod saepe quoque sit, si in arteriarum partibus sanguinis stagnatio et gangraena, et in vicinis ad eas marcor et atrophia, actionem affectorum vasorum deficere, quod certe non addubitandum est, ostendunt; id, sine arteriarum actione cordis potestatem non sufficere declarat, etque arteriarum irritabilitatis haud obicurum indicium.

Quod ad sanguinis in arteriis extremis meatum velociorum, quam ut ea, cordis tot impedimentis obiectae potentiae, velocitas tribui possit, atinet; praeter supra (n) commemorata, de sanguinis, ut a corde impulsu, propter tot huius obiecta remota, necessaria tardatione, argumenta, quae pariter id, cujus causa adlata sunt, pariter praesentem quaestionem confirmant; vel ipsa sanguinis in extremis ar-

teriis

terius visa celeritas, novi motus additi, eoque actionis muscularis arteriis propriae indicium esse potest. Cum enim arteriarum, quo magis hae a corde recedunt, et quo plures in ramus dividuntur, si cavula omnia simul sumantur, trunci communis cavo multis partibus capaciora sint; eoque, ut supra dictum est, sanguis in his, quantum a corde ejus motus pendet, necessario tardius profluat, et nulla alia, ut relatum quaque est, motus causa supersit; ideo, per quam is motus defectus pensatur, actio, muscularis, et ipsarum arteriarum, sit necesse est. Motus cordi tribuendi tardationis eandem ubique rationem esse, id est, pro ramorum crescente numero, majorem fieri, Martinus demonstrare conatus est. Igitur aliquam rationem hanc, aut cum Keilo pone ramum aliquem ferrei ramorum quinquagesimum numero esse, et in eo sanguinem, quantum a corde percitatus credendus est, ad certum modum tardius, quam protinus e corde, fluere. Tum animalis vivae extremam aliquam arteriam incide. Reperiesque sanguinem altius fluere, quam ut ea fluendi vis, ex computatione sumpta, tribui possit. Verum, ut de cordis ante motus velocitate dictum est, ita de arteriarum hic dicendum est; exactam mensuram nusquam reperiri, remque, ut ante et modo positum est, ita se habere, magis ex crassiore ejus judicio, quam certo et claro indicio, colligendum est. Idemque hoc, quod superiorum pleraque, argumentum pondus habet, ut rem verissimillimam quidem, sed non certam et compertam esse, ostendat. Et, quod ad omnia attinet, ut singula incertiores, ita conjuncta omnia, satis certam arteriarum actionis muscularis fidem praebent.

Ejusdem utique rei certissimum indicium est, alia sanguinis in arteriis, cum eadem cordis actio est, aliis temporibus et aliis in corporis partibus cum impetu velocitatem. Quaecumque enim cordis agendi vis est, si ea sanguinis ubique motus sola origo esset, effectus ejus, nempe sanguinis motus, quilibet una in corporis parte, idem esse deberet. Quod non ita esse, inflammatio, haemorrhagia, affectus quidam nervosi, et in statu saepe corporis, quem vis morbosum dicas, proprietates, quae idiosyncrasiae vulgo nominantur, et multae ibi sanitatis ipsae affectiones, declarant. In inflammatione et haemorrhagia loco contentis, sanguinis in hoc, corde immoto, augeri impetum; aut ubi eadem in consensum cor pertraxerunt, tamen in parte affecta, quam cordis, majorem impetum esse, quis non videt, et ad eam imminuendum curationes suas non sedulo dirigit? Quorsumque etiam, nisi hoc, pertinet arteriarum partium



rheumaticarum, quam aliarum, tensio major et rigiditas? Simili modo, si apoplexiam, paralyticamque sive initium sive finem, quorum aliter natura apoplectica est; item si epilepsiam aut maniam, turgens cerebri vasorum flatus, aut eorundem contritus, sanguinis inopiam et deficientem impetum ponens, in aliis casibus alter, semper facit, nec cordis actio vel minime utrolivis tangitur; quis hoc arteriarum affectarum alias nimiae, alias deficienti, irritabilitati illico non tribueret? Eodemque leviorum quarundam nostrum, aut etiam rerum plerisque salutarium, sed quibuscumque per idiosyncrasiam cum rubedine calorem in partibus pignentiis, effectus quoque pertinet. Ira rubedo cum calore vultus, quae quibuscumque cibis, ut piscibus, assumptis, in nonnullis protinus innascuntur, quaeve affectionem animi aliquam excitantem, sive in eodem parte, ut in verrecundia sit, sive alibi, ut in cavis manibus plantisve pedum, alia ex causa, subsequuntur, nonne auctam vasorum partis actionem docent? Et ponne vultus contra palles, quem sedantes animi motus faciunt, eandem imminutam, indicant? Quibus casibus ear non affici, temporis, ex causa remota adnota, brevitatis, nulliusque toto corpore calor diffusus, qui aliquando utique corde in consensum pertractis, incipit, manifestam fidem faciunt. Membrique paralytici arteriarum, quam reliquarum similium, minor actio, similem rationem habet. Verum quia omnia huiusmodi in morbis incidentia, et auctam imminutamve vasorum actionem submonstrantia, commemorare longum foret; igitur his, quae nunc exposita sunt, contentus ero, eoque magis, quod, si alia argumenta vel maxime deficerent, sola ea ad propositum nostrum probandum, id est, arteriarum actionem muscularem evincendam, satis superque videntur. Sic, ut spero, musculari arteriarum contractione declarata; eandem non certis earum partibus, quod aliquis forte suspicetur, contineri, sed universarum, ad minimarum usque fines, facultatem esse, proxime ostendendum est. Quod ut faciam, cum de majorum arteriarum hac potestate dubitatio nulla sit; ideo eandem minorum et minimarum quoque esse, quae fidem faciunt, ea deinceps exponam.

*Quo longius a corde dissident arteriae, eo majorem earum irritabilitatem esse.*

Quo longius a corde dissident arteriae, id est, quo minores sunt, et propius extremos fines accedunt, eo earum irritabilitatem magis crescere hoc ostendere videtur; quod irritabilitatis signa relata, praecipue visus arterias extre-

mas,

mas, apparent (a). Ita secretioncs glandulares, sudoris et perspirationis excepta, a corde et arteriis majoribus minime afficiuntur, aut eas partes contra afficiunt, sed cingentium partium actione aliqua potissimum excitantur. Cujus rei exemplo saliva est, quae non cordis arteriarumve, ut in aestu febrili aliave actione utat aucta, sed maxillae inter mandendum compressione, rebus acerbis admotis, cibique grati visu aut odore, vel etiam recordatione, augeri solet. Similique modo, ab animi affectionibus, aliisque irritamentis, urinae, per alvum, facillime, secretioncs intenduntur. Quod non solum, quantum secretioncs generi nervoso subiciantur, sed arterias minimas, ejusmodi glandulae sunt, omnium maxime irritabiles esse, significat. Quod autem Cliftonus Winttingham, Eques, arteriarum quo minores sunt, ea majorum pro magnitudine vim roburque, ostendit; id non tantum contra musculatam earum fabricam, quantum pro ea res modo adducta, et ipsarum arteriolarum species, facit. Quae, quo minores sunt, eo exiliori et flexiliori textura sunt. Cujus rei effectus esse videtur, non, ut nonnulli crediderunt (p), tanica muscularis adempta, sed structurae comitio, naturae musculari accommodatione. Unde argumentum, quo contra arteriarum majorum irritabilitatem nonnulli utuntur (q), pro harum certe facit. Et quod illarum, propter densam texturem, naturae musculosae obiectum est, id harum obijci nequit. Idque, cum aliorum a nobis de hac re dissentientium, tum praeter caeteris, saepius jam relati magni viri Halleri, tribuendum opinioni videtur; ut majorum arteriarum densitatem eam esse, quae musculari officio minus accommodetur, et ad naturam elasticam propius eo accedat, quod cordis actio major irritabilitatis earum deficientis officium explet, agnoscas; minorum vero laxiorem texturem, quod musculositati, ut ita dicam, occasionem dat, id efficere, ut ibi maxima irritabilitas sit, ubi maxime ea opus est, existimes.

Motus oscillatorius ingeniosi Roberti Whytt eo fictus est, quod, posito vasorum serie decreascentium, longo et prope infinito, ab aortae trunco ad nervos, ensine, cordis et arteriarum

(a) Verschuier. diss. supra relat. experim. xlv. et xc. V. Swiet. comment. vol. iv. p. 424. 405. Eodem pertinet, sed aliter explicandus, Roberti Whytt, nuper in hac academia professores egregii, ille vasorum minimorum motus oscillatorius.

Quem etiam esse, et "minora vasa, majori vi se contrahendi gaudere, quam majora," celebrae vir Swenccke, ex experimentorum fide, affirmat. Vid. Haemat. pag. 27. 28.

(p) Ludwig. Leip.

(q) Vid. pag. 402.

tiarum eam, quam definivimus, potestatem ad omnia pervenire non posse, et jure, si illa vera opinio fuisset, physiologi nuper existimaverunt. Sed talem vasorum ordinem nullum, et a minimis rubris arteriis ad vasa fecerunt brevissimum intervallum, esse, Hallerus demonstravit (\*). Qui, ut et Leenwenhoek, ad ultimos illarum fines cordis et arteriarum vim extendi, et ad sanguinem etiam ultra ire venis, contractio corde, promovendum pertinere, observavit. Unde motu oscillatorio, a cordis et arteriarum actione sejuncto, minime opus esse, manifestum est. Omnisque de ea re sine ratione pariter reque vera opinio est. Idemque de capillari arteriolarum opere dicendum est, eodemque modo refellendum (\*).

Quod ad vim derivationis attinet, quam, pro potestate sanguinis motum adjuvante, Hallerus habet, ejus opinio hinc tracta est, quod exigua arteria vulnerata, non solum in vasis eo aliquando pertinentibus, sed in arteriae portione infra vulnus, et sicubi vasa intercurrentia sunt, per ea quaque, sanguinem, ad vulnus retrogradum, ducere, observavit. Quod eo quidem fit, quia, cum omnes arteriae semper plene, immo distenae, sanguine sint; igitur, si qua relaxatur, ut in vulnere fit, ab omnibus, vulneratae pervia, ad hanc sanguis confluit; et hinc vicini, et in pervia, rami omnes pro ratione relaxantur. Ob eandem causam, obligato vase, in vicinis et ei pervia ramis sanguis percitabitur. Totiusque rei causa et caput nihil aliud est, quam vasorum contractilitas, eo humorem suum urgens, quo vacuum spatium datur. Quod in sano corpore nullum pondus habere potest, siquidem circa statum morbosum hinc relaxatio, illinc contractio, quae sanguinis motus assidue et aequabiliter motet, aut deficientem alibi potestatem, percitatricem alibi compenset, nulla ostendi potest. Tota autem derivationis et revulsivae doctrina, adeo nuper perulgata, et a clarissimis viris, acerrimis studiis, inculcata, falso vasorum humanorum iudicio, recepta est. Aliter enim humores, in vasis rigentibus, ac in corporis humani vivis animatisque, moventur, et ulla legibus reguntur. Ita, in vase, puta, metallico, si ab ima parte unciam humoris subtrahis, et ea duos digitos latus in vase occupaverit, in summa parte, et non ibi, unde abstractus humor est, aequum spatium vacuatum iri, manifestum est. Quod non in nostris quoque vasis fit. Nam, exempli ergo, si vena pedis detractus sit sanguis, non ideo ortus truncus relaxabitur. Nihilque aliud fit, quam

(\*) Prim. Lin. 147.

(\*) Cal. Inst. chm. class.



respondentes proximaeque reteriae, distantiores minus usque, relaxantur, et in parte propterea dilata nihil levamini oritur. Quod per conditionem, a vasorum eigentium natura alienam, nempe contractilitatem, fit. Quae estur, ut, cum vasa omnia ultra diametron naturalem sanguine distendantur, hujus abstracta parte, illa reliquam columnam etiam amplectantur, eique se accommodent, nihilque aliud fiat, quam ut nimia et dolorifica tensio dematur.

Sic actione musculari constituta; an eadem, aliqua saltem ex parte, venis quoque contingat, nunc inquirendi tempus est.

## C A P. III.

*Venis irritabilitatem non desse.*

NEQUE ex vasis sanguiferis arteriis solia propria est irritabilitas, sed his cum venis aliqua ex parte communis. Ita venarum cavarum et pulmonalium trunci fibris muscularibus vique musculari praediti sunt. Quod viris antiquioribus notum est; ut Nicol. Stenoni (c), ut Thomae Bartholino (a), ut Boreichio (x), ut Joanni Wallae, qui toto utriusque venae cavae tractu, hinc a jugulo, illinc a jecore, ad cor usque, contractiones, exciso corde, deprehendit (y). In vena pulmonali Lancisius contractiones invenit (z). Quod si hoc in equis tantum fuit; idem eadem in vena pulmonali humano derexit, quas ibi et in vena cava esse, Hallerus confirmavit. Rasmem in cava superiore et inferiore Van Doeveren reperit. Experimentum autem Wallaei, Verischiurus quarto ejus experimento iteravit, cujus ipsius haec verba sunt. " Variis arteriis et venis frustra irritatis, aggressi sumus pectoris contenta; elegans spectaculum praebebat vena cava utraque, contractione sua sanguinem vere in cordis sinum perpellens; manifestius id erat quando cordis actio jam cessare incipiebat; quandoque sua contractione, sanguinem impellens in cordis sinum, ejus motum resuscitabat. Ut plane convicli essemus motum illum a corde non pendere, quanquam illud

(c) Vid. sch. Hafnens. tom. II. observ. 46. N<sup>o</sup> 7. p. 142.

(a) Epist. med. cent. 4. epist. 16. p. 109.

(x) Ibid. epist. 41. p. 179.

(y) Epist. de chyl. mot. in fine Th. Barthol. anat. p. 793.

(z) De mot. cord. et aeneur. propos. 57. § 4. cap. 1. p. 212. edit.

Iud minime apparet, ligavimus filo venam cavam utramque, et cor forfice sullulimus; nihilominus motus ille et contractio saepius adparebat, et ad irritationem ferro factam conspicua erat; per quadrantem horae et ulterius, illa utraque vena cava hanc vim retinuit; nonnunquam, imprimis in initio, similis etiam motus adparebat in vena azugo. In hoc experimento vena cava diuturnitate superavit cordis irritabilitatem, nisi semel eo lecerit, quod illud de reliquo corpore separavimus." Quis et in variis cavae ramis contractionis muscularis indicia explorata sunt (a), item in vena jugulari (b) aliisque. De hac re Verschuierus satis late venarum contractilitatem, sed minore gradu, quam in arteriis, parere non adubitat (c). Eodemque pertinent circuitus sanguinis inventorum experimenta, quibus in venis, licet ligatis, sanguinem ad cor promotum illi summa cum admiratione videntur: Idemque suis experimentis illustris Hallerus confirmavit (d). Vasis etiam lacteis non deesse vim irritabilem, hoc apparet, quod chylo plenissima brevi mora ravescent, et, hlorum tenuissimorum instar, ante oculos evanescent (e). Nec lymphaticis ad motum satis esse, videtur musculorum et arteriarum vicinarum actio, eas valvulis praeditas comprimens; nam manifesta earum insignisque irritabilitas morum peristalticorum, ab absorbentibus sinibus forsitan coepta, ostendit (f). Quanta earum irritabilitas sit, testatur Hallerus (g). Eorundem ejusmodi actio esse videtur, ut, cum in articulis contractiora, quam sibi sint, hi primum repleantur, eaque repletio pro stimulo, humorem porro promovere, agat. Quem tamen agendi motum, quoniam coram oculis nequit, pro conjecturali ita propono, ut inde esse hic actionem, eamque muscularem, nevisquam adubilem.

Arterias contractione musculari, sive irritabilitate, toto suo tractu ad ultimos fines, praeditas esse, eamque non deesse venis, jam, ut spero, demonstrato; quis ejusdem, aut  
in

(a) Linn. loc. relat. Haller. op. minor. loc. relato, et tom. II. p. 124.

(b) M. Van Gessendiff. relat. not. h. p. 16. Vid. etiam Verschuier. exper. II. sly. xvii. xviii.

(c) Dissert. cap. § 202.

(d) Elem. physiol. tom. I. p. 199. Harv. exercit. anatom. p. 92. 99, 100. Proquet. de circul. sanguin. cap. 1. p. 27. 33. 38. Wal. ibid.

(e) Hall. oper. minor. 378. et Elem. physiol. tom. I. p. 199.

(f) Cull. inst. clyvi.

(g) Elem. physiol. tom. VII. lib. xxy. sect. 2. Chyl. mot. §. 3. Exper. 230. Vasa autem lactea eadem ac lymphatica esse, et ejusdem naturae participia, vid. eund. p. 199.

to sanitate aut in morbo, effectus sit, deinceps est dicendum.

## C A P. IV.

*Arteriarum irritabilitatis Effectus.*

## S E C T. I.

*In Sanitate.*

Si enim et arteriae, aequali vi, five majore five minore, agerent, tum aequali quaque impetu humores toto corpore veherentur, et pars unaquaeque, pro reliquarum ratione, suae moleculi accuminatam sanguinis copiam acciperet. Quod utique, etiam integerrimo corpore, saepe non fit. Nam multis temporibus corporum volutorum usus et velionum quarundam necessitates, ut sanguinis in aliquam partem plus, quam in reliquas, perferatur, postulant. Quoniam certe, si sola cordis actio, quae eadem sit necesse est, sanguinem motum dirigeret, fieri non posset. Quaecumque enim vi sinistro, quod hujus quaestionis maxime refert, corde sanguis ejiciatur, nihil in eo est, quod in alteram autem, magis quam alteram, impetum converterat; ideo, si in alteram magis quam alteram revera dirigitur, ejus causa quin actio arteriarum sit, dubium esse nequit. Cui quidem occasionem dat, aliorum vasorum impetus, qui idem est, credendum, quam aliorum, laxitas, atque dissensibilitas, major. Estque ab impetu facta dissensio, ut ita dicam, occasio; arteriarum partis irritabilitas, seminium, quorum conjuncta opera sit, ut, ob causas supra expositas, sanguis partem aliquam, magis quam reliquas, adpetat. Jamque, ratione breviter exposita, rei verae exempla videamus.

Ineunt vita, sanguis ad caput celerius et abundantius, quam alio corporis, fertur; idque naturae consilio, ut ea pars, a qua pleraeque corporis, et maximi momenti, actiones pendent, primum perficiatur. Post quod, ad utriusque sexus genitalia, et praecipue uterum, explicanda, quod aliquanto ante pubertatem fit, sanguinis cum impetu abundantia ad descendentes aortam, et ejus ramos hypogastricos, dirigitur. Quo perfectis opere, hinc ad vitae meridiem abundans onus in pulmones vertitur, semper deinde venas obtenturum. Unde prima humanae vitae parte, arterialem, postea venosam, plethoram fieri, manifestum est. Quam rem omnium medicorum observatio, et multa tam secundae quam adversae valetudinis, item tem-



peramentorum ratio, postremo experimenta instituta, confirmant. Quod ad haec attinet,

Cliffordus Winttingham, Eques, priore vitae tempore arterias laxiores, venas densiores esse, posteriore contrarium fieri, luculentis experimentis ostendit. Cujus rei haec explicatio est. Arteriae primum ob laxitatem sanguinis impetui magis cedentes, ejusdem plus quoque recipiunt. Hinc magis distenduntur, quae distensio, ut stimulus, excitat irritabilitatem. Estque hoc simul plethorae, simul arteriarum auctae actionis, seu irritabilitatis, exemplum. Cumque arteriae, quibus hoc fit, quaeque eo ordine quo dictum est, ob id ipsum, quod sic propria actione et sanguinis impetu exercentur, densiores usque fiunt; ideo, aliquando plethoram deinde recepturas, tandemque ipsas venas, densitate superant. Laxioresque arteriis venae in se inclinatae abundantiam demum accipient, ad vitae finem servaturae. Haec igitur vasorum sanguiferorum libraminum inclinationes, quatenus certis partibus, aliisque vitae tempore, aliis continentur, arteriarum irritabilitatis, quae alia alibi toties est, totidem exempla sunt, cordisque, quae eadem necessario semper est, actione minime explicandae.

Eaedem temperamentorum duorum, quae maxime evidenter, et inter se contraria, sunt, rationem parvo simul illustrent, simul ob ea illustrentur. Ea temperamenta sanguineum et atrabilem sunt. Quorum illius prima vita hominis, hujus postrema, magis particeps est; propterea quod ante mediam aetatem irritabilitas major, post minor, usque ad diem supremum, est. Haec variae superans aut deficiens irritabilitas, aliis corporis simul et animi notis, alias aetates, progrediente vita, distinguit, et mores alios imprimit. Cujus rei pulchram nobis imaginem Lyricus poeta depinxit.

Reddere qui vocem jam scit puer, et pede cecito  
Signat humum, gessit paribus concludere, et iram  
Consigni ac ponit temere, et mutatur in heras.  
Imberbis juvenis, tandem custode remoto,  
Gaudet equis cimbisque, et aprici gramine campi;  
Cereus in vitium lecti, manatibus asper;  
Utilem tardus proci, praedixus acri;  
Sublimis, cupidusque, et amara relinquere pernis.  
Conversis studiis, aetas animusque virilis  
Quaerit opes et amicitias, inservit honori;  
Commisisse cavet, quod mox mutare laboret.  
Multa senem circumveniunt incommoda; vel quod

Quaerit;

Quærit, et iocentis miser abstinet, ac timet uti;  
 Vel quod res omnes vinde gelidæque minuat,  
 Dilatur, spe longæ, inertis, avidæque futuri;  
 Difficilis, quæculus, laudatur temporis acti  
 Se puero, castigato censorque minorem (b).

Hoc modo, si conjunctum cum irritabilitate temperamentum sanguineum omnium hominum primos annos, atrabilarium postremos, signat; ita, per totam vitam alius hoc, illud aliis, inhaeret. Sanguineum quibus est, ille cute leviori, colore candidiore, genis rubris, vultu amabili, oculis coeruleis, capillis non nigris, alvo faciliore, frequentiore quam tutiore, avidiore quam potentiore veneris militis, animo mobili, cito irascentes, cito placabiles, in amorem patitur et amari fastidium præcipites; similiterque in amicitias, odiis, studiis, negotiis, voluptatibus, omnibus denique rebus, mutabiles. Contrarium temperamentum significant, cutis crassior, aspera, color ater, nulla aut generarum rubedo, aut reliqui vultus candor, capilli nigri, nigri oculi, dura alvus, veneris major potentia, quam cupiditas, vis invicta, animus certus, haud facile irascent, non placabilis, amoris, amicitiae, odii, omniumque affectuum, præcipue tristitum, ut doloris, potius quam gaudii, motoris quam lætitiæ, tenacissimus, a voluptatibus alienus, studiis, negotiis, sed unius non plurium rerum immorens, laboris uniusmodi consuetique patiens, diligens, ab omni varietate abhorrens. Unde quantum hoc temperamentum genus corporis, illud irritabilitas contineat, quantumque arteriarum, de qua agitur, actio vitalis actionem hominum fundamentum et intinam penitus naturam sustentet, haud difficile judicatum est. Verum, cum cor et aliæ partes musculares sibi in hac re aliquid vindicent, earum a potestate nervosa et animali (i) pendentis, fusiores, quam hujus operis ratio recipit, explanationem requirant, et jam, ut respiciens video, temperamentorum doctrina, et Horatii de ea versuum dulcedine captus, a proposito longius aberraverim; ut, ad hoc redeam, arteriarum in sanitate irritabilitatis effectibus jam expositis, quid in morbis eadem inordinata præstet, proxime exponamus et a omnia incipiam.

## S E C T. II.

I. *Nimis;**In morbis;*

NISSIA arteriarum in morbis irritabilitatis quadrupliciter

3 P 2

CUL-

(b) Horatii ara poetica.

(i) Cul. in 2.

consideranda est, prout aut, I. Cessante, et constantiore semine; aut, II. Internæ conditione, casu magis et occasione simul oblatis, suboritur; aut, III. Sine cordis actione febres locales concitat; aut, IV. Compluribus morbis, et symptomata, accedit.

*1. Cessare semine.*

In vasorum sanguiferorum libramine, sic, ut dictum est, intra sanitatis fines variare, irritabilitatis effectus libere fert, ac in hæmorrhagiis, de quibus nunc dicendum est, sed minores sunt, eodemque modo explicandi. Ita epistaxis sit, quia sanguinis, alioquin necessarius, impetus in caput nunc nimis veritur. Cedentibus enim vasis et sanguinis debitu plus recipientibus, abundanti humoris dissentio in majores et crasiores contractiones sumit. Hinc cerebri oras, super naribus arteriolas in laxiore membrana positas, eoque sumpti magis periclitantes, inclinant, his perturbatis aut extremis anoplatis, profunditur. Similique modo ductus in uteri vasa, menstrua faciens, impetus, hæc omnia, eoque morbum, veluti immediam sanguinis ex utero profluvium, constituit. Quod non ruptis, sed præter solitam anoplatis, vasa menstrualibus evenit. Jamque ripidior aortæ ubique vasa, eoque ita resistentia, ut non vena tamen superent, in arteriam pulmonalem, laxiorem, plusque sanguinis recipientem, libramen inclinant. Quæ inclusio et magis sustinetur, qui magis in ipsis pulmonibus obstat aliquid, liberum sanguinis transitum, qualis tubercula, aut male formatus angustiorque sultu thorax est, prohibet.

Quod ductus hic, inmutatur alibi corporis, arteriarum irritabilitatis exemplis annumerandum est. Ubicumque enim, propter vasorum laxitatem, eoque verum, resistentibus aliis, humorum impetum, dissentio est, ibi augeatur quoque, ut ante explicatum est, irritabilitas. Quæ irritabilitas in hæmorrhagiis, ut est, in ampla corporis parte, quam in reliquis viget magis, alius in genere nervosa idem, et sæpe a primorum fluminum conformatione, repetenda est. Hinc in feminis aliis hoc morborum genus postulat est, de quo, quia salutem actionem hujus opusculi natura non recipit, scire plura viximus ad dissertationem, quam, competitorem morbum quidam et singularis amicus, ingeniosus pariter et doctus juvenis, Rudericus Peronensis, de menstruum immodico profluvio, accuratius hoc Cullenianæ doctrinæ parte exposita, hoc ipso impune edit, relegandos existimo. Plurima quoque uti-



lia quidem, sed laboriosius et doctius, quam simplicius aut correctius, idoneis ei deficientibus principiis, et ignota doctrina nostra, edidit in sapientia relaxa disputatione Verschuëri.

2. *Interna Conditione casu magis, et occasione simul obiectis.*

Natura quoque irritabilitas non in parte aliqua majore solum, inclinata in hanc vasorum omnium liberrime, sed in minore sæpe, et in aliis casibus alia, ob congestam eo sanguinis casu, aut causa visus patente, copiam, morbum, ut in phlegmaticis, efficit. Quod, quo modo fiat, e phlegmaticæ cujusvis causa proxima patet. Ea est sanguis in partis aegrotantis arteriolas supra solitum congestus, has distendens, eaque distensione eas in validiores et crebriores debili contractionis conditio. Quæ contractiōnes, sic distudentis sanguinis stimulo aducltæ, invicem sanguinis impetum et compressionem adaugent. Ilque vasorum extra partem inflammatam status, diathesis phlogistica vulgo nominatus, ab extremis arteriis, morbi sede, per majores ad cor succedens, hujus actione concitata, pyrexiam toti corpori communem efficit. Ex hac inflammationis definitione, quo modo arteriarum actus irritabilitas, hoc morbi genus sive ordinem ardet, manifestum, ejusque ante sæpius ratio redita, est. Idem contractilitatis in arteriis musculæe supra expostis argumentis parum annumerandum est. Atque hæc in se scortum a cunctis actione arteriæ agere demonstrat, aucta in parte prius, dein ad cor percolens, actio.

3. *Febris localis concitantes.*

Ventum eundem effectum arteriis propria irritabilitas alias etiam trahit, id est, in genere nervoso et sanguiferi parte, hinc, ut videatur, sine cerebri, illinc certe sine cordis actione, febrium propolis concitat. Cujus casus insulsi quidem prius, quam rationem aggressas, exempla pauca relique veras exponam.

Vix egregius De Haen, sine ullò alibi corporis febris proprio signu, partis dolorem, pulsum crebriorem, certa hora recurre observavit (A). Van Swieten, vix sanu et robustu, eadem quotidie hora supra oculi orbitam, ubi nervus supra orbitalis fertur, dolorem, mox oculi ruborem, cum summo ad futuram prope agente cruciatu, lacrymas, et in cantha oculi majore pulsationem molestant, solitu co-

leriozem

(A) Thes. febr. divif. fifticolas, etc. to. p. 134.

leniorem et validiorem, pulsu carpi non mutato, deprehendit (f). Similem aliam quotidianam febrem ophthalmicam ab unico sibi memoratam narrat Verschuijrus (m). Item clarus de Haen violentam cephalicam certa noctis vesperti hora cum ingenti molestaque pulsatione accidere vidit (n). Morronus, in seipso insolitum vultus calorem, post quatuor dies in hemicraniam sinistri capitis molestam verum, quotidie redeuntem, et novem horas permanentem, aliis remediis frustra, cortice Peruviano feliciter, curavit (o). "Homini," inquit Van Swieten, "per sex septimanas quotidie, circa horam septimam matutinam, brachium dextrum valido frigore curtipielatur, reliquo corpore naturalem calorem servante; circa octavam horam, rigor et tremor digitorum et manus adierunt; tribus elapsis, sequebatur ingens calor: hora duodecima, cessabant hæc omnia, sequenti die eodem ordine restituta (p)."

In anomala febre, post tertianam, virginem aggressa, inter alia, "alterutrum crus quotidie eadem hora tremere, dein calefcere et sudare, reliquo corpore integro, et cortice Peruviano sanatum malum esse, similemque alium casum, accepimus (q)." Praeter hoc, multos casus a gravissimis viris memoratos, ubi pulsus carpi non afficiebatur, variarum effectuum imagine latentes, ad febrem localem referendos esse, et nostrum propositum illustrare, eorum cortice Peruviano curatio argumento est (r). Horum duo, exempli ergo, apponam. Apud Anton. Storck casus reperitur, ubi per octo dierum spatium, cum duas quotidie horas quidam, sine ullo alibi affectu, proorsus visu privatus esset, cortice Peruviano sanatus est (s). Et de apoplexiâ imitato casu sagax Sydenhamus, "Paroxysmi," inquit, "non cum rigore et horrore, quos postea febris excipit, invadebant: Sed ægrum iisdem plane symptomatis tentabant, ac si apoplexiâ vera laborasset; quæ tamen nihil aliud esset, utcumque hunc effectum æmularetur, quam ipsa febris, caput impetens (t)." Huiusmodi morborum epidemicam frequentiam Lauter observavit, et cortice Peruviano curavit.

Quorum de uno casu, ubi secunda accessione apoplexiâ ægrotantem extinxit, idem vir, "evasurum cum fuisse animad-

(f) Comment. in aph. Boerh. tom. II. p. 534.

(m) Dissert. sept. rel. cap. 3. § 74.

(n) Loc. relat.

(o) Pyret. exercit. hist. 27. p. 100.

(p) Loc. rel. ex miscell. curios. p. 381.

(q) Med. essays, tom. I. p. 293, 296. et tom. II. p. 322.

(r) Vid. Versch. dissert. et Van Swieten. locis relatis.

(s) Versch. loc. relat.

(t) Bica. mod. p. 33, 34.

animadvertit, si corticem Peruvianum, quem nihil secus metuens, neglexerat assumpsisset (u)."

Hi casus, licet non frequentissimi, satis tamen cetero, et saepius, si bene observarentur, incidentes, arteriarum partium activitatem, cordis expertem, manifesto decedant. Qua in re arteriae, alicubi intra extremos fines, a vi nervosa, ut totidem corda, si verbo Senacii mihi liceat, causa nobis ignota, commotae, calorem febrilem sustinuerunt. Quarum, ni fallar, extremi fines simili, ac in febribus universi corpori communibus, spasmo contracti, primum frigus circaverunt, dein, per corporis legem, hic in parte agentem, verso in stimulum spasmo, calorem, hocque sudorem, excitarent. Et, si febrium, tunc corporis inhaerentium, causa proxima cerebri et totius generis nervi debilitas est, extremarum arteriarum spasmodum creans, et per hunc, ex modo relata corporis lege, calorem demum suscitans; quid obstat, quo minus eadem, quae totum genus nervosum, id est, cerebrum et nervos omnes, afficit, debilitas, ejusdem generis partem, id est, nervos aliquos, aut quandam nervorum aliquot tractum, afficiat? Aut si, immuni mali cerebro, nervos, qui ab hoc pendent, a causa, quae communis, non localis est, localiter affici, minus verisimile est; nunne, ut in multis aliis, qui purius nervosi sunt, affectibus videtur, cerebrum obscura aliqua ratione ipsum affici, et partes manifeste afficere, potest? Profecto, ut partim affectum cerebrum partes afficit, et communius laborans, alias tamen partes quam alias, citius laedit; ita, licet non videatur, ipsum tamen tactum, partes clare tangere, credendum est. Partis cerebri laborantis effectus est, in morbo paralytica localis; in secunda saetudine, somni et vigiliae, primo incidentium, ratio; et his statibus media ebrietas. Quod ad hanc attinet: Eadem vini vis, affecto quamvis cerebro, tamen, et in aliis hominibus, et in eodem aliis temperibus, aliter agit. Hic stupet, ille torpet, hic pedibus, ille lingua, alter oculis, deficit, alius vigilat, dormit alius. Fletus, risus, clamor, silentium, cantus, motus, alios aliter exercent. Variisque ira, gaudium, pugna, amplexus, poenitentia, gloria, vices. Egressus tandem convivio, quae datur, reliquis; unus relicto supervenienti sobrio constantia satis loquitur, mente, pro rebus praesentibus, intacti videntur. Exeundi et illi tempus est. Frustra surgere conatus, collapsis membris, sedili relicto, cadit. Jamque, quae sola sincera pars modo visa est, desi-

(u) Hist. med. hinc: morbi. med. lib. p. 19, et 20. cap. 2. De his omnibus effectibus, vid. Coll. gen. morb. G. 4. B. p. 207.



deficiente tamen mente, quicum modo placide, amice, feliciter confabulatus est, cum temporis puncto ignotum, et amicum in auxilium manus admoventem, et inanicum pulsar, aut pulsare cupit, &c). Unde alius, affecto cerebro, loqui inde pendentes, tam variæ partes affliguntur? Re, unde extremi convivæ mentis, quæ intacta ad finem, visa est, tam repentinus affectus? Responsum in promptu est. Cerebrum, omnibus affectum, reliquarum partium actiones, sed in aliis aliter, ob causas haud facile explicandas, affert. Ita, quod ad superstitem reliquis arinet, illius membrorum onulorum, si in usi citius remavisset, vitæ labassent, et mentis sanitas, quæ inveni negotiabat, simulacrum tantum erat. Nam cerebri, quæ partes reliquas diu ante casum, labor, mentem quoque, sed cæcæ magis ratione, affecerat. Utque reliquis membris firmamentum fuisse, in capiti membra incommensa fuerunt. Simili ratione, adventante tempe, membra remota, ut, exempli causa, crura prius læpe languent. Qui languor, coeptus latenter in cerebro, tamen illic prius sentitur. Arthriticus affectus, ante inflammationis in articulum adventum, in eo soporem percipit. Sed cum soporem confusio cerebri et generis nervi affectus, quamvis non perceptus, nunquam amittit, fecerat. Utque articuli contrarios status, scilicet tonus, ibidem inflammationem præcedere solet, ita et ille a sensorio communi oritur. Hinc arthritico philosophia dicti origo, qui accessioni, præsentis, febri cogitandi facultatis vile præstium, sequentem dolorem uestigavit. Eodem pertinet auræ epilepticæ, ab extremis ad cerebrum tendere risar, sed revera a cerebro coeptæ, et eodem eademque, imago.

Et quibus omnibus rebus et rationibus, quomodo localis febris pensus ejusdem naturæ, ac toti corpori summo, sit, haud difficile, ut opinor, conceptu est. Quam enim eo fufius tractavi, quod species ejus nostræ de genere nervoso doctrinæ adversa, imperitioribus videri poterat, quod noli infelicitate sane cessasset, qui hoc argumentum, de quo scribam, eo potissimum elegi, ut illam doctrinam, fundamento firmissimo collocatam exhiberem. Interea loci, quin febrium partium ratio muscularem arteriarum potestatem sustentet, demo inficere est.

#### 4. Cum morbum complurium symptoma fit.

ARTERiarum puræ irritabilitas, varis generis nervi motu-

(\*) Vid. summi Philosophi et humanæ naturæ peritissimi Hogarthi, *zuchurum convivium*.

motibus excitatis, aut irritamentis admotis, in diversis locis inflammationem, aut ei vicinum statum inferens, morbum symptomata accedit. Quod, praecipue in febris jussis, scire, quoniam nullam sui pulsu indicium edit, majoris momenti ac difficilius sit, haud facile dixeris. Cujus scrupuli causa est, quod quo status interni, inter se diversissimi, inflammationem tamen pariter significare videntur. Alter vasorum sanguiferorum affectus, in horum aucta actione, seu irritabilitate, consistit; alter, illius actionis ex-  
pers, et aut rarsa non tangens, aut cum eorum inanitate et atonia conjunctus, a generis nervos imminutis mutibus, pendet. Ille solus quaestionis hujus est. Et, quoties deprehendi potest, arteriarum, a cordis separatae, actionis argumentum manifestum est.

Itaque, sive in febris, ubi minime credis, magna praesente debilitate, in cerebro, in pulmonibus, aut in abdominis viscere aliqua, dolores, plenitudo, ac tensio, sanguinis detractione et remediis antiphlogisticis tolluntur; sive in nonnullis affectibus nervosis, qualis apoplexia, paraly-  
sis, et epilepsia sunt, cerebri irritatio, quibusdam circa caput signis suspicanda, his remediis sublevarur; ea res, in-  
tacto corde et vasculis aliis, partium affectarum vasorum excitatam actionem, quae nihil nisi muscularis posse esse dic-  
ta est, ostendit.

Quid in secunda pariter et adversa valetudine nimia ar-  
teriarum irritabilitas praestet, breviter demonstrato, et  
inde ejusdem irritabilitatis prioribus argumentis, novo su-  
per addito;

## 2. *Deficientia.*

### *In morbis.*

Quia in morbis eadem deficiens praestet, paucis per-  
currere satis est. Ut in febrim et morborum febrilem  
valore, huius inaequalitas, non tantum actioni, sed arteri-  
arum irritabilitati auctae, tribuenda est; ut in febrim ju-  
stam frigore, eadem deficiens ad ipsam viam facit.  
Quod quo clarius percipitur, febrem causae proximae  
accipere rationem. Debilitate per causas remotas cerebro  
et toto genere nervosa, debilitatum cor et arteriae, ad ex-  
trema vascula sanguinea percellere nequeunt. Hinc ea  
vascula, non satis sanguine impleri, suo elatere, sublata  
dilatationis causa, contrahuntur. Quo facto, et summa  
causa excitante, effectus, irritabilitas, in hac parte deficit.  
Quae unius affectio levior est ejusque modi, quam resti-

tuta cordis arteriarum actio protinus auferat. Sed graviores dat eadem irritabilitas aliunde, et ex origine pejore, imminuta. Nam, ut vasorum contractilitas a fibris eorum muscularibus pendet, et harum actio, potestate nervosa in eas influente, assidue sustentatur; ita hac quoque, per communem generis nervosi debilitatem, summoti, aut debita vi non in fibras influente; in vasculorum status suboritur, quo vasa non, omnium partium muscularium more, invicem se contrahere et relaxare possunt, quod sanæ irritabilitatis est; sed in diuturniorem et vehementiorem, sine relaxatione, contractionem, quod deficere illam denotat, conjiciuntur. Qua in re deficere irritabilitatem hoc patet, quod restituta cordis, restituta majorum arteriarum actione, eoque solito stimulo, nempe sanguinis impetu, minimis et extremis arteriis reddito, hac tamen, saltem diu, ad solitam actionem non redeunt. Cujus rei causa est potestatis nervosæ, in musculares vasculorum fibras adventantis, deficiens commercium. Quod si, sic cordis et omnium aliorum vasorum actione vegeta reducta, et cerebri actione ubique corporis, exceptis solis extremis vasculis, constituta, cessat tamen horum irritabilitas; id, quam non a corde ea pendent, et quantum generis nervosi imperio pareat, ostendit. Eandem rem confirmat cœteris Peruviani, non vasa sanguifera moventis, sed cerebrum et genus nervosum toto corpore, idemque in extremis quoque partibus, roborantis, et ab extremis valis atoniam, in qua spasmus consistit, pellentis, efficacia. Deficiens igitur in his vasculis irritabilitas, si non morbum continet, utpote quæ ipsa altioris potestatis effectus sit, saltem causæ continentis indicium est.

Eadem imminuta irritabilitas nimiam sui ipsius vim sæpe sequitur. Est enim corporibus nostris inita lex, quæ sit, ut nimia incitatio collapsum, et hic illam, gignat. Sic somnum vigilia, hanc illæ, quotidie reducit. Similiterque e medicamentorum numero stimulantium effectus, in sedantem, sedantium in stimulantem, vertitur. Cujus, agente cerebro, mutati operis hinc frigida lavaria, illuc opium, exemplum est.

Proinde, ut vasorum tensio, quam sanguinis impetus et copia dat, sanisque, quem vis a nervis et cerebro in fibras eorum musculares derivata impertit, irritabilitati necessaria sit; ita, ubiqueque ea deficiunt, deficiat irritabilitas, et deficiens nocet necesse est. Non solum igitur in febrium guttarum tempore, sed in toto typhi cursu, in synochæ profectione, amque in atonicum statum, accessio-



nam crebris reditibus, versae, et phlegmasiarum ac haemorrhagiarum, eundem statum adeptarum, sine, item in his nervosis et cachectis, quas toto suo cursu atonia continet, irritabilitas deficiens corpus humanum pessumdat.

In hoc opere, omnia ad rem, quae nihil in disciplina medica, ne ipse sanguis quidem circuitus detectus, majoris momenti sit, aut cum totius artis fundamentis imis artius conjungatur, pertinentia, comprehendere sum innatus. Certe, quod ad rei dignitatem attinet, si potestas muscularis, non solum ab omnium corporis animati motuum, idemque vitae principio, pendere, sed ipsa vitae principium esse, a clarissimis viris existimata est; eadem, quatenus vasorum in humores suam actionem praestat, pluris, quam effectus ejus, humorum motus, judicanda est. Cujus potestatis, si porro, cum in secunda, tum in adversa valetudine, effectus quomodo valeant, ut in novissimo capite brevissime quidem ostendimus, atque inde naturales pariter, et praeter naturam, humorum impetus, alio corporis alio tempore dirigi, eosque a musculari actione proterius et recta omnes pendere, reputat praefecto nihil philosophi, qui mores hominum, et eorum naturalem ac incorruptam originem, temperamenta, scire velit, nihil medici, siue in occurrendi, siue morandi morbis, partes sibi vindicet, studium et cura dignum videri debet. Denique, si ejusdem potestatis originem spectes, quique modo ad hanc investigandam, et genus nervosum altius perforandam, illius contemplatio doceat, et a notionibus quae diu nimis in scholis, etiam post saniorum philosophiam saeculum, vixerunt, quibus ad materiam, e qua corpus humanum coeunt, proprietates, male etiam animo et falsa chimia conceptas, et humorum in suis vivi corporis vasibus motus, quasi alidem, quibus in inanimatis organis, legibus suis regerentur, nonnulli humorum corporum motus et actiones audaces petulerunt, ad hanc motuum actionumque veram originem, revocet; ea etiam nomine, hoc non indignum, quod tractaremus, argumentum elegisse, faciemus. Denique, si omnia, quae vasorum utriusque, et praecipue arterialium, sicut lactentium et lymphaticorum, actionem spectant, eorum irritabilitatem probantia, cum omnibus, quae hanc desse ponunt, comparaveris, et quantum illa scientia ad verum corporis actionum judicium molientem dirigat, quantum hanc opinio his actionibus laborantibus auxilium molientem iudicet, tecum reputaveris, certe hujus operis, consilium nam aut de me, aut sue-

cessu ejus, nihil usquam dico, non frustra fuisse, agnosces.

Postremo, ex eodem hoc meo argumentu non solum recte necne id elegerim, sed, quasi exemplo, ex quo de aliis orbis medici partibus et toto eo judicetis, addito, hoc addisci licet, ad artem medicam in schola ista, ut tuo labore et observatione reliqua quae desunt, paulatim dein acquiras, adipiscendam, tum prudentia, tum ingenio, tum temporis spatio, tum aetate, tum artis amore ac summo labore, opus esse. Et si, quod Cicero ait, "nulla re homines deus propius accedunt, quam salutem hominibus dando," verum, nec in ulla, quam in nostra professione, verius est; suaeque natura difficilis et ardua ars salutifera est, ut homo, per suo tempore et seculi sui scientia, satis prudens, conjecturalem eam dixerit, quia inde sequitur? Non, quod nonnulli sudeant, ideo nullam, sed ideo certe omnem curam, omnem laborem, omnes ingenii vires, ad ejus tantum addiscendum, quantum mortales consequi possunt, intendendum esse. Certe mihi, qui in hac academia, per quinque annorum spatium, omnia, quae de re medica tradita praecepta sunt, audiui, et cum vetustissimis paucis studiosis saepe colloquutus sum, postremo proprio demum periculo facta, persuasum est, neminem, utut aduſum, utut diligentem, utut ingeniosum, nisi mirabilis ille **CALCHTONUS** (1) fuerit, qui ad omnia istama, non per media, et sine suo labore, pervenit, summos medicinae, biennii spatio, mereri honores posse.

Janque, finitis hic studiis, et hoc opere, non ut velim, sed ut potui, absoluto, nullis laudibus academiam prosequar; quippe quae eo famae et gloriae pervenit, ut non juvenili commendatione, sed custodem ipsius, ne bene parata oratione infelici perdantur, cura vigili opus sit: Praeceptoribus autem meis, et in primis viro maximo Cullenio, qui sua me amicitia dignatus est, ob doctrinae medicae, ab eis accepta, egregia rudimenta, summas gratias ago.

## DIS-

(1) Vide charam mentuam et vetricam Edinensium, (cujus titulus est, *Edinburgh's Magazine and Review*, N<sup>o</sup> 78, p. 264.) ubi ingeniosissimus, aliquis, et scriitor accuratissimus pariter et elegantissimus, utagat hujus viri, quoniam quasi portus una hominum dicitur, vitam tabulis et notis, quibus vulgo pro veris avide accipiuntur, purgatam, nuper in lucem edidit.

DISPUTATIO INAUGURALIS,  
Quaedam de Hominum Varietatibus,  
et harum Causis, exponens:

QUAM, ANNUENTE AUMMO NUMINE,  
Et Auctoritate Reverendi Amandi Vni,  
GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.  
Academici Edinburgensis Praefecti;

HIC RUM  
Anglicis SENATUS ACADEMICI Censura,  
Et Scholasticæ FACULTATIS MEDICÆ JUVENI  
PUB. GRADU DOCTORIS,  
SUMMISQUE IN MEDICINÂ HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LEGITIME CONSEQUESTHIS;

FRUITORUM EXAMINI SUBJICIT  
JOANNES HUNTER, SCOTUS-BRITANNUS.  
Societ. Med. Soc. Hon.

Frid. Id. Junii, hora locoque solita.

---

—The passing Will,  
And all the burning passions of the soul,  
Hold on a party, to the cruel flight  
Of Envy's rage, till he's tempting or he's free  
AS MAN IS MAN. ACCEPTE.

---

1775.

---

Viri Egregii,  
GULIELMO CULLEN, M.D.  
Colleg. Reg. Med. Edinburg. Pres. C. Med. Reg. Prim. et Medicinæ ultra  
in Academia Edinburgensi Praefecti Societatis, cui, quicquid rei medicæ  
morit, acceptum lege referendum, grata animi agnoscit;

Et  
ANDRÆ DUNCAN, M.D.  
Qui xpo regis in amicitiam, et accepta beneficiis;

Denique,  
SOCIETATI MEDICINÆ  
Edinburgensi (Edinburgi);

In hoc, primum aliam vim collationis cernere, ad veram mentem fin-  
gere, et nullum juxta de veris moribus, didicit;

Hoc Obsequium

D. D. D. G.

JOANNES HUNTER.



## Quaedam de Hominum Varietatibus, et harum Causis, exponens.

DE varietatibus Hominum, et harum causis, scripturus, non est, quod rei dignitatem proferre laborem. Plurima de animalibus, de natura rerum ac deorum, multi scripserunt; suntque etiam ac fuerunt, qui mentis humane vires et facultates indagare conati sunt. Verum, quod ad hominis faciem externam, vultum, colorem, corporis magnitudinem, ceteraque similia attinet, nihil dilucide a quiquam fere scriptore dictum est. Plurimas autem hominum diversitates ac discrepantias extare, ututiquam insciendum est. Nonne enim stirpe eadem orti, iisdemque parentibus geniti, temperamentis, valetudine, robore, statura, colore, forma, maximeque animi ingenio ac indole, inter sese differunt? Majorque etiam, sub diverso coelo degentium, regionesque orbis terrarum disjunctas, et longe inter se distitas incolentium, diversitas reperitur. Colore albo aut nigro, corpore formoso aut horrido, humanitate aut saevitia, indole urbana aut rudi, alii ab aliis distinguuntur.

Tantae discrepantiae, tamque omnibus notae, materiam, in qua philosophi, rerumque naturalium studiosi, sese exerceant, dignam quidem suppeditant. Quae, plurimis (a) has res agitantibus, ac mente causas revolventibus, tantae apparuerunt, quantae a causis naturalibus nequaquam pendere, sed ad rerum omnium Gubernatoris voluntatem, naturae supremam legem, referendae viderentur; tanquam ille tam variis et diversis notis a principio homines designasset. Cui viae philosophandi insistentes, omniaque, quorum rationem reddere non possumus, operae divinae tribuentes, ostium obsecramus, omnesque fontes claudimus, e quibus omnia, quae vitam orant, artes promouent, denique mentis humanae vim ac facultates amplificat, oriuntur. Quae cum ita sint, ideo, quid certi in illius opinione sit, qui diversitates omnes Numini imputant, et utcirco hominum diversas esse species existimant, ante omnia inquirere, operae pretium est.

Diversitates tantas esse, specierum diversarum fautores contendunt, ut nullo modo, siue caelo siue aliis causis externis, explicabiles eas existiment. Quae, inquit, causa est coloris cuprei, menti imberbis, Americanorum, nigra-

(a) Sketches of the History of man, Vol. I. Sk. I.

rum mulierum Samudearum papillarum, Afhorum nigri coloris et labiorum crassorum, Promontorium Spei Bonae incensurum mulierum pudendorum tumidorum? Haec cum multis aliis quis mortalis explicaverit? Non explicanda, sed ad Numen referenda, affirmant (b).

Quantum scientiae obstat superstitio illa, quae omnia ad divinam operam nutumque Numinis, quae nobis inexplicabilia videntur, refert, supra dictum est. Et praeter has diversitates, tamen nobis non explicandas, occurrunt aliae aequae inexplicabiles, ubi nulla tamen speciei diversae suspicio concipitur. Quis celsas Scotorum malas explicaverit? Nemo; an ideo speciei discrepare habendi sunt? Neque ulli oculorum caetulearum Gothorum (c) ratio adhuc reddita est. Ideoque si quaque specie diversa sunt? Hoc modo ratiocinandi, eadem in familia species diversas esse, sequeretur.

Ut species hominum diversas esse probarent, ad mentis etiam facultates decurrunt (d). Hic fortis est; ille timidus. Quomodo igitur si ejusdem speciei esse possunt? Hic advenas animo volente accipit; ille totis viribus repellit. Ille quoque ejusdem speciei sumi? Si ita res esset, et discrepantiae hujusmodi pro speciei diversae signis notisque certis accipiendae essent, nonne unaquaque ferè familia species diversas gignere? nonne idem homo diversis temporibus similiter sibi ipsi speciei discrepare, dici posset?

Qui hanc opinionem, species diversas esse, tuerentur, his argumentis non contenti, alia e causa finali petunt. Cum enim regiones hominibus habitandae, coelo, solo, ardore, et aliis calibus innumerabilibus, ex toto inter se diversae sint; igitur alias hominum species alias regionibus necessario accommodari credunt (e). Sed quis dixerit, sapientiae perfectae non magis consentaneum esse, animalibus diversis eas destitisse naturas, quae ad id quod forte se offert, se facile accommodent, quam unicuique externarum mutationi speciem novam aptatam de industria creavisse?

Haec, quia non quaestio prorsus curiosa, igitur, non sine aliqua causa, acerrime agitata est. Si enim diversas esse hominum species concederetur, tum, in disquisitionibus medicis, naturalibus, civilibus, theologicis, denique in operibus omnibus quae de homine tractant, spectatio differendum; et quicquid de speciei quolibet diceretur, id summa

injuria

(b) Sk. of the hist. of Man, Vol. I. p. 22.

(c) Lin. Faun. Suec. p. 2.

(d) Sk. of the hist. of man, Vol. I. p. 25.

(e) Ibid. p. 20.

Injuria de qualibet altera foret, dicendum. Non enim, si ita esset, sapientissimum rerum Fabricatorem diversas species, colore tantum, aut labiis crassis aut naso depresso, sed natura etiam diversa, ad finem aliquem accommodata, distinctas creaturam fuisse, credibile est. Igitur, quicquid ex scriptis doctorum hominum ab una specie tractum, ad aliam deductum est, id sic omnino rueret; et ratiocinandi fontes, ex quibus veritas saepe fluere credita est, scilicet variarum inter se gentium, comparationes habitae, omnino clauderentur. Sed quid de his censendum, qui licet homines specie variare judicent, nihilo tamen minus de homine, ut in omnibus regionibus semper et omni ex parte quasi eodem, tractare ubique perstant?

Alius error hic culpandus est. Nam, dum hoc modo inter se de specie contendunt auctores, quo sensu id vocabulum recipiant non explicant. Definitionem Rasi a celeberrimo Bussen adscitam, refutatam rejiciunt; sed nullam ipsi substituant. Sicque, specie nusquam definita, nihilominus hominum species diversas esse pronunciant. Quod prius certe non licitum erat, quam sensus verbi *speciei* saltem esset expostus.

Quae cum ita sint, ne alii nobis, quod nos his, objiciant, nostram rucis *speciei* definitionem, quoque modo nostrae de ea notiones animo concipiantur, quae, accipe.

Ut a natura, ejusque contemplatione, omnes nostrae rei ejuslibet notiones oriuntur; ita ex eodem fonte, non scholarem dogmatis, et logicis disquisitionibus, vocis quoque *speciei* definitio petenda est. Quicunque hunc orbem terrarum circumspiciat, se repletum cum animalibus, passim sese oculis ejus offerentibus, et inter alia ex illis similitudinem prope perfectam acerbissimamque affinitatem, inter plura maximam dissimilitudinem, inveniet. Quam diversitatem aut congruentiam intuens, animantes in varias, pro variis similitudinibus et dissimilitudinibus, classes protinus distribuet. Cumque saltem, ut aiunt, non faciat natura, haud raro accidit, ut animalia inter se adeo simul similia et dissimilia sint, ut dubium interdum sit, in quas classes singula referenda sint.

Quae autem hic regula, quae unum judicandi? Si duobuslibet animalia, quibus inter se similitudo non ita perfecta est, ut pro certo eidem speciei adjuvantes et prolem tamen alterutri parenti aut jam similem, aut aliquando futuram, procreent; tum quantum quantum inter se differant, illa ejusdem tamen speciei esse habenda sunt.

Quae



Quae praestam species animalium hoc modo definienda nihil videtur.

Classis animalium, ubi singula cum singulis procreant, et horum proles alia animalia, aut jam simili classi, aut aliquando futura, etiam procreant.

Hae species definitio exemplo ab homine, de quo agitur, petiti illustrari commodè potest. Ex omnibus, quibus nomen humana inditum, longissime discrepantes matrem et foemina, Itham, *Cercallidem* pulcherrimam, illum, *Aetum* in *Gama* dictae regione natum, nigerrimum et apprimè deformem, seligito. Pone praeterea, quod certe licet, matrem et foemina, ab illis editos, et hujus libero in matrimonium cum matris, illius cum patris, popularibus conjunctos; et sic, si post generationes aliquot foeminae proles matri, maris patri, omnibus rebus similis evaserit, certe ipsos parentes ejusdem speciei esse agnoscendum est. Quam rem etiam veram esse, nigrorum et alborum consilia quotidie demonstrat. Quod, si quis hujus definitionis veritatem rejiceret, quid ordinis, quid ceteri, in regno animalium relinqueret? Altera in alteram species migraret. Bos equus, simia homo fieret. Et, si a talibus positivibus, tam absurdis, tam monstruosis, ratio et sensus communis non abhorrerent, idque quod modo positum est, fieri tamen posse, acriter quis contenderet. Circumspiciat mundum, naturam contemplerur. Quid invenisti? An multiplex verum facies suppetit, qua natio tua confirmetur? Nonne animalium classes huc usque discretas permanferunt; et cur non in aeternum permanent? Indemita enim et caeca cupido saepe commisit, ut mutationes illiusmodi, et genera nova, si fieri posset, existerent. Et in hoc multi summa cura laborarunt; sed nondum novam speciem perficere, aut unam in alteram vertare, valuit quisquam. E quibus omnibus concludere licet, unamquamque animalium speciem a Numine sapientissimo finibus certis ab origine circumscriptam esse; et, impotente nullo amore, utut naturae legibus repugnante, unquam discreta natura quae sunt animalia misceri, aut perturbari posse. Reque vera, de plerisque animalibus id dubium non est, quippe quae facies externa, et signa evadentia, primo intuitu distinguant, et de solo homine, paucisque aliis speciebus, maxima ex parte domesticis, haec est. De quibus quod scriptores dubitarunt, haec duae causae sunt. Prior, quia quaeque varietas et aberratio ab ordine generali, sub oculis nostris posita, facillime observatur. Posterior et longe valentior est, quia animalia, curae nostrae,

contra illorum omnino instinctum, commissa, atque officii et vivendi moribus, illis haud congruentibus, subiecta, hac ratione magnopere, et, quo maiorem eorum curam suscipimus, eo magis mutantur (*f*). In canibus varietates prope infinitae apparent; qui vitam inter homines degentes, eadem, ac illi, patiuntur, lusuque et sociis iisdem fruuntur. Varietates canum, specierum diversitatem indicare, si quis diceret, quid aliud faceret, ac, si eodem tempore canem in utero species diversas gerere, affirmaret? Haud enim raro eadem canis catulos variantes, quam varietatem speciem illi appellarent, eodem partu enititur. Quibus autem diversi et permanentes canum, ut aiunt, ordines ad species diversas constituendas multum valere videntur; iis respondendum est, ordines nullos quidem sine cura et diligentia hominum permanentes et constantes esse. Ita canem (*g*) Gallicum aut (*h*) Odorum efficere, quam difficile sit, quis ignorat?

Ob has rationes, homines ad eandem speciem referendos existimavi. Et, uti in plantarum natura, eadem species nonnunquam varietates plurimas comprehendit, quae omnes a coelo, solo, cultuque pendent; ita, ut botanicorum verbis utar, diversitates hominum, eodem modo, ejusdem speciei varietates esse habendae, et e causis naturalibus deducendae, sunt.

Quantum casus ad homines afflicientes ac mutandos polleant, nemo certe ignorat. Ab his morbi fere omnes, et multiplices in corpore humano mutationes, pendent. Ad quorum effectus ac speciei humanae varietates rite explicandas, et quomodo fiant dilucide monstrandum, non solum naturae humanae scientia intima, quoad motiones ejus mutationesque omnes, item incrementum et decrementum, sed etiam rerum omnium, quae in hominem agere possunt, cognitio, quoad qualitates earum et agendi vires, alta necessaria est. Nam ad corporum quorumlibet duorum actionis inter se rationem reddendam, utrorumque natura cognoscenda est. Quam scientiam quis possidet? Corporis humani naturam quis explicavit? Quis rerum naturae vires persequutus est? Nemo. Multa enim caligine latent, nisi labore maximo, multorum hominum conjuncta ingenia, et longi temporis spatio, non eruenda. Unde quam difficile mihi pensum imposuerim, facile intellectu est. Quid utique, quasi necessitate, non scribendi cupidine

(*f*) Buffon, vol. xii. p. 191. A Paris 1772, 1200.

(*g*) Graium

(*h*) Sagacem } Linnæi.

dine aggredior. Et non doleri mihi, contra gaudio, erit, si quod sperare licet, viros clarissimos, praesertim hoc, quo historia naturalis adeo viget, tempore, ad studia homine digna, a conchis papilionibusque, hi mei conatus revocaverint.

Ut aliquam operis rationem exponam, id in partes quatuor diducere visum est; quarum in prima, de hominum colore; in secunda, de statura et forma; in tertia, de partium excessu aut defectu, aut aliis differentiis; in quarta, de mentis facultatibus, verba facturus sum. Ea capita, omnia quae quivis hujus terrarum orbis curiosus inspector visa narraverit, fere complectuntur.

## CAPUT I.

*De Colore.*

COLORIS varietates imprimis mirae sunt. Ita albus, ruber, fuscus, cupreus, denique omnes inter albedinem et nigritiem gradus medii coloris, alius aliis, hominibus contingunt. Quae res quo conspectu facilior sit, hominum, prout generatim iis differunt, colorum tabulam subjunxi. Quam non pro colorum historia justa et absoluta, sed varietatum tantum exemplum quasi, aut argumentum, propono.

## TABULA COLORUM.

NIGRI.	Afri sub rectis Solis radiis. Novi-Guineenses. Novi-Batavi.
SUBNIGRI.	Mauri Africae septentrionalis. Hottentoti, ejusdem meridiei versus incolae.
CUPREI.	Indi orientales (i).
RUBRI.	Americani (i).
FUSCI.	Tartari. Persae. Arabes. Afri Maris Mediterraneo accolae. Chinenses (i).

3 H 2

Sun.

(i) Hi, etsi colore, prout aliorum paulo aut candidior sit, variantes, ad cupreum magis minuscule omnes accedunt.

(i) Qui color e cupreo vix discrepat. Septentrionalem Americae tractum tenentes ita magis albescunt, ut colorem rubrum haud omnino amittant.

(i) Omnium fuscum inter et album colorum Chinenses sunt; ad meridiem scilicet fusci, ad septentrionem albi.



Sunt ſæci, Europæi meridionales.

Uti Sicoli.

Abyſſini.

Hiſpanenſes.

Turci.

Aliique.

Samoidei et Lapponiæ incolæ.

Alii, Europæi reliqui ſere omnes.

Uti Sueci.

Dani.

Angli.

Germani.

Poloni.

Aliique.

Kabarſſſſki (m).

Georgiani.

Mingreliaæ incolæ (n).

Quæ colorum iam diverſorum cauſæ ſint? Ad id difficile reſponſa eſt: Cujus tamen rei multiplices cauſas philoſophi attentaverunt. Qui philoſophiam ſuam e ſcriptis ſacris depromunt, atque inde opera omnia naturæ explicant, à Cainum pro patre nigrorum habent, et omnes, à variis alborum et nigrorum inter ſe mixturis, medios gradus deducunt (o). Quæ utique de re inter illuſinodi philoſophos neutiquam convenit; dum alii pro Hamo acerrime ſtant (p), nec Iſmaeli fautores deſunt (q). Alii ad alias res, ut Solis ardorem, vapores denſos (r), et arenae urentis viciniam, decurrunt. Quas opinionem nec firmare nec reſellere, ſed potius e rebus veris argumentum deducere, mihi in animo eſt.

Coloris ſine controverſia ſedes eſt cutis, per quam totam non diſſunditur, ſed tantummodo partem, cuticulam dictam, quam epidermīs et reticulum conſtituunt, et ex his præcipue reticulum, occupat (s). Nigris quam albis cuticula craſſius duriorque eo eſt, quod his quaſi macus tenuis, illis membrana denſa reticulum ſit (t). Alborum epi-

(w) Buſſon, tom. v. p. 20.

(v) Incolæ Inſularum quarundam in orbe ſuo magno Paſſus huc forſan relegandi ſunt.

(e) *Essai ſur la populat. de l'Amerique*, tom. iv. l. 7. chap. 19.

(f) *Id.* chap. 13.

(g) *Spectacle de la nature*.

(h) *La bibliothèque impériale*, tom. v. Mars et Avril, p. 227.

(i) *Albin. de color.* *Ediſtop.* p. 8.

(f) *Haller, phyſiolog.* tom. v. p. 17.

epidermis translucida, tenuissimae cornu laminae speciem praebet; eorundem reticulum mucro coarctato haud dissimile est, et ex eodem indurato epidermis constare videtur. Quam ei formam materiamque eam veram esse, nonnulli quidem docent (u). Licet autem de ea nequaquam inter anatomicos conveniret, et rem consilidere nostrum non sit, paucis utique attingere propositi ratio exigit.

In albis quicquid partium subter cutem, aut potius cuticulam colorem mutat, id corporis etiam colorem, propter cuticulæ pelluciditatem, mutat. In sceleris, curis ex sanguine bile tincto flavescit, et sanguinis plus solito in vultus vasa impulsu verocundiam elicit. Et typhi species, Indis occidentalibus sere propria, febres flava eo dicitur, quod, sero flavo in vasa cutis congesto, haec flavedine tingitur. Quinetiam pigmenta intra epidermidelem applicata, colorem adeo constantem imprimunt, ut ad extremam vitam permaneant. Pulvere tormentatio cuti inustus color, quamdiu permaneat, quis igitur? Similique aliquo modo cutem pingere, et variis figuris, ornamentis causa, distinguere, multae barbarae gentes (x) consueverunt, uti majores nostri (y).

Il quibus rebus haec colligenda videntur. Primumque vasorum exere, saltem paucissimis instructa, cuticula dicenda est. Si enim vas paulo pluribus instructa esset, bilem sanguine mixtam ad partes intimas, et recessus interiores, admitteret; et sic quid obsideret, quin flavedo, aequae ac aliter color a pigmentis effectus, aliquamdiu permaneret? Porro, cum cuticulæ pigmentis coloratae status adeo fixus sit, ea res illam ex partibus diu manentibus constare, ideoque etiam paucissimis, si ullis, vas instructam esse, ostendit. Ossa partibus corporis, vas abundantiis, non annumerant scriptores; quae tamen colore tincta, particulas omnes mutare prius non desinunt, quam pristinum colorem recuperarint. Unde cuticulam paucissimis, si ullis, vas instructam, suasque partes componentes vix unquam mutare, pro certo haberi potest.

Hic de colore, et sedis ejus structura, expositis, causae ejusdem, et imprimis nigrellinis, investigandae sunt. Et in his regionibus epidermidis et reticuli coloris mutationis causas primum inquirere, fortasse pretium operis est; eoque magis, quod natura simplex ad eandem efficienda similem plerumque cause vitur.

AÏr,

(u) Haller. physiolog. tom. v. p. 10.

(x) Hawkesworth's voyage, vol. ii. p. 121.

(y) Caesar, comment. lib. v. cap. 4.

Aër, squalor, et Solis ardor, pelluciditate cuticulæ delecta, fuscum dant colorem, eamque simul duriorcm efficiunt.

Qui manus suas candentes nitescere velit, ei a Sole et squalore eas defendere non sufficit, nisi etiam ab aëre caveat, quod mulieribus bene notum est, quæ manicis omnibus temporibus utantur. Præterea, calor faciei, in nullis acque ac aliarum corporis partium semper testarum, pulcher est, etiam si nunquam Soli exponeretur.

Neque qui sordida opera faciunt, iis unquam manus candent. Pulvis tormentarius, uti supra relatum est, subter epidermidem insinuat, colorem nigrum præbet. Idem hoc, sed minore gradu, sordes et pigmenta efficere possunt. Quam rem confirmare videtur immunditiarum usus, quibus se, quo nigriores sint, oblinire nigri solent.

Causa potentissima ardor Solis est. Cujus vim ostendit facies candidissima ei objecta, candorem omnem uno die amittens, et fusca aut rubra quasi evadens. Idem aestate in rufos cute candentes præcipue efficax est; maculisque fuscis totam cutem, maxime vero manus et vultum, quippe ei magis objectos, quod pro morbo nomine Ephelide Linnaeus habet (2), afficit. Nec dubium est, quin, si satis diu ardor admoveretur, eandem fuscum colorem tota cutis traheret.

Si igitur hæc causæ, aër nempe et Solis ardor, his in regionibus, ubi propter tecta et velamenta, tantum ab iis tegimur, tantas mutationes inducere possunt, certe in regionibus multo calidioribus, ubi nudi Soli ardenti, omnibus fere temporibus, homines obijciuntur, plus nigredinis effici, neutiquam est mirandum.

Praeterque Solis ardorem, et aëris, ubi ei patet aliquis, injuriam, aliæ causæ majorem, qualis Afrorum est, nigredinem inferunt.

Partes cuticulæ rarissime mutari antea dictum est, et fortasse eo rarius, quo crassior ea sit. Ideoque cum eadem particulæ magno calori diuque obijciuntur, magnis sit effectus, id est, multum nigredinis subnascatur, necesse est. Ad quod augendum, pigmenta, quibus, ut dictum est, ad corpora sua nigriora, sive, ut ipsis videtur, pulchriora, reddenda, porro valere certum est.

Nigrorum quam candidorum crassior et densior cuticula esse dicta est; eoque, oblatis nigredinis causis, nigrior quoque erit; si quidem ea densitas efficit, ut potestatibus nigredinem facientibus plures particulæ obijciantur. Omnes

nes



nes enim qui in rebus opticis versantur, bene norunt, lamineas quilibet transparentes et coloratas colorem vividiorum, magisque intensum, edere, quo plures, alii alia, imponuntur; quia radii lucis ab una transmissi, ab alia reflectuntur, splendorque coloris numeri radiorum reflexorum rationem semper habet. Ubi autem ad nigritiem, quam lucis absentia constituit, laminarum color accedit, radii ab una non suffocati ab alia utique delentur, sicque, luce nec transmissa nec reflexa, color niger existit. Quod, si requiritur, quomodo cuticula nigrorum quam candidorum densior fiat, quanquam id ad sententiam explicare nequimus, paucis illustrare conabimur.

Solis et peris in nostrum corpus actio quasi stimulus est, et ex iis legibus, quae stimulantia regunt, agit. Cujus stimuli, cutem urentis et fricantis, effectus est, hanc semper duriorum et crassiorum reddere, ut opificum manibus, et omni corporis, quam stimulus afficit, parti usu venit. Eodem modo aer et radii Solis, actione stimulante, densiorem cutem reddunt. Quod cutis crassior fiat, causa finalis patet, et modus quo sive a Sole, sive ab aliis rebus fricantibus, crassescit, idem sere est. Partium irritatio pleniorum humorum influxum sollicitat, et vasorum, incremento aut reparationi intervientium, auget actionem. Quod quidem praeterea Solis, et aliarum potestatum, attritu frequente cutem stimulantium, actionis similitudinem magnam ostendit, progressus actionis in utroque casu idem est. Stimulantia et fricantia primum cuti, adhuc tenerae, applicata, vesicas plurimas excitant; contra quae, post certum temporis spatium, durior, crassior, tandem callosa evadit; et nunquam deinde causis hisdem in vesiculas insilari potest. Similiterque, cum Solis meridionalis corpora nostra adrentes radii, vesicas multas in cute excitaverint, talem porro effectum neque eadem corpora regioni assueta, neque ejus ab initio vultores, unquam recipiunt.

Cutis igitur intemperie aeris et ardore Solis densior, rectisque Solis radiis ac pigmentis nigrior reddita, nostram de colore doctrinam totam absolvit.

Explicatio nunc tradita quantum rebus veris consistetur, quantumque ad has explicandas pertineat, proxime inquirendum est.

Cum nigri omnes candidi nascantur (a), et sic aliquandiu permancant, ex ea re Solem et aerem, ad cutem in colorem nigrum mutandam, necessarios esse apparet. Idemque

(a) Histoire generale des voyages, par M. l'Abbe Prevost, tom. iv. p. 299.

que porro probant vesicatoria, et ambuſiones, corporibus nigroſum applicata, quæ partes ita in albedinem mutant, ut color niger, niſi multo poſt dies, non reſtat (b). Partes etiam corporis magis reſiſtæ, et a Sole atque ære deſenſæ, colorem album primigenium haud amittunt, ut in ſiſ nigris cernitur, qui glandem præputio teſtam habent (c).

Gentes omnes intra Zonam Torridam habitantes, colorem magis vel minus ad nigredinem vergentem habent. Hæc obſervatio prope perpetua opinionem ſuprà relatam ſine dubio tuetur. At non ita rem ſe habere, et numerum candidorum in Torrida Zona haud parvum nonnulli obſiſciunt (d). Quod, licet ex toto inſcrvari non poſſim, niſi tamen minus Zonæ Torridæ incolæ, omnium nigerrimos eſſe, et omnes ſere colore fuſco, et ad nigredinem accedente, imbuï ſatis conſtat.

Verumtamen, quoniam cauſa nigredinis, ut a nobis tradita, nequaquam ſimplex eſt; neque a majore aut minore ad Circulum Equinoctialem vicinitate ſola pendet; et, parte una aut altera cauſæ abſente, effectus omnino rueret; igitur haud alienum a propoſito noſtro erit, utrum gentium Zonæ Torridæ candidiorum ratio, ad ea, quæ a nobis allata ſunt, reſellenda, an conſumenda, pertineat, inquirere.

Ad quem laborem breviorẽ reddendum, quædam prius generaliter dicenda videntur.

Calor non ſemper, pro majore aut minore regionum a Circulo Equinoctiali diſtantiâ, minus majorve reperitur.

Propter vapores e mari oriẽtes, et ab eodem aſſidue ventos aſſantes, qui utriusque ad terram refrigerandam pertinent, inſulæ non æquæ ac terræ continentes caleſcunt.

Calorem quoque montana, aut montibus vicina loca, magnopere temperant. Cujus rei ratio reddetur.

Porro, frigus et calorem, qua accendo, qua minuendo, ventus variat temperat; a regionibus calidis et Sole torrefactis veniens, calorem, a canis gelidiſque montibus aſſans, frigus, ſecundum aſſerens.

In locis denique quibus valui idem eſſe, idem quoque color non ideo ſequitur; ad quem mutandũ, haud parum conferi varias vitæ cultus.

Hæc obſervationes paucis exemplis illuſtrabo. Quodque ad

(b) Hiſtoire générale des voyages, par M. l'Abbé Fæwoll, tom. 51. p. 165.

(c) Hiſt. de l'Académie des Sciences, an. 1702, p. 22.

(d) Eſſai ſur la population de l'Amérique, tom. 17. livre 7. chap. 14.

ad primam attinet; plurimae insulae aëre temperiore, eoque potissimum, quae longius a terris continentibus distant, recreantur (e). Quomodo illas habitantes eandem ferrent, coram, qui oceani meridionalis Pacifici magni nomine insulas incolunt (f), exemplum docebit. India fere omnis Orientalis, qua ad meridiem vergit, in insulas aut peninsulas dividitur; quod, ex parte quare color cupreus seu fuscus, non niger, illic sit, explanat.

Quod ad alteram observationem attinet; Abyssini, sub ipso Aequinoctio siti, tamen candent. Apud eisdem mercurius in barometro non altitudinem digitorum viginti superat; unde Abyssiniam, terrae forsitan partem altissimam hominibus habitatam, supra telluris superficiem saltem duo millia passuum, eminere apparet. Ea altitudo, nemo qui montes ascendit, non expectus est, quam calorem valde imminuat. Ita nuntios quosdam Americanos, nix alta et glacies horrida, licet sub Sole recta positos, totum annum obtegit. Quin et summum ipsius Aetnae jugum aeternam nivem habet (g). Ut igitur altitudinem calori moderari verum certumque his exemplis est, ita nec ejus explicatio difficilis. Quam si plenius tractare non licet, praeis tamen eam attingam.

Calorem, radii lucis a Sole projecti, et in materiam aliquam aut recta incidentes, aut in eam repercussi, faciunt. Qui utique in omni materia, in quacunque radii incident, idem non reperitur; siquidem in corpora translucida, eandem calorem, quem, in opaca incidentes, neutiquam excitant. Hoc clarissime eo probatur, quod speculi metallici concavi, radiis solaribus oppositi, focus in aquam conjectus, non fervet, aut calorem ullum edit; et si cuprum, vel aliud quodvis metallum eidem obiectum, temporis puncto liquefcit, aut dissipatur. Cumque, in lucis per corpus translucidum transitu, eo minus caloris excitetur, quo tenuius aut pellucidius corpus est; aër autem eo tenuior, quo altior supra terram, sit; ita is, ob eam causam, facilius ac prope sine ullo obstaculo, locum transiit. Nam lux calorem eo magis citere videtur, quo magis transitui ejus obstitit. Sed hac de re haec dixisse sat est.

Quantum ad calorem mutuum ventos valeat, America exemplo est, ubi septentrionali vento vigente ea usque frigore intenditur, ut una nocte flumina congelata, innavigabilia fiant. Idem etiam Asiae attendis, ubi venti am-

(e) Hawkesworth's Voyages, Vol. II. p. 245. (f) Ibid. p. 287.

(g) Brydon's Letters, Vol. I. L. 6.



nas torrentes, per multa millia passuum verrentes volventesque, calorem vis tolerabilem excitant.

Uti vitae cultus quid valeat illustrem; qui semper veste teguntur, et se totis plerumque abduunt, ii causis calorem mutantibus nequaquam obiciuntur, eoque candorem retinent. Quod Europaeis regiones calidas habitantibus usu venit, qui, pristinum vivendi more retento, vestimentis uti perseverant, cum indigenae (b) nudi Solis et ventorum vehementiae usque pateant. Cum autem horum aliqui aëri et Soli sese nunquam obiciunt, ut mulieribus (c) saepe accidit, ii colorem multo reliquis meliorem sortiuntur.

Quod autem homines albos in regionibus calidioribus, ubi observationes supra allatae candorem explicare nullo modo valent, existere obiciuntur; idque, ut in Abyssinia, in insulis Java et Madagascar dictis (d), ubi simul albi et nigri reperiuntur, verum est; ea res vere aliter explicabilis est. Nam hos albos et nigros diversarum originum esse, nec colore tantum, sed vivendi ratione, multisque aliis externis rebus, discrepare, observandum est. Certumque et exploratum est, non inter eorum locorum ab initio incolae illa discrimina lueruisse, sed aliunde e regionibus, quarum temperies aut nigredini aut candori favisset, cum priscis earum regionum cultibus advenisse. Quod inficias nemo est. Id enim eorum similitudo valet, ut ex ea singulorum originem ad vicinam aliquam gentem facile referas; incolae Abyssinae nigres ab aliis Africae vicinis partibus illuc venisse deprehendas. Similiterque insulas oceani magni Pacifici, nigri Afris, albi Europaeis, simillimi incolunt (e). Quorum illi sine dubio a terris Nova Guinea dictis migraverunt; hi, ut verisimile est, ab Asiae tractibus, magis ad septentrionem vergentibus, profecti sunt.

Nostrae porro opinioni obijci potest, quod duae gentes ab initio diversae, eademque regiones habitantes, licet eisdem causis externis pateant, nihilominus diversae permanent. Verum in hac re duo consideranda sunt, scilicet gentes diversas eadem ratione minime, sed diversissima, vivere. Nec ad aliquod semel effectum servandum, quam ad idem ab initio efficiendum, causae aequae validae ac vires vehementes necessarias esse. Hoc modo quavis, in insulis oceani maris Pacifici supra relatis, Solis adest colorem

(b) Histoire gen. des voyages, par M. l'Abbe Prerost, tom. iv, p. 412.

(c) Histoire nat. naturel. tom. v, p. 40, 49, 50, 52, 90, &c.

(d) Ibid. p. 22, 23.

(e) Travels voyage, Vol. I. p. 308. Vol. II. p. 178.

lorem ab albo ad nigrum mutare nequit; tamen semel effectum constantem reddere potest.

Color fuscus, et ab albo divergens, Zona Torrida sola haud continetur; quia plerumque Europae ac Asiae Septentrionalium, ubi frigus cum nive et gelu in perenni societate regnat, coloris fuscī homines sunt (a). Idem miseriam degunt vitam; cibum ex piscibus et feris consistit. Pro pane, radices & terrea detestantur. Hyeme tellis reconduntur, nisi illis temporibus quibus saina coacti exsunt. Tecta sub terra construunt, quod, propter frigus intolerabile, necessario faciunt. Hoc vitae genus sine dubio candori faciendo aut servando minime accommodatur. Dumque iidem pisces captant, aut feras venantur, diu aëris intemperiei obijci necesse habent. Quae aëris inclementia, visusque in piscibus constans, ad cutem duriores et crassiores reddendam, quam maxime pertinet; et ei incutendo tecta summa involuta neutiquam erunt remissio. Hoc, quantum aëris intemperies in colore mutando per se fore efficere possit, exemplo est.

Haec sunt quae de colore dicere habui, generaliter quidem, quia dissertationulae hujus limites subus aut plenius dicere non permittunt; quae tamen ejusmodi, spero, sunt, quae ad colorem in omnibus casibus explicandum psullulum conferre possint.

## C A P. II.

*De Statura et Forma.*

Hominum staturarum haud parva sunt discrimina. Americae Meridionalis locum quendam incolentes ad septem pedum altitudinem excreverunt (a); cum Zona Frigidam habitantes vix quatuor aut quinque pedum altitudinem attingant (b). Insulae, *Huakine* et *Marian* dictae, homines sex pedum aut eam septem altos alunt (c); contra Americae Meridionalis *Promontorium*, *Cape-Horn* dictum, habitantes parvi sunt statura (d). Sed quid plura, cum unaquaeque sese regio eadem omnia altitudinis humanum discrimina praebet? Unde igitur sunt?

Modus, quo alimentum corporibus nostris applicatur, vix adhuc investigatus est, nec, quibus ea crescant, legem

(a) Hist. gen. des voy. par M. l'Abbe Prevost, tom. xiv. p. 671.

(b) Hawkesworth voy. Vol. II. p. 27.

(c) Hist. gen. des voy. tom. par M. l'Abbe Prevost, num. xiv. p. 67.

(d) Hawkesworth, Vol. II. p. 104. Bouguer, tom. v. p. 32.

(e) Hawkes voy. Vol. I. p. 172.

exploratae sunt. Quod tamen ita est, tamen, dum et arguenda major lax assalgeat, verisimilia quantum, aut quasi probabilia, mihi proponere liceat.

Incrementum actioni cordis deberi videtur; ejus pulsibus renovatis fibrae nostrae longiores reddantur, et omnes partes distractae ampliuntur. Totius corporis humani, maximeque uteri, explicatio hoc illustratur. Sed actio cordis haud per se causa est; nec hominibus ac plantis eadem natura est. Haec se movere nequeunt, sed crescentes ad altitudinem justam assurgunt; quod in homine aliter se habet, qui sine motu, sine actione, vix ad perfectionem pervenit. Pulsibus igitur iteratis cordis, actio et motus corporis etiam conjungenda sunt: Quae, omnes nostri, partes, quasi distendendo, in longitudinem et magnitudinem, augent. Quantum haec causa valeat, unicuique, qui singulare partis casusvis, multum exercitatae, incrementum, magnitudinem minime naturalem, a causis distractentibus, ut in tumoribus multis ortam, et notum illud aurium augmen, quod in aures magni ponderis efficiunt (f), contemplatus est, patebit. Incrementum igitur, cum actionis cordis, tum motus corporis, rationem habebit. Quibus utique semper continuatis, non semper crescit quoque corpus, quia fibrarum muscularum actionibus, rigor magnus ab his ipsis effectus, non solum incremento, sed vitae quoque, aliquando finem imponit. Hic rigor ab actionum frequentia pendere hoc probatur, quod, quicumque, adhuc juvenis, immodico labore exerceatur, is vix unquam hominis magnitudinem attingit; quique semper laborare, et durum vitae genus persequi, arguntur, si haud ad senectutem aut hujus principia quidem perveniunt, sed immaturis annis, cum facie tamen habituque vultus senili, ante diem extinguuntur. Hoc modo causae incrementi sese tandem conficiunt.

Sic posita incrementi hominum causa proxima, eamque cordis actionem et corporis motum esse, partiumque rigorem, illius effectum finire, constituto: Quae causae remotae externae proximam afficiant, et naturae hominum varietates explant, deinceps est dicendum.

Harum praecipuae coelum, victus, exercitatio, et labor sunt.

Coelum aut calore aut frigore agit.

Calor, multis animalibus quasi origo, omnibus nascentibus necessarius est; et in nobis, si motus et sensus non causa

(f) Buffon, tom. vi. p. 34. Dampier, Vol. I, p. 22. Hawkesworth, Vol. I. p. 311.



causa est, saltem hi, quidam ex parte, et aliæ actiones nostræ, ex cæteris puncto quidem temporis sint perniciæ non possunt. Idem est stimulus, sensuum omnium acumen ac mobilitatem corporis humani, magnopere auget. Hinc regionum calidarum incolæ cito justam suam magnitudinem adipiscuntur, et omni a parte absoluti multo, regionum calidarum cultoribus, maturius perficiuntur. Anno octavo, nono, aut decimo, mulieres menstruales, duodecim mares apti veneri, sunt (1); cum in regionibus frigidis, menses ante annum decimum quartum, sextum, et aliquando vigesimum, non appareant; nec ante decimum octavum, aut aliquando vigesimum etiam, concubitionis mares tulerent. Corpus humanum idem calor neque augere, neque imminuere multum, posse videtur; id quod, in regionibus calidis pariter ac temperatis, magni simul parvique homines procresti argumento sunt. Et, si quid in incrementis re valet, ad hoc imminuendum potius pertinere videtur, propterea quod ex cordis actio valida, et corporis motus magnus, hinc incrementum exel faciant, illinc fibrarum rigorem, aut potius firmitatem, citius simul evocant. Reque vera regionum calidarum incolæ, temperatas habitantibus, plerumque statura cedunt.

Frigus calori omnino contrarium, vel, ut accuratius loquar, caloris absentia (2), vi sedante, qua pollet, motus omnes et irritabilitatem imminuendo, et stimulum omnem obviando, ad imminuendum corpus pertinet. In regionibus omnibus frigidioribus, torpor inducitur: Actio corporis, præcipue infantibus, parva; ideo ad extensionem ejus incrementum sustentandum, parum accommodatur. Unde tutum crescendo opus maxima ex parte actione cordis pergitur. Ob quam causam, cum actionis et exertationis effectus sit, formosa ac elegantia corpora rariere, neatiquam mirum esse debet, si, in regionibus perquam frigidis, nec statura magna, nec forma elegante, homines sunt. Quod dictum, omnia scriptorum de incolis terræ *Greenland* dictæ, et aliarum Europæ ac Asiæ septentrionalis partium, observata, consentiant (3). Frigus, ut alia naturæ omnia, ita corpora nostra, minus vero hæc eodem modo, scilicet calore dempto, qua illa, contrahit. Idque in fibras sensui motuique inservientes, qua ex sese magis contrahere coguntur, agendo quidem præstat. Calor enim humanas, in regionibus omnibus, quantumvis temperis cœli

(1) Buffon, tom. v. p. 60.

(2) Præfati. Doctor Black, *Chemist* hujus Academiæ Prof. Illust.

(3) Buffon, tom. v. p. 3.

coeli diversis, vix ullam subit mutationem. Ea igitur constructio, unicuique potestati, corporum nostrorum partes in longitudinem aut amplitudinem augenti, obviam ibit. Eadem contraria relaxatio, quam calor dat, et de qua, cum de calore ut incrementi celeris causa agebatur, agi simul speravit, in fibras quoque motrices agendo, hoc effectui praestat.

De exercitatione et labore, quia in corporis actione praeriter consistunt, et solum in hoc differunt, quod illam voluntas praecipit, hunc officii ratio exigit; ideo simul sub motus corporis nomine tractabitur.

Motus corporis, ut aut vehemens, aut modicus, aut parvus, considerari potest.

Vehemens, rigore, qui actionem frequentatorem sequitur, et exhaustionem potestatis vitalis, incrementum retardat et impedit.

Motus parvus aut quies, organis robur, quo officia rite peragantur, necessarium non impertit; nec corpori firmitatem, aut artibus eam, quam actio sola parit, stabilitatem unquam tribuit. Observatum autem dignum est, eos motus et quietis effectus, aetate teneriore, priusquam corpus, nullis deinde naturae viribus mutandum, usus et consuetudo informarunt, potissimum existeret. Corporibus enim adultis laborare prodest, saltem raro noxae est, et in iisdem quies plethoram creare seu augere potest.

Supra dicta, ni fallor, opificum staturam spectans conditio confirmat. Ille suam quisque artem, a primis annis discere exacti, in officinis vitam exigunt. Ad terram depressi labore degravati, pro statura et magnitudine hominum, quam nunquam assequuntur, gibbi, distorti, et tumiliones quasi, evadunt; ita ut, Martialis his verba "si solum species hominis capis, Heclora credas, si faciem videas, Assyriaca putes," apprimè conveniant, reque vera capita magnis plerumque habent. Eisdem, loca, sive meridiem sive septentrionem maxime spectantia, incidentes (x), haud dissimiles sunt, et ubi eandem ex parte causam, quae, aetate teneriore, nempe nimia quies, utriusque est communis.

Quibus modis, exercitatio modica, quae ad incrementum corporis maximum confert, sine dolo eligenda est. Quae vero modica habenda sit, definitum est difficile; tanta ejus, ut eorum, qui de sanitate disputant, verbis utar, limitatio esse potest.

Ad causam, staturam et magnitudinem hominum sive augendam

(x) Buffon, tom. v. p. 3. Hawkes, voy. Vol. I. p. 302-303.

nugendam sive immiscuendam, potissimum, nempe, victum, nunc transeo. Cibus, etsi vitae hominum apprime necessarius; tamen, integræ valetudini conveniens, in aliis aliis, quod quantitatem, magnopere variat. Quem parvum, staturam exiguam dare, manifestum est. Crescere enim augeri que corpus, materiae ei alendo necessarie parte subducta, non potest. Contra, saepius sumptus ac plenus impii corpus augeat. Quantum ab oves et alia pecora alenda cibi copia valeat, unicuique pecuario notum est. Oves Scythiae montibus et campis sterilibus producti, et in agris Angliae fecundioribus postea nutriti, ad magnitudinem duplam crescunt.

Sed, praeter diversitates cibi copiae, qualitatum etiam sunt. Ita ad corpus humanum alendum, olera et caro minime aequae valent. Alimentis quibusdam, ut carni, vino, piscibus, aliquando aromatis conjunctis, plurimum stimuli inest. Hoc celerius incrementum, sed ita, dat, ut stimulo quasi assiduo corpus attritum multo citius conficiat.

Ex rebus farinariis partim, partim ex carne, victus paratus, quantum plenissimum optime concoqui potest, omni alio melior, expedit incrementum.

Haecenus de causis incrementi separatim dictum est; jamque de iisdem conjunctis dicendum videatur, eoque magis, quod orati fere in casu simul conjunguntur. Verum, cum hujus chartae fines, me de ea re agere, et ejusdem ad varias hominum gentes rationem deducere, prohibeant; ideo, ea omissa, ad id quod proximum est transeundum.

De varietatibus formae nunc dicendum. Hae profecto, totidem numero, quot homines, sunt. Quis enim faciem, formam, habitumque vultus sibi peculiarem, ab omnibus aliis dignoscendam, non habet? Et, praeter quod sibi haec quisque propria habet, signa notaque etiam genti aut nationi propria non desunt: Ita hanc nasus depressus, labia crassa, illam oculi parvi aut magni, et aliam alia nota, milibus singulorum hominum communis, generatim distinguunt. Quae causae sunt? Quas diversitates, a specierum nulla diversitate, esse, eadem nasi depressio, aut labiorum crassitudo, inter nos haud raro cernenda, declarant. Depressum Nigrorum nasum, arsi multi (y), alii naturae, tribuerunt. Et, esto artis opus; tamen scrupoli, haud facile superandi restant. Saltem, quod ad me attinet, unde hominum

(y) Buffon, tom. v. p. 122. Hist. gen. des voy. par M. l'Abbe Prevost, tom. III. p. 127.



minum diversae inter se formae, et vultus lineamentaque sint, quae referendae, nescium me fateor. Quo autem modo ea semel effecta permaneant, max. ubi de generatione agetur, dicendi occasio dabitur.

## C A P. III.

*De Corporis humani Partium Defectu vel Excessu.*

Si quis in verba scriptorum jurare paratus esset, is amplam hic, quam tractaret, materiam repiret. Sic Arimaspos uno oculo in fronte insignes, Androgynos mare et foemina in uno conjunctis, et capitibus caninis homines, et sine cervice praesferentibus oculos humeris, accepimus (a). Patagonorum, intra paucos, quam de his audivimus, annos, statura duodecim pedum vix contenta, nunc amplius septem non affectat. Quae omnia omnem fidem superare, unusquisque facile videat.

Quia et quae verisimiliora referunt, adeo et eorum inter se testimonia discrepant, dum hic, se quod ille adfirmat, vidisse aut videntum cuiquam esse negat, ut cui potissimum, an cuilibet omnino credendum sit, proflus sit incertum. Et, quoniam quae veriora, aut contra, essent, ea iudicatu difficillima impemina mihi erant; idem varietates certiores et exploratas magis, quae in hac re pertractarem, selegi. Jamque nun, an crucibus prae aliis crassioribus, aut altero quam alterum est crassiore (a), caudisve, quas nonnulli utique esse credunt (b), quidam homines praediti sint, inquisitionis sum; quippe quae, nullis veris rebus observationibusve fide paulo dignioribus, unde nobis aut ad explicandum, aut conjecturas faciendas, aditus esse possit, confirmantur.

Itaque defectus aut excessus, de quibus agitur, ejusmodi sunt, scilicet, mentum imberbe, mammae pendentes, aut pudenda prominentia.

Barba, inter nos, aliis rarior quidem, aliis densior, vis unquam tamen docti. Item, in gentibus illis, quibus nullam a natura barbam datam, scriptores fere omnes nuper auctores fuerunt, plerique saltem, id falsum esse, et non a natura illi barbam negatam, sed ab ipsis evulsam, recentiora testimonia confirmant (c). Est igitur hic non magis

(a) C. Plin. Nat. Hist. lib. vii. cap. 1.

(a) Buffon, tom. i. p. 64.

(b) Origin and Progress of Language, Vol. IV. p. 259. 2d edit. Edin. 1774.

(c) Dampier, Vol. I. p. 409. Hist. gen. des Voy. par M. l'Abbe Prevost.

defectus, quam promissa aliarum gentium barba excessus, et utraque tantum morum res est.

Necque quod ad mammas attinet, ulla mihi dubitatio datur, quin earum pendula inter quasdam gentes longitudo (d) peculiari mulierum lac infantibus praebeendi mori debeat. Si enim pars quaecvis dissensione aut distractione amplior omnibus sit, uti antea observatum est, an mammas, de quibus agitur, supra humeros rejectas, et a lactantibus infantibus satis vehementer attractas, longiores fieri, mirandum est.

De mulierum Africae maxime meridionalis pudendis, acriter decertatum est; aliis subligaculo naturalibus praetento praeditas esse affirmantibus, aliis nihil praeter communem mulierum naturam habere, contendentibus. Quae miracula, sive monstra potius, sive omnino, sint, recentissimis testimoniis huc demum redire videntur, ut illic nymphae paulo turgidiores et prominentiores sint, vitium illis in regionibus eo minus mirandum, quod ne in hac quidem illud deesse certum est (e).

#### *Capillorum Differentiae.*

CAPILLI maxime colore differunt. Quem utique inter et cutis nexus quidam videtur. In regionibus omnibus, colorem cutis fuscum, vel ab albo decedentem, semper nigri capilli comitantur. Contraque rufi aut albi cum cute candida conjuguntur. Et ab eisdem causis, scilicet ad aërem et calorem aditu patente, utrorumque, nempe et cutis et capillorum color, pendere videtur. Cujus rei hoc argumentum est, quod, quo magis minusve capilli his causis obijciuntur, eo eorum magis minusve ater color est. Sic recti pili semper minus atrii, quam nudati, sunt.

Quod ad eorum texturam attinet, magnum discrimen esse videtur, quod aliorum molles crispique, quasi lanugo, aliorum duriores et crassiores, sunt. Quae hujus rei causa sit, cum parum inter physiologos adhuc de pilorum natura convenerit, nos non aucto pro certo conlittere, conjectura una aut altera contenti erimus.

Cum in summo corpore siti pili sint, ita haec afficiunt, cum alia forsitan, tum praecipue evidenter humorum eo affluxus, eos afficiunt; et ita quidem, ut, quo major minusve affluxus est, eo majus minusve incrementum eorum procedat. Hinc, uti omnibus tonsoribus notum est, aetate

quam hyeme pili magis crescunt. Quod de barba observandi occasio praecipue est. Ideoque, in regionibus calidis, quam in frigidis, pili luxuriosius crescunt, et ob id crassiores et densiores erant. Quod re vera in omnibus fere regionibus, ut in Indis orientalibus et occidentalibus, usa venit.

Unde exceptiones tamen non desunt. Ita in Africa, regionum omnium calidissima, et ubi ideo capilli crassiores esse debent, e contrario tenues prae se speciem lanuginis ferunt. Quod, etsi non explanare, tamen rationis similitudine illustrare, licet.

In multis morbis cutaneis, materiam copiosam ulcuscula efficiunt, quod humorum ad quaedam cutis vasa impetum fieri ostendit. Qui utique morbi saepe immediis sudorem moventibus sanantur. Quomodo hoc fit? Cum humorum nunc forma sudoris per vasa sana copia excretatur, idem a vasis morbidis sic abundantia avertitur. Et ita ulcuscula antea humida exsiccantur, crustaeque sursumantur, quae delapsae dein sanam infra cutem ostendunt. Hoc modo, impetu in cutem primum facto, capilli magis crescunt; quo magis etiam magisque adaucto, et humoribus facilius per vasa perspirantia e corpore emanantibus, copia, capillorum incremento inserviens, imminuitur, et pili attenuati quasi lanugo evadunt. Quam opinionem hoc confirmare videtur, quod Nigrorum, quibus pro pilis quasi lana est, bulbi seu radices capillorum attenuati et graciles (*f*), tanquam ob nutrimenti defectum, apparent; et calidissimas tantum regiones incolentibus, aut qui ab his alibi proguati sunt, lanæ magis quam pilorum species est.

## C A P. IV.

*De Generatione.*

CAUSIS, quae colorem mutant, staturam magnam aut parvam inducant, et crines aut alias partes afficiant, sic explicatis; eas nullo modo necessarias esse, hominesque notis et varietatibus modo memoratis, simul ac in lucem editi sunt, discriminari, saltem has diu ante, quam causis externis tribui possint, exoriri, obijci potest. Quod certe quoque verum est. Et quo igitur modo explicandum est? Nam aut explanationes nostrae fuitiles et frustra sunt, aut multae proprietates acquisitae a parente ad prolem transferuntur. An igitur transferuntur? Profecto sic videtur. Ita forma corporis, habitu vultus, crinis colore, et vocis  
sono,

(*f*) Haller. El. physiolog. tom. v. p. 33.



sono, sibi omni ex parte similem, filium pater gignit. Temperamentum quoque a parente ad prolem profluit. Item signa quaedam propria diu eandem hominum propaginem distinguunt. Sed hanc rem praecipue historia morborum illustrat. Cujus rei exemplo omnibus noto podagra, scrophula, et mania sunt. Quin et alvi profluvia, et praeter naturam mortae arcus dilatationes, eandem diu familiam infestant (g). Quae conditiones morbosae, eodem in loco, ac quaelibet aliae corporis status mutationes, habendae sunt. Utrique de utriusque pariter loquar; certe cur ea mutatio qua nigra cutis evadit, a parente ad prolem communicetur, explicatu non difficilius est, quam cur ea, quae podagram simili modo transdit, etiam communicetur; neque, quod certo post diem natalem tempore cutis nigrescat, conceptu difficilius est, quam quod post annos aliquot parentis scrophulosi proles, ulceribus infestetur.

Verum nihilominus vera res est, quod explicabilis nobis non est; et proprietates hominum acquisite ad posterum descendere, non est addubitandum.

Sic re vera constituta, inde, quare tantas coloris, staturae, et aliorum de quibus relatum est, mutationes ex causis allatis, homines patiantur, haud obscurum erit. Ater parentis color in filio, iisdem rebus externis obiecto, atrior evadere, et sic per secula magis magisque in nigredinem verti; eoque modo a causis minimis, nusque fallentibus, cum quacunque generatio aliquid ad eos augendos conferat, magni tandem effectus profluere possunt.

Cur alia aliis gentibus facies et vultus forma permaneat, hoc explicatur, quod sibi similem parens prolem edit.

Quot vero ad cutem ab albo ad nigrum, aut alio modo mutandam, seculis opus sit, dictu difficile est. Verum, si a subita solis et aeris in cute mutanda effectus conspiceretur licet, tempus longum necessarium non est. Quod autem Europei regiones calidas incolentes colorem tuncum aut nigrum non post longissimum temporis spatium acquirunt, Nigrique in Europam transducti diu non albescent, ejus rei causa esse potest; quod neque illi horum vivendi modos moresque, et alia externa, quae ad hoc ad mutationem valere dicta sunt, unquam experiuntur; et, si necessitate aut fortuna adversa experiantur, pariter ac hi colore mutantur (h); neque his ad molle illud vitae genus, quo candor taetropere continetur, miseris mortalibus, provchi contingit.

3 K 2

Præc.

(g) Praelest. Doct. Cullen.

(h) Hawk. Vol. III. p. 751.

Præterea, candoris et nigræ causarum remotarum aliquantum diversa ratio est: multoque citius ater, quam candens color, acquiritur, diutiusque retinetur. Ita unius diei Solis ardet plus fuscescens imprimet, quam longi temporis idonea ad eum vitandum adhibita cura delebit. Quam observatio, quo modo ad eos, qui notas proprias in aliqua regione acquisitas, in alia eo transducti, retinent, deduci possit, nigredinemque ibi, ubi causæ ejus sublatae sunt, permanentem tamen explicet, facile intellectu est.

Sic quæstione, quomodo a parentibus ad prolem, quæ singulos distinguunt, notæ transferantur, absoluta; altera illa, nempe, quomodo ab his illæ notæ, quæ non sic transferantur, differant, quæve causa sit, quod alia nota parenti propria, alia non, transferatur, recurrit. Ad quod respondendo imparem me fateor. Rerum enim Fabricator in ultimis naturæ recessibus proles suscipiendæ negotium abdicat, omnemque ejus rei progressum alta caligine mensum obrutumque celavit, nunquam forsitan in lucem excitandum. Eoque e tali causa res veras pendentes explicare vanus foret, et irritus labor.

Quod, tamet si ita est, quædam tamen ad generationem pertinentia, miranda quidem, sed nihilo vera minus, non memorare non possum.

Inter nigros interdum albi nascuntur (i), et quis alios quoque albos ex se suscipiant, neutiquam dubito.

Inter albos unum tantum nigrum natum accepimus (k), quem sibi similem filium genuisse, ingeniosus viri, medici et rerum investigatoris, Jacobi Lind, qui ipse suis oculis vidit, relato accepimus.

Equidem, naturam omnem ad meam opinionem videri cogere nolim; verum, ut hæc observationes colori nigro dando specierum diversitatem non necessariam esse, proprietatesque cum aliis, tum hæc, rebus externis acquiri, et sic a majoribus ad posteros descendere, probant; ita eandem traditam jam de colore doctrinam aliquo modo confirmant.

Alborum inter nigros cutis fursuracea quasi est (l), id est, cuticula in squamulas abit, nec satis diu, ut in nigredinem eat, permanet. Nigri inter albos, ut et filii ejus cutis densa et dura quasi fuit (m), quæ res densitatem mag-

(i) Hist. Gen. de Voy. par M. l'Abbe Prevost, tom. iv. p. 190. Hawk. Vol. II. p. 188. Maupertuis, tom. ii. p. 216.

(k) Phil. Trans. N<sup>o</sup> 422.

(l) Hawk. Vol. II. p. 182.

(m) Phil. Trans. N<sup>o</sup> 424.

magnopere ad colorem conferre ostendit, et nostram opinionem tuetur.

## C A P. V.

*De Mentis Varietatibus.*

Mentis aequa, ac corporis hominis, et nonnullis etiam majora, discrimina apparuerunt. De qua re, quoniam propositi nostri pars est agere, pauca dicenda putavi.

Hoc caput in duas partes recte deduci posse videtur: Quorum in altero ratio et prudentia, in altero mores, tractentur. Et, quo facilius notio nostra capiatur, prius, quam de utrovis argumento agam, utrumque exemplo illustrabo. Igitur, si alter homo argutus, ingenio acutus et docilis, alter hebes, stolidus, et ab omni disciplina alienus est, ea res ad rationis et prudentiae differentiam referenda est. Verum, si quis animosus, vividus, alacris, et animi felix est, eique contrarius alter tristis, moestus, et miser, eam rem morum esse dicimus.

In priora parte, quaestio protinus ad animum occurrit, Quae sit differentiae causa? An ad Deum referenda est? iustumque et omnibus aequum Numen adeo mente discretos fecisse homines, credendum est, ut hunc stultum, illum sapientem, magnanimum unum, ignavum alterum crearet? Certe, me iudice, non; mentisque quae videntur differentiae, causis naturalibus tribuere verius et aequius est.

Ut has paucis inquirem: non tam nascendi sorte, quam rationis usu et exercitatione, alius ab alio inter se homines, ingenio differre videntur, eodemque fere modo, quo corporis, mentis quoque, usu scilicet, facultates magis minusve esse absolutae. Cujus exercitationis, cum plures causae sint, has in tria capita, situm, educationem, et animi affectiones, redigam.

Quod ad primum attinet: Si quis in eo locum est, ut aut insuperabilia impedimenta, aut nulla, adimnis ejus, obijciantur; in illo casu desperationi, in hoc ignaviae, sese tradit, pariterque in utroque nihil agit. Neque vera, in similibus inter se rebus, Samioidei et Nigri posui videntur. E contrario, sint aliqui homini omnia vitae necessaria, non tamen, propter eorum, solum, aut alia quaecvis, certa; quid sit? Statim certiora arte et industria reddere conatur. Pecora quaerit. Hinc copia, et cum hac, proles crescunt. Colendi ad victum agri sunt, jamque abundantia nascitur. Qua inquit humanae animae cupido non contenta,



contenta, necessariis commenda addit, dein elegantiae appetuntur, postremus luxus est. Crescente vitae cultu, artes semper, saepe scientiae, crescunt. Hominem rudem primum, jam ad summum cultus et humanitatis vestigium proVectum, contemplato; quantum idem sibi discrepat? Gradus etiam quibus tanta affectus est, respice. In nullis proximis duobus major rationis et prudentiae vis, quam in Samoideo tugurium infra terram adversus frigora struente, aut in Nigro umbellam, qua a calore protegatur fabricante, cerui potest.

Quia et sub iisdem rebus posterorum hominum magna aliquando differentia apparet. Quantum inter Isaacum Newtonum, aut Verulamum, et omnes fere is coaevos intervallum! Qui tamen facultate se propria, ad scientiam comparandam, aliis negata, pollere nunquam crediderunt. Accuratius quidem naturam observarunt, observatisque in ratiocinando melius alius usi sunt. Sed id non is naturale, tantumque usu ac consuetudine comparatum. Quae vero ad eam felicem consuetudinem formandam contulerint, praeter ipsos, nemo facile dixerit, neque dictum quidem opus est; adeoque lubrica res est, ut et ipsos eos fallere potuerit; utpote cum multa rerum minuta consuetudinem, is, qui ei obijciuntur, nescientibus, quotidie facere videntur. Reque vera multi, qui scientias felice labore promoverint, se, casu fortuito, ad is animum adjiaciendum ductos esse fatentur. Ut igitur ea ad rationem excitandam ampliandamque sita vis est; ita,

Ad islem animi affectiones, et praecipue cupiditates, plurimum quoque valent. Quid non ad scientiam et cognitionem, maxime in rebus publicis regendis et administrandis, aut benevolentia, aut aemulatio, aut invidia, aut ambitio, aut gloria praestiterunt?

Quid ad animum formandam et excitandum, educatio ac disciplina valeat, nemo dubitat. Verum ea certe optima disciplina est, quae non solum praecepta impertit, sed etiam mentis facultates exercet, et quasi praeparare dictata cogit (n). Stimulum quoque menti ad discendum, aemulationem, curiositatem, blanditias, et saepissime reverentiam, institutionis pueritiae rectores, addant. Ultra via potius habenda sit, alii iudicent.

Ecquid ad mentis facultates augendas aut imminuendas valet conformatio? Mentis actiones, si a genere nervoso, praecipue cerebro, non omnino pendentes, sicut is, qui mentem materiae expertam esse negant, opinantur, saltem

fine

sine dubio cum eo arctissime conneſcuntur, et variante hoc, variant. Quod varietates mentis hominis ſunt, et ejuſdem aegroti, uniuerſi, et triſtiſ, probare videntur. Fracto cranio, aut compreſſo cerebro, qui modo acute cogitata prolocutus eſt, nunc rationis et mentis inopas quaſi videtur. Et quis, mutato cerebri ſtatu, non mutari quoque mentem, hiſ exemplis doctus, dubitaverit?

Utrum quoque huiuſmodi cerebri conditio propria aliqua, mentem afficiens, a parente ad prolem fluat? Sic certe temperamenta communicari ſupra dictum eſt. Temperamenta autem alia cum aliis mentis tonis aut conditionibus ita conjunguntur, ut, vulgari ſermonē, ad mentem ſolam, deducantur. Ergo, ſi quamquam cerebri conditiones, a quibus aliquae mentis actiones profluunt, forte naſcendi tranſmittuntur, quid obſtat, quin partis quoque cerebri, rationi inſervientis, conditio propria, ſimili modo tranſmittatur? Atque hoc multo veriſimilius ei erit, qui huius partis ſtatum morboſum, qualis mania eſt, a maioribus ejuſdem familiae ad poſteros per ſecula tranſferri reputaverit.

Aliquid igitur conformationi et ſtaminibus primigeniſ, plus exercitationi, quatenus ſitus, animi affectiones, et educatio eam invitant, in rationis et prudentiae negotio, tribuendum eſſe, jam relata ſuadent.

Sed mentis varietates peregrinatores magno opere ultra verum amplificaverunt, qui regionum diſſitarum incolis, vitae ratione, moribus et inſtitutis a ſuis diverſiſſimis utentibus, virtutem negaverunt; haud unquam reputantes, Tactarum hominem equo docendo, Indamque tugurio erigendo, idem ingenium, quod dux Europeus exercitum inſtituendo, aut Inigo Jones regiam aedificando, oſtendere.

In nulla re quam in moribus magis diſcrepant homines. Ab innumerabilibus originibus ſunt. Coelum (a), ſolum (b), vicus (c), occupationes, leges, religio, homines ſinguli, dominatio, regia impetii forma, et res publica (e), cum milibus aliis, mirum in modum eorum mores informant commutantque.

Quod ad coelum attines, vici egregii verbis uti liceat. "Under the extremes of heat or of cold, the active range of the human ſoul appears to be limited; and men are of inferior importance, either as friends or as enemies. In the one extreme, they are dull and ſlow, moderate in their deſires, regular and pacific in their manner of life; in the other, they are feveriſh in their paſſions, weak in their judg-

(a) De l'Eſprit des loix, Liv. xiv. xv. xvi. xvii. (b) Ibid. Liv. xviii.

(c) Hiſt. des Indes, tom. i. p. 66.

(e) Ibid. Liv. iv. v. vi.

judgments, and addicted by temperament to animal pleasure (1)."

Casorum relatarum effectuum multa exempla ante oculos sunt, quae omnia memorare temporis ratio vetat. Ideoque uno aut altero, quo quid unus homo valeat, clarissime illustratur, exemplum ero contentus. Lycurgi leges et mores, prioribus praefus cum ipso in exilium actis, quae non in voluptatem, sed utilitatis, tam publicae quam privatae, et austeræ virtutis causa, institutae sunt, tamen annorum septingentorum spatium duraverunt. Item Petrus merito cognomine Magnus, Russorum Imperator, qui gentem barbaram, rudem, insulicam, aut spretam, humanitate et cultu donavit, et, contra insita animis praecipua, moribus ornavit, legibus emendavit, et nunc imperium diu potentissimum alteri mutuendum, aliis gentibus et nationibus suspiciendum, posteris tradidit, alterum hujus rei exemplum imprimis illustre est.

Verum, utut variae causae sunt, quae hominum mores formant commutantque, una tantummodo est, quae eos diuturnitate, stabilitate, et aeternitate quasi donat. Ea imitatio est, principium in homine potentissimum. Hoc mores, hoc modos, et omnia fere acquirimus. Cujus tanta aliquando vis est, ut ad alios imitandos vel inviti et machi impellamur. Ab eodem, morum in familia, in urbe, aut in gente universa, pendet similitudo. Quod Poetae, qui naturam humanae mentis ex toto perspexit, bene notum erat.

*Falstaff.* "It is a wonderful thing to see the semblable coherence of his men's spirits and his. They, by observing of him, do bear themselves like foolish justices; he, by conversing with them, is turned into a justice-like serving-man. Their spirits are so married in conjunction, with the participation of society, that they flock together in consent, like so many wild geese. It is certain, that either wise-bearing or ignorant carriage is caught, as men take diseases, one of another." *Shakespeare, King Henry IV.*

Pauci sunt tamen, qui, quid rectum aut contra in moribus sit, ipsi pro se judicant, et etiam pauciores qui pro se cogitantes, et a vulgo dissentientes, tamen propriis suis ipsorum opinionibus mutatos mores accommodant.

(1) Ferguson's essay on the history of civil society, Part III. Sect. 1.



DISSERTATIO INAUGURALIS,  
DE PHYSIOLOGIA PLANTARUM.

QUAM, ANNUNTE SUMMO NUMINE,  
Ex Auctoritate Reverendi omnium Viri,  
D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.  
*Academiæ Edinburgensis Profestli*)

NEC NON  
*Amplius SENATUS ACADEMICI Censura,*  
*Et Medice FACULTATIS MEDICAL Decretis,*  
PER GRADU DOCTORIS,  
SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS AULÆ ET  
LEGITIME CONSECUTENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT  
GEORGIUS BELL, BRITANNUS.

Societ. Physico-Chirurg. S. H. et  
Soc. Med. Edin. Soc.

Præl. Ed. Junii, hora locoque solitis.

---

1777.

---

Viro Dignissimo,  
GULIELMO CULLEN,  
Medicinæ Præceptor Profestori Venerabili,  
Simul et Academiæ Edinburgensæ,  
Et Medico Urbis Decori,  
Mihi ob Maximam, utraque Collata Beneficentiam,  
Semper Cœquum;  
Nec non Ingeniosissimum Botanices Profestori,  
Instruendissimo Medico,  
Optimo Viro,  
Mihi Amicissimo,  
JOANNI HOPE,  
Cujus Ope et Ductu,  
Naturam Vegetabilem cœtemplatus sum:  
Hunc de Plantarum Physiologia Sermone,  
Eo quo per me Officio,  
D. D. D.

GEORGIUS BELL.

## PHYSIOLOGIA PLANTARUM.

**A**LI philosophi alia naturae sibi observanda proponunt. Praeclarissimis ingeniis placet, naturam humanam cognoscere. Studiosorum est multitudo, qui, facio homine neglecto, ad animalia caetera descendunt, et in eorum figuris, moribus, et nominibus notandis, sedulo et semper versantur. Non infimi habentur philosophi, qui in systema vegetabilium, fere immensum, animum intendunt; hoc tamen culpandi, quod habitum plantarum externum, potius quam structuram interiorem, observare solent.

Perspecta vegetabilium structura, oeconomia eorum certius delectatur; et ea cognita eorum oeconomia, non solum res botanica, sed et agricultura, haud ita parvula incrementa caperet. Ea vero oeconomia, utut scitu dignissima, vel curiosissimas latuit observatores. Eam investigare, magis studio adductus, et dulcedine rei, quam spe philosophiam priorem superandi, audeo; et in sequente sermone, paucis de structura, vita, actionibusque plantarum, differere libet. Praemitti velim, si structuram plantarum, ex qua sola cognita detegeretur earum oeconomia, non ad omnia cum certitudine demonstremus, in causa esse partes plantae minutas, quas aciem oculorum eludunt, ratione saepe sola, nonnunquam fallaci, comprehendendae. Multi tamen hac de re solide sunt observata. Haec proponenda.

Transversim dissecta arbor, tribus partibus consistere reperitur: cortice scilicet, ligno, et medulla.

1. Cortex duplici materia constat, cuticula nimirum et cortice vero. Cuticulæ est, tegumentum externum reliquis partibus præbent; numerosis consistat stratis, facile inter se separabilibus, quorumque fibrillae circulares inveniuntur. Cortex verus tela videtur cellulosa, ubi ponuntur organa duplicis naturæ, vasa propria, nimirum, et fibræ longitudinales, de quibus nihil in praesentia statuendum.

2. Cortice separato, lignum dictum apparet, cujus materia densior quam cortex, structuraque demonstrata dissimilis. Exponendo tamen liquet, ei inesse vasa propria, fibrasque longitudinales; inesse item magna vasa, quae runciat

nicæ

ricas habent in spiras involutas, quaeque tota longitudine arboris extenduntur, et vocantur Vasa Aëria. Lignum inter et medullam ponitur materia colore viridis, quae ex sententia nobilis botanici Joannis Hill, qui primus eam accurate demonstravit, et Coronae insignivit nomine, omnes plantae partes inchoatas, et ejusdem quasi rudimenta, continet.

3. Centro custoditur medulla, in arbutulis adolescentibus abundantior; in vegetis, arboribus et parvior; in annulis, nulla. Cellulosa est ejus materia, et, apud eundem auctorem, diversis plantis ejusdem est formae. Hae sunt plantarum partes solidae.

Plantis item insunt fluida, sive succi, qui duplicem naturam induunt; alter succus omnibus plantis similis naturae est; alter vero, in diversis plantis, diversus. Prior appellatur succus communis, qui, collectus primo vere ex incisa vite aut betula, haud distare ab aqua fontium videtur: Posterior appellatur succus proprius, multum variat, plantisque suppeditat qualitates sensibiles. Haud commisceantur hi succi; nam posterior non nisi vasis propriis servatur.

Nondum plantae compertum, succine plantae per substantiam ejusdem cellulosam, an per vasa, transeant. Utrunque disputatum; utrinque rationes probabiles proponuntur: Sed dolendum est, rem tanti momenti ex dissectis arboribus non posse judicari. Mihi verisimillimum videtur, fluida omnia plantarum vasis contenta moveri: Propterea quod, 1. Nudo oculo apparent vasa propria et vasa aëria, microscopio manifestissima, et succum proprium atque aëria plane continent: Hinc, si analogiae fides, succo communi sua esse vasa, concludendum. 2. Quod secretio, quae certissime plantarum est actio, nullibi sit sine actione vasorum. 3. Quod experiundo reperit sagax Steph. Hales, succum communem suis vasis contineri, neque semere per interstitia plantae transire. Caudici vitis instrumentum circumcirca infixit, quo et contractiones et expansiones ejus accurate metiretur; ac nihil intercedere invenit, sive planta succo abundaret, sive non; etiamsi ita exquisitum fuit instrumenti artificio, ut vel centesimam digiti partem notare puerit; sed si succus per materiam cellulosam transmittatur, ea, succo subducto, compressa fuisset, et caudex ita ad molem minorem se contraxisset.

Jam qua directione fluida plantis transmittantur considerandum.



## 1. De cursu succi communis.

MULTA experti sunt botanici, quo cursum succi communis cognoscant. Nova vere, quum succi plantarum copiosius effluent, incisi fuerunt tam trunci quam radices arborum, ad medullam usque, et perpetuo observatum, e superiore margine incisionis plus liquoris emitti, quam ab inferiore. Quod intuentes plantarum studiosi, sibi persuaserunt, novo vere, nultum humidi ab atmosphaera absorbere arbores, et copiam succi communis hoc fonte derivari. Hanc opinionem male naturae congruere, dubius experimentis ego comperi: 1. Complures radicularum tiliar, incisuris in tronco alia atque alia altitudine factis, decocto ex ligno Campechensi immerſi; liquorem coloratum absorbabant radicales, qui tandem superiorem, non inferiorem, incisurarum margine, apparuit; neque fere longius ab ea parte arboris se extenderat. 2. Tempore veris succosissimo, vitis erectae et crescenti, alte incisus fuit ramus, et major vis succi superiore margine effluxit: At, simili ramo inverso, ut margo superior inferior fieret, copiosius e margine radicibus propiore effluxit liquor.

Contra, sunt multa quae confirmant, succum communem, novo vere, e radicibus ad ramos versus ascendere; suscitaret sequentia notasse: 1. Sub initium veris, quum nova succus vis plantam intrasset, professor noster botanices, ingeniosissimus Juaneus Hope, radicem betulae incidit. Succus, simul atque ascendit, superiore infimae incisionis margine erumpebat, tum deinceps eodem pacto a reliquis incisionibus superioribus. 2. Si, incunte vere, quum succus in tronco et ramis etiamnum paucior est, inciso prope radicem vitis laecla fuerit, copia exinde succi profunditur. 3. Quantitas succi variat, pro solo humido, ubi planta crescit.

## 2. De cursu succi proprii.

SEPARATA portione ligni et corticis pinus, effluit haud ita paucus succus proprius, tam a superiore, quam ab inferiore incisionis margine. Hinc in mentem venit botanicis, paululum vel nihil motus succo proprio competere, cumque, hanc unam ob causam, erumpere, quod pressione corticis et ligni liberatus est. Ad hanc opinionem non libet accedere, licet enim principii, utroque invisionis margine prorumpat succus, postea tamen, ut observavi, e solo margine superiore effunditur. Haec una autem observatio vix sufficit. Suspiciari enim est, propter haec, uberius superiorem

riore margine profluere succum; quod aër superiorem, minus quam inferiorem, gravitate sua comprimit, quodque liquor ipse, quum etiam gravis sit, deorsum, ut succus communis, nititur. Quo rem extra dubium ponerem, tum ramo pinus, situ horizontali servato, tum ramo ejusdem inverso, frustula corticis et ligni exsecanda curavi, et utroque posito, maximo margine summæ arbori propiore, protulit succus. Sic experiundo liquet, cursum succi proprii in vasis suis constanter a ramis plantæ radices versus illigi.

Praeter vasa, succum communem servantia, vasaque propria, tertium genus in plantis reperitur, vasa nimirum aëria. Haec, maxime in ligno, foliis, et petalis locentur; neque in cortice arboris, neque in plantis herbaeocia inveniendæ, numerosis tenuibus filamentis, in spiras ita convolutis, ut cavitatem mediam relinquant, constantia. Nomen vasorum aëriorum hic inditum, quod liquore vacua sunt, quod lignum plantarum aëre abundat, quodque præcipue ligno, cui nulla alia organa peculiaria sunt, reperiuntur. Inservire respirationi plantarum existimantur; sed quæ modo hæc functio peragatur, non ita liquet.

1. Quibusdam persuasum est, aëra elasticitate privatum radice plantam intrare, et transeuntem per eam sensim elasticum evadere. Huic opinioni obijciuntur: 1. Multa vasa aëria radicibus arborum reperiri, ubi ex paucis succorum motu, fere nihil aëris evolvi potest. 2. Haud opportune ad aëra absorbendum radices locari, ita profunde inhumatos, ut eos aër attingere nequeat.

2. Aliis persuasum, aëra per folia absorberi, et inde per totam plantam transmitti. Non negandum, folia vasis aëris instrui, quæ necessaria videntur, ad aëra circulatione evolutum recipiendum, qui tandem cum materia perspirabili exitum invenit. Sed si absorbeatur foliis aër, et ad radices descendat, motus ejus succo ascendenti contrarius foret, et ita fluxui succorum obsisterit, non savorer. Vulgo creditur, aëra, ubi vasa aëria intraverit, pro temperie atmospheræ, expandi et contrahi; hasque expansiones et contractiones ascensum aut descensum fluidorum adjuvare. Huic opinioni obijci potest: 1. Vasa aëria in radicibus, ubi primum succus movetur, ita profunde solo locari, ut mutata atmosphaera temperiem eorum mutare nequeat. 2. Ultra ascendere succum communem, descendere vero succum proprium, si aër externus calidus sit, si aër frigidus. 3. Vasa aëria non posse, vasa succi comprimendo, cedere ut is celerius aut tardius moveatur, nisi posterius in-

deantur

derentur valvulae, quae cum rostra moveri cogerent; positis vero valvulis, ingressu succi prohiberetur. Verisimiliora quaeramus.

Demonstravit ingeniosus Hill, cuticulam plantarum cum organis formari, talisque instrui, quorum oscula arboribus et fruticibus externe sunt aperta; plantis vero herbaceis externe occluduntur. In arboribus et fruticibus sunt vasa aëria: Planta sub antliae aëriae recipiente vacuo posita, in cuticulam intrat aër, et non nisi per lignum, ubi vasa aëria collocantur, emittitur. Quae, si attente consideramus, locus erit concludendi, aëra per ea vasa cuticularia in vasa aëria immitti. Sic lenis calor, primo vere, nictula vasorum cuticulae, frigore praeteritis contracta, resolvit et expandit: Spatio dato, statim influit aër externus, et ad radices gravitate sua tendit; quibus, sicut fibris animalis motricibus, *impulsus* addit, et comprimendo etiam succos sursum propellit. Plus aëris etiam internis plantis motibus evolvitur; et omnis demum aër, una cum materia perspirabili, emittitur. Ita perpetua est in plantis circulatio, quae potentias succos moventes adjuvat, ab eisdemque adjuvatur.

Duo restant, quae hanc opinionem confirmant, et simul ostendunt, plantis, perinde ac animalibus, respirationem impeditam motum fluidorum impedire, et interceptam, interrompere. 1. Hiemale tempore, complures arbutusulas solapone gummi masticis olei, et pannis praeterea cera oblitis involvi, exerts solummodo ad auras summis. Hoc statu, per proximam aestatem servabantur; et factum est ut quaedam earum languide viderent, pauculis tantum foliis protrusis, ac reliquae omnes, quibus aer accuratius exclusus fuerat, ad unam mortuae sint. 2. Arboribus musco obductis paucula sunt folia, surculi, debiles, fructus nulli: Hoc igitur laudandi hortulani, quod cortici arborum annosarum, tempore veris, muscos auferunt, ad aëra libere immittendum, qui et viriditatem et fructum eisdem restituebat. Haec de cursu fluidorum in plantis.

Jam potentiae, istorum fluidorum motrices, considerandas.

Attractio capillaris, ex sententia quorundam est causa motus succorum plantarum; eaque evaporationem superficiei foliorum factam sequi perhibetur. Nuper vero vium vitalem, quae fluxum succorum promoveat, plantis tribuerunt botanici; ad quorum sententiam, re attente considerata, accedere libet; idque ob sequentia argumenta.



1. Descensum succorum, hoc est, eorum e ramis ad radices regressum, explicare non est, nisi posita vi vitali, quae matum dirigat. Nequit enim fluere liquor (tubis capillaribus, nisi si minus ab altera extremitate resistatur; et posita minore resistentia a superiore extremitate, videre quidem foret, quo modo foliis calore externo affectis ascenderet succus; obscurum autem maneret quomodo descenderet succus, cum atmosphaera sola sit calidior. Constante descendit succus proprius; neque alienum est existimare, aliquantum succi communis, et interdum et nocte, similem cursum tenere.

2. Ideo vim muscularem multis plantis concedimus, quod, stimulis admotis, actiones exerunt. Spontaneus motus quarundam plantarum idem confirmat.

3. Lumen plantis illapsum perspirationem iis adauget (a); lumen item folium inversum in positum priorem revolvit (b); tenebrae contraria efficiunt, et somnum plantis, etiam si calor aeris periret immutatus, obducunt. Hi effectus, naturam plantarum irritabilem, seu vim muscularem, probare videntur.

4. Si fluida plantae vasis transmittantur, id quod supra probabile reddidi, anne putandum, vasa ea ita exigua esse, ut, ope solius attractionis capillaris, succum in summam arborescens tollendo, idonea sint?

5. Posito, fluida ex capillari attractione sola moveri, qui sit, ut succus vitis, si incisum vere facta fuerit, effluat, si aestate, cohibeatur? Vasis enim manentibus immutatis, et calore saltem non imminuto, aequè ubertim aestate ac vere effluere debet succus. Exinde equidem crederem, aliud ac attractionem capillarem, ad succum movendum requiri.

6. Fluida sua non disperdant tubi capillares, transverse fracti. Qui vero sit, ut vitis transverse secta, tantum, experiente Stephano Hales, liquoris effundat?

7. Quomodo planta et animal, quod infra explicatio notabitur, multis se invicem referant, primum est credere, fluida utriusque similibus potentia moveri. Respiratio et motus muscularis sunt animalis actiones; de his in plantis, supra dictum; et observata movent, his potius, quam attractioni capillari, motum fluidorum in plantis debere.

Huc referrem, quae nuper expertus sum, ut viderem quemadmodum aer variis effluviis impregnatus, his, solutionisque salinae, plantam afficiant. Haec tamen, utpote adhuc

(a) Vid. Philosophical Transactions.

(b) Vide Bonnet sur l'usage des feuilles.

adhuc imperfecta, nolim in praesentia proponere; sufficiat quod confeci, summam proponere, nempe res esse, quae fibras nutritrices stimulando, plantas adaugescere efficiunt.

Quaedam etiam sunt functiones, oeconomiae vegetabilium necessariae, quas etiam explicare conarer.

Plantae, velut animalia, perspirant, et utrisque perspirationis maximè est momenti. Experientibus Hales (c) et Guettard (d), materia plantarum perspirabilis nihil differt ab aqua pura, nisi quod ad putredinem paulo est promior.

Quantitas perspirationis, pro superficie plantarum, tempore diei, et humiditate atmosphaerae, variatur. Quum maxima pars plantae superficiei foliis impenditur, concludere liceat, numerosa folia copiosam perspirationem gignere. Rem ita se habere, experiendo invenit Stephanus Hales (e); et experimenta ejus ostendunt, pro foliis numerosis paucisque, perspirationem plantae copiosam parcamve existere. Gradus item caloris, quo afficitur planta, eodem auctore, plurimum quantitatem perspirationis variat, ut copiosius calido, parcius frigido aëre, perspiretur. Neque nihil efficit gradus lucis: Namque, experiente Philippo Miller, constat, copiosius tempore prumeridiano perspirari, licet temperies aëris, toto die, immutata maneret. Docet etiam Guettard, harum rerum idoneus auctor, copiosius perspirari, si planta radiis solis obijciatur, quam si eadem aëris temperie sub umbra cresceret. Atmosphaera denique siccata, humidave, plus minusve, et par ratione, perspirationis efficitur.

Quo vegetiores sauloresque plantae, eo uberius perspirantur; ista actione, ut caeteris, plurimum a vi vitali pendente. Perspiratio modum excedens plantis nocere, et aliquando eas interimere videtur: plus minus nocet cohibita. Compertum quoque est, foliis praecipue et furculis perspirari. Quo haec functio itaque recte perficiatur, omnia folia decidua sunt; et, in arboribus sempervirentibus dictis, ut organum illud perspirationis rigidum evadat, nova folia deinceps exacto uno aut altero anno, prioribus succedunt.

Primus observavit Steph. Hales, plantas, si atmosphaerae humidae objectae fuerint, humiditatem inde attrahere.

Hale

(c) Vid. Statical Essays, Vol. I. p. 49.

(d) Vid. Mémoires de l'Académie des Sciences, 1748.

(e) Vid. Stat. Essays, Vol. I. p. 99.

Hæc absorptio æquæ ac perspiratio, intervenientibus foliis, perficitur; sed qua ratione, nondum constat.

Auctore Guettard (f), copiosius superiore quam inferiore foliorum pagina perspirant: Auctoribusque eodem Guettard, Du Hamel (g), et Bannel (h), ulterius inferiore, quam pagina superiore, absorbetur. Quam, ut manifestum fieret, duobus similibus foliis electis, pagine unius superiori et alterius inferiori, solutionem gummi masticæ obduxerunt; et factum est, ut hinc levius evaderet, illud nihil fere ponderis amiserit. Tum folia similia superficiel aquæ imposita: Quorumque foliorum pagina superior aquæ incubuit, ea nihil fere pondere aucta, paucis plerumque diebus mortua sunt: quorum vero pagina inferior aquam contigit, ex ponderosura facta, menselque complures viguerunt.

Ex dictis patet, et perspirationi et absorptioni eadem vasa non interservire, sed alterutri functioni sua esse organa. Vulgo existimatur, maxime aëre calido perspirari, eodemque frigido et humido, absorberi. Sed absorptioni sua sunt vasa, inferiorum paginam foliorum occupantia, quæque, nisi constanter agerent, marcescentia occluderentur. Omnibus organis absorptioni interservientibus peculiaris est structura, actioque cum vita conjuncta: Idem talis organis foliis subesse creditur, quod, foliis aridis aut mortuis cessat omnino absorptio. In radicibus quoque, per absorptionis rationem; namque, si radices hypocythi, ex aqua crescentis aliquantulum abscissæ fuerit, continuo moritur tota radix, novæque radiculæ emittuntur, quibus ab extrema parte peculiaris est organis, ad nutriendum aptus.

Materia noxia cum perspiratione educta, nisi multum diluta, delicatis foliorum fibrillis noceret; sed, simul atque ad summam folii cuticulam elicta fuerit, excernitur; quiddam tamen illius liquoris, in usum secretionis, qui hinc succo antea præparato perfici nequit, reabsorbetur. Corpore item animalis, materia salina et putrescens, quæ cum urina exit, etiam si renis substantiæ delicatæ, nisi multa aqua diluta fuerit, noceret; tamen vesica demum ad tempus servatur, ubi nonnihil aquæ, relictis materiis excernendis, iterum in sanguinem refunditur. Similis fere est perspiratio quoque animalium: Quidam ipsa utile, per vasa forsan externe aperta, quæque alia sunt ac exha-

VOL. III.

3 M

lantia,

(f) Mem. de l'acad. des sciences. 1749.

(g) Vid. Phys. des Arbres, tom. I. p. 134.

(h) Vid. Traité des sevelles, memoire 1.



lantia, superficiei corporis recipient: Quod confirmat et pedilorum, ex quo saepe magna vis aquae in corpus inferitur; et evacuatio urinae, in morbo diabete dicto, ubi urinae quantitas emissae eam liquidi ore assumpti excedit.

Neque animalibus, neque plantis, mentium est absoluta perspiratio aut absorptio; hoc solenniter dici potest, alteram altera, hoc vel illa casu, ubertatem esse. Exempli gratia, si uno die Helianthemum unciis viginti ponderis deperdit, altero die equaliter pondus perdet, et tertio die unciis decem gravitas sit; inde solenniter concludendum, quantitatem perspirationis aliquando absorptionem superare, aliquando ei aequiparare, et aliquando eam minorem esse.

Plantis facilis est partes suas formandi, quae formatae secretio vocatur. Quaedam vero sunt potentiae, quae hunc effectum producant, conspiciere quidem possumus, quae ratione percipimus, ignoramus.

Plurimum viget animalium vis vitalis, quae princeps est partem suas novas ferrendi et varie disponendi. Plantis vero ea vis languidior est; illis neque sufficeret, nisi huc quoque absorptio et fermentatio conferrent. Vis enimque ferrendi est firmior calvaia, cuius convolutum habent vase, qui fermentationi et liquidi tenuiores absorpti locum praebet. Sic insensitum nuclei fructuum recipient, interseptionibus fibris multum convolutis: Tum deum formari videtur succus proprius, quam succus communis a foliis, qui ascenderat, ad radices vertos, restat. Lignum etiam fit, descendente succo communi: Vincula enim cortici arboris injecto, lignum supra vinculum crassius evadit; infra id, in longitudine immutatum.

Palula, unde materiam secretionum hauriant plantae, elementis circumpositis continentur. Quam aquam e solo trahunt, ea praecipue easdem nutrit: Quiddam autem a lumine solis recipient, a quo maxime qualitates sensibiles pendunt. Haec de re item paucis expressus sum, sed nunc ea exaltitudo, ut experimenta in medium proferrem.

Quibusdam botanicis persuasum, plantis, sicut animalibus, circuitum esse sudorem regularem. Aliis improbabile videatur talis circulatio; et utriusque ad experimenta decurritur, unde conclusiones, sibi invicem pugnantes, deduxerunt.

Vincula arboris injecto, ut nullus per corticem transire possit succus, supra vinculum amplius crassescit arbor, infra id priorem crassitiem servans. Experimentum, unde quidam collegerunt, per lignum ascendere succum, et per

corticem ad radices regredi. Quibus contraria est sententia repertum est, ceteris calibus, per corticem solum ascendere succum: Extracta enim portione ligni, et reposito exacte cortice, pergit crescere arbus immutata: Hinc dicitur, succum per omnes partes aequè transmitti. Experimenta utrinque prolata vera sunt, sed male ab experimentis utrinque conclusi videntur. Opinioni priori, succum, scilicet per lignum ascendere, et per solum corticem reverti, favere existimatur analogia naturae animalis; quam analogiam tamen, non satis longe, nec ad omnia profecti sunt. Non partes internas unas occupant arteriae animalis, nec omnes partes externae, venae; sed tota distributione sibi invicem sunt comites. In plantis, ascendit radicibus succus communis; ramis vero descendit succus proprius; ex succo, inter descendendum, conterescit lignum; et absque constanti subiorum est actio. Haec probabile reddunt, circuitum esse succorum; qui si fiat, vasa ei intervenientia, ad instar vasorum animalium, ubique juxta se constitui credendum.

A vi denique vitali pendet incrementum et formatio partium plantarum; sed haec vis, non nisi stimulis admota, exoritur. Rationem ei consilium, quibus planta creatur et sustinetur, admiramur; sed nullam putamus esse intelligentiam, quae functioni cuiusque peculiari praesideat. Plantae et animalia, et structura sua, maxime stimulis pareant; omniaque organismo instructa, ex legibus generalibus, non occasione notis, et agunt et conservantur.

Per omnia diffundi videtur principium vivendi, etiam si peraeque non omnibus conceditur. Animalibus maxima pars est vitae; sed ubique species infra speciem locatur, descendente tam sensatione organica, quam eorum sagacitate. Descensus autem perennis, et ita gradatim factus, ut imperfectissima in specie superiore, perfectissima speciei proxime inferioris, et appropinquent et commisceantur.

Tum indissoluta servatur catena qua conjunguntur plantae et animalia. Utrisque est facultas simile sibi procreandi, et utrique similis procreandi ratio. Animalibus humillioribus haud ita multum est sensus et motus: Corallium et polypus saxi adhaerescunt, ut plantae solo; et, periinde ac plantae, si sedibus suis divulsa sint, moriuntur. Plantae item sunt, animalia multis referentes: Borrho Chondoli, super India adlato, inesse principium vitae, demonstrat minus sulcorum sponte et constanter factus. Sensitiva Mimosa, Muscipulaeque Dionaea, vel levissime

tactus, mirum in modum agunt, et hospites muscas, aliave insecta, suis clausis corripiant.

Vivere eas plantas, ut reliquas, concessum: Sentire quoque suspicari. Neque perperam rectene factum sit, una voluptas et doloris capaces esse animantes, affirmare, satis fecit. Illud equidem affirmarem, quaedam plantarum et animalium generatione communia, et plurima utrisque eadem et consimilia, sensum utrisque esse communem indicare. Brutis regulas unde plantae, omni casu animalibus fecerantur, tradere conaremur. Sunt animalia, quae vivunt terrae adhaerentia, et sicut plantae, per cutis poros, aluntur: Neque non reperiuntur plantae, animalia vita et forsan sensu superantes.

Ubi vivendi principium, ibi organismus peculiaris. Neque minus prudentis consilii, ad plantam quam ad hominem, conservandum opus. Vita plantarum perspecta, botanica in philosophiae disciplinam convertis, et floribus pulchritudinem, arboribus dignitatem, superaddit.

Restat ut me excusarem, quod, medicos honores affectans, rem omnino botanicam tractantem suscepi. Uno verbo responderi velim, ita plantis cum animalibus convenire, ut plantarum cognitio nonnihil luminis physiologiae animalium affundat; quamque pro remediis et alimentis usurpentur toto orbe vegetabilia, eorum naturam medicum animadvertere oportet.



DISSERTATIO PHYSIOLOGICA INAUGURALIS,  
DE  
ALIMENTORUM CONCOCTIONE;

QUAM, AGENUENTE SUMMO NUMINE,  
EX Auctoritate Reverendissimi Viri,  
D. GULIELMI ROBERTSON, S.S.T.P.  
Academiarum Edinburgensium Professoris;

REC. HON.  
Anglicani SENATUS ACADEMICI Censura,  
et Notissima FACULTATIS MEDICAE Decretis  
PRO GRADU DOCTORIS,  
SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS EIVS ET  
LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT  
EDVARDUS STEVENS, A.B. ex INDIA OCCIDENTALI,  
Soc. Med. Edin. Sod.

Ad diem 12. Sept. hanc locoque solitis.

---

The main object of Natural Philosophy is to argue from Phenomena,  
without tracing Hypotheses. New York.

---

1777.

---

Viro Celebratissimo,  
ALEXANDER MONRO,  
Rei anatomicæ,  
In academia Edinensi,  
Professori,  
Omnibus, quæ medicum philosophumque faciunt,  
Imprimis ornatis;  
Ob plurima beneficia,  
Quibus ab eo fuerit affectus,  
Hanc dissertationem  
D. D. C. Q.

AUCTOR.

## DE ALIMENTORUM CONCOCTIONE.

## P R O O E M I U M.

**C**AUSAS, quae concoctionem expediant, rite investigate, a primis medicinae seculis, ad nostrum usque, pro virili consili sunt medici; cæteram ex incommodo mortalium accidit, hypotheser vanae et otiosae, quas cupidius fuerint secuti, eos in errorem plerumque incidisse, et in causis fuisse, cui operam hanc in argumentum persequendo frustra posuerint. Si multas theorias inuicem leviter etiam percontas, quas philosophi, cum antiquiores tum recentiores, operibus in suis memoriae procedas curarunt, quam difficilis quamque obscura hujus naturae natura sit, te fugere non poterit, et eandem nulla per ratiociniam, rebus veris et observationibus neglectis, plene exponi et illustrari posse, tibi ex toto persuasabitur. Quae miranda et arcana natura agit, ea adeo in obscuro posita sunt, ut, cum nobis ordine naturali obijciuntur, sensus adeo fugiunt, ut acutissimi et ingenuissimi ea intelligere et perspicere nequeant, nisi sibi naturam per seipsum experimentorum numerosam et regularem indagandi laborem suscipiant. Nisi hoc feceris, te ullam rerum naturae veram notitiam tibi adepturum esse, frustra sperabis (a).

Investigationem autem hujusmodi, variis ingenii nostri admodum diffisi, aggredimur. Quam difficile argumentum sit, quamque parum ad id argue accurate, ac utilitas ejus postulat, considerandum sufficiamus, non ignoramus. Necessè vero est, ut operi simus imparis, quod nonnulli scriptorum seculi praesentis celeberrimorum exequi non designati sunt, cum juniores parumque experti simus, et pauculos tantum annos rei medici operam navaverimus. Id tamen aggredi non gravatur, candore publico confisi, qui nunquam non plantis scientiae infirmas protegit, quique, uti speramus, errores, quos, ob vices animi minus vividas, negamus vitare, excusatos habebit. Hoc saltem nostrum consolamur, quod conamina nostrae forsitan alicui, vera ingenii nostra divite praedito, hoc argumentum grave, quod hucusquam factis adhuc illustratum, altius agitare, penitusque intraspicere in animum inducent.

Antequam vero modum, quo haec functio obscura per-

(a)

pat, exponere incipimus, quasdam de substantiis diversas, quibus pro cibo uti consueverimus, non alienum erit notare.

## CAPIT. I.

## HOMO ANIMAL OMNIVORUM.

**I**N scholis medicis diu fuit certatum, utrum cibum animalalem, vel ex oleribus confectum, homini natura destinasset. Haec autem res facile dirimetur, si invenimus calas varias, quae a vi imaginandi hominis vividius fuerint profectae, in punctum temporis relinquamus, et earum nationum, quae imperiis naturae paraverunt, nec vi consuetudinis, nec artibus luxuriae perniciosas, in errorem inducatur, morem consideramus. Et testimonio scriptorum omnium fere seculorum evidenter apparet, cibum utrumque, propemodum ubique terrarum commixtum, et in usu communem fuisse. Structura quidem corporis humani, appetitus hominibus proprius, et moris, qui ab usu vel animalis, vel ex oleribus confecti, solus oriuntur, leviter considerata, alimentum mixtum generi humano naturam destinasse testantur.

## CAP. II.

## CIBUS VEGETABILIS.

**M**USEIONIS sapiensque mortalium genitor non tantum animalia innumera in usum eorum creavit; sed hunc quoque terrarum orbem floribus et fructibus ornavit, et alimentis deliciarissima is liberaliter comparanda curavit. Quae omnia quidem frustra facta fuissent, nisi genus humanum organis ad ea fruenda accommodatis intulisset, et ad ea et desideranda et quaerenda proclive reddisset; quod, ea est ejus benignitas, haudquaquam neglexit. Caeterum, e plantis innumeris et pulcherrimis, quas nobis benevolus suppeditavit, instinctu raro fallaci, quod quidem mirandum, moniti, et experientia docti, nocivas facile fugimus, tutas, salubres, gratas tantum seligimus. Mires et odoris expertes, gustos gratas, suisque nutritionis praebent; acres, contra, et nauseosae ingratae et alienae (b).

Ut fructus terrae aliis in regionibus alii sunt, ita incolae omnis fere regionis vegetabilia diversa adhibere consueverunt. Alii pomis, alii radicibus potissimum victitant; fru-



frumentum vero nutrimentum vegetabile præcipuum omnium nationum constituit. Ita hordæum, locale, et avenæ alimentum partibus orbis terrarum septentrionalibus; triticum, oryza, et frumentum Indicum australibus Africae et Americae; frumentum Europae proprium Indiae Orientali liberaliter sufficiunt.

Quamquam vegetabilia, odore, sapore, colore insigniter differunt, omnia tamen quantitatem materiae communis amplam continent, quae ad animalia alenda quam optime accommodatur, et locustas nutrimentum pro quantitate, quam comprehendunt, materiae oleosae saccharumque reddentis (c). Propter saccharum, quod partem eorum componit, facile vinosam et acetosam fermentationem, et sponte unam vel alteram, subeunt (d).

Omnes substantiae animales a vegetabilibus originem ducunt; sed haec nihilominus ab illis, antequam viribus ventriculi concoctricibus objecta, et ad systema sanguiferum intrandum apta redacta fuerint, revera plurimum discrepant. Vegetabilia facilius accedunt, et e corpore per perspirationem expelluntur; sed tamen accrius, quam cibus animalis, solvuntur (e). Minus materiae nutrientis comprehendunt; igiturque minus sanis et valentibus conveniunt. Hanc ab eausam, licet ii, qui alimento vegetabili potissimum victitant, sensus acutiores, vim imaginandi vividiorē, judiciumque argutius habeant; corpora tamen eorum minus firma et valida, quam eorum qui carne nimis liberaliter utuntur. Cibus e vegetabilibus constans, absque multo incommoito in regionibus calidioribus, copiosissime adhiberi potest; in frigidioribus vero, ubi tempus anni procellosum, perspiratio parca, nullaque insignis ad putredinem proclivitas, quantitas cibi animalis major sumi debet.

## C A P. III.

## CIBUS ANIMALIS.

QUO tempore cibus huiusmodi ab omnibus corporis adhiberi, ita quere difficile. Primum per secula, cum mortales nihil, cuius usum non monstrarat natura, adhuc desiderarent,

(c) Vide Cullen's instituta, p. 167. Idem, Mat. Med. p. 47.

(d) Praeter fermentationem vinalem et acetosam, supra comprehensam, aliud fermentabile studium est, quod a rebus animalibus vegetabilibusque committitur, et liquorem dulcem edit, et, haec ab eorum, a Cel. Mc Bride, *doler* esse male nominatur.

Mc Bride's Experi. Essays, Essay I. p. 8.

(e) Vide Exp.

sederant, cibus eis salubris simplexque erat, et ex vegetabilibus potissimum constabat. Post diluvium vero brevi, cum homines numerosiores esse inciperent, et consuetudini victus cultiori studerent, carnem animalium sibi necessariam esse putavit luxuria. Et eo tempore vix animal est, quod terram aut mare tenet, quod aliqua natio non pro cibo habuit. Aliis cibum salubrem et gratum incolae oceanus squamosi, aliis caro potissimum praeberet. In nonnullis regionibus pro cibo delicato habentur, equus, alinus, et camelus; in aliis vero, ab humanitate non ita alienis, ruminantia, ut bos, ovis, et caper, caeteris anteponuntur.

Substantiae animales moelce sumptae satia nutritivis, ejusque idonei, praebent; immodice, morbos dolentissimos et periculosissimos faciunt. Ob plurimam materiem nutritientem, quae illis inest, corpus plenum reddunt, et homines ad morbos putridos et inflammatorios proclives efficiunt. Ad putridinem magis, quam vegetabilia, vergunt, et fermentationem putrefacientem facile subeunt. Omnes substantiae animales putridae vel putrescentes fermentationem in farinaceis et plantis visculentis movere, et eandem in his, quae fermentationi aliqua ex parte jam obiecta sint, renovare possunt.

Quaquam omnia cibi animalis genera materiae corporeae adeo similia esse videntur, ut nullam aliam, quo ad consilia oeconomiae humanae accommodentur, mutationem, quam uti fluida reddantur, requirant; omnia tamen inter se multis differunt, pro spatio quod habuerint, specie, et praeparationibus, quas subierint. Hoc discrimen in causa fuit, cur eas substantias, quae celeriter et facile concoquantur, ab eis quae spatium longius desiderant et difficilius solvantur, secernere fuerimus conati. Investigatio hujusmodi non modo jucunda sed utilis est, et, cum rebus veris et observationibus suis possit inniti, seriem experimentorum in homine et animalibus, quorum organa concocticia humana magnopere referunt, instituendam curavimus.

Ex hisce experimentis evidentissime constat, vegetabilia, quam cibum animale, difficilius concoqui; olea fortitan quam farinacea; pisces celerius quam carnem; quadrupedes quam aves; animalia aetate provectiora quam juniora; et cibos omigenos, bene coctos, facilius, quam crudos (*f*). Diveria, quae regna animale et vegetabile constituent, hoc modo per seriem experimentorum continuam et accuratam ex omni parte medicinae dieteticae

multum luminis offunderet; cum vero quaestio hujusmodi nimium temporis spatium desiderasset, eam in praesens omittere, et alia non minoris momenti persequi sumus coacti.

## C A P. IV.

## CONDIMENTA.

**P**RAETER eas substantias, quae, propterea quod materiam humidorum aut solidorum corporis humani sufficiunt, non absque causa gravi Alimenta vocantur; aliae sunt, quae Condimenta appellantur, quaeque ad saporem tantummodo cibi gratiorem reddendum, vel ad quibusdam vitis, quae alimentum inter coquendum facile possunt incidere, occurrendum conferant. Harum plurimae sunt, quarum maximam partem subministrant regna fossile et vegetabile. Omnes tamen enumerare, supervacaneum foret. Igitur sal, saccharumque solummodo breviter considerabimus, utpote quae omnium condimentorum maxime necessaria sunt, plurimumque adhibeantur.

Sal, rerum animalium condimentum pernecessarium, saporem alimento gratiorem conciliat, idemque palato acceptius reddit. Appetitum movet, et excretionem auget. Modicum, magnam carnis ad putredinem proclivitatem accelerat; et liberaliter adhibitum, eandem sistit aut tardat (g).

Quaecunque condimenta in praesentia novimus, omnium saccharum maxime utile et gratissimum. Magnam nutritivam quantitatem continet, vim antisepticam potentissimam habet, resque animales adversus putredinem tutiores, quam sal ipsum, reddit (h). Huic sacchari dosi antisepticae (i), quod per centum proximos annos alii cibi acescenti liberaliter fuit adjunctum, Pringelius celeberrimus magnopere tribuit, quod morbi putridi gradatim magis magisque rari evaserunt.

## C A P. V.

## POTIO.

**C**IBO solido amplam humorum quantitatem addere solemus, cujus maximam partem constitunt aqua et liquores spirituosi. Haec oeconomiae animali multum

(g) Pringle's army-diseases, appendix, exper. 25.

(h) Haller's element, physiolog. tom. vi. p. 223.

(i) Pringle's army-diseases, appendix, exper. 26.



tammodi secum afferunt; caeterum limites hujus opusculi angustiores non sinunt, ut de hoc argumento solius dicamus. Igitur ad hosce humores considerandos transibimus, qui in coctione cibi plus videntur praestare.

## C A P. VI.

## SALIVA.

**H**AEC humor aquosus est, a parotide, maxillari, sublinguali, aliisque glandulis conglomeratis, secretus. Viscida in aquam acre diffunditur, nec facile cogitur frigori objecta. In animalibus carnivoris acris et salina. In quibusdam serpentibus, ut in viperis, subdulcis et insipida.

De dotibus hujus humoris auctores magnopere inter sese differunt. Stahlus (*k*), Boerhaavius, Hoffmannus, McBride (*l*), alique scriptores celebres, fermentationem movendi potestatem ei tribuunt, et hisce substantiis, quae fermentationem vegetabilem possunt excitare, accensent. Illustis, contra, Pringelius (*m*) eam putredinem tardare, et, quo minus fermentatio immodica fiat, obitare testatur; et ex experimentis ejus, dotibus hujusmodi praeditam esse satis evidenter patet.

Saliva cibo, inter mandendum, constanter admiscetur, et ad eum ad concoctionem parandum adeo necessaria est, ut eam exipiendo imprudenter consumere, morbus molestissimos et periculosos facere soleat (*n*).

## C A P. VII.

## LIQUOR GASTICUS.

**O**B magnam hujus liquoris puri, et ab aliis ventriculi humoribus separati, comparandi difficultatem, naturam ejus veram et dotes hucusque magna ex parte ignoramus. Non pauci modis diversis hunc quantitate tanta, ut experimenta in eum possent institui, colligere sunt aggressi; haec vero conamina non tam rite processerunt, ut futura supervacanea reddiderint. Ex periculis humoris gastrici mali et avis, quae a Rastio (*o*) jam fuerint facta, cum liquorem salivae simillimum esse apparet. Mucosus et viscidus

3 N 2

(*k*) Vide Froidam. Chym. part. 2. tract. 1. sect. 1. cap. 3.

(*l*) Experim. essays, p. 16.

(*m*) Army-diseases, append. p. 51.

(*n*) Halleri Phys. tom. vi. p. 62.

(*o*) Halleri Element. Physiolog. tom. vi. p. 143. sect. 1. lib. 12.

cidus est. Acidis vitriolico et nitroso admixtus fermento, felle. Syrupus violarum, aliosque liquores vegetabiles sacculus, colore viridi impletur. Celeberrimus Reaumurius (p), quantitatem hujus humoris e venarum luteonis per spongiar, quas cum devorare coepit, sibi comparavit. Examinatus, opacus, saporis salini, et coloris albidii, et ad flavum vergentis, esse repertus est (q). Et e periculis, quae quantitas parvula collecta occasione ei faciendi subministraverit, cum vi antiseptica praeditum esse, cum rerum animalium potenter retardaverit putredinem, coegit. Haec autem sententia, in quam concessit, experimentis (r), quae postea referemus, magis etiamnum confirmatur. Ex his quoque constabit, cum fermentationem retardare et moderari, et ad cibum solvendum multum conferre.

Natura eorum, unde nutrimentum nobis deducamus, et humoribus diversis, quibus adulescantur, jam consideratis, proximum est, ut mutationes varias, quas prius subeunt, quam in chylum vertantur, consilisque oeconomiae accommodentur, examinemus.

Cibus ore acceptus in particulas mandendo dividitur, et seci unque salivae accuratissime admiscetur, quae in tempore liberaliter secretur. Hoc modo dentibus divisus, in esophagum per oesophagum descendit. Pars hujus canalus superior pharynx appellatur, diversisque musculis, quibus peragitur actio devorandi, instruitur. In ventriculo magnum emendationis opus per certas causas promovetur, quae nunc investigare conabimur.

De nulla forsitan physiologiae parte, quam de modo quo emendatio fiat, magis discrepant medici. Quo igitur hunc rite conperiamus, nonnullas opinionum maxime celeberrimorum, quae hucusque invaluerint, excutere, necessarium esse ducimus. Ab his, quae primorum medicinae seculorum propriae fuerint, incipimus.

## C A P. VIII.

## CULOR.

**H**IPPOCRATES, ille celeberrimus medicinae consultor, concoctionem ratori tribuit (1). In hanc sententiam facile iuvant Galenus (2), ejusque sectuli. In scholis quidem

(p) Mémoires de l'Académie des Sciences, Ann. 1723, p. 721.

(q) Hucusque nullius est cuius colore salivae et opere salivae.

(r) Vide JOURN. 23, et 25.

(s) Celsi, praefat. p. 5.

(t) De usu parti lib. 1. cap. 8. Facult. nat. lib. 3. cap. 2.

dem medicis inveteravit, nec repudiata est, donec homines, non amplius verbis meris in errorem abducti, doctrina Galeni minus suspicere coeperunt. Quamprimum vero mortales, vinculis auctoritatis exutis, libere, et ut viros decuit, ratiocinari ausi sunt, haec ubique fere contempta habita est. Et calorem quidem, quanquam mensuris ventriculi diversis vim possit addere, pro causa tamen concoctionis principis haudquaquam esse habendum argumentis valitis, demonstrare facile foret. Quinetiam calor corporis humani proprius nunquam tantus est, quantum hoc praestare valet, et pisces, quamvis aqua sibi circumdata non multo calidiores sunt, cibum tamen facillime concoquant. Operae vero non est argumentis pluribus uti, cum Fernelius (y), Helmontius (x), alique auctores celebres, hanc opinionem fallacissimam esse, et calorem cibos minime solvere posse, haud dubie demonstrarint.

## C A P. IX.

## PUTREDO.

**C**IBUM in ventriculo putrescere, est opinio antiquissima, et primae medicinae origini fere aequalis. Empedocles, Plistonichus (y), Dionysius Aegens, et Diocles, in antiquis primi fuerunt, qui ita putarunt. Nonnulli e recentioribus, viz. Iasterus (x), Knight (a), multique alii scriptores celebres, eandem opinionem renovare, multisque argumentis subtilibus et acutis firmare conati. Nulli vero fundamento stabili innititur, et leviter etiam examinata certissimis experimentis omnino repugnare videtur. Namque, quamvis anatomici ventriculos multorum animalium, quae viva fuerint incisa, summa cura examinarunt, nullum tamen putridum fermentum in eis repertum est. Et admodum quidem probabile nullam hoc in organo, nisi morbo labori, putredinem unquam incidere. Hic insuper, sanitare insulante, haudquaquam existere potest; etenim supra positum est, salivam, cui cibus humanus constanter admisceatur, vim admodum antisepticam habere, et succum gastricum docibus quoque insilem esse praeditum, haud dubie postea demonstrabimus. Licet vero alimentum in ventriculo putrescere concedamus, neutiquam inde

(y) Abdit. res. causar. p. 247.

(x) Calor effluenter non digerit, sed exercitat, &amp;c.

(y) Cels. praefat. p. 6. Le Ctre. hist. de la med. p. 38.

(z) De Hamor. c. 2. Ay. med. tog. p. 36. ed. 1.

(a) Vindikat. p. 22. 26.



inde sequetur concoctionem ab eo pendere; namque chylum blandum et inodorum, qui ad systema sanguiferum intrandum, et ad illud detrimentum, quod corpus humanum perpetuo capiat, reficiendum accommodetur, nunquam gignere potest putredo.

## C A P. X.

## TRITURA.

**A**LIMENTUM partes in parvulas tritura redigi philosophi mechanici diu sunt opinati; et igitur actioni ventriculi mechanicae concoctionem retulerunt. Hujus opinionis auctor celebris Erasistratus (b), vir literis et medicina quam maxime imbutus, postque cum multi eruditi, ejusdem patroni fuerunt. Quinetiam ei fidem firmare, et vires ventriculi et musculorum abdominis contractiles suas ad concoctionem absolvendam sufficere, rationes mathematicas subducendo probare conati sunt, Peyerus, Leuwenhoeckius, Borellius, Pitcairnius (c), Hecquetius (d), aliique, haudquaquam infimae notae, scriptores. Hae vero supputationes a principiis falsis profisciscuntur, omnino errant, votisque ad eas decurrentium minime respondent. In avibus granivoris, quibus ventriculus validis musculis instructus, et membrana crassa firmaque succinctus est, quaeque scrupulos, aliaque dura, quae ad concoctionem accelerandam conferant, devorare solent, vires hujus visceris, fere supra quam cuiquam credibile, potentes. Ventriculum galli et anatis sphaeras vitreas cavas in pulverem facillime redigere, et galli Numidici parietes cylindri ferrei, vi, aliquot librarum centuriis aequali, comprimere posse compertus Reaumurius (e). Exemplum quoque idem genus e scriptis Borelli (f) aliorumque peti possunt; idem vero in ventriculo humano incidere affirmare absurdum, igiturque philosopho indignum. Nihil enim similitudinis ventriculum humanum inter et avium carnivorarum interest; et, ubi tantum structurae discrimen offendimus, haud dubie ratio gravissima est, cur consilium naturae et hic et illic non idem esse concludamus. Haec opinio igitur ab omni seculi praesentis physiologo, qui rationem ducem secutus est, repudiata fuit, et argumenta plurima et acuta, et digna, quibus fides habeatur, eam refellendi causa in medium

(b) Celsus praef.

(c) In diss. de modo quo cib. coct.

(d) Hecquet de la digestion.

(e) Memoires de l'academ. des Sciences, an. 1722.

(f) De motu animal.

medium prolata. Cum vero limites, quibus hoc opusculum continere decreverimus, non sinunt, ut ea omnia recensamus, sequentium tantum, quæ, cum lectore candido iudice, eam falsam esse monstrabunt, mentionem faciemus.

1. Vires ventriculi et musculorum abdominis conjunctæ haudquaquam æque magnæ sunt, ac a Pitcarino celebri habentur. Namque experimenta Halesii (g), vim humani ventriculi viginti libras nunquam excedere, testantur.

2. Substantiæ, quas ventriculus concoquit, sæpe ventriculo ipso duriores et firmiores sunt, adeo ut hic prius laceraretur, quam illas magnopere posset afficere.

3. Canes, aliæque animalia prædantia, quorum ventriculi ab humano textura non differunt, ossa quotidie devorant et facillime concoquunt.

4. Vermes in ventriculo, absque incommodo, sæpe vivunt, alvusque uras Corinthiacas, aliasque res teneras, nec fractas, nec forma minima ex parte mutatas, non raro excernit.

5. Magna humoris quantitas partiimenti nostri fecæ constanter admiscetur, quæ trituræ tali, qualem in ventriculo fieri ponunt mechanici medici, foret magno impedimento. Namque, si pressura ventriculi, per humorem intercedentem, cibum admoveatur, figura hujus externa parum nihilve mutabitur. Hoc, nobis iudiciis, ex ea pressura undique æqua, qua humores solida in se immersa afficiant, facile et evidenter effici potest.

Hæc argumenta hanc theoriam, nostro iudicio, satis evidenter refellunt. Quo vero omnis dubitatio tolleretur, nullaque, super hac re, in posterum lis moveretur, experimenta (h) non pauca in homine, et quibusdam animalibus, faciendâ curavimus. In hisce experimentis, cibis, quamvis adversus actionem ventriculi mechanicam tutus redditus, ex toto solutus est; quod trituram in ventriculo nunquam incidere, sed coctionem per aliquam causam potentiorē fieri, clare evidenterque probat. Pericula, hisce similia, olim in avibus carnivoris et ovibus sunt facta, et, quanquam auctor eorum illustris trituram in classe priorē nihil præstare concedat, cibum tamen in posteriore partim per trituram solvi temerario et præpropere conclusit (i). Etenim actionem ventriculi in omnibus animalibus,

(g) Haematitica, Vol. II. p. 17.

(h) Vide Exp. 1. et 501.

(i) Reaumur, mem. de l'academ. tom. II. an. 1712. p. 221.

bus, quibus e membranis confectus sit, partes alimenti tantum diversas inter sese commiscere, sed neutiquam concoctionis esse causam, postea haud dubie probabimus.

C A P. XL.  
FERMENTATIO.

**E** Theoriis diversis, quas acumen philosophorum et ingenium, concoctionem, suomis quidem tentibus involutam, exponendi causa, excogitarunt, nulla est, quae argumentis majorem veri speciei praese ferentibus, et a pluribus scriptoribus doctis et celebribus coëstata est, quam quae eam a fermentatione singulari pendere ponit. Haec tempus per diuturnum ubique fere recepta est, et nuper per experimenta duorum celeberrimorum virorum (A), quorum opera medicinam magnopere excoluerunt, accurata et ingeniosa magis magisque firmata fuit. Quamquam multa super hoc optime fuerint exarata, nondum tamen comperta est satisque illustrata. Ad multa phaenomena explicanda non sufficit, et causa concoctionis sola neutiquam esse videtur. A viris autem tantis dissentire, aut argumenta eorum convellere conari, arrogantiam forsitan praesertim cum in investigationibus hujusmodi parum diu sociis occupati, nimiam existimabunt redolere. Hoc autem, et verum, quae juvenem nunquam non decet, modestia, suscipere decrevimus; hoc saltem nostrum consilium, candidos, verique rimandi cupidos, utrumque acriter in audaciam nostram juvenilem invecti fuerint, opinionibus receptis et verulioribus addicti, interceptum non reprehensuros.

Fermentationem haudquaquam penitus expellendam putamus; sed, quod hujus theoriae patroni potissimum eius reddunt, viz. in ventriculo incidere, id verum esse fateamur. Coereturum, hanc fermentationem rerum animalium et vegetabilium, in loco calido et humido commiscuimus, sequelam tantum necessariam esse; per humorem gastricum, ut vim eam movendi habentem, neutiquam excitari, et solum ad cibum solvendum nunquam sufficere posse, enixe contendimus. Hisce conclusionibus autem quoniam plurima argumenta favent, quorum sequentia tantum recenseamus.

1. Gastricus liquor tantum abest, ut fermentationem excitet et promoveat, ut, contra, eandem retardet et sistat (B).

2. In

(A) Cel. Fries. et Mc Bride.

(B) Vide Exper. 24.



2. In omnibus experimentis Pringelli et McBride, fermentatio multas, post res alimentarias commistas, horas semper incepit; cibus, contra, brevi, postquam captus est, solvi consuevit.

3. Ossa aliaque dura in ventriculis caninis, aliorumque animalium praedantium, multo breviori spatio concoquantur, quam vel fermentatione, vel putredine, digerí possunt.

4. Concoctionis in piscibus progressus clare perspicueque videri potest. Hi alios pisciculos plerumque vorant, qui multo, quam qui in parte ventriculorum eorum concoctrice possint contineri, ampliores sunt; et partem pisciculi, quae ventriculo includitur, magis minusve solvi, partem vero, quae oesophago inhaeret, ex toto sanam et incorruptam esse comperimus: Fermentationem autem, quolibet in corpore motam, in omnes ejusdem parvis brevi diffundi comperit habemus. Si igitur ex pisciculi parti, quae ventriculo contineatur, fermentatione solvatur, ex quoque, quae in oesophago haereat, ut iisdem fermentationis viribus objecta, solveretur.

5. Animalia carnivora quaedam vegetabilia coquere nequeunt. Carnem nunquam solvant animalia granivora et granivora. Hae tamen substantiae vinosam, acetosam, vel putridam, fermentationes sponte et facile subeunt.

6. Si fermentatio concoctionis causa foret, omnia, quae eam subire possent, in stomachis membranosis facile concoquerentur. Caeterum, ex experimentis Reaumurii plane apparet, buteonis ventriculum, quanquam corneum, ossa, aliaque dura, cito dissolveret, hordeum tamen elixum (m), quod multo facilius, quam reliqua, fermentescat, ne quidem minima ex parte motasse.

7. Ventriculi animalium diversorum a se invicem structura numeroque insigniter differunt. Si concoctio autem per fermentationem solam fieret, nulla structurae diversitate, sed superficie tantum magis extensa, magnitudini animalis pro rata parte respondente, opus foret.

8. Concoctionem perturbant, metus, moror, alique animi affectus; sed fermentatio nullam per ventriculi conditionem interpellaretur.

9. Quo plura fermentationis in ventriculo signa subsunt, eo tardior seriorque plerumque concoctio est.

10. Quae fermentatio singularis in ventriculo sit, eam extra eundem per artem nemo haecenus reddidit. Nec fermentatione mutationem, quam cibus in ventriculo sa-

bit, imitari possumus. Igitur, donec hoc fiat, ad motum intestinum solum frustra decurreres.

II. Solutionem cibi a causa fermentatione potentiori proficisci, aliqua ex parte pro certo potest ostendi (n).

Fermentationem solam ad alimentum coagendum nequam sufficere, si necesse esset, multis aliis argumentis demonstrare facile foret. Ad hoc aliquid eam conferre admodum probabile. Quidam vero, aut quantum praestet, nondum compertum habemus, et futura experimenta sola statuunt necesse est.

In omnibus investigationibus philosophicis, forsitan nihil difficilius, quam, cum duae pluresque causae ad idem praestandum conferant, singulis actionem suam, nihilque amplius, pro certo tribuere. Haece tamen causas comprimere operae est, quanquam, quomodo singulae agant, quantumque possint, pro certo nequamus affirmare. Igitur, ad aliam concoctionis causam, quae, si non sola sit, saltem praecipua est, dicendam transibimus.

## C A P. XII.

### SOLUTIO.

**H**UMORUM naturae singularis e tunica ventriculi secreti, qui in cavum ejus effusus cibum in usus oeconomiae accommodaret, vel, ut alio verbo utamur, concoqueret, multi scriptores veteres sunt opinati. Cum vero sententia conjecturae merae tantum, eo tempore, innoteret, nullisque argumentis, quae silem ei possent firmare, suffulciretur, a medicis philosophisque mechanicis praepropere fuit expulsa. Hoc autem fecerunt, quod, succum gastricum non minus ventriculum ipsum, quam ingesta, consumpturum fuisse, illis persuasum est.

Haec theoria vero, a nonnullis seculi praesentis medicis ingeniosis (a), qui, quam solida et stabili, ei fundamenta sunt,

(n) Vide Experim. 22.

(a) In monumentis academicae Gallicae, anno 1732 in vulgus editis, duas dissertationes ingeniosae super concoctione avium granivorarum et carnivorarum celeberrimus Remondinos emittit, in quarum posteriori per multa pericula, accurate atque tacta, concoctionem in omnibus huius animalibus, quibus ventriculi membranae sunt, potestati liquoris gastrici solvendi potissimum tribuendam esse, satis evidenter ostendit. Quinetiam Monphas clariss. hypotheses varias et inutiles sperans, et veritatem, ut philosophum decet, per res veras et observationes solas compendiendi desiderio solus, hanc opinionem multis gravibusque argumentis sustinere conatur, et quotiens

sint, monstrarunt, quae et olim fuerint objecta haud dubie refellerunt, et succum ventriculi proprium in cibo coquendo non parum posse magna observationum copia probarunt, esse renovata.

Probabiliorae hujus opinionis hisce argumentis, quibus fermentationi jam aduersati sumus, insignopere firmata est; quo vero omnia hanc spectantia magis clara et illustra efficeremus, sequentia in homine, et nonnullis aliis animantibus, quorum organa concocticia ab humanis non multum discrepant, experienda curavimus.

### EXPERIMENTUM I.

Hona octava vespertina viri (p) devorandam dedit sphaeram argenteam cavam, duas in partes per septum quoddam divisam, et multis foraminibus, quae oticulum possent admittere, pertusam. In alterum ejus cavum scrupulos carnis bubulae crudae quatuor et dimidium, in alterum scrupulos albumi crudi quinque inclusimus. Circiter unam et viginti horas, postquam sphaeram devoraverat, eandem exerevit. Inclusis accuratae ponderatis, caro bovina scrupulum unum et dimidium, piscis duos amississe, reperta sunt. Quid non solum manebat, magnopere emollitum est; nihil vero odoris ingrati emittebat.

### EXPER. II.

Pauculus post dies, eandem sphaeram devoravit, altero in ejus cavo uno scrupulo quatuorque granis carnis bovinæ crudae, in altero quatuor scrupulis octoque granis

praecedentibus in publicis, eorumque periculum a se factum meminit, quae ad hanc thesaurum etiam illam illudam plane conferunt. Denique vir celebris Husterius, in Transsylvanis Philosophicis, quasdam observationes nuper edidit, quae eandem opinionem plenius firmant.

(p) Haec in equite Pannonicæ, qui hanc urbem nuper invisit, experti sumus. Hic solidius et miserrandus vitam, non absque summo libi periculo, lapidibus devorandis vulgari oblectando, tolerare consuevit. Hoc facere incepit puer septennis, et, per spatium annorum viginti, vixit hoc modo sibi quiescitavit. Ventriculus nunc eadem distensus est, ut lapides plurimos simul possit devorare, qui non tantum in ventriculo plane possunt leniri; sed, repente hypogastriæ positi, supinum edunt, qui stare ab assantibus casuunt.

Singulae e sphaeris argenteis, quibus in experimentis uti sumus, duos dimidiumque digitos longae fuerunt, tria utramque quartam partem in circulo petierunt.

\* Anno 1754. Complura esse sphaerae quædam, postea dicitur tria forma certata, eodem tempore, cum solis. Quæ sphaerae in hanc et illam habuerunt. Omnia, prout dicitur, quantum quocumque nihil, ita bene et citius acque ac citius itum, superius, et solo consumpta sunt.



nis carnis bubulae elixae, inclusis. Post horas quadraginta tres excrevit. Caro cruda unius scrupuli duorumque granorum, elixa scrupuli unius et granorum sedecim, jacturam fecerat.

## EXPER. III.

HASCE autem substantias, si ante aliqua ex parte divisae fuissent, focculque solvens eas penitus intrasset, perfectius solutum iri suspicari, aliam sphaeram, cui foramina adeo ampla erant, ut his inferi posset calamus corvinus, comparavimus, et in ea aliquantum carnis bovinæ leviter manfæ inclusimus. Devorata est, et post horas triginta octo descendit. Caro ex toto soluta est.

## EXPER. IV.

QUAM facile eibus manus in experimento superiore fuerit solutus notantes, utrum, furaminibus adauctis, neque facile necne, non manus, solveretur, tentare volumus. Igitur in unum sphaeræ cavum scrupulum carnis suillæ crudæ et octo grana, in alterum eandem casei crudi quantitatem indidimus. Sphaera sumpta est, et, quadraginta quinque horas retenta, excreta. Ne minimæ quidem vel carnis suillæ, vel casei, reliquiae repertæ. Ex toto soluta.

## EXPER. V.

EANDEM sphaeram, altero in cavu aliquantum galli Numidici assæ, in altero aliquantum halecis saliti elixæ, continentem postea cepit. Quadraginta sex horas retenta descendit. Nihil vel galli Numidici vel halecis sese ostendit, Quicquid sumptum ex toto dissolutum.

## EXPER. VI.

RES animales, quamvis in sphaeras inditas, facillime concoqui comperti, utrum vegetabilibus, quæ ægrius solvuntur, idem necne incideret, cognoscere volumus. Eandem idcirco pastinacæ et batati crudarum quantitatem in globum inclusimus, qui devoratus quadraginta octo horis excretus est. Hoc et illam ex toto soluta esse comperti sumus.

## EXPER. VII.

PORTIONES quoque pomi et rapi, cum crudarum, tum assuæ, addidimus, et, post spatium triginta sex horarum, solutas esse reperimus.

## EXPER. VIII.

Globum in altero cavorum aliqua fœcalis, tritici, et hordei grana, in altero aliqua pisorum et avenarum, omnia siliquis non exuta, continentem, voravit. Multas canali in alimentario horas mansit; sed nulla eorum, quae sumpta fuerant, minima ex parte mutata sunt; præterquam quod pisæ, ob humorem quem imbibebant, aliquantum intumefacta et rupta.

## EXPER. IX.

Cum succus ventriculi proprius in partes rerum animalium molliores adeo potenter egisset, quamnam mutationem quoque in partes duriores, ut ossa, ederet, competire decrevimus. Igitur in alteram globi partem fragmentum accuratissime ponderatum, ossis femoris ovini, et in alteram aliquantum alae galli Numidici inferuimus. Hic globus sumptus est, et horis quadraginta ossi descendit. Os, rursus expensum, nullum ponderis detrimentum ceperat. Caro, contra, cutis et ligamenta artuum alae ex toto soluta sunt, adeo ut ala in due ossa, a se invicem sejuncta, fuerit divisa; ossa vero ipsa nullam mutationem, sensibus percipiendam, subierant.

## EXPER. X.

Cum inanima, in experimentis supra comprehensa, tam facile solverentur, quatenus animalia viva actioni hujus succi potentis possent obistere, periclitari statuimus. Quapropter hîrudinem, quae, quantum noverimus, nulla spîcula habet, quoque, ut experimenta a nobis instituta testantur, calorem humano aequalem ferre potest, comparavimus, et in unum e globis, qui foraminibus minoribus, ut hîrudo moribus suis ventriculo non noceret, inseruimus. Pannanius hunc sumpsit, et post solitum tempus excrevit. Nihil autem, præter subnigrum viscidumque humorem, qui reliquiae hîrudinis constrictae esse visus, in globo repertum. Huc experimentum postea reiteravimus, lumbricus adhilentes, et eos non minus facile solvi compèrimus; cum vero calorem humano parem non aeque facile ac hîrudines possint tolerare, eos prius extinctos esse, quam inceperit concoctio, probabile (y).

Plura hoc genus experimenta instituere nobis in animo fuit; cum vero Pannanius Edinburgo breve post tempus dis-

dis-

(y) Hîrudines forsitan prius quoque interruptae sunt, quam concoctio coepit.

discesserit, sequentia virium succi gastrici pericula in canibus, et classe animalium ruminantium, facere coacti sumus.

## EXPER. XI.

CUM canem trimensem a cibo, horis quatuordecim, abstinissemus, cum quatuor globos ex ebore conflatos, figura ovum reddentes, magnitudine diverfos, multa foramina parvula habentes, devorare coepimus. In primo aliquantum carnis bovinæ, in altero asini, in tertio batati, in quarto brassicæ, inclusum est. Singula horum cruda fuerunt, et grana sedecim accurate ponderarunt. Quamprimum hœc quatuor præterierant, canis occisus est, et abdomen ei patefactum. Globi adhuc in ventriculo fuerunt, et, quæ comprehenderunt, ponderata, quod sequitur, amiserant; piscis grana novem, caro bubula quinque, batatum tria, brassica unum. Globi ipsi quoque tenuiores facti sunt; cum vero focum gastricum in durum solidumque rube acturum esse non suspicaremur, non prius, quam sumpti, ponderati sunt. Igitur, quantum ponderis detrimentulo ceperint, statuere non potuimus.

## EXPER. XII.

CATULUM quinque menses natum nobis nacti, cibum ei per horas sedecim negandum, deinde quatuor globos, experimenta in superiore adhibitos, qui quantitates certas carnis ovinæ, rhombi, passinacæ, et batati comprehenderunt, dandos curavimus. Hæc omnia actioni ignis prius fuerant objecta, et singula grana sedecim ponderarunt. Post septem horas canis interemptus est, et globi e ventriculo ejus exempti sunt. Quæ continebant, ea, quod sequitur, amittere conspexta sunt; piscis grana decem dimidiumque, caro ovina sex, batatum quinque, passinaca nihil omnino. Globi tenuiores etiamnum, quam in experimento superiore, redditi sunt; sed eos prius, ut antea, expendere facimus obliti.

## EXPER. XIII.

CANIS sex menses natus, qui per spatium solitum cibo abstinerat, quatuor globos ex ebore compositos, qui in experimentis supra positis adhibiti erant, sumere coactus est. Inclesta sunt in primo carnis ovinæ grana sedecim, in altero totidem piscis elixi, in tertio totidem batati elixi, et in quarto totidem passinacæ elixæ. Octo horis præteritis, interemptus est, statimque incisus. Ventriculo  
rite



rite examinato, globi magnopere fuerunt mutati. Partes enim extremæ, non mediæ, ex toto solutæ sunt, adeo ut illis inclusa in ventriculo hæc illuc fluitarent. Omnes globi, antequam vorati sunt, tres scrupulos et grana sedecim; fragmenta vero e ventriculo collecta, unum et viginti grana tantum, pondere æquabant. Caro ovilla et piscis omnino concocta fuerunt; batatum undecim grana amiserat; pallinæcæ vero nulla ex parte erant mutata.

## EXPER. XIV.

Potentia succi gastrici, qui durum ebur, et brevī, posset dissolvere, obstupescit, aliis corpora dura ei obicere decrevimus. Tria igitur fragmenta ossis femoris ovæ parata, summa cum cura perpendimus, canique, cui cibum multas per horas fuerat negatus, dedimus. Septem post horas necatus est, et ossa e ventriculo exempta. Quorum iterum pensuram primum septem grana, secundum novem grana, et tertium duodecim grana, amiserat. Solutio a superficie eorum interiori incepit, centrumque versus progressa est, adeo ut cara eis non parum fuerint aucta (r).

Quinetiam canem portiunculæ cartilaginis devorare coegimus; sed succum gastricum eas haudquaquam mutare comperti sumus.

## EXPER. XV.

Cum et globi eburni, et ossa in experimentis præcedentibus, tam facile dissolverentur, aliquid durius adhibere necessarium duximus; et ideo complures tubos cylindricos stanneos, multis foraminibus instructos, paravimus. Cum canis cibo horas duodecim caruisset, quatuor ex hisce tubis ei dedimus. Continebant, grana sedecim carnis bubulæ assatæ primus, totidem vitulinæ alter, eandem sebi quantitatem tertius, et tantundem panis tritici quartus. Post decem horas morte affectus est, patefactus, et tubi e ventriculo exempti. Caro bovina et panis ex toto soluta esse reperta; vitulina, contra, jacturam tantum decem granorum, et sebum octo dimidique fecerat. Tubi ne minime quidem mutati.

EX-

(r) Quo hanc solutionem nec a fermentatione, nec ab acido, præstici compertum haberemus, ut ejusdem generis in militiam alimentariam, e carne bubulæ assa, pane tritico et aqua consistam, inque pulpam contusam, et calori gradum therm. Fahrenheitiani 102 adæquantem abjectam, immerimus. Cum ibi 48 horas mansisset, id examinavimus; sed, licet fermentatio schemata fuisset, atque admodum austerus esset, nihil ponderis amiserat. Multo tamē minus redditum est.

## EXPER. XVI.

CUM, experimento in proximo, vitulina non tam brevi, quam bovina, solveretur, omnia animalia juniora, quam ætate provectiora, soluta difficiliora esse posse, suspicari cepimus. Igitur experimentum reiterandum curavimus, urinam et aguinam assas adhibentes, quorum singularum partes æquales in duos tubos diversos indidimus, tandemque eventum omnino eundem esse cognovimus. Namque, cane, qui hosce tubos voraverat, horas post septem interemptus, uvilla ex toto concocta est; agnina vero decem granorum solummodo detrimentum ceperat. Quod agninae et vitulinae in hoc et superiore experimento concoctionis expertæ mansit, id aliquo viscido et gelatinoso circumdatum est.

## EXPER. XVII.

CANIS bovinæ crudæ grana sedecim, assaeque totidem, duobus in tubis inclusa, cani dedimus. Quem cum hunc postea septem occidisset, bovinam crudam quindecim grana tantum perdidisse, assam vero ex toto concoctam esse comperti sumus.

## EXPER. XVIII.

Hoc experimentum repetivimus, pisces pro carne ubi. Grana sedecim crudi aselli in unum tubum, et eandem cocti quantitatem in alterum, inclusimus, eaque cani devoranda dedimus. Necato, nullae piscis cocti reliquiae repertae; sed crudus grana quatuordecim tantum amiserat.

## EXPER. XIX.

QUADRUPDES ac aves soluta faciliores essent, postea quaerere conati sumus. Hoc compendiendi causa, partes bovinæ, ovillæ, et gallinaceæ æquas, in tres tubos inseruimus, et in ventriculum caninum ingessimus. Singula ex hisce assa, grana sedecim, nec plus nec minus, peperderunt. Cane jugulato, tubisque caute inspectis, uvilla et lubula penitus evanuerant. Gallinacea undecim granorum tantum amiserat.

Pleraque experimentorum, supra comprehensorum, reiterata sunt, et eundem finem nunquam non habuerunt. Qua ratione igitur alimentum, hac in classe animalium concoqueretur, ambigere nequivimus. Utrum vero coctio animalium ruminantium eodem modo, necne, ab-

solva-

solveretur, cognoscendi cupidissimi sequentia sumus experti.

### EXPER. XX.

QUATUOR tubos cylindraceos stanneos, certas bovillae, salmonis, rapum, et batati quantitates comprehendentes, ovi dedimus. Hae substantiae crude fuerunt, et singulae grana saecum ponderarunt. Ovis sex horas, post eas devoratas, jugulata est, et tubi in primo ventriculo reperti. Piscis et caro nequaquam mutata; rapum et batatum, contra, ex toto soluta.

### EXPER. XXI.

Idem experimentum postea reiteravimus, alimentis iisdem bene coctis, pro crudis, utentes. Eventum ex toto eundem esse reperimus. Vegetabilia concocta fuerunt; res animales vero prorsus immutatae.

### EXPER. XXII.

CUM res plurimas vegetabiles et animales ovi dedissemus, et eam illas facillime concoquere, has ne minime quidem mutare posse, comperti essemus, quatuor tubos in ventriculum bovis, duos bovinam piscemque, duos foenum concisum et folia olerum crudorum continentes, ingessimus. Decem circiter horas, postquam eos devoraverat, mactatus est. Primo in ventriculo tubi reperti, piscis et caro integra et immutata manserunt; nullas vero foeni olerumve reliquias notare potuimus.

Hoc modo multa eodem in animali sumus experti, unde et a periculis in ove factis idem omnino cogendum putamus: Succum nempe hujus animalium speciei gastricum vegetabilia facile et celoriter coquere; res vero animales ne minime quidem posse mutare.

In omnibus his experimentis alimenti solutionem humori potentissimo e tunica ventriculi secreto tribuimus. Huic vero obijci potest, quod experimenta haec quaquam clare ostendant, utrum cibus per vires gastrici humoris, an per fermentationem, fuerit concoctus; namque haec aequè, ac illae, in cibum globis inclusum agere potuit. Modo sequenti huic respondendum ducimus; praeter argumenta plurima, quae fermentationem refellendi causa protulimus, quaeque, iudicio nostro, ad eam funditus subruendam sufficiunt, res non paucae haec experimenta concomitantur, quae vim humoris gastrici potentissimam esse clare testantur. Etenim, in hisce experimentis, in quibus



cibus non ex toto erat coactus, dissolutus, quod nos haudquaquam fugere potuit, a parte exteriori semper inceperat, centrumque versus progressus erat (1), quodque non solum mansit, id nullis fermentationis signa edidit. In experimento decimo tertio, durum, ut ebur, facile solutum est; dum pastinaca, ulus melle et ad fermentationem primum, ne minime quidem mutata est.

Quo vero omnis super hac re dubitatio amoveretur, periculum, quod sequitur, fecimus, idque compluries reiteravimus, eventus semper eodem, nullaque ex parte mutato.

### EXPER. XXIII.

Cum eodem alimentis horas per octiduum prohibuissimus, ut ventriculus ejus a reliquis cibi prioris quam maxime vacuus foret, secutus est, abdomen ei patefactum, et semuncia aut circiter succi gastrici puri e stomacho collecta. Haec phialae cum grana carnis bubulae assae duodecim inclusa est. Eadem bubulae, quoque assae, alteri phialae, cum aquae semuncia, quantitas inclusa est, cum qua, ut norma certa, illam comparare decrevimus. Utraque in fornace collocatae sunt, cujus calor a gradu thermometri Fahrenheitiani centesimo secundo ad centesimum tertium usque variavit. Spatio octo horarum, qui cibus in gastrico succum inditus fuerat, is ex toto solutus est; qui vero in aquam, is nihil mutationis sensibus percipiendum subierat. Horis viginti quatuor exactis, utraque phiala a fornace removimus, calque attente examinavimus. Solutus in humore gastrico cibus odorem rancidulum et pungentem, non verò putridum, emittebat, et saporem plumarum exultarum prae se se ferbat. Cibus in phiala, quo pro norma sumus assae, ex toto putridus factus est, et uiderem ingratum, et intolerandum crevit; magnitudinem verò priorem etiamnum retinuit.

Phialam cui succus gastricus inesset, donec solutio ad finem fuisset perducta, diligenter notavimus; nullas verò aëris bullas ad superficiem ascendere, nec ulla fermentationis signa semet ostendere vidimus. Hoc experimentum reiteratum est, cibo mansu adhibito, et solutionem spatio multo breviori absolutam esse compertum est.

Pericula postea ovillae, vitulinae, agumae, et aliarum rerum animalium, una cum magna vegetabilium copia, fecimus

(1) Hoc ulterius ab Hallero, in elementis physiologiae, firmatus: 'In ex,' inquit, 'ciborum coctione partes externae, quae proxime focus ventriculi tangit, primae fere dissolvuntur.' Lib. xix. sect. 4. p. 373.

## DE ALIMENTORUM CONCOCTIONE.

cimus, et omnia aequè facile concoqui; spatium vero, quo solutio absolveretur, facilitati majori aut minori, quae regula eorum solvi solere experimenta supra posita testantur, semper pro rata ratione, respondere reperimus.

Cum solutio, in experimento proximo absque ulla fermentationis aut putredinis notis, facta fuisset, succum gastricum easdem doses, quas saliva habet, possidere, et cum fermentationem tum putredinem retardare suspicari sumus. Quo hoc compertum haberemus, periculum iniquum facendum curavimus.

### E X P E R. XXIV.

Duas mixturas alimentarias, utramque e drachma ovillae et eadem panis quantitate constantem, comparavimus. Alteri succi canini gastrici recentis semunciam, alteri, quam pro norma adhibuimus, eandem aquae purae quantitatem adjecimus. Utraque in pulpam contusas, phialis accurate clausis inferuimus, et fornaci ad gradum thermometri Farenheiteani centesimum secundum (1) usque calefacto imposuimus. In ea phiala, quae pro norma summo usi, intra paucas horas fermentatio incepit, partes solidiores superficiem innatarunt, et aer magnus cum tumultu expeditus est. Mixtura, contra, cui succus gastricus fuit adjectus, quatuordecim horas in fornace, vix ullis fermentationis notis semet ostendentibus, remansit, brevi vero fermentatio plane visa est. Panis et caro summam mixturam petiverunt, sedimentum se deponere coepit, et bullae aëriæ ex ea constanter eruperunt. Hæc actio in hac multo diutius, quam in phiala, quam pro norma adhibuimus, perrexit, magis modica fuit, aëremque minore cum tumultu generavit. Cum fermentatio ex toto cessasset, mixtura saporem ex toto acidum, sed tamen multo minus acidum, quam phialæ pro regula adhibitæ, habuit, et alimentum mixturæ prioris per vim succi gastrici solventem fluidum redditum esse observavimus.

### E X P E R. XXV.

FRUSTUM ovillae putridæ duas in partes divisimus, et eas in totidem phialas indidimus. Alteri semunciam succi gastrici recentis, quem e ventriculo canino nos antea collegeramus; alteri, quæ pro norma fuit habita, eandem aquae purae quantitatem affudimus. Hæc loco in frigido collocatae sunt, cumque eas post biduum examinaveramus,

3 P 2

phiala,

(1) Hic calor est canis proprius, ut observationes Martini testantur. Martine's essay on the various degrees of heat in bodies, p. 141.

phiala pro norma habita odorem putridum et omnino intolerabilem emisit; cibus vero succo gastrico circumdatus, quamvis odorem etiamnum ingratorum habuit, non tamen atque ac in altera phiala contentus intolerabilis fuit, nec colorem etiam tam ingratorum, quam antequam phialae incluserat, diffudit. Phiala agitata, cibus, quem comprehendit, in particulas divisus est, sed neotiquam ex uno solutus. Hoc forsitan ab eo profectum est, quod gradui caliditatis idoneus non obiectus est.

In summa, haec experimenta concoctioni non parum luminis offundunt. Hanc non per calorem, trituram, putredinem, vel etiam fermentationem solam, sed per humorem potentissimum, qui e tonicis ventriculi seceratur, in cavum ejus effunditur, ibique cibus naturae sanguinis et indoli accommodat, absolvi, clare manifesteque testantur. Si enim veris, quidnam ventriculum ipsum ab actione hujus succi potentissimi defendat, rogare placuerit, eum adversum vim hujus, per principium vivum, tutum reddi, ut observationes Hunterianae (u) demonstrant; post mortem

(u) Vide *Philosophical Transactions*, Vol. LXII. ann. 1770, p. 447.

Ventriculum, sanitate subsistente, ab actione liquoris gastrici, per principium vivum defendi, ex observationibus Hunterianis, satis probabiliter esse videtur; caeterum vir ingeniosus potentiam hujus principii nimiam esse credit. Omnia enim animalia, partem animaliam ex parentibus, actioni hujus liquoris posse obistere possit. Argumentum vero, quo opinioni huius fidem excutere conatur, parum probare videtur. Namque, quamvis lumbrici in ventriculo humano revera possint vivere; hoc tamen, cum eos forsitan natura ita formaverit, ut viribus liquoris gastrici possint resistere, alia animalia quoque, quorum structura diversa, illis obistere posse, haudquaquam demonstrat. Utrum necne possint, sequentia dubium reddunt. Pisces non raro cancris, ascaris, aliaque animalia viva devorant, et facillime conungunt. Hircus, in ventriculo humano, non difficulter emicula est, quamquam nulla spiracula habet, et in calore humanum adhaerente, absque incommodo, vivere potest\*. \* Anguillam, in avis ventriculo, partim consumptam, et tamen vivam, Cornelius† reperit. Etiam filum oculum consumptum vidit auctor celeberrimus‡, cum piscis reliquus viveret. Liquorem autem gastricum nonnunquam in vivis, perinde ac in res inanimatas, agere, ex hisce observationibus verisimile videtur. Nec improbabile est, per murbum aliquando ita mutari, ut in ventriculum ipsum, vita manente, possit agere. Exempla sequentia, quae a Monroio celeberrimo accepimus, quaeque huc opusculo, permissu ejus, inseruimus, hanc opinionem aliqua ex parte firmare videntur.

\* Mulier, loci honesto nata, cui ventriculi doloribus laboranti chirurgus quidam Edinensis succurrere conasseverat, tandem fato repente concessit. Abdomine cadaveris patefacto, foramen lateris ventriculi sinistri in conspectum datum est, et tunicae ejusdem, qua-

\* Vide *Exp.* 10.

† P. 112.

‡ *Phil. nat. hist. of Scotland*, p. 216.



tem vero aquae facile, ac quolibet aliud inanimatum, solvi respondemus.

Singulas animalium species succum gastricum sibi proprium habere, cujus potestas ceteris rebus alimentariis circumscribitur, ut nobis videtur, admodum probabile. Alia animalia ex toto vegetabilibus, alia ex toto carne victitant, et longissima etiam inedia cibum vegetabilem gustare cogi non possunt. Omnia autem, instinctus rarissime fallentis monita, ea sola sibi eligunt, ad quae concoquenda suus gastricus speciei suae proprius optime accommodatur.

Cibus solutus ventriculum egreditur, et in duodeno bile succoque pancreatico miscetur, tandemque in humorem mitem, blandum, et inodorum, chylum appellatum, mutatur. Hic autem per vasa numerissima absorbetur, et per ductum thoracicum in venam subclaviam, ubi detrimentum, quod corpus humanum singulis momentis capiat, reparat, ingreditur.

Hoc modo veram solutionis alimenti causam, mutationesque diversas, quae subeat constanter, per experimenta competere sumus conati. Quatenus vero consamen nobis processerit, penes lectores candidos esto iudicium. Opusculi difficultas, celeritasque nimia, quae id conficere temporis angustiae nos coegerunt, sola sunt, quae errores plurimos, quibus scateat, excusatus possum habere. Id perfectius reddisse multo plus temporis, quam quod dissertationibus huiusmodi impendi consuebat, deposuisset. Examini igitur eruditorum, utcumque mancum et debile sit, subjiciamus oportet.

<sup>1</sup> si semiputrescentiae, relaxatae; nullae tamen gangraenae nutae semet  
<sup>2</sup> ostenderunt. Infuper puer quidam doloribus idem genus diu con-  
<sup>3</sup> sultatus vita tandem excessit. Venterque ei incisus eandem om-  
<sup>4</sup> nino speciem, si foramen, quod desuerit, excipias, prae se se tulit.  
<sup>5</sup> E signis autem praecedentibus aliquid mutationis ante mortem fac-  
<sup>6</sup> tum esse forsitan cogere licet.

Horum autem, ut conjecturarum tantum, mentionem facimus, et nihil ex his pro certo concludi posse fateamur oportet. Futura igitur experimenta, quatenus animalia, principem per vivum, liquori gastrico queant obfistere, demonstrent, necesse est.

DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS,  
DE  
RABIE CANINA.

QUAM, ANNUENTE SUMMO NUMINE,  
EX AUCTORITATE RECTORIS SÉDENDUM VIRI,  
D. GULIELMI ROBERTSON, B.S.T.<sup>4</sup>  
Academice Edinoburgense Præfelli;

REC HON  
AUGUSTI SENATUS ACADEMICI Cœdæ,  
ET SCIENTIARUM FACULTATIS MEDICÆ PRÆFECTI,  
PRO GRADU DOCTORIS,  
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET  
LÉGITIME CONSUEQUENDIS;

CAUDITORUM EXAMINI SUBJICIT  
JOANNES HEYSHAM, Anglus,

---

*In pibula mihæc illud erat quod, labere scriptis,  
Vixit tamen quæte ipsa suam exemplaverat ædem  
Lana pium, quam Sigus hæc munda illa dixerunt;  
Sed hæc exemplis non fuit proba aperta;  
Ut tenet illi scripta innot, sed tempore actus  
Fidelis, et finem citæ per pibula capitis.*

---

FRACAT.

Pœd. 14 Junii, hora locoque festiva.

1777.

---

Juveni Ornatiſſimo,  
HENRICO CULLEN,  
Medici et philoſophi maximi  
GUILLIELMI nostri CULLEN Filio,  
Animo vere humano,  
Sæmpe et fide, et probitate conſpicuo,  
Ingenioque ſimul venerabilis patris  
Mulum particeps,  
Hunc de morbo dicto ſermonem,  
Affectus hauri exigui  
Exiguum monumentum,  
D. D. C. Q.

JOANNES HEYSHAM.

## DE RABIE CANINA.

## PROOEMIUM.

**A**N viri, vel virorum animi, ullis principiis, priusquam ratio sese expandat, praediti sint, non meum est dicere; neque eorum philosophorum, qui homines semper ratiocinari, animum humanum semper agere, censent, quibusdam rationibus, a prima in utero origine usque ad ultimum vitae punctum, deductis, contradicere stetit est.

Haec minime ad nos pertinent; neque nostra refert, quod homines in rebus metaphysicis, nullo aut suo aut alieno commodo exercere animum possunt. Hoc constat, quod nemo sobrius et sanus inficias eat, ratione et hac utendi facultate praeditos esse homines. His ab aliis omnibus animalibus distinguimur, et viribus corporis praestantes, multa sic animi vi, superamus. Hinc facile patet, semperque patebit, rationem hominibus congenitam esse; et indidem sequitur, eam necessariam esse, et, quum recte colitur, nos maximo adjuvare. Quam rem gloria, multis corporum et rerum naturalium scientia quaesita, insuper confirmat.

Noone multis dotibus supra bruta animalia praediti sumus, imo etiam supra aliquos ex nostra specie, qui primis et rudis mundi aetatibus vixerunt? Si igitur ratio et ratiocinatio quibusvis hominibus perutilia, atque etiam necessaria sunt, certe ea medicis et philosophis plurimum profutura, dabitur. Neque dubium est, quia naturae arcana, mirabilia phaenomena, et multa ac varia morborum symptomata, quae medicos accuratissimos hactenus omnino latuerunt, investigando explorari poterunt.

Quod cum ita sit, tamen ex ratiocinatione et contemplatione, quae theoria vulgo audit, maxima incommoda profuissse, homines ingeniosissimos in errores abreptos esse, neque verum et certum est: Erroresque quos alii serviliter secuti sunt, vel industrize ad pristinos errores consultandos defectu, vel ob ingentem erga auctores venerationem, qui ea dogmata excogitaverunt, exorti sunt.

Quae tamen culpa haud omnino rationi, sed ratiocinatoribus, imputandae sunt, qui in vastum oceanum imaginationis, ad prosequendam aliquam hypothesein proveci, facta atque experimenta, quibus solis valida et vera theoria fulciri potest, acque neglexerunt.

Neque



Neque hi errores, quanquam ingentes, ad rationem et medicinæ scientia tollendam, arguendi sunt. Illi nostris ingenis est insita, ideoque æque in sententiis agricolarum, ac in philosophorum libris, manifestatur; et exquisitissimi empirici, qui unquam extiterunt, ex tempore, quo rationem e medicina expellere conati sunt, ipsi ratiocinati sunt.

Sed de his hæcenus. Hæc disputatio maximam medicorum attentionem meretur, utpote quæ argumentum tractet, quod, si dira symptomata, quibus hic morbus stipatur, spectentur, primum sibi locum vindicet, nullisque cedit: Et pro certo habeo, si quis unquam ægrum hoc morbo implicitum viderit, eum semper morbi recordaturum, quamdiu memor erit sui.

## CAPUT I.

*De morbi Definitione.*

Celeberrimi Sauvageus, Linnæus, Vogelius, et noster Cullenus, Hydrophobiæ titulo, varic in suis egregiis operibus, hunc morbum definiyerunt. Qui

Est, definiente Sauvageo,

\* Esraenis potulentorum averlatio, sæpius a morfu animalis rabidi (a).<sup>1</sup>

Apud Linnæum est

\* Averlatio potulentorum cum rigore et tardialii; (sæpius præcedenti maritata), nempe Rabies, cujus character est,

\* Desiderium mordendi laterandique innocuos (sæpe a morfura Mammalis) (b).<sup>2</sup> Idem,

Ut Vogelio placet, est

\* Febris cum averfatione liquidorum, singultu, convulsione, et delirio (c).<sup>3</sup> Denique,

Cullenus nostro,

\* Potionis cujuscunque, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque a morfu animalis rabidi, definitur (d).<sup>4</sup>

Quibus candide trutinatis, memoratos nosologie cultores egregios, hunc morbum pro genere, in varias species dividendo, habuisse, primo patet aspectu.

Sed in talem sententiam nequaquam pedibus ire possumus, siquidem, in historia tractanda, Rabiem Caninam nun-

(a) Culleni Synop. Nosolog. edit. altera, p. 54.

(b) Ibid. p. 91.

(c) Ibid. p. 121.

(d) Ibid. p. 120.

nunquam, nisi extraneum admoto veneno, in hominibus occurrere, ostendere deinde conabimur.

Averſatio equalem aquarum in diverſis caſibus aliquando ſeſe manifeſtat; quæ, quum cætera rabiei ſigna abſint, morum ſymptoma eſt, ac neque pro genere, neque pro morbi ſpecie, habendum (e).

His in animo ſedulo perpenſis, meæ ſententiæ, ſymptomata, ex viro canino in corpus humanum recepto oriëntia, genus morbi, nimirum in diverſas ſpecies ſegregandum, conſtituunt. Pace itaque horum ſummorum auctorum, valicem caninam ſic definiam velim.

Incurio tempore poſt virus caninum in corpus receptum, potionis cuſudibet, ac convulſionem pharyngis dolentem ſcientiæ, ſalutem et horror.

## CAPUT II.

*De Morbi Hiſtoria.*

UT canes, vulpes, lupi, et homines eodem ſere tempore arati ſunt, ita hunc morbum antiquiſſimum eſſe, concludi poſſe videtur. Cujus tamen, dum numerus eorum haud exuberaverat, factis veriſimile eſt, multa æva ſine ullo exemplo elabi potuiſſe: huncem multi auctores celeberrimi in ſuis operibus deſcripſerunt, et varia ei nomina tribuerunt (f).

Sed nobis in animo eſt ſolum rabiei caninæ et hydrophobiæ mentionem facere. Quarum prior aptiſſima eſt, quia hic morbus ſolum canibus congenitus eſt, et ab eorum morſu homines, et cætera ſere omnium generum animalia, aſſicit.

Posterior, a ſymptomate mirabili, teteriſſimoque ſpasmus convulſionumque, in aquarum et aliorum humorum deglutendi conatu, occurrentium, originem ducit.

Qualis hic morbus ſit, multum inter ſe diſcrepant auctores.

Vol. III.

3 Q

torres

(e) Med. Edin. Edin. Vol. I. 477. p. 222.

Saurag. Noſſi. Methen. ſup. 7. c. 57. Febilis intermiſſi. ſe ſerena ſubſequentia. p. 224. Schenckii, lib. vii. de venenis ex animalibus. p. 82.

Med. new edition, pub. Edinburgh 1773. p. 64. Ingoſ. 'I have known it, in the height of a violent hyſteric diſeaſe, to have continued for many hours, till the convulſed motions in the throat were quieted by proper medicines: And I remember a caſe, in which ſigns of a palſation in the heart were attended with ſevere a degree of it, that it ſeemed not to differ from the true hydrophobia.' bl.

(f) Cæſus, Galenus, D. Joſeſcides, &c.

tores, dum alii acutum (g), alii longum esse morbum, contulerunt; quorum inter postremos illustrissimus Boerhaavius, et ejus commentator Ger. Van Swieten, maxime eminent (h).

Quid in hanc opinionem eos impulerit, haud mihi compertum videtur; nam cum saepissime cum febre esse, et plerumque citissime aegros, nempe, circa quartum sere vel quintum diem, et medio tollere; hinc ad morbos acutissimos, ni fallor, referendum esse, posita demonstrare conbor.

Quod, si veneno aut contagione in corpus nostrum recepta, spatium temporis, antequam vires exserat, perlongum esse, forte objiciatur; non tamen ex ea re de morbi diuturnitate judicandum est: Nam morbus adesse non existimatur, donec quaedam symptomata, aliquam vel vitalem, vel naturalem, vel animalium functionum, laesionem indicantia, apparuerint; et, si aliter esset, eadem lege rationeque, multi alii morbi acuti in numerum chronicorum referri possent. Cui ignotum est, variolarum morbillorumque venena non suos effectus ante certum diem edere? Verique simillimum est, effluvia a stagnis et paludibus orientia, quae intermittentibus, et contagionem, quae omnibus sere epidemicis ansam praebent, saepe absque ullo praesentis morbi signo, in corpore intus latere; cum tamen medici his febribus, et multis aliis simili natura praeditis, acutorum morborum nomina optimo jure indiderint.

Hoc in loco occurrat quaerendum, an hic morbus unquam sua sponte in hominibus, absque veneno ab aliis animalibus accepto, oriri possit?

Nemo scientiae medicinalis paulo peritior negaverit, quin deglutienti cum solida tum fluida difficultas, imo etiam horror averfatioque, varios morbos comitentur, quibus nomen hydrophobiae imponendum est: Sed nondum neque constat, an his symptomatibus laborantium saliva, phaenomena horribilia, quae originem ab canino veneno trahunt, possit excitare. A medicis hanc rem tractantibus, exempla quaedam, quibus hunc morbum sua sponte ortum, et brevissimis symptomatibus stipatum esse, censuerunt, in medium proferuntur.

Van Swieten unius exempli mentionem facit ex quibusdam

(g) Caelius Aurelianus de morbis acut. et chron. lib. vii. cap. xi. p. 322.

(h) Ger. Van Swiet. comment. in Herm. Boer. aphorism. tom. iii. de rab. canin. p. 333.



dam miscellaneis sumpti, de juvene, scilicet, qui animi affectibus vehementibus agitatus, cum suum digitum mordisset, viginti quatuor horarum spatio hydrophobicus factus, et cæteris rabiei caninae symptomatis oppressus, brevi periit (i).

Celeberrimus etiam Boerhaavius exemplum hujusmodi memorat; ubi homo, ab intemperantia, insolatione, fatigationeque, febre ardenti correptus, maxime omnes liquores averfabatur, et brevi mortem obiit (k).

In actis medicis, Edinburgi editis, hydrophobiae historia accuratissime enarratur, quae a ventriculi inflammatione oriri credebatur (l).

Verum, hauriendi humores difficultas satis non est. Quam (m) difficultatem (n) averfationemque saepe in morbis, haud omnino rabiei caninae similibus, incidere certe pater. De tertiana subcontinua, haec habet Ill. Sauvagesius:

• Jam febris facta remittens perniciose facile cognoscitur ex defectu apyrexiae; et, quamvis ab origine intermittens fuerit, non caret periculo; nam trahit secum quoddam faevum symptoma, ut cæterae malignae ab initio remittentes, vel continuæ, potissimum vero paroxides, delirium perpetuum, convulsiones, anorexias, hydrophobias, seu cujusvis potus averfationes, et similia (o).

Alia etiam exempla commemorantur. Inter quae tamen casum, quo morbus sic ortus in alios grassatur, nequeo invenire.

Quumque veneni naturam dotisque indagaverimus, haud a fide alienum erit, hos canis (si vere ad rabiem caninam pertinerent) infectione productus esse.

De primo exemplo ab Illustrissimo Van Swieten memoriae prodito, aegrum, viginti quatuor horarum spatio post morsum, hydrophobicum factum animadvertendum est; quod in morsu canis rabidi, ubi virus virulentissimum est, nunquam tamen tam cito accidit, idque, e contrario semper aliquot dies, septimanas, vel menses, in corpore intus latet.

Astamen, Van Swieten virus in juvene, pathemate cal-

3 Q 1

lenti,

(i) Comment. in aphor. Boerh. de rabie canina, tom. III. p. 330.

(k) Ibid. p. 337.

(l) Med. Ess. Edin. Vol. I. cap. p. 227.

(m) Ibid. § xxviii. p. 222.

(n) Shenck. libervii. de venenis ex animalibus, p. 221.

(o) Nosologi method. tom. I. p. 274. et de dysphagia, tom. II.

flenti, gentium, et sic vulnere in digito communicatum; et hinc morbum arrium censuit; opinione minime vero consentanea, et haud annuo tam perito et doctissimo viro digna.

Quanto, contra, recti similis est, juvenem venenum antea recepisse, et animi pathemata potius prima symptomata, vel causam procatacticam, quam directam morbi causam, fuisse?

Dein morbum non rabiem, sed ardeorem febrem, et, ac vileatur, phrenitidem fuisse, ortumque ab ebrietate, insolatione, et fatigatione traxisse, satis manifestum est. Certe huic morbo furibunda deliria saepe subesse; peculiaremque hujus aegri idiosyncrasiam difficultati averlacionique aequi hauriendi causam praebuisse, ita ut speciem hydrophobiae indueret, experientia quotidiana exploratum est.

In exemplo altero supra memorato, de quo, in Actis Medicis Esinburgi editis, relatum est; licet ex symptomatibus aestimanti vera rabies existisse et nulla suspicio contagionis fuisse, videatur; tamen haec pro valida ratione haud haberi debet.

Ex hac ratione, et quia morbus rarissime hominibus, quibus venenum aliquo modo non evidenter applicatum fuerit, accidit, veram rabiem caninam nonquam in hominibus sua sponte oriri, concludere liceat. Porro, si homines sine contagione huic morbo obnoxios esse concessimus, eundem in omnibus aliis animalibus similiter oriri posse, nam omnia ejus effectibus obnoxia sunt, cum virus in eorum systemata penetraverit, etiam standum erit. In quibus tamen morbum occurrentem, canis rabidi mor sui veniens fere una vox auctores acceptum, retulerunt. Hinc hujus morbi originem canibus percutarem esse, et solum ab infectis causis in eis oriri, in universum pro certo habendum est. Qui tamen, quoniam saepe quaque in vulpibus et lupis occurrat, ita ob id, et quia illa ejusdem generis cum canibus sunt, ea in eundem morbum natura prona esse, perquam verisimile est.

Ab argumentis restat jam expositis, hujus morbi virus, in illo genere animalium, cui nomen Canis est, gigni demonstratum est.

Ne qui nequeat, ab auctoribus multis et etiam magni nominis, dissentio solus sum, arrogantiae infuset, dissensum de hac re Galeni sententiam addam:

\* Nam facile intelligitur ex canibus, quantam habeat  
\* vim allucinendae rei aptitudinem, quam enim reliquorum  
\* animalium nullum rabie capitur, solus canis eo affectu.

\* corrigitur; atque tanta fit in ipso humorum corruptio,  
 \* ut sola ejus saliva, si humanum corpus contigerit, ra-  
 \* biem excitet. Ut igitur ab exiguo initio salivae qualitate  
 \* aucta, quaedam in corpore affectio, quando ad magni-  
 \* tudinem notatu dignam pervenerit, discernitur post sex  
 \* menses, quam nonnunquam ante id tempus nulla nota  
 \* deprehenderetur; sic eodem modo, vitioso humore in  
 \* animalis corpore genito, paulatim tractu temporis prin-  
 \* cipum partium aliquis consentit, a qua universum corpus  
 \* celeriter mutatur (p).

Jamque de veneni natura et qualitatibus dicendum est.  
 Id in animalis rabidi saliva latere apparet; unde plerum-  
 que morbus morsu inducitur; dentes, saliva, et hinc ve-  
 neno imbuti, in vulnus ubi primum insiditur, penetrant.

Diversis autem modis oriri potest: lugens vulnus mi-  
 nime necessarium est ad ejus effectus excitandos; solum  
 sufficit, ut cuticula ita amoveatur, ut in quibusdam aliis  
 contagionibus videre est. Variolae, infectione productae,  
 cuticula elata, et viro varioloso cuti applicato, saepe exo-  
 riuntur. Nec alio modo in nostrum corpus virus vene-  
 reum agit; multa quoque exempla nobis adsunt, quibus rabies,  
 contagione molli et tenerae parti (q) applicata, inducitur  
 v. g. multi saepe homines (r), vel etiam canes (s), hydro-  
 phobiam laborantes, tantummodo osculando, morbum sibi  
 adseverunt.

An integrae etiam manuum vel aliarum partium cuti  
 idem adnotum morbum inducere possit, experientia haud  
 constat.

(p) Galeni de locis affectis, lib. 6. caput 5. p. 510, tom. vii. char-  
 ter.

(q) In via obscuris venit ei natus rabiosus, qui vestem ejus dentibus  
 arripens, huc et illic trahit, donec tandem veste lacerata, cuti ex-  
 amen nullum intacta et intacta, canis adugit. Illa vero, nescia caecum  
 vulnus fuisse, laceratam vestem filo (penet saluberrime) fastidire  
 saltem) dentibus alacris, refectioe coepit. Unde nullum quidem per  
 vix mensis fuisse incommodum. Postea vero sensum melancholici  
 fasti, imaginationibus, visionibus horribilibus, et parvibus legari  
 vixit, et paulo post, equum in vinum eduxit. Sed illuc tandem  
 in ea miseria animam efflavit. Histories centur. 1. obscur. char. 16  
 p. 52.

(r) Cum enim tibiens quidam rabie perculsus furiosusque ageretur,  
 sibi ex vivo migrandum esse intelligeret, alliciens qui eum vir-  
 culis circumscriptus tenebant, in turris internullam obvia regerit,  
 ut quos mox deseruimus esset finem, illi desolati liceret. Quod  
 cum ei sollet emicissum, liberisque oscula esset, praesentibus est.  
 Sed ecce, septimo post die, illi eodem morbo correpti, eisdemque  
 cruciatibus torti, brevi miseram vitam cum morte commutarunt.  
 Palmaris de morbo canis rabidi, lib. 1. cap. 1. p. 119.

(s) Schenck. lib. 7. de venenis ex animalibus, p. 148.



enustat. Sed, si res ita se habeat, is cui sic admissum est, statim ablui debet. Certe saliva siccata, et diu aëri exposita, si vulneri aut partibus tenera cuticula præditis admissa est, excitare morbum potest. Huiusmodi singulare exemplum, de quo fortasse nonnulli dubitarent, Schenkius memorat, juvenem nobilem, qui digitum gladio vulneravit, quo, aliquot ante annos, canis rabiosus trucidatus erat, hydrophobia correptum esse (1).

Quod si vir, cum uxore rem habens, hoc morbo eam afficere dictus est (2), id ex basiatione, quæ concubitus præcedit, quam ex hoc, incidisse credibilis est, morbumque, et saliva labiis linguaeque admissa, et non semine, ortum. Porro, nec rebus veris, nec experimentis accuratissimis, satis probatum est, an alii humores, saliva excepta, hoc veneno imbuantur: Hoc autem certum est, aërem inde non contaminari posse; hinc nunquam morbus per populum grassatur. An caro rabidi animalis in ventriculum assumpta morbum producere possit, necne, non exploratum est. Quod a priori licet verum esse videri possit, tamen multa venena subtilia impune deglutiuntur; quæ, vulneri admissa aut sanguini admixta, symptomata facillima (3) excitant: Quoniamque hepato rabidi canis in numero medicamentorum celebratum sit, hinc absque ullo incommodo carnem edi posse, conjicere licet. Sic locutus est Sauvagesius: 'Ani-  
' malium rabidorum carnes comestæ, excerpta forte gula,  
' aliis hydrophobiam intulisse non constat; fœcus ipsum pro  
' hydrophobiae antidoto multis laudatur; veneni ergo se-  
' des in œsophago fixa videtur (4).'

Quoniam vero tam dira symptomata morbum comitantur, ideo homines a carne et secretionibus hoc morbo laborantium summa cura cavere debent. Nam quid imprudentius absurdiusve esset, quam carnem rabidi animalis ultro edere?

Mirum est, hoc lethale venenum tamdiu in corpore latere. Morbus, secundum medicorum experientiam et observationes, intra triginta, quadraginta, quinquaginta, vel sexaginta dierum spatium, postquam virus sanguini admixtum est, nuncunquam impetum facit. Alias vero citius se ostendit (5); alias in corpore ab uno (6) ad duode-

cim

(1) Ib. observ. 9. p. 348.

(2) Van Swiet. comment. in Galien. 1236.

(3) Haller Element. Physiol. tom. 5. lib. 2. p. 252.

(4) Sauvag. Nos. Method. tom. 5. p. 254.

(5) Palmieri de uniuscuiusque rabidi lib. 2. cap. 1. p. 129.

(6) Galen. comment. 2. in lib. 1. parvul. Hipp. tom. 3. Mer-  
gagni de crur. et sed. morb. epist. 6. art. 29. 31. 37.

cum menses; alias ab uno (b) ad duo, tres (c), vel etiam viginti (d) annos, venenum remanet. Morgagni dixit, se vidisse exemplum, quo quadraginta annos latuit (e).

Ratio hujus haud in promptu esse videtur; sequenti autem modo clarissimus Acliel Roscius hanc rem explicat. Mirum sane videre debet, quod quosdam celerius, alios tardius, enecet. Quae ratio hujus effectus tam suspendi potest? Si quae sit, haec erit, ni fallor. Venena deleteria, quae toto generi humanae naturae adversantur, a colore nostro nunquam evinci, neque superari possunt, sed vel hausta, vel ejaculata, in corpore humano exsistentia, semper agunt, vitam oppugnantia, in perniciem tandem homines ducunt. Actio illa alias cito, alias tarde, perficitur. Hujus diversitatis ratio a duobus pendet; videlicet, vel ex violentia seu imbecillitate agentis, vel a fortitudine seu debilitate patientis. Ratio ne agentia quandoque idem venenum cernitur, modo suam actionem citissime, modo longo tempore edere, ex ejusdem violentia, vel majore, vel minore. Ratione patientis, multos novimus, qui, eodem assumpto veneno, diversis tamen temporibus extincti fuerunt; quia ad omnem actionem patientis dispositio requiritur, cujus merito imbecilla corpora citius, fortia tardius, veneno necantur (f).

Sine dubio copia veneni, in corpus recepta, semper perquam exigua est, et priusquam nostros humores in suam naturam capiat, ut morbum tam lethalem inferre possit, multum temporis requiri, credibile est. Aliquid autem viribus veneni tribuendum est. Quo enim magis virus venenatus viribus pollet, eo citius sanguinem aut caeteros humores corrumpet, et sic morbum maturius inducet. Nam symptomata fere observantur in hominibus vel animalibus, qui a cane, in ultimo stadio morbi exsistente, mori fuerunt, citissime occurrere, quo tempore virus virulentissimum est. Etiam dignum notatu est, quoniam in capite vulnus illarum sit morbum maturius, quam in aliis partibus, apparere, et, caeteris partibus, etiam serius in membris inferioribus (g).

His observationibus et rebus recte manifestum est, hominibus

(f) Ibid. p. 335.

(g) Bracken's Art of Farriery, p. 327.

(a) Boerhaavi Aphor. 2137.

(c) Morgagni, de sed. et causis morborum, epist. 8. art. 21.

(d) Villousius, centur. 1. observat. chirurg. 36. p. 64.

(e) Sauvaz, dissert. sur la nature et cause de la rage, p. 5.

mines huic contagio obnoxios esse, cum maxime securos sese putant, et ab ejus in corpore mora, multos oblivisci posse, talem casum nunquam sibi accidisse; et venenum eos cuncto, sed dirissimo impetu, dum miser sui fati minime conscius, securus quiescit, clam incedere possit. Quamvis hydrophobia, cum infectio non manifesta est, curi potest; tamen inde eam a causa in corpore humano interius gigni, neutiquam est concludendum.

His praemissis, pathognomonica, symptomata, quae canem rabidum esse indicant, exponere conabor. Quorum notitia eo magis necessario est, quod, sine ea, in perpetuum timore metoque, nullo periculo imminenti, vitam homines traherent.

## C A P. III.

*De Symptomatis in Cani rabido occurrentibus.*

**P**rimo canis suum vigorem amittit, minus vividus fit, et, inter obsequium domino praestandum, solitudinem petit. Non latrat, sed marmurat, aliis minatur; auribus et cauda denicillis, cibum averfatur, et vultus tristitiae omnia signa exhibet. Postquam haec symptomata unum, duos, vel tres dies permanserunt, dein canis cito difficulterque respirat: linguam ore exerit, atque salivam primo parcius movet. Hero laud obedienter obviam venit; domo fugit; hinc illinc vagatur; interdum quasi lectu sopitus, tacite currit; sed, paulo post, cursum accelerat, ac semper inaequali et titubanti gradu; augetur salivae fluxus, tota lingua ex ore promittitur et livescit. Indiscriminatim omnia rapit, et hirit. Nec moram delirat; vires amittit; corpus marcescit; respiratio difficilior fit; os spuma scaetet. Tum omnia ita mordet, itave mordere conatur, ut vel umbras ore hianti capret. Proinde alii canes, ejus calamitatis quasi consci, cum signis magni terroris eum fugiunt (h). Qui dein dolore et fatigatione exhaustus expirat.

Prac-

(h) Reliqui canes ab eo discurrunt, eique, si repente sit, obviam eundem et blamantur. Palmari de morbo canis rabidi lib. cap. 1. p. 230. Hoc plane mirum est, et manifeste demonstrat, omnia animalia, atque ac homines, aliquos praeter materiam nocentem praestita esse; simile quid quibusdam aliis animalibus accidit. Cervus canibus venaticis fugatus, ut eos evitare possit, gregem petit, cum quo antea congruere solebat, sed cum palam illis appropinquat, statim ea virge crudeliter expellitur. Goldsmith's Natural History, vol. II. p. 118.



Praeter haec, aliud signum characteristicum scriptores memorant, nempe, si frustum panis, aut carni elixae, quod in os mortui rabuli canis immissum, et ejus saliva bene imbutum sit, deinde cani jejuno offeratur, harrere respondabitur (i).

Haec notae sunt, quae attente rursusque perpendae, semper morbum indicabunt. Interest autem hominum quorum capes sunt, sua securo et bene munito loco, cum primum symptomata apparent, concludere; quo facto multum periculi, variae anxietates terroresque vitari possent, et, quod minus quidem interest, multi canes, immaturae mortis securi vitam dederent.

His similia symptomata in caeteris animalibus ferme occurrunt: aut, si minime negari potest, quin animalium variae naturae, doctisque, seriem jam expositam mutare possint; tamen symptomata pathognomonica raro mutari dicendum est.

## CAPUT IV.

*Symptomata in Homine praecipue occurrentia.*

**N**IHIL, ad justam morbum naturae notitiam acquiescendam, aut etiam ad curationem idoneam, magis, quam symptomatum accurata, plena, fidelisque narratio confert.

Quam solum utique longa, diligenti, et sedula praxi assequendam, aetas et experientia, summorum medicorum praeceptrix, minime nobis suppeditant. Praecipua itaque symptomata sunt ea, quae celeberrimus Boerhaavius eleganter depinxit (k), vir, ob summam diligentiam, praecellentem sapientiam, egregias virtutes, mirumque suavitatem, a nobis et aliis medicinae cultoribus, nunquam satis laudandus. Sed haec haecenus; ad nostrum propositum veniamus.

Post incertum ex recepto in systema veneno spatium, (quod, uti antea dictum est (l), intra unius hebdomadae et viginti annorum, at sepissimae unius vel duorum mensium spatium, accidit), dolor aut quaedam peculiaris et insolita sensatio prope partem, cui virus applicatum fuerat, sentitur, vulnere forsitan jamdiu sanato, vagans et ad vicinas partes patens. Languor, gravitas, et in totum usculoso genere lassitudo, lassitudinis febrium lentis occurrentis instar, oritur.

Vol. III.

3 R

Nunc

(i) Acad. des Sciences, 1725. Hist. p. 39. Van Swiet, Comment. in Aphor. 1135.

(k) Aphor. 1137.

(l) Vid. pag. 11.

Nunc moestus fit aeger, saepe ab imo pectore gemitus trahit, solitudinemque petit; somnis inquietis et horrendis animi imaginibus, jactationibus et levibus convulsionibus, perturbatur. Pulsus irregularis, celerior quam in sanitate, et saepe plenus, nausea, prostratus appetitus, ad sunt. Quae symptomata, secundum auctores, primum morbi stadium explent.

Tum priora non solum augentur, sed his porro ingens circa praecordia angustia et oppressio et respiratio difficilis accedunt. De magna siti et aestu aeger conqueritur, et, se non potum sine summa difficultate deglutire posse, miratur; deglutendi difficultas, convulsionibus musculorum laryngi et pharyngi servientium, augetur. Globi, ad fauces ascendentes et strangulationem minantis, sensus subest. Et quo magis limpidus pellucidusve liquor sit, eo magis bibendi difficultas augetur.

Procedente tempore, anxietas, horror, horripilatio, tremores, convulsionefque ad aquarum conspectum, imo etiam ad eorum mentionem, sese ostendunt.

In nonnullis aegris, haec memorata symptomata saepe a speculi reflectentis aliarumve rerum pellucidarum albarumve conspectu, aequae ac conspecta aqua, sed leniore cum effectu, exoriuntur (m). Neque panem vel cibum solidum, non, absque his facillimis tetercimisve symptomatibus, deglutire aegrotans potest. Est ubi aer frigidus, sonusque anxietatem et gutturis spasmus producit (n). Levantur haec omnia brevi temporis spatio, post aquam remotam, meliusque sese aegrotans habet, quin et delirii etiam saepe immunis est. Idem multum de siti questus, ut bibere tamen obstinate recusat, ita se deglutire, vel per calamum sugere posse, si ejus oculi velentur, sperat. Sed vane sunt spes, vanae cogitationes; nam, simul ac tetigerit ejus labia liquamve liquor, summa angustia, maxima anxietas, convulsionefque immanes, et furibunda deliria iterum recurrunt. Nunc materies biliosa per vomitum ejicitur, et saliva ex ore stillat. Pulsus plerumque est frequens plenusque, aliquando tardus, et cum continuo vigilis conjungitur. In viris aliquando priapismus, frequens invitaque seminis ejectio (o), et stranguriae cum convulsionibus,

(m) Mead, new edition, published at Edinburgh, p. 38. Med. Comment. Edinburgh, vol. 3. p. 197. Palmarij de morbo canis rabidi lib. cap. 2. p. 133.

(n) Mead, *ibid.* London Med. Observ. vol. iii. p. 161.

(o) Caelius Aurelianus de morbis acutis et chron. lib. iii. cap. 11. p. 499.

bus, compluribus in partibus corporis, et praecipue faciei, adfunt, quibus subsultus tendinum addi potest. Hoc modo malum procedit, et sic statim secundum finitur.

Nunc omnia symptomata enarrata crescent, soletque delirium sequi; os semiapertum; lingua aspera et spumosa ore extritur; saliva emanat, quae aliquando in adstantes vehementer semperque expulitur etiam aegro invito. Vox rauca et insonora est. Hinc quidam eam sonum, quem canes inter latrandum edunt, comparaverunt, sed manifeste falso. Licet sitis ingens et intolerabilis sit, tamen ad conatum bibendi, imo etiam ad contactum, conspectum, etiam mentionem humoris cujuslibet, convulsiones, horrores, et furores redintegrantur. Saliva copiosa et spumosa expulitur. Omnia mordere etiam praeter voluntatem nititur aegrotans. Delirium est ferrox; vires et conatus ingentes sunt (p). In amicos et consanguineos impetūs sit, quos in lucidis intervallis aeger, sciens se non esse potentem sui, sibi caveant admonet, his enim furoribus cohibendis se imparem esse; et quod mirandum est, mens prudens, constansque sibi eo ipso tempore, quo corporis actiones conatusque immanes et terribiles sunt. Postremo, vires deficient, respiratio difficilis, et sudor gelidus omnia membra pervadit, vultus squalidus et viso terribilis sit. Mors fere semper, intra quartum ab initio diem, doloribus sine intermissione imponit.

Haec symptomata, secundum aegrotantium naturas, hanc scenam dirissimam emittantur. Aliquando, etsi raro accidit, delirium melancholicum est, in quo furor rabiesque non tam immania sunt; sed stupor atque torpor totum corpus, nisi cum potius irritamentum abjicitur, occupant. Estque ubi haerit et aversio non acque magna sunt ac supra dictum est.

## CAPUT V.

*De his quae Cadaverum inspectio demonstrat.*

CADAVERUM inspectio, quae multus in munus ad eorum sedes naturasque explorandas et indagandas, plurimum, nihil tamen in hoc malo, confert. In multis dissectionibus, a Boneto, Morgagnio, et aliis celeberrimis pathologiae anatomicae cultoribus, institutis, fauces partes-

R 2

qua

p. 220. London Med. Observ. et Inquiries, vol. 7. art. 19. p. 296. Mead, new edition published at Edinburgh, p. 17. Bonet. Sepulchret. Anat. lib. I. sect. 8. p. 213.

(p) Mead, p. 58.



que superiores laryngis pharyngisque inflammatae appa-  
 erunt. In aliis vero inflammationis nulla signa adfuerunt.  
 Et, ubicunque inflammatio subest, eam non causam con-  
 vulsumum et spasmodicæ contractionis musculorum, his  
 partibus intervenientium, sed esse dum esse, antea et jure  
 dicere possum. Nam, si inflammatio faucium bibendi dif-  
 ficultatis causa sit, necesse est, eam omnibus, qui hydrop-  
 hobia correpti sunt, semper adfuturam esse; porro, angina  
 aut gutturis inflammationes majorem difficultatem in soli-  
 dis, quam in fluvis deglutendis, producant. Meriten-  
 di desiderium in eam rabido morsu, magni nominis me-  
 dica referebat ad inflammationem faucium et conjunc-  
 tam anginae speciem: Sed aperta aliquoties cadavera,  
 nulla inflammationis vestigia ostendere (q).

Ventriculus saepe vere multum distenditur, et vasa in-  
 testinorum sanguifera solito majora videntur; denique,  
 omnia viscera quam solent sicciora (r); atteritiora, quam  
 venae, plus sanguinis abundant. Cerebrum aliquando in-  
 tactum apparet (s).

## CAPUT VI.

*Causae quae huic morbo opportuniores canes reddunt.*

UT hunc morbum internis causis in hominibus nunquam  
 originem debere, videri nobis dictum est; ita nihil in  
 humani generis natura loesse, quo huic morbo opportuni-  
 or reddatur, saltem nihil, quod certis argumentis demon-  
 strari queat, haud dubitamus dicere. Causae predisponen-  
 tes (ut aiunt) in canibus, apud auctores, haec plurimum  
 valuerunt:

1. Ingens aestus,
2. Ingesta putrida,
3. Aquarum inopia.
4. Vermes in cavis et diversis corporis visceribus, vide-  
 licet, cerebro, jecore, renibus, &c.
5. Vermiculus sub lingua positus.

De quibus nobis tantum conjecturas proponere licet.

Quod ad ingentem aestum attinet; canes rabidos hye-  
 me, verique frequenter, at in aestate, Syris urgente, fre-  
 quentissime fieri, observationibus multis compertum est.  
 Quod licet ita se habeat; tamen, si verum sit, quod a non-  
 nullis memoriae proditum est, neminem in America Au-  
 strali

(q) Boneti Sepulchret. Anat. lib. 1. sect. 8. observ. 10. p. 211.

(r) Ibid. observ. 7. et 8.

(s) Ibid. observat. 2.

itali canem rabidum vidisse (x), certe inde, calorem ad hunc morbum faciendum minime valere, apparet.

Neque certior causa putredo est. Canes enim caeteraque animalia diu ingessis maximae putridis, sine ullo incommodo, vescuntur. Quin e contrario tali conditione eorum gustui gratissimi sunt.

De aquarum inopia haud multum dici potest: sed hoc tamen certum est, in canibus haud aqua carentibus, aliquando morbum ortum: et multos diu aqua carentes, morbo minime implicatos esse, acque exploratum est. Quomodo autem vermes ad hoc malum creandum valeant, nemo mihi explicabit; nec aquae igitur inopia, nec vermes, merito incusantur.

De vermiculo sub canum linguis latente, haec habet Alexander Brodie (y).

Credidit autem Plinius, hujus rabiei causam esse vermiculum quendam sub illorum linguis latentem. Est, inquit, vermiculus in lingua canum, qui a Graecis *veres* sive *veres* appellatur, quo exempto, infantes canuli nec rabidi fiunt, nec fastidium sentiunt. Hanc autem Plinius opinionem falsam esse, persuasum habeo. Nam ipse, canum saepissime linguis accurate admissum ac diligenter dissectis, vermem nunquam ullum invenit. Conspicitur equidem, sub eorum linguis, congeries vermiformis (zeta) figuræ, quam nonnulli plexum esse nervosum crediderunt; nusquam autem congeries haec mihi nervosa, cum substantia sit omnino distincta, quae nulli alii connequitur, sed glandulosa potius videtur. Nec ex eo, quod nullum ductum excretorium observavi, quod certe connequitur, sequitur nullum esse; potest enim esse talis ductus, quamvis, propter tenuitatem ac subtilitatem liquoris per illum secreti, adeo parvus sit, ut conspici non possit. Eoque magis mihi haec sententia arridet, quod ex substantiae hujus compressione secuta est liquidum alicujus subtilis parva effusio. Atque, si ita se res habet, haud parum conducet ad explicandam simul et confirmandam communem illam opinionem, morsum, canis, qui post irreptionem hujus substantiae, fit rabidus, rabie hominem afficere non posse; quia, nimirum, verisimile est, particulas venenosas hae glandulae in ure secretas, non amplius fecerit posse; adeoque magis intime, ac majori copia cum aliis visporis humoribus mixtas fore; Nec tamen congeries illa rabiei causa agnoscenda; quia canes

etiam

(x) Biblioth. raisonnée, 1770. Avril, May, Juin, p. 422. Van Swirt. Comment. in aphor. 2229.

(y) Dissertatio medica inaug. de rab. can. p. 8.

\* eam habentes eadem fruuntur siti, qua ceteri qui  
 \* ea omnino privantur. Quamvis hæc theoria minime  
 vera esse mihi videatur, tamen certe recte faciunt, qui hanc  
 congeriem, sub canum linguis latentem, extirpant.

Sed causa, quæ maxime huic morbo solam præbet, est,  
 secundum illustrissimorum medicorum placita, organi su-  
 doris defectus. Canes, quatenus exsiccatores et laboran-  
 tes, nunquam tamen sudare, omnibus notum est; et for-  
 san hic sudoris defectus aliquantulum conferre potest. Tamen,  
 nō multum fallor, contra hanc opinionem multa argumen-  
 ta adduci queunt. Observatione compertum est, in omni-  
 um animalium oconomia, ubi ulla secretio, aut excretio,  
 deficit vel morbo, vel quailam partium peculiari structura,  
 naturam, talem defectum, alia augenda, compensare.  
 Ita cum perspiratio in homine impedita est, urinae magna  
 copia secretitur; et secretio aut excretio ex glandulis in  
 ore, faucibus, intestinisve positis augetur (x). Nec aliquid,  
 his simile, non etiam in canibus accidit. Quibus urina et  
 copiosa et acris est, ac, cum labore et exercitatione oppri-  
 mantur, saliva ex ore copiose funditur; ingenique per hi-  
 litum excretio quæ sine dubio perspirationis vicem sup-  
 plet, e pulmonibus animadvertitur. An aliquæ canum  
 species perspiratione præditiæ sint, fateor me ignorare.  
 Celebratissimi Buffon et Goldsmith, in suis de hac re operi-  
 bus, omnino silent.

Quod de virginum mensibus, Schenckio aliisque memo-  
 riæ proditum, certe absurdum est, et nostra attentione  
 haud omnino dignum videatur (y).

\* In short, as we cannot describe the alembic by which

\* the rattlesnake distils its malignity, nor the process by

2

\* which

(a) Sed etiam alicui repressa perspiratio moveri consiliis, live a  
 metu contracta fuerit, live a primi autumnali frigore, live frigido  
 parietum pedra immiseris, qui remedia ad liberandam aërem, du-  
 dum cessantem, via aliud potentius est. Aliquanto rariis non igno-  
 tum tamen etiam veteribus, accidit, quo hydrops sanatur, dum  
 universa cutis pice acrimie obducitur, ut repercussa perspiratio in  
 diuresin convertatur. Sed etiam ad salivæ viæ humorem perspirabilem  
 micat, quando pedum refrigerium, aliavæ causâ sudorem suppressit,  
 aut aliquem coagulor spiritus effluens, materiam perspirabilem avertit.  
 Elem. Phys. Haller. tom. li. lib. 7. sect. 1. p. 369. Et iterum in-  
 quit, p. 377. Quando hæc exempla repetemus, constabit, non ejus-  
 dem unice classis diversos humores sua inter se cola commutare. Sed  
 etiam per suavi ingana aquam, per muci, aquæ et adipis cola lym-  
 pham et sanguinem, per aquæ, muci, et lymphæ vias adquem, bilem,  
 sanguinemque secretis, atque ad eam omnino, nullum in animato cor-  
 pore separatorium organum esse, quod non omnium classium hu-  
 mores suis eam dotibus segregare queat.

(y) Schenck. de venen. ex animal. p. 348.



\* which the scorpion, that lives among roses, converts  
 \* their sweets to venom, so we cannot discover the man-  
 \* ner by which fishes become thus dangerous (y):<sup>†</sup> Et quo  
 pacto saliva canum rabidorum viribus, suis, hominibus,  
 omnigenisque animalibus, tam diris tamque infestis, polleat,  
 atque difficile est exploratu.

Nulla enim horum hujus morbi causa esse videntur. Sed  
 doctus, quae nobis parum notae sunt, praedixi canes, et  
 inde hoc malum originem ducere mihi videtur.

## CAPUT VII.

*Causae Occasionales.*

HAECA causa est subtilis et potens venenum, salivae et  
 fortasse quibuscumque humoribus rabidi animalis commixtum.  
 Hujus veneni effectus in corpus humanum, longa et molesta  
 experientia, satis patent: sed natura ejus et modus ope-  
 randi adhuc summus medicos latuerunt.

Naturam vel operandi modum ullius contagionis illu-  
 strare perdifficile est. E quibus hoc forsitan medici etiam  
 peritissimi nunquam investigare poterunt. Nam, propter  
 contagionis subtilitatem, ejus dotes in animo tantum per-  
 pendere possumus; quod neque oculus, neque aures, neque  
 gustus, neque tactus, neque denique sensus organa, partes  
 ex quibus constet, detegere possunt. Quae res licet ita se  
 habeat, sitque alta nocte obvoluta, tamen homines rerum  
 naturae studio deditos minime decet, hujus veneni ali-  
 quam notitiam adipiscendi spem omnino deponere. Quam  
 fortasse, diligente rerum verarum et factorum, adfecta ra-  
 tiocinationis et analogiae ope, aliquando adipisci pote-  
 runt.

Quaedam de hac re dogmata medici nobis obtulerunt;  
 sed, qualia minime hujusce rei obscuritatem illustraverunt.  
 Desault (a), Medicus Gallicus, hunc morbum ex conta-  
 gione vermiculari oriri, animo concepit. Ingens minimorum  
 animalculorum vel vermiculorum vis salivae, ut illi  
 videtur, inest. Quia autem, in omnibus fere animalibus  
 disiectis, quae hoc morbo moriuntur, vermes sunt re-  
 peri; quia mercurius et ab eo praeparata affectum tollere  
 censentur; denique, ab analogia contagii pforae et non-  
 nullorum morborum, qui pro suis causis animalia ag-  
 noscunt, ideo ille hanc causam amplexus est. Quae opinio  
 cum nec argumentis validis, nec rebus certis sustentetur,  
 neque

(y) Goldsmith's Natural History, vol. vi. p. 350.

(a) Desault. dissert. sur la Rage, 1734.

neque ab aliis agnoscatur; idcirco, ea omissa, ad aliam, nostra attentione multo digniorem, veniamus. Noster illustrissimus et peritissimus Mead, et etiam alii medici, hoc venenum, et alla *venena animalia*, æteri soli crystallizato virum debere docuerunt (b), et a mechanicis regulis solis eorum effectus deducere valuerunt. Hi sales, inquiebant, spiculis acutis præditi sunt, qui in nervos vel fluidum nervosum, irritando et excitando eos in spasmodicas contractiones, agunt, et hoc modo cerebri cerebellique functiones perturbant, sanguinis circulationem commovent, febrem, delirium, cæteraque symptomata inducunt. Sed, utrum acidi an alkalini hi sales essent, idem vir illustris non dixit. Qui, si acutis spiculis, acutisve ficiis effectus edunt, quare tandem in systemate latent, laud facile explicatu erit. Quare non tenera nervorum extrema quibus primum applicantur, statim afficiunt, ut accidit, quum alia irritantia et stimulantia corpore admoventur?

Cantharidum sales acres, viperæ, tarantulæ, apium, et omnigenorum angulum venena, temporis puncto, in partibus, quibus admotæ sint, effectus edunt, et ab his in alias systematis partes vagantur, ubi symptomata, prout virus plus vel minus valeat, excitant; et aliquando mortem, aliquando nihil præter inflammationem localem, inducunt. Contra, in hoc casu, vulnus, nullo exquisito dolore, nullo insolito tumore stipatum, æque cito ac cætera ejusdem magnitudinis vulnera, perfrangitur.

Ex his multisque aliis argumentis, quæ contra hanc theoriæ adferri possunt, eam minime ad naturam effectusque hujus veneni illustrandos valere, constat.

Aliquid igitur aliud querendum est, quo qualitates, indolemque hujus rei ostendamus, et naturam accuratius perpendamus. Quamobrem pauca de hac re, sed summa dissidentia, summaque verecundia, præferam; ut, priusquam cardinem rei attingam, quædam communia breviter proponam.

1. Venenum salivæ inesse, utpote quod nulle observationibus confirmetur, pro concessu habeo.

2. Hoc virus, quoad ejus naturam et effectus, ab omnibus aliis venenis et contagionibus prorsus differt.

3. A putridis proprietatibus alienum est.

4. Non cum ære ita commisceri potest, ut hominum corpora morbo afficiat.

5. Fixum est et minime volatile, ut ex quarta propositione,

(b) Mead, new edition published at Edinburgh 1772, p. 22, 23, 29. Bracken, the Art of Farriery improved, p. 302.

tionem, et quod saliva siccata, et aëre jamdiu expulsa, rabiem inducere potest, apparet.

6. Denique, pro certo habeo, solum certumque remedium prophylacticum adhuc inventum, excepta membri aut partis recisione, esse terram absorbentem vel calcariam, ut postea confirmare nitat.

His præmissis, illustrissimo viro Ricardo Mead venenum aliquod naturæ salinæ habere, ab multis et variis rationibus, quodammodo assensum. Sed, præcipue ob methodum morbi medendi, vel potius prævertendi, adductus, acidum causam esse asserere velim.

Quo autem modo hoc gignatur, non dicam, potius re vera contentus, quam quomodo effectus tam mirabilis fiat, explanandi cupidus.

Multa huic opinioni faventia mihi occurrunt. Primoque hydrophobicum, ab omnibus aliis venenis et contagionibus, hoc differt, quod putredinis symptomatis nunquam causam præbet. Primo quidem morbi congressu, animi defectio et virium prostratio adsunt; sed paulo post, robur corporisque vires, ut in cæteris maniacis, incredibiliter augentur (c). Sanguis missus et jam concretus, nulla putredinis signa præ se fert, et plus sanguinis hoc in morbo, quam in ullis aliis, etiam absque virium ingenti defectu, detrahi solet. Contra, quum putridis affectionibus implicitum corpus est, ad uncias quindecim vel viginti mittere sanguinem, est hominem in summam debilitatem projicere, imo etiam trucidare.——'I should like,' ait Huxham (d), 'the action of the morbid effluvia in the former, to that of the poison of the viper, which immediately affects and destroys the texture of the blood-globules, and brings on a speedy corruption: but, in the latter, to the virus of a mad dog, which works but slowly, and seems primarily to affect the lymph and succus nervosus, and manifests no signs of putridity, at least till the very close of the tragedy.' Porro, maxima pars contagiorum a putrefactione aut oriuntur, aut ex multum augentur. Miasmata palustria, putrida fermentantur vegetabilium animaliumque, si non oriuntur, saltem foventur et excitantur. Unde in calidis, quam aliis regionibus humiditate et quodam caloris gradu miasmata suscitantur, febres intermittentes facius et satius grassantur. Effluvia humana, vel, ut stricte loquar, contagium, ab hominibus,

(c) Mead, editio published at Ellensburg 1775, p. 24.

(d) Huxham on fevers, edit. 7. chap. 9. p. 11.



minibus, quos putrida mala, ut dysenteria, pestis, febris carcerum putrido obruerint, esse argumenta validissima, confirmant. Sed hoc venenum in vivo corpore, cui nulla putredinis signa adsunt, dum systema nervosum affectionibus laborat, subnaicitur.

Fortasse quaeratur, quomodo acidum in corpore animalis generari queat? Læcet in summam animalis acrimonia acido obviari ita; tamen, ut ex variis causis animalium functiones perturbari et subverti possunt, ita ex acidi nimia copia frequentissime morbos oriri, et semper oriturus, optimis auctoribus, et usu quotidiano, compertum est. Porro, acidi (e) cibi copia, et lente nata acidi humoris abundantia, ipsum sudorem acido (f) odore inspicit, inque lentis nonnullis morbis (g). Porro, quaedam fluidorum nostrorum pars, exempli gratia, lac, saepe in aciditatem ruit. Sanguis ætis mephitici magnam copiam habet, qui acida qualitate gaudet (h); ac quaedam animalia in statu naturali acidis humoribus prædita sunt. Cujusmodi sunt formicæ; unde venenum, quo homines et pecora afficiuntur, acidum esse, satis est credibile. Omnium animalium sevo acidum inest. In humoribus etiam nonnullis, juniorum potissimum animalium, manifestus acor reperitur, in ulpæ etiam evidentior. Jus et gela de carne vituli, sibi relicta, acent. A butyro rancido acis eroditur et effræscit, ut ab acidis liquoribus solet (i). Idem in carnicorum ventriculis inventum est, quod, ex quadam mutatione in carnis decoctis elisatque, oriri potest. Hinc patet carnivororum stomachos facultate acidi generandi præditos esse; quod procul dubio ei putredini, cui, ab eorum victu animali putrescenti, et ex longa saepe inedia orienti, aliter semper obnoxia forent, resistit. Hinc homines a Deo Optimo et Maximo, cibi ex materia vegetali animalique confecti destitutos, colligendum est.

Quæritur hoc venenum spasmos convulsionisque excitat, et ætulum eundem effectus sæpius inducere, neminem, qui medicinas paulo peritior sit, fugere certe potest.

Nilul

(e) Haller, elem. phys. tom. v. lib. 2. sect. 2. p. 19.

(f) Id. ph. univers. p. 19. Quæst. cellays, tom. in. p. 62. Woodward's tales, p. 236, 237. Salsus enim odor utris de sang. constit. 27. Bennet, theat. lib. 28. 29. Ludwig, patholog. p. 64, 182. A methemorrh. Hæmorrh. mem. de l'acad. 1754. p. 274.

(g) Facovine suppur. ossa spum. emollia sunt Navier anal. des os, p. 62. Acidus vegetatus in febr. anomala, Grainger, febr. Bat. 2. 32.

(h) Pichet's Observ. on blood air, vol. 1. part 1. sect. 1. p. 32.

(i) Haller, elem. phys. tom. v. lib. 5. sect. 2. p. 92.

Nihil frequentius ad nervorum vellicationes gignendas, in teneris infantibus, quam acidum in primis viis latens, conducit. Eorum ventriculis acidum inesse ex materia, supra et infra rejecta, manifestum est. Quod et idem hoc acidum his spasmis solum aulam præbere, siqualem tunc obnoque per alkalios, et, præ cæteris, absorbentia tolluntur, haud dubitarem dicere.

Illustris Cullenus, de acidis et proprietatibus refrigerantibus loquens, hæc verba habet (k). "This cooling quality of vinegar may go so far as to imitate the effects of the gas sylvestre, and prove spasmotic, and have all the consequences of an acid generated in the stomach itself."

Venenum acidis dotibus gaudere, a ratione medendi suspicio est. Nec aliter, quo pacto medicamenta, quæ inter omnia maxime eminent, suus effectus, venæ viribus occurrendi, edant, intelligi potest. Si vero acidum sit, ut nunc verisimile videtur, nihil est clarius, nihil manifestius, quam ejus modus operandi.

Remedium, quod septentrionales Angliæ incolæ, pro medicamento prophylactico, et cum felicissimo et facilissimo exitu, ut experientia diutina docuit, semper usi sunt; penz totam e creta, seu quadam alia terra absorbenti, consistit.

Hoc medicamentum nullis proprietatibus, quibus in nostrum systema, et præcipue in genus nervorum, suus effectus edere possit, nisi vi absorbenti, et forsan allringenti quadam qualitate, per suam cum acidis conjunctionem acquisita, præditum esse, eulioribus medicinæ notum est. Idem omnia ædæ, siue vegetabilia, siue mineralia, siue denique animalia, penitus destruit; imo cuilibet materie, in statu fermentationis admodum, acidorum generationi obviat it; ut experimentis a celeberrimo Equite Pringello, viro, qui optime de literarum republica meruit, institutis, clare constet (l).

Ejusdem experimentis, hoc medicamentum nihil profuturum esse, si virus putridis alkalibus particulis gaudet, quia creta revera sepius est, demonstrant (m).

Creta acida, tam extra corpus quam in primis viis absorbet et extinguitque. 1. Tandem hæc vires in acido, in genere sanguifero existentia, haud exorere posse, obijci potest; et, si possit, 2. Quare igitur, ubi adsint hydroplici-

(k) Cullen Mat. Med. p. 371.

(l) Pringle's Diseases of the Army, appendix, paper 3d. cap. 24.

(m) Ibid. cap. 23, 24.

hæc symptomata, non morbum tollit? Prima obiectio nihil valet. Quare non eodem effectus in systemate, quam extra, edere potest? Varia et valida argumenta talem sententiam confirmant stabiliuntque. Sulphur mercurio, antimonio, et forsitan arsenico, vim aerem operandi adimit, sive intra, sive extra corpus, illis admisceatur. Mercurius hoc modo in virus (n) venereum agit, et sic fortasse cala viva, alkali causticum, et aer mephiticus, calculos dissolvunt. Porro, quamvis creta caeteraque absorbentia non aqua penitus dissolvuntur, tamen eorum particulae minutissime dividuntur, per totum fluidum diffunduntur, et diu in ea suspensae manent. Quin et quaedam particulae tam intime aquae admisceantur, ut cum ea simul per chartam bibulam (o) transeant; cujus pori aequè parvi sunt, ac vasorum lymphaticorum, vel lacteorum oscula. Et, quoniam absorbentia hæc haudquaquam acia sunt, quare non a lacteis absorberi possunt? Multa medicamenta acque indissolubilia, acrioraque, in nostrum systema intrant. Vasa lymphatica sæpiissime terram calcariam vehere, certum est. Celebrerrimus noster Monro (p) experimentis argumensque probat, terram ossium frequenter absorberi.

Sic opinatur clarissimus de Haen (q). \* Quæri hic potest, num omnes illæ cretaceæ materies tantummodo a solidis humani corporis detritivæ? an vero dentur alimenta, potulentæque, quibus subtilissima hæc terra continetur; quæ idoneo vehiculo mista, lacteorum oscula subeat, cum sanguine commisceatur, ab eodem per urinam abluatur? Sane regiones, in quibus calciculos vix invenire est, ut, æ. g. multi Lombardiæ loci, ejusmodi suggerunt suspicionem.\*

De quibus qui plura scire et certiores fieri studeant, eos ad observationes Cullenii (r), Morgagni (s) et Sauvagesii (t) relego; qui, terras calcarias vel generari, vel in nostrum systema intrare posse, observando, ostenderunt. Hi peritissimi auctores multa exempla memorant, quibus terra calcaria a pulmonibus per aliquot annos copiose expueretur.

Sic

(n) Duncan's treatise on the action of mercury in the venereal disease.

(o) Home prælect.

(p) Monro prælect.

(q) De Haro Rat. Med. tom. ii. de Calculo, Uva Uris. &c. cap. 3. p. 25.

(r) Cullen. prælect. de Haemopt.

(s) Morgagni. de caus. et eff. morb. epist. 45. art. 19, 20, 21, 22, 23. Schenckius, lib. 2. de pulmonibus, p. 227.

(t) Sauvag. Nos. Method. tom. ii. p. 456.



Sic etiam ait celeberrimus Fordyce. ' Sometimes a quantity of calcareous earth is found in the urine (y), suspended by a mechanical mixture, or at least mixed with an acid.' Si quis tam dubius, tamque incredulus, existat, qui, quae jam dicta sunt, neget; tamen et ille in eam sententiam concedet, has terras calcarias acidis saturatas facile absorberi posse. Et nemo scientiae chemicae gnarus insuetas ibi, acida diversa, varia corpora, diversa modis, attrahendi vim possidere. Acidum igitur, de quo contendimus, majore vi terrae calcariae se conjungere, quam acidum in ventriculo existens, et hinc decompositionem fieri posse, aequum est concludere. Creta acidum, cui unitur, fugat, et virus rabiei caninae petit. Ad summam, minime dubitandum est, quin creta et caetera absorbentia in acidum, vel intra vel extra corpus, suas vires exercere possint.

Quam rem sequentia maxime confirmant; ' An eminent (x) practitioner at Leyden has of late used the oculi cancrorum with great success in the cure of fluor albus. He gives this medicine, to the quantity of half an ounce in 4 days and observes, that it is particularly serviceable in that species of fluxus albus, where the acrimony of the discharge is so great as to corrode the parts.' Quenam est natura materiae leucorrhoeae? Quomodo agunt oculi cancrorum? Certe viribus astringentibus aut antisepticis, quam experimentis Joannis Pringelli septicis dotibus instructos esse, compertum est, morbum non tollunt.

Obiectio altera, quae validius est, minime tamen valet ad nostram opinionem refutandam. Nam, quum primum symptomata morbi sese ostendunt, venenum in systema nervosum suus effectus edidit. A quo totum fluidum nervosum vitari verisimillimum est. Tale igitur medicamentum nihil aut parum boni praestare, in systema nervosum penetrando, quia illuc penetrare nequit, sed antequam illuc acidum venenum pervenit, et dum in sanguine, aut lymphâ lateat, in id agendi copiam terrae calcariae praebet.

Haec argumenta resque verae sunt quae in hanc me opinionem perpulerunt. Haecque tenuis hujus veneni naturam investigare, vel potius de ea conjecturas facere, quod nihil obscurius, nihil difficilius, nihil majore caligine vel tenebris obrutum est, comatus sum. Quod, si in re tam difficili, tamque ardua elaborando, erraverim, at, ' Humanum esse errare,' memineris velim. Certe eadem non aequo

jure

(y) Fordyce Elem. Pract. Physic. lib. 7. p. 22.

(x) Med. Com. Edin. vol. 1. p. 315.

jure mihi, quas illustrissimus Pringelius sic, qui sibi acedam scorbuti speciem esse sinnerant, objecit, obijcienda spero. Id, de scorbuto natura agens, dicit (y) : ' I cannot, for still more, see what relation the various kinds of scurvy and rickets (which are species of the leprosy) have to the disease of sailors; or how those who admit of putrefaction for one cause of the hurry, though, at the same time, acknowledge an acid acrimony for another. It would seem as if they had been led into this last inconsistency, by observing how serviceable the raphanus ruscifolius, the cochlearia, and the like plants, had been in the cure. For, as all these were deemed to be of an alkaline or putrefying nature, an acid species of scurvy seems to have been invented, in order to account for their virtues. But, from the experiments laid before the Society, it appears, that those vegetables are real antiseptics (z), and therefore possessed of qualities very different from what those respectable authors imagined, when they considered their alkaline parts as septic, and their resolution, in heat and moisture, as tending to putrefaction only, and not to fermentation.'

## CAPUT VIII.

*Causa Proxima.*

Hujusce morbi causa proxima manifeste in systemate nervoso haeret, et ex materia quadam extranea in corpus recepta, cujus naturam supra explicavi, ortum deducit. Intimae systematis nervosi structurae cognitio adeo deficit, ut certam rationem, qua venenum, sive acutum, sive album, sive cujusvis generis, operetur, non indagare possimus. Quod, cum ita sit, nihilo tamen minus illius impetum ad hoc systema referendum esse, ut spasmus et convulsiones clare demonstrans, credibile est.

Cum enim morbus primo per languorem, lassitudinem, appetitum prostratum, solitudinis desiderium, aliquae debilitatis signa, sese manifestet; venenum ad claustrum sceleratum referre, haud sine ratione est. Convulsionem vero ipsorum, summaeque irritabilitatis (a) symptomata, illud suae in nervos, maximam mobilitatem inferendo, effectus

(y) Pringle's Diseases, appendix p. 23.

(z) Ibid. xxi. 11, 12, 13, 14, 15.

(a) Irritatio, ut nota dicitur, est illi vis tanta visibilis, ut levissimi stimuli in tantum erumpat excoere, quibus aequilibrio functionum tenor perturbatur. Insit. Patol. Med. Gaub. p. 22, tit. 170.

scelus edere, et inde hos motus inordinatos et astringentes immanes, a stimulis etiam levissimis, oculis, argumento sunt.

## CAPUT IX.

*De Diagnostica.*

ILLUSTRISSIMUS noster praeceptor Franciscus Home, de hoc capite, in egregio suo opere, cui titulus est Principia Medicinae, agens, ‘*Diagnosis*,’ inquit, ‘est ea pars pathologiae quae tractat de specifica morborum consimilitudine natura et differentia. Sine hac scientia, nulla salubris institui potest prognosis vel therapeutica, et medicus adstantibus saepe ludibrio fit.

‘*Extruitur diagnosis omnium symptomatum notitia, sed praecipue eorum quae semper morbum concomitantur, et ob hanc characteristica vel pathognomonica dicenda sunt. Haec symptomata characteristica in diagnosi nobis semper enumeranda sunt.*’

Nec dubitandum est, quin, in multis morbis tractandis, diagnosis omnino necessaria sit. Nam symptomata morborum saepe consimilia tenus externa specie sunt, quamvis eorum naturae multum inter se discrepant, et plane diversae medellae parent. Sed, cum hic morbus tam insignibus, tamque celsis, symptomatibus stipatus sit, ut nemo, qui nomen medici sibi vindicet, de eo ambigere possit: ideoque, diagnosis attingere, seu iterum signa pathognomonica exponere, supervacuum proflus foret.

## CAPUT X.

*De Prognosi.*

POSTquam symptomata hydrophobiae apparere, salutis fere inanes sunt spes, et in universum nihil praeter mortem miserissimam expectari potest. Sed, quoniam hanc fortasse cura et medicamenta quaedam tardiorum leviorumque reddere, atque etiam aliquam salutis spem praebere queunt; certe ad extremum sic remedium decurrere, quam miserissimum agrum suo sano penitus relinquere, praestat. Verum enim vero, exempla, quibus aeger hoc morbo simpliciter convalescit, tam pauca et rara sunt, ut solorum Empiricorum insipientiae et audaciae effrenatae, cuilibet certam salutem promittere, videatur.

## CAPUT



## CAPUT XI.

*Symptomatum Ratio.*

QUAMVIS hujus morbi symptomata varia et multa sint, tamen ad paucapita referri quaeant: Nempe, convulsiones, fluidorum deglutiendorum difficultatem, horrorem, anxietatem, delirium, et immodicum salivae profluvium; ex his, et earum causis, alia symptomata minora suam trahunt originem.

*Convulsiones.* Ita constructum ab optimo et summo Opifice corpus humanum est, ut ex internis insitisque viribus, absque ullis stimulis aut potentia externis, motus et actiones perficiat. Haec interno via procul dubio est animus, cujus imperio corpus subiecitur. Exempli gratia, animus vult, ut certi musculi membraque in actionem eleantur, eamque voluntatem motus statim sequuntur. Quod ita fit: Animi quasi mandatum ad hos musculos per nervos, velut internuncios, deferatur. Cui rei idoneus animi simul et corporis status requiritur. At, si aut animus, aut corpus, aut ambo, male se habeant, tum, sine mentis consensu, motus inordinati, qui involuntarii vel spasmodici vocantur, exoriuntur. Neque tamen in hoc, ut in altero casu, hi motus non a fluidi nervosi, sive potestatis nervosae in musculos influxu, nascuntur. Cum diversae corporis nostri partes musculis, variis officiis subservientibus, praeditae sint; ita, si vis nervosa solummodo in musculos, crura vel brachia scedentes, impellatur, membrum vehementer contractum fit, et musculi extensores longiores redduntur. Haec musculorum contractio violenta et invita, ex quadam nervorum lachione, vel quodam stimulo extrinseco applicato, oriri potest; illa effectus vehementiores diuturnioresque excitat; hic plerumque effectus fugaces edit, qui, causa ablata, statim evanescent.

Spasmi autem vehementissimi oriuntur, quum stimuli acres nervis summopere irritabilibus et mobilibus applicantur, ut in hoc morbo plerumque usu venit.

*Fluidorum deglutiendi difficultas,* manifeste a musculorum, deglutitioni subservientium, convulsionibus pendet; quibus efficitur, ut humores nulli in oesophagum recipiantur. Quare autem haec deglutiendi difficultas solum inter bibendum nascatur, haud facile explicatu, et forsitan clare et recte non omnino explicabile est.

Oeconomiae et structurae corporis humani prudentibus optime notum est, certos stimulos nervis unius musculi

sanè applicator hunc irritare, et in vehementes contractiones spasmodicas compellere; cum eisdem stimulis, alterius musculi nervis applicatis, eundem effectus minime sequitur. Celeberrimus ille vir Hallerus, de motus animalia phænomena agens, hæc habet (b). Videtur etiam, alia corporis partes aliter ab eisdem stimulis edfici. Itaque vesica ærem urinam tolerat, injectam tepidam minime commode fert. Ventrículus animæ ad vomitum citatur, quo oculi non irritantur.

Pari ratione, in rabie canina, ubi musculi et nervi continentur tam longe abeunt, hoc mirabile phænomenon pro sua causa, instrumentum quoddam, ab humoribus solis suppetens, agnoscere potest. Illustrissimus Whist, in suo egregio de vitalibus et involuntariis motibus opere, multorum stimulorum mentionem facit, qui diversis musculis admodum varios et valide diversos effectus ederent. Cold water, which is very agreeable to the nerves of the stomach, excites violent coughing as often as it gets into the wind-pipe. Light, which by irritating the retina occasions the contraction of the pupil, does not act sensibly as a stimulus on any other part of the body. Although an injection prepared with corrosive sublimate, occasions considerable pain, when it is introduced into the urethra; yet neither it, nor the urine, excite any convulsive contractions of the musculi acceleratores urinae, as the semen does, although it is of a soft unctuous nature, and possessed of very little acrimony (c).

Cui opinioni longe diversa invaluit. Quæ ad humores hauriendos in corpore vi, atque vehementiore muscularum actione, quam ad firmam devoranda, opus esse contenditur (d). Nec epiglottidem spasmo affici posse; hinc humoris pondus ad eam convulsionemque superandam, et epiglottidem, deprimendam non sufficere; et sic paululum aquæ tracheam intrare et suffocationem minitari, non est verisimile. E contrario, panis aut firmi quilibet epiglottidem deprimunt, laryngem accurate claudunt, et absque ullo suffocationis periculo in oesophagum viam sibi aperit. Quæ res in quibusdam casibus certissime sese habet, ut huiusmodi exemplum clarissime demonstrat (e). Quæ licet ita sit, nihilo tamen minus

VOL. III.

3 T

10

(b) Haller. Elem. Phys. op. mæd. tom. iv. lib. 11. c. 466.

(c) Whist of the vital and other motions, book 3. c. 10. p. 22. 40.

p. 22.

(d) Mæd. new edit. prob. Edis. 1775. p. 61.

(e) Sic videt Tulpius, in muliere quædam (p. 224), post vomitum, ære glottidem, et quædam excretionem, tam pertinaciter vesicula depresso.

in hoc malo multa et gravissima argumenta mihi persudant, hauriendi humores difficultatem, ex quadam irritatione, quæ fluida contagiosa præstita sunt, pendere.

Primo, in morbi historia nulla enjalis in gutture affectionis, præsuppositæ liquores admoveantur, mentio fit. Sed, cum primum aeger libere conatur, non tantum puerum, sed etiam aliarum corporis partium, muscoli convelluntur. Atque Richardo Mead, Sauvagesio et alijs testantibus, multi, saltem sub morbi initium, nequaquam aquæ usum expaveſcunt, neque a liquoribus abhorrent. \* As to the  
\* hydrophobia (f), the patient at first has no dread of water, nor any aversion to liquors. On the contrary, he  
\* sees them with pleasure; being thirsty, he desires drink:  
\* But then soon wonders what should be the reason that  
\* he is not able to take it. He contrives ways to do it,  
\* by endeavouring to suck through a quill, &c. but soon  
\* cries out, it is impossible. When asked, why? He answers it will not go down, it strangles him; and begs to  
\* be excused trying any more. In nonnullis etiam casibus, aquæ visum expaveſcit ægrotans, priusquam libere conatus est. \* Hydrophobus (g) ille, cujus meminit ex-  
\* labrimus Sauvages, sensit se non posse ferre conspectum aut contactum aquæ, dum scyphos chutere vellent,  
\* iaculum tamen oblatum adhuc deglutire potuit, sed  
\* cum molestia.

Secunda, semper spasmos, humorem in ægentantis conspectum danilo, inducere possumus. Quo sublato, illi brevi prius evanescunt.

Tertio, causam proximam et auxilii mobilitate ex irritabilitate

tionis musculos, ut ne guttulim quidem transcurrere possent, licet res dolens, nec tumor, nec ulla visum ingerere apparet: unde etiam septima die perit. Hinc aliæ malum latè insidens vel in muliere quadragesimoque anno, ætatem præsumptam. Dum enim ante novem menses optima valens appetit præmium iumentis, morabatur, quod, aliquæ ulla causa provocata, subito tempore deglutit: nullum tamen dolorem sustulit, nullus tumor apparuit. Medici et chirurgi in consiliis vocati tentaverunt plura remedia, neque tamen integre potuerunt deterrere modum. Monstrat enim late deglutitionis impedimentum, ut liquida nullo modo, solida vero rivas, impetibus impetores, transcurrere in ventriculum possent. Hæc tamen ex quoque in malum mutabatur malum, ut, dum me consuleret, novem jam elapsis mensibus a primæ morbi initio, liquida potuerit quædam deglutire, si modo quoque vel fixa simul et firmi ingereret quæm subtilissime. Porcum vero liquidum quovis modo deglutire valebat. Van Swiet. tom. II. com. inaph. 818. p. 23.

(f) Mead, new edition, p. 126. 1771.

(g) Van Swiet. Cum. in aph. 132. tom. II. p. 221.



bilitate systematis nervosi pendere, compertum habemus. Sic musculi levissimis stimulis, qui nullum effectum in corpore sano edunt, convelluntur. Aër frigidus, lucernae lux, jubar, corpora plurimum vitæ et splendentis; sonum inter aperiendum vel claudendum sonus, in nonnullis aegrotantibus, æque ac aqua, eadem symptomata excitant. Quos tamen omnes effectus ex quadam irritatione, systemati nervoso applicata, oriri, haud ambigitur. Quæ igitur cum ita sint, difficultatem hauriendi, convulsionum ex aquæ stimulo orientium, et minime spulmorum prius existentium, effectum esse verisimile est.

Quaecunque autem causa hujus phaenomeni sit, (quavis prior opinio, nempe, irritamentum quoddam humoribus inesse, quod spasmus, &c. gignit, ad scopum propius mihi accedere videtur), humoris conspectum vel etiam mentionem eadem symptomata excitare, non est mirandum. Animus enim mirabiliter actiones nostri corporis regit, et mirus sane inter corpus et mentem consensus est. Quo certe fit, ut idea eundem effectum, ac res ipsa, edat. Quam rem mille exempla, huic procul analogæ, firman. Multos, qui, postquam semel tartarum emeticum, ipecacuanham, aut alia medicamenta emetica sumplerint, semper postea horrore vomituque, ad emetici conspectum, vel etiam mentionem, corripì, neminem laret. Condiscipulus Zacuti casum ita averfabatur, \* ut syncopen ab ejus odore \* sæpe incurreret; \* socis per jocum oblato huc cibo, ita- \* tum cum livore faciei, stertore superveniente, cum pulsu \* parvo, mortis imaginem repræsentabat; at, spuma ex- \* creta ex ore more epilepticorum, ad vitam revocatus \* est (h). \* I like calbage very well now,\* ait celebris- \* mus Alison; \* but remember when the smell of one was \* hateful, and disposed me to vomit (i).\*

Nec quisquam ignorat, grati et jucundi cibi odorem, conspectum, vel etiam commemorationem (k), salivæ profluvium in jecuri hominis ore excitare, et ita quidem, ut apud vulgus hæc nota res locum proverbio præbuerit, \* It makes my mouth water.\* Illusterrimus Boyle (l) hominem meminit, cui olivætorium, ubi odore privata ven-tilis erat, forte prætereunsi, hæc, quamvis olim absque ullo incommodo bibi ab illo solita, vomitum moveret. Sed, en mirabile exemplum ad hunc scopum maxime pertinens,

(h) Sauvage, *Nat. Method.* tom. 5. p. 671.

(i) Alison's *Mat. Med.* vol. 2. lib. 4. p. 20.

(k) Haller, *Gen. Phys.* tom. 1. lib. 1. p. 462.

(l) Boyle's *Usefulness of* &c. *quædam ad Phæon.* part. 2. p. 260.

et quod nostrae opinioni certissimam fidem facit (iv). Petrus ille Magnus, Russiarum Imperator, a juvenute tam vehementer aquam abhorruit, ut, absque sudore gelido et nervorum dissentionibus, flumen transire nequiret. Cujus rei causa sic memoriae prodita est; eum, quum quintum aetatis aegens annum, Rhoda cum matre prope flumen haberetur; catarschu vel aqua cum sonitu in praecipiti ruente in matris gremio dormientem adeo perterritum, ut febre statim corripereetur, nec aliquot post annos vel flagnum, nedum flumen, absque summo terrore et convulsionibus videre sustinuisse. Multa hujusmodi exempla (v) eodem pertinentia adduci possent, sed haec sufficere videntur.

*Horror* in variis morbis, praecipue caeteris, in febribus occurrit. Idem saepenumero a frigore excitatur, et plerumque sensum frigoris emitem habet. Vehemens in tremorem transit; qui pro sua causa paralysem aut partis aut totius systematis agnoscit, et nihil saepe aliud est, quam certamen, ex continuata debilitatis et potestatis medicatrix naturae alternatione, oriens. Sed, in hoc casu, horror ex spasmolice vasorum extremorum constrictione, et haec iterum ex irritatione, pendet. Rursus irritationis, qua horror excitator, causa, humoris vel conspectus vel mentio saepissime est. Quae ratio opinionem antea tractatam corroborat, difficultatem, nempe, deglutienti a convulsionibus, irritatione humoris effectis, originem ducere.

*Famulus* in aliis morbis alias causas agnoscit. Aliquando ex acri materia in systemate genita, ut in cholera morbo et putridis febribus, fit; aliquando ex acri materia in ventriculum assumpta; aliquando ex mera stomachi musculorum fibrarum debilitate, ut in syncope et dyspepsia fit; aliquando ex totius systematis atonia, ut in febre typhode incidit; item denique a ventriculi spasmis, cum nullae aliae causae in corpore subsint, oritur. Et, in fallor, in rabie canina, qui ex mobilitate et irritabilitate systematis nervosi pendet, spasmus causa vomitus est.

*Convulsio* autem sic mihi explicabilis est. Ut unusquisque humani actiones facili, jucundo, et debito ordine pericerentur, necesse est sanguinis circuitum nulla in parte impediri. At, si sanguis ex quavis causa, puta, ex Ir-

gure,

(iv) Hist. Russ. Imp. under Peter the Great, Vol. i. vol. i. p. 123.

(v) Cullen's praefect. de Epilepsia et de Insult. Med.

Peri modo, equit Hallerum, ut convulsiva tabula lactiva, aut odor elemum perculoriscant veserem, et omnes insidiat, et omnium animalia. Haller, Elem. Phys. tom. 2. sect. 4. p. 101.

pure, ingenti debilitate, spasmodis, moerore et terrore in minima vasa superficiem externam non impellatur, is circa cor et pulmones accumulatur. Hinc anxietas, somni inquieti, suspiria, debilitas, cordis palpitationes, spirandi difficultas, et aliquando etiam mors.

*Hiatus oris* sub morbi finem, quo tempore muscoli vultus et oris, ob continuos et immanes spasmos, suum tonum penitus amiserunt, et quasi paralytici deveniunt, supervenit. Hinc maxillam inferiorem non suspendere agnoscens potest; quae ideo sua gravitate delabitur. Et fortasse stridor dentium, qui mordendi desiderium vocatur, subito vis nervosae in hos musculos influxu, nascitur. Eque eadem causa, scilicet, musculis relaxatis, lingua extra os eminet.

*Vox rauca et insana*, hanc explicationem recipit: Ut vox clara et harmonica sit, opus est musculor et laryngis cartilagineo justum intentionis humiditatisque gradum habere. Quoniam vero, ex symptomatum historia, haec organa citissime et frequentissime convulsionibus affici, addiscitur; ideo muscularium fibrarum tonus perit. Musculique pene paralytici, et ex difficultate, tum alius cuiusvis humoris, tum salivae deglutiendi, aridi deveniunt, et vocem modulari nequeunt.

*Delirium* auctores plerumque omnes, auctae actioni encephali vasorum, vel cerebri aut ejus membrarum inflammationi,tribuendum esse contendunt. Eaque causa in variis morbis, praecipue febribus inflammatoriis, certe subest. Caeterum, in quibusdam aliis, res non ita sese habet. Et, quod ad hunc morbum attinet, delirium non ex inflammatione aut vasorum aucta actione, quia hic non semper subest, sed per intervalla solaminodo, cum aegrotans humore et caeteris irritationis causa urgetur, reverti solet, oriri verisimile est. Ob quam causam, nostri celeberrimi Culleni, majorem vel minorem cerebri cerebellique excitationem, delirii causam iudicantis, doctrinam sequendam arbitror. Si quis autem de hac re certior fieri velit, cum, ut praedilectiones Cullenii, vel dissertationem inauguralem de intermittentium causa ab eruditissimo, et nuper in hac academia studioso alumno, medico Bouclier editam, ubi haec theoria lute et eleganter exponitur, perlegat munemus. Quod cum ita esse videatur, tamen sub morbi in hoc casu lineam, inflammata aut vasorum cerebri aucta actio delirium exsuscitare potest; si quidem, continuatis muscularum spasmodis, sanguinis circuitus impeditur,



ipse in vasa cerebri magna copia impelli, et hinc infantimationes, dilentationes, et delirium oriri, possunt.

*Fluxus salivae auctus* ut explicetur; nō fallor, salivae secretio non resecta multum augetur; sed tantum res sic sese habere videtur, quia aeger non deglutire potest, et quod spatium et oris hiatus ductus excretorius glandularum salivarium comprimunt, et sic excretionem adaugent. Unde saliva diu oris retenta, ibi agitata et aëri commista, spumae speciem præ se fert.

## CAPUT XII.

*Modendi, vel potius curandi, Methodus.*

**H**ujus morbi curandi methodus in duas partes recte dividitur. Prior apud auctores Prophylactice nominatur, et omnia, quibus venenum in systema receptum et sanguini admixtum prius depellatur aut dometur, quam suas vires exerat et symptomata rabiei moveat, comprehendit; posterius ea tractat, quae ad symptomata tollenda, aut saltem levanda, maxime pertinent.

Ex quibus methodus prophylactica hic maximi momenti est, et in ea spes salutis praecipue sita est. Eoque de ea fere solum hic agitur.

Prophylactices duo consilia sunt,

1. Ex systemate venenum quam primum expellere; quod, si fieri non potuerit,
2. Ejus viribus obviam ire, et sic effectus noxius praecavere.

Primo consilio multa et varia remedia respondent, sed quae magis ad chirurgi partes quam medici pertinent; ita tamen ut medicus, remedia, temporis, et eorum administrationum modum scire debeat, praecipiatque; quamvis illius mandata exsequi chirurgi sit.

Multa medici, tum antiqui (a), tum recentiores (p), ut quamprimum totus locus, cui venenum admotum sit una cum vicinis, vel excidatur, vel magna profundisque scatificationibus percutiatur, quibus magnae et valide trahente cucurbitulae admittantur; dein vulnera bene curata, ex sale, aqua, et acida compolita, sanantur, praecerunt.

Alii

(a) Galenus de *tractu*, ad eos qui introducuntur, cap. 8. *Quart.* tom. II. p. 293. Dioscorides *Tarriac.* cap. 2. p. 224. Celsus de *Medicina*, lib. 8. cap. 27.

(p) *Palmarum de morbo canis rabidi*, lib. 8. cap. 2. p. 136, 137. *Hilarius Centuria 1. Obliqua Canis*, 17. p. 61. Boerhaavius, 228.

Alia (g), unguentum mercuriale, caustica medicamenta (r), imò etiam ferrum candens, laudaverunt. Nec inficias illo, quin hæc sæpe corpori venenum ademerint vel ejus vires penitus persequerint, et sic alterata ratione morbo efficaciter occurrerint. Cum vero sæpe accidat, ut hominibus, qui contagium luseperint, non adsit chirurgus, et sæpe partibus haud excerpationis aptis morsus incidantur; et talis morandi methodus multum porro doloris et difficultatis adferat; ideo nunc, roque magis, quod medicamentum tam efficax tamque simplex nobis in promptu est, ab omnibus opus chirurgicum tandem fere rejicitur. Adversus autem scarificationem et cauterium, siue potentiale, siue actuale, hoc insuper arguendum est, quod nihil, nisi sitim, post modum applicata, prodesse possunt. Venum subtilissimum cum cito systema penetrat, ut nullo chirurgi auxilio, nisi membro reciso, quod doctissimus et periclitissimus lusus (scilicet medicus commendavit (z), amoveri possit. Perpaucos autem remedium tam crudele, tamque dolorificum, præsertim si membro majori virus forte adnotum sit, passuros esse, scio. Quia et in primis difficile exploratum est, cum animal vulnere aut saliva alteri rabiem intulerit visum sit, an ipsum ante morsum pro certo rabidum fuerit. Et, si hoc vel maxime explorari posset, tamen etiam ambigi potest nec liquido apparere, quin tabidus ille, puta, canis, sic mordere putuerit, ut nulla veneni pars corpus alterum penetraret. Sed recidere tamen membrum, quamvis crudele ac terribile videri poterat, nihilominus, priusquam id remedium, de quo postea dicatur, exploratum est, optimum ex omni copia erat.

Alii lavationem frigidam frequentem laudant, alii calidam in coelum, pro remedio prophylactico, quo consilio dicere nequeo, tulerunt. Ex omnibus vero, longo et quotidiano usu edoctus, nihil unquam profuisse compertum habeo. Sed hæc hæc tenens. Jamque restat, ut ad ea, quæ secundo consilio respondent, viribus, scilicet, veneni obviam ire, et sic ejus effectui occurrere, veniamus. Eorum quæ ad hoc consilium spectant, de virtute multa jactantur. Quæ utique egregiis illis laudibus, quibus elata sunt præterius insignia esse, experientia lais constat: Quorum vires quoniam Magnus Boerhaavius tam eleganter, tamque breviter, in aphorismo 1147. commemoravit, ita haud abs re mihi visus sum totum cum aphorismum hic recitare.

(g) Senner. Nat. Method. &c. De Hydrophob. tom. II. p. 236.

(r) Galeoni in Journ. cit. Dial. med. Nov. tit. Palmarius loco citat.

(z) Sauvagesius Dissert. sur la Rage.

citare. \* Hactenus vero nullius ea comperto fides, cui credi  
 \* queat salus miserum periclitantis hominis, quum nul-  
 \* lum sit notum, cujus experimenta certa; sed vel spe-  
 \* culationi ortum debent, vel descriptis ex aliis confi-  
 \* sum fuit: Nec Ascletrionis apud Galenum, et Orba-  
 \* sum arcam de canis vomibili; nec Scribonii Lari  
 \* sanguisuga opista ad rabiem Siculorum; nec Placini  
 \* consilio de pelle hyaene; nec Aëlii, Rufi, Vallianii,  
 \* cinere trancorum cum theriacis: nec iactata Palmario  
 \* medela; vel nimis laudato Mayerno, Grew, et senato-  
 \* ribus, stanni cum mithridatis; nec in infomitis sacris  
 \* revelata radice cyathodons, aliisve in coctum elato  
 \* lichene cinereo tetrastri, pimpinella, jecore salubri canis  
 \* causto, et similibus, exceptis.

Hinc nullum certum remedium prophylacticum dum  
 vitali fruebatur aura Boerhaavio, innotuisse, apparet. Ne-  
 que tamen, ut ex aphorismo 1346, colligi potest, egregius  
 ille vir remedii efficac, aut, ut aiunt, specificum, olim  
 inventum iri desperavit. Mentis fere ejusdem est editur  
 operis illustrissimi (t) Senac—\* O nimium felix huma-  
 \* num genus, si talia adversus alios morbos specifica e si-  
 \* nu suo protulisset natura! Manet forte nepotes hanc se-  
 \* licitas!

Quod dictum, nempe Boerhaavio, tempus tandem firma-  
 vit. Jam enim remedium efficacissimum præparatum est,  
 quod per triginta annorum spatium felicissimo et faustissi-  
 mo eventu, per totas septentrionales Angliæ regiones, u-  
 surpatum est. Hoc medicamentum, nisi omnia me fallunt,  
 ex creta, boli Armenæ, alumine, et emulæ campanæ pul-  
 vere, constat. Quæ omnia, creta excepta, ad compositi-  
 onem luvandam, et vulgus specioso medicamento fallen-  
 dum, adjecta sunt. Duba ut administratio ejus simplicis-  
 sima, et hæc sunt. Quum primam homo morsu vel quovis  
 modo venenum in suum systema recepit, quo citius, eo mo-  
 tius, misturam ex,

Pulveris cretæ, 5 ss.

Boli Armenæ, 5 iij.

Alumini, gr. x.

Pulveris Emulæ campanæ, 3 i.

Olei Anisi, gut. vi.

omni mane ad sextam vicem capiat, ex aquæ cyatho, cui  
 lactis recentis paululum admissum est. At, si ventriculus  
 totum haud ferat, partitis vicibus sumatur. De operandi  
 modo hujus medicamenti antea dictum est; et, si qua



nostrae conjecturae de natura veneni fides habenda sit, ejus in virus actio facile concipietur.

Nonnulli ambigere possunt, si medicamentum tam simplex huic morbo profuturum sit; at experientia summorum medicorum facile princeps, in frequentissime rabiem caninam praeventisse, docuit. Ipsemet hoc medicamentum haud semel administratum vidi, prospero successu; et ex mille casibus, quibus idem tempore assidue datum fuit, exempla perpaucis sunt quibus aegrum spes fecellit. Limites hujusce dissertationis omnium exemplorum, quibus hoc medicamentum utiliter administratum est, haud mihi memorandi copiam praebent; eoque unum, quod pro crucis argumento sit, solum in medium proferam.

Mense Septembris, anno 1773, juvenis quidam, nomine Josephus Stoney, amicus meus, et medicinae cultor studiosus, viginti sex canibus venaticis, tertio quoque die, ad tres vias, bolum ex hujus pulveris drachmis tribus compusitum administravit. Illorum canum sex vulnerebus sanguinem fundentibus, ex morfu rabidi canis affecti, et duo crudeliter dilaniati sunt. Postquam hos omnes commorderat, et multis aliis injurias intulerat, affectus canis in custodiam traditus, sequenti die, inter horrida rabiei caninae symptomata animam expiravit. Sed morfi ab eo, et sic, ut dictum est, curati ad hunc usque diem omnino rabiei immunes existerunt. Sed, heu! in rebus humanis nihil certum, nihil stabile est!

Mense Maii, anno 1774, duae infelices foeminae, a rabida sepe morsae sunt; ambo remedium, a viro nomine Hill praeparatum, statim sumpserunt. Vulnere earum cito cicatrice obducta sunt, et per quatuor menses omnia bene se habuerunt. Verum, sub finem mensis Novembris, altera mulier rabie implicata est, et triduo diu obui suppreum; altera, quamvis diu animi dislocata, tamen nunc in tuto quiescit (a).

Mense Februarii 1774, Felix rabida virum, annos quadraginta natum, mulieremque demibus affecit. Utrique hoc medicamentum summa cura administratum est. E quibus vir decimo sexta die Junii, hydrophobia correptus, brevi animum efflavit. Mulier autem vita incolumi fruatur, et, ut spero, diu fruatur (x).

Quod, si apud aliquos fortasse, ob haec duo infausa exempla, huic medicamentum levior fides habeatur, tamen si eos causas infelices si cum multis salubribus conferre voluerint, ad incognita et fortissima rerum referent, et medica-

Vol. III.

3 U

mentum

(a) Med. Comment. Edin. vol. III. p. 335.

(x) Lond. Med. Obscr. et Inq. vol. 9. art. 19. p. 195.

mentum celebre non temere e forma medico ejciendum, quia semel hñve parum succellerit, judicantur.

Vinum non semper ebrietatem, nec opium somnum, nec tartarus emeticus vomitum, nec radix jalapi catharsin, nec mercurius salivationem, nec denique arsenicum lethale mortem, hominibus inferunt.

An virtuti Peruviano intermittenter, mercurio lues venerea, sulphuri plura, semper cedere inveniuntur? Ex quibz tamen hacce remedia, in his morbis depellendis, maxime esse momenti inficias illis? An penitus rejicienda sunt, quae semel vel iterum vana evaserit? Minime certe. Nec medicamentum, de quo nunc agitur, rejiciendum est, quia virtute, nunquam spem medici frustra habentis, haud praeditum est. Cur in ea virtutes, quas nunquam in ulla alio experti sumus, quaeramus? Nec ideo tamen negandum est, saepe, ubi morbus nunquam, licet neque hoc neque aliud quodvis medicamentum datum esset, incassum erat illud datum esse; quia multi, qui vel levissime se viri contaminatos extimescunt, ad remedii usum decurrunt, eoque curis et anxietatibus solitudinibus penitus liberantur.

Ex hoc hujus medicamenti effectu illud ab Aesclepiione inventum praeparatumque, quod ab ipso Galeno multis laudibus elatum, totum ex caneris ustis constabat, ad horrido huic morbo occurrendum magno fuisse usui, colligi potest. Nam id salem alkalinum et terram absorbentem contineret, quoniam non tanta semper copia abundans, quanta veneno esset subigendo, necesse est.

Hanc habet de eo Galenus: <sup>1</sup> At fluviatilium canerorum cinis, quanquam similiter praedictis efficatarius est, <sup>2</sup> substantiae tamen proprietate mirabilis est ejus in his, <sup>3</sup> qui a rabiente cane sunt morbi, effectus, isque, tam solus, <sup>4</sup> tum cum gentiana et thure, multo praestantior. Thuris sane partem esse unam oportet, quinque autem gentianae, porro canerorum decem. Ecce raro equidem aliter, <sup>5</sup> illis ustis nos sumus usi; cacterum, ad eum modum plerumque, quo Aesclepiion empiricus ille medicamentorum <sup>6</sup> peritissimus senex, concivis ac praecipuus meus, Patellia erat aeris rubri in quam impositos caneros viventes <sup>7</sup> haecenus ussit, ut in cinerem redacti facile ad laevorem <sup>8</sup> redigi possent. Hic Aesclepiion paratum semper in aedibus <sup>9</sup> hoc habebat medicamentum tempore aestivo, urens <sup>10</sup> eos post ortum Canis, quando Sol in Leonem transisset, <sup>11</sup> non nisi Luna decima octava. Porro bibendum hoc <sup>12</sup> medicamentum his, qui a cane rabido fuissent morbi praebat <sup>13</sup> quotidie, diebus quadraginta mensura cochlearii magni, aquae inspersum. At si non protinus ab initio, ve-

\* rum aliquant post dies curam cepisset demorſi, tunc quo-  
 \* tidie duo cochlearia aquae inſpergebat. Ad ipſum vera  
 \* vulnus emplaſticum applicabat medicamentum, quod ex  
 \* pice hruſta et opopanace acetoque conficitur, habens  
 \* picis libram unam, unum acetii acerrimi ſextarium ſpa-  
 \* licum, opopanacis vero uncias tres. Hæc, tametiſi a  
 \* præſenti inſtituto eſſent aliena, ſcribenda tamen cenſui,  
 \* quia magnopere medicamento huic ipſe conſiderem, ni-  
 \* mirum, cum nullus unquam eorum, qui illo fuerint uſi,  
 \* ſit mortuus (y).'

Illuſtriſſimus etiam Meadens hoc medicamentum lau-  
 davit, et haud immerito celebratum eſſe, teſtatus eſt. Qui  
 tamen aliud huic præſus diverſum, quod ni fallor nullas  
 aut certe minimas meretur laudes, inculcavit; et de quo  
 ipſe ſic loquitur. 'I have often wiſhed that I knew ſo  
 \* certain a remedy in any other diſeaſe (z).' Erat id pul-  
 vis lichenis cineres terreſtris et piperis. Quod ſummopere  
 ab illo laudatum, et ab aliis celebratum, nihili nunc æſti-  
 matur. Quidam mercurium ſedulo injuria laudaverunt.  
 Multa enim (a) exempla præſu nobis ſunt, quibus nihil  
 profuit. In diſſertationibus medicinalibus Edinburgi edi-  
 tis, juvenis in ea academia rei medicæ operam dans,  
 et gonorrhœa laborans, memoratur, qui a rabido cane  
 morſus, rabie quamvis mercurius ei per totum tempus di-  
 ligenter adhibitus eſſet, ſato tamen functus eſt (b). Quæ-  
 dam tamen exempla Sauvageho (c) aliſque memorata ſunt,  
 quibus ille videtur mercurium non ſemper fruſtra adhibuiſ-  
 ſe. Quo rectius ii faciunt, qui unguentum mercurii vul-  
 neribus admovent.

Hæc tamen de prophylactice; jamque ad alteram conſilii  
 partem progrediendum eſt.

Si remedia jam memorata non in auxilium vocata, vel  
 minus mature adhibita, ſunt, tunc morbo ipſi occurrere  
 conandum eſt, ubi primum imminentis ejus ſymptomata  
 vel leviſſima ſe manifeſtant. Medicum omnia ubique co-  
 nari, imò remedia et methodum adhibere, quæ pleriſque  
 crudelia videantur, oportet; nam, etſi ſpes futuræ ſalutis  
 fere inanis ſit, tamen miſericordum ægrum priuſus ſato  
 relinquare multo magis crudele erit; et, quamvis perpauci  
 tantum exempla ſunt ægrotorum, qui hoc morbo laborantes

3 U 2

ex

(y) Galeni de Simp. Med. Fac. lib. ix. u<sup>o</sup> 386 p. 330. 721.  
 tom. xxi.

(z) Mead, new edition published at Edinburgh 1773, p. 64.

(a) Mead, Com. Edm. vol. iii. p. 290. London Med. Obſerv.  
 et ſeq. vol. 7. appendix, p. 2. et vol. iii. p. 210.

(b) Med. Eſſ. Edm. vol. vi. 287. 315. 37.

(c) Sauvage Noſol. Meth. vol. iii. p. 241.



ex orci faucibus evasere, minime tamen desperandum est sed tentanda potius incerta remedia, quorum virtus efficax parum nobis comperta sit, limet ea humanitati et benevolentiae minus consentanea videantur.

Quapropter, in adeundis periculis, consuetudo imitanda medicorum est, qui leviter aegrotantes leniter curant, gravioribus autem morbis periculosas curationes et ancipites adhibere coguntur (a).

Quae cum ita sint, medendi consilium esse debet,

Spasmi et convulsionibus, quae evidentissime morbum consiliunt, occurrere.

Hoc consilium ad morbum tollendum minime valere, obijci mihi potest; quamdiu enim venenum, quod morbi origo est, immutatum in systemate manserit, tandiu etiam morbum, nisi mors ejus impetum praevertent, permanfurum. Neque id refellere audeo. Verum enim vero, cum nulla remedia, aut ad veneni vires destruendas, aut debellandas, postquam totum genus nervosum tam vehementer ab eo correptum sit, adhiberi posse patrat; ideo symptomata removere, nulla causae ratione habita, medici solum refert. Neque novi aut insoli quicquam haec curandi ratio habet. Contra, eadem est, quae plerisque morbis contagiosis saluti esse, comperta est. Ita in peste, typho, variolis, morbillis, ad symptomata removenda, non ad contagium, quod omnibus his ansam praebuit, tollendum, medendi consilia diriguntur. Ad hoc consilium absolvendum, varia remedia in medium proferuntur; sed, quoniam multo magis ad medicinam ornandam, et morbus tute curandos conducant, paucorum potentium, quam multorum remedium inefficacium, virtutes scire; itaque de his solum dicemus, quae experientia, quamvis parvum, aliquid auxilii ferre probavit.

Detractio sanguinis magni momenti, et non parca sed libera manu instituenda, est. Sub primum morbi insultum, ex aegro recumbente, sanguis ad deliquium animi, vel saltem ad uncias quindecim, detrahendus est.

Enemata emollientia et laxantia crebro injicienda sunt, subinde potui aliqui gratum dandum; et tertia vel quarta quaque hora, larga casulibet antispasmodici dosi, quale opium seu moschus est, sumenda. Hujus semidrachma quarta quaque hora conveniet.

Post duodecim horas, sanguis iterum ad uncias decem, vel secundum pulsus rationem, mittendus.

Si hydropsyphotia vel humorum saltidum urgeant, limoniorum, aurantiorum, aut tamarindorum pulpa sugenda est.

Clysmata

(a) Cicero de officiis, lib. 1. cap. 24.

ethico, lib. 1. cap. 24.

ethico, lib. 1. cap. 24.

Clysmata repetantur; quae ex magna parte in corpus absorbentur, et quodammodo humiditatis vicem, quae calore et magna caloris actione dissipatur, supplere possunt.

Opium, quod maxime viribus antispasmodicis pollet, in hoc morbo utendum est largis dosibus, et vel ore dandum, vel in aleum immittendum est.

Ex egregiis mercurii in tetano et opisthotono curando, effectibus eundem etiam hydrophobiae profuturum credibile est; dummodo, quantum ad salivationem inducendam satis sit, adhibeatur. An ullae mercurii preparationes aliis anteposendae sint, non pro certo dixerim; nisi ut turpethum minerale omnes hujus medicamenti formulas virtutibus aequare credam. Sed quaecumque medicamenta usurpentur, sanguinis detractio minime negligenda est, quae principem inter remedia locum, in his praecipue aegris qui morbo liberati sunt, videtur obtinuisse (c). Quo in casu sanguinis missionem minime parca manu fieri debet, alias ad uncias centum et viginti, alias autem ad centum et triginta, paucis diebus factam, esse, observatum est.

Aliud est medicamentum celebre antispasmodicum, quo, ut mihi videtur, nemo ad rabiem depellendam unquam usus est; nempe, liquor aetherius viridius, sili caustico alkalino rectificatus. Qui liquor, odori gratissimus, et in morbis convulsivis efficacissimus, multum in rabie canina curanda certe promittit. Eandem saepe hyleriae et epilepsiae insultibus occurrisse, neminem in morborum curationibus versatum latet. Unde eum rabiei profuturum, saltem non nociturum, in primis verisimile est. Quum autem nullum aliud remedium, quod ad hunc morbum tollendum valet, in promptu est, non abs re erit illius periculum facere. Aeger igitur pro se nata guttas hujusce liquoris triginta vel quadraginta ex aquae cyatho, si ea domari poterit, vel frusto panis assatas, capiat. Eodemque panni lanei madidi faucibus externis applicentur.

David Campbell, amicus et eruditus condiscipulus meus, et lauream mecum accepturus, in sua egregia de musices effectu dissertatione inaugurali, haec habet: 'Hoffmannus, Baglivi, Albinus, alique, de musices effectu salutari, moribus quorundam animalium venenosus agentibus, abunde disseruerunt. Fortasse usus ejus cum fructu in hydrophobia esset. Et quid noceret tentare?'

Si morbus omnibus his medicamentis cedere recusaverit, et si mercurius non adhibitus sit, aegrum in balneum descendere oportet.

(c) Sed

‘Sed unicum tamen remedium est,’ ut ait ille celebrissimus medicus Celsus, ‘nec opinantem in piscinam, non ante ei provisam, projicere, et, si natandi scientiam non habet, modomersum libere pati, modo attulere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satiatur; sic enim simul et sitis, et aquae metus tollitur (f).’ Magnus Boerhaavius etiam frigidam lavationem collaudavit, et aegrum nec opinantem in aquam cum tumultu projiciendum curavit, scilicet, ex animi horrore, qui inde ortus est, optimos effectus sperans. Et, quamvis temerarium tale remedium videri possit, tamen ab auctoribus exempla memoriae prodita sunt, hominum, qui in aqua submersi et ita ex faucibus urei erepti sunt (g). In quibusdam casibus, aegrum in aquam projicere, et ibi per aliquot temporis spatia eum continere, non inutile erit. Et, si suffocatur, utendum est remediis, quibus homines submersi ad sanitatem revocantur (h). Si minus frigida lavatione uti velit, aegri caput aqua frigida perfundatur oportet. Quod remedium, quamvis nunquam sanitatem restituat, tamen aliquando difficultatem deglutiendi tollit, et caetera symptomata aliquantulum mitiora reddit (i). Sed sanguinis missio, ut antea dictum est, inter omnia maxime eminet, et ejus usu quidam penitus convalescerunt. Sed hic tam optandus, tamque saultus, vix semel in centum aegris occurrit eventus. Illustrissimo Joanne Rutherford in hac academia praxis medicae professore et praelectiones clinicas tradente, aeger in nosocomion regium admissus est, qui a rabido cane morsus erat. Et, quamvis jussu medici Dundas statim aliquot doses morichi et cinnabaris, et postea medicamentum a Meadco celebratum, adsumpserit; et insuper, in aquam frigidam vicinis descenderit, et locus denique, cui venenum admotum erat, scarificationibus percutus, et unguento mercuriali quotidie inunctus sit; tamen rabidus evasit. Joannes Rutherford cum summa cura et diligentia tractavit, sanguinem ad uncias centum misit, antiphlogisticum regimen sedulo observavit, sed frustra; nam tertio vel quarto die, a morbi primo insultu, expiravit. Symptomata autem leviora erant, quam plerumque accidit ubi aeger nullum auxilium sibi adhibuit. Haec de morbi curandi methodo satis sint.

## CAPUT

(f) Celsus de Medicina, lib. 5. cap. 27.

(g) Van Helmont, *Discen.* idem, p. 286. Van Swieten, tom. iii. *Comment. in Aph. Boerh.* 1144. p. 576.

(h) Cullen's Letter to Lord Cathcart, President of the Board of Police in Scotland, concerning the recovery of persons drowned, &amp;c.

(i) Van Swieten, tom. iii. ibid.



## CAPUT XIII.

*De quibusdam experimentis in remedium apud virum Hill  
venale institutis.*

Ut omnes de compositione hujus medicamenti, antea laudati, certiores fiant, experimenta quae ad naturam ejus investigandam institui, enarrabo.

## EXPERIMENTUM I.

GRANIS nonaginta remedia a Domino Hill praeparati unam aquae calidae unciam affudi. Effervescencia, sed levissima, secuta est. Mixturae acidi nitri paululum paulatim affudi. Acidum effervescenciam hanc parvam elidit; quae peracta, tota mixtura turbula per chartam bibulam colata est.

Prima, in hoc experimento, effervescencia ex decompositione aluminis paululi orta est. Quantum autem aluminis huius remedium inest, difficile exploratu est, sed certe parce inest.

## EXPER. II.

Liquori colato, qui pellucidus et fusci coloris erat, paulatim salis tartari solutionem affudi, quae copiose materiam subalidam deiecit; postea, quantum satis erat alkali ad totam materiam deieciendam, insillatum est. Deinde per chartam colatum, et optime aqua ablutum est. Materies praecipitata bene siccata, granorum viginti sex, reliquum pulveris acido indissolubilem et siccatum granorum triginta sex, pondere, fuit.

## EXPER. III.

GRANIS viginti inodora et insipida materiae praecipitatae, aquae mistis, guttatim, quantum satis acidi vitrioli erat, adjectum est: Quod effervescenciam excitavit, et aeris fixi magnam copiam emisit. Mixtura turbida evasit; sed brevi album sedimentum deposuit, quod pulveris magnitudinem, priusquam acidum ei adjectum est, aequavit.

## EXPER. IV.

GRANIS decem ejusdem pulveris acidi nitri affudi, quod, effervescencia excitata, pulverem penitus dissolvit.

## EXPER. V.

PULVEREM, qui, in experimento primo, acido hanc dissolutus est, in aqua diffudi. Quo facto, pars ejus maxima fundum vasis perit, aliqua autem in aqua suspensa remansit; quam statim in alterum vas affudi, iterumque atque iterum idem feci. Particulae leviores siccatae, quatuor vegetabilis speciem prae se ferebant, et saporem E-nulae Campanae referebant. Particulae autem graviiores quibus boli Armenae qualitatibus praeditae erat.

Haec

Hæc experimenta eodem fere eventu instituit vir præclarus, Præceptor noster Josephus Black, chemiæ omnium peritissimus.

Licet his experimentis, et aliis supra relatis rebus, unicuique paulo prudentiori, remediū ingenui viri Hill partem efficacem detectam esse, pateat; non ideo tamen ignarum et superstitiosum vulgus, quod omnis gentis maxima facile pars est, atroque huic et horrendo malo, ob suam vitæ sortem, præ reliquis objicitur, hoc restanti simul et confirmanti fidem mihi, ac ne juranti quidem habebit. Ad quam ei faciendam indicia vel maxime luculentia et certa fides sæpe non sufficiunt. Ob quam causam, quo certius dubiū confirmetur, timidi et solliciti erigantur, turbæque tristes et furibundæ, infandam hanc pestem semper fere comitantes, quas natura territa horrore gelido refugit, prohibeantur, animus humanus ac, tanquam suis, alienis acuminis tactus, ad preces me descendere coegit, et ab ingenuo viro Hill suppliciter petere, ut suum remediū paucis contentum, in universi generis humani commodum publici juris faciat. Certe factis adeo liberali, adeo laudando, dignum præmium, mens sibi recti salutisque hominibus datæ conscia, omnibus, quos reges conferunt, splendidior titulus foret.

Ita, quæcunque mihi nota sunt de morbo, cujus natura, post operam meam ei explicando studiose positam, etiamnum tamen obscura est et nodis soluta difficilibus impedita, exposui. Vera et certa forsitan haud mihi corrigi mente comprehendere: ut veritatem summo studio indagavi; et similia vero, ut speratur, affecutus sum: <sup>6</sup> Sequimur probabiliora; nec ultra quam id quod verisimile <sup>7</sup> occurrit progredi possumus, et refellere sine pernicietate, <sup>8</sup> et refelli sine iracundia, parati sumus (b).<sup>7</sup>

Jamque valeas, celebratissima Edinbergi Academia; in perpetuum laus et nomen tuum maneat: Vosque Professores illustres semper honorandi semperque colendi, valete; longa et felix sit vita, juventutem orbis terrarum lenire dolores, et morborum luctus compescere, pergitis docentes. Valete.

Ingrati animi essem, si virum mihi amicissimum medicum simul instructissimum, Andrean Duncan, silentio transirem: Eam ingenio et moribus ac benignitate spectatum, nunquam ego obliviscar.

(b) Cæc. Disput. Tusculan. lib. 2.







